



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>






3 2044 106 478 183

*Fl.*  
*48.5*  
*14.25*  
*17 1870*  
*Bought*

HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.

LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM  
HARVARD UNIVERSITY  
BOUGHT











Hartman.

Scandinavian Flora.

I.

774

**HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.**

*Bought*



HANDBOK

I

# SKANDINAVIENS FLORA,

INNEFATTANDE

SVERIGES OCH NORGES VÄXTER,

TILL OCH MED

MOSSORNA;

<sup>AF</sup>  
*Karl Johan*  
C. J. HARTMAN.

*Tionde upplagan,*

utgifven med

RÄTTELSE OCH TILLÄGG

<sup>AF</sup>

CARL HARTMAN.

FÖRRA DELEN:

Phanerogamer och Ormbunkar.

*J. G. Klingwall.*  
Stockholm & Sista.  
STOCKHOLM

ZACHARIAS HÆGGSTRÖMS FÖRLAG

IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI

1870.

# Herbarium

*Omnis vera cognitio cognitione specifica innitatur.*

Linné Sp. Plant.

## Förord.

Ett halft århundrade har nu gått till ända, sedan denna boks första upplaga utgafs. Naturligt är, att en så lång tid måste hafva medfört många viktiga upptäckter och framsteg, många väsentligt förändrade åsikter och uppfattningssätt inom Botaniken lika väl som inom de öfriga naturvetenskaperna. Illa vore då, om närvarande bok, som under tiden blifvit många gånger reviderad och utgifven på nytt, skulle mer än andra hafva förblifvit oberörd af dessa förändrade förhållanden. Det har den icke heller; ty knappt en enda rad ur första upplagan, och säkerligen inga många ens ur den 5:te — den sista, som redigerades af den ursprunglige författaren — torde finnas oförändrade qvar i den närvarande. Och likväl tror sig utg., i och för den plan, som blifvit följd vid närvarande upplagas utarbetande, kunna fortfarande hänvisa till de Förord, som åtföljt de föregående upplagorna. Planen har nämligen i hufvudsak varit densamma nu, som tillföre, och, korteligen sagdt, gått ut på att låta boken någorlunda följa med sin tid.

De förändringar, som för detta ändamåls vinnande denna gång vidtagits, äro följaktligen till stor del af samma beskaffenhet, som vid de föreg. upplagorna. Men åtskilliga andra hafva dessutom synts utg. behöfliga och dessa äro förnämligast följande:

Alla artdiagnoser hafva underkastats en ny granskning och omarbetning, i följd hvaraf dels karaktererna i alla diagnoser, hela boken igenom, numera följa hvarandra i en och samma bestämda ordning, den hvari växtens delar utveckla sig, hvilket förut icke alltid var händelsen, dels en eller flere karakterer i en stor del af diagnoserna blifvit utbytta mot eller tillökade med nya. I slägtdiagnoserna hafva de enligt utg:s tanke viktigaste eller för åtskiljandet användbaraste karaktererna blifvit kursiverade, såsom det redan i förra upplagan skedde med artdiagnosernas. Ett betydligt antal arter, som hos oss antingen på en mansålder icke återfunnits eller så småningom utdödt, eller hvilkas förekomst efterhand



befunnits högst tvifvelaktig eller alltför tillfällig, deribland i synnerhet en mängd förvildade annuella kulturväxter, hafva uteslutits ur den egentliga Floran och fått sin plats i Bihanget. Att utg. vid verkställandet af denna flyttning, särdeles de sist nämnda växternas, i åtskilliga fall torde befinnas hafva gått inkonsequent till väga, inser han mer än väl, men vågar ock tro, att, hvarhelst man ville uppdraga gränsen mellan vårt lands verkligt inhemska, acklimatiserade och blott tillfälligt förvildade arter, det för närvarande skulle vara absolut omöjligt, att helt och hållet undvika inkonsequenser, särdeles om man icke vill alltför mycket skilja sig från hvad som är brukligt i andra länders floristiska arbeten.

Vidare hafva i denna uppl. en mängd, såsom minst behöfliga ansedda synonymer, jemte ganska många ännu i föreg. uppl. qvarstående kritiska eller andra anmärkningar vid åtskilliga arter dels blifvit uteslutna, dels ersatta af andra. Likaledes hafva en mängd obetydligare varieteter, företrädesvis sådana som befunnits endast bero af lokalförhållanden, blifvit borttagna eller endast helt flygtigt omnämnda, utom i den händelse, att deras namn kunde anses ega ett slags historiskt intresse på den grund att de af äldre svenska — särdeles af Linné — eller mer framstående utländska författare varit ansedda för egna arter. I ganska många släkten hafva arterna fått en annan anordning än förut, hvarigenom, såsom utg. hoppas, deras undersökning och jemförelse sinsemellan bör kunna underlättas. Af samma skäl hafva ock för släktens och arters uppställning dels flere, dels andra indelningsgrunder än förut mångenstädes blifvit följda, hvadan det i denna uppl. endast undantagsvis inträffar, att flere än 2 à 3 släkten eller arter förekomma sammanställda inom en och samma afdelning. De svenska genusnamnen hafva, såsom i sednaste upplagan af Exkursionsfloran utlofvades, nu blifvit äfven här ändrade, med ytterst få undantag, till likhet med dem, som Prof. Fries i Bot. Utf. 3:dje bandet föreslagit till antagande; och de Lappska ortnamnens stafningssätt har blifvit rättadt till öfverensstämmelse med Norrbottens sedan några år under arbete varande ekonomiska karteverk. Möjlighet till sistnämnda förändring har blifvit utg. beredd genom Löjtnanten vid K. Hels. Reg. Herr H. A. WIDMARKS välvilliga meddelanden.

Slutligen hafva tvenne af vår Floras mest omtvistade »kritiska» genera, *Hieracium* och *Lepigonum*, denna gång bearbetats af män, som egt vida rikare tillfällen än utg. att studera deras former i naturen, nämligen det förra af Lektor C. J. LINDEBERG. det sednare af Herr J. A. LEFFLER, hvilka haft den stora välviljan att i detta fall erbjuda sitt biträde.

Förutom dessa Herrar hafva många, i föreg. upplagor omnämnda, den skandinaviska Florans älskare, och deribland i främsta rummet de

nordiska botanisternas vördnadsvärde Nestor, ELIAS FRIES, nu likasom tillförene bistått utg. med råd och upplysningar af många slag; men äfven följande yngre botanister hafva med värderika uppgifter och meddelanden riktat närvarande upplaga: Stud. Herr H. W. ARNELL i Uppsala, Docenten Herr S. BERGGREN i Lund, Konservatorn Herr AX. BLYTT i Christiania, Studd. Hrr G. EISEN och A. STUXBERG i Uppsala, Herr EUGENE HEMBERG å Smedstorp vid Ystad, Ph. Drn Herr JOH. HULTING i Uppsala, Prov.-Läkaren Herr Dr C. HÅKANSSON i Piteå, Pharm. Kand. Herr CONR. INDEBETOU i Stockholm, Med. Drn Herr FRANZ KLER i Christiania, Herr J. A. LEFFLER i Göteborg, Stud. Herr N. S. LINNARSSON i Uppsala, Lärov.-Adj. Herr Dr A. A. W. LUND i Vester-vik, Stud. Herr R. OLDBERG i Uppsala, Docenten Herr Dr P. OLSSON i Lund, Lärov.-Adj. Herr Dr JOH. SAMZELIUS i Nyköping, Ph. Drn Herr G. R. A. THEORIN i Halmstad, Stud. Herr G. THORSTENSON i Carlstad, Löjtn. Herr H. A. WIDMARK i Luleå. Slutligen hafva Ph. Drn Herr S. ALMQVIST och Docenten Herr Dr V. B. WITTRÖCK i Uppsala haft godheten tillsända utg. ett par nyligen af dem utgifna värt-geografiska afhandlingar, ehuru dessa tyvärr kommo utg. tillhanda först sedan Handbokens tryckning så långt avancerat, att några tillägg eller rättelser ur dem icke kunde införas.

Alla dem, som sölunda på ett eller annat sätt behagat understödja utg. med råd och däd, hembär han härmed sin upprigtiga tacksägelse.

Mången, särdeles bland vår Floras äldre vänner, torde emellertid icke utan missnöje finna, och måhända känna sig hugad att klandra utg. därför, att denne stundom alldeles icke, mången gång blott till en ringa del ställt sig välvilligt gifna råd till efterrättelse. Till sin ursäkt och såsom ett litet prof på svårigheten, eller snarare omöjligheten, att i en bok af detta slag motsvara allas förväntningar och dymedelst vinna allas bifall, tager sig utg. friheten att här exempelvis ur sin brefsamling anföra några af de olikartade, icke sällan fullkomligt motsatta råd och önsknningar, som af olika korrespondenter blifvit honom meddelade rörande de åtgärder, som vore skäl att vidtaga till den nya upplagans förbättrande.

Så hafva någre tillstyrkt indragandet af åtskilliga smärre genera, som i nyare tid utbrutits ur de större Linneanska, samt af en mängd s. k. kritiska arter, såsom allt för svagt begränsade, under det att andre tvertom uppmanat utg. att öka åtminstone arternas antal genom att såsom sådana upptaga icke så få af de i förra uppl. såsom subspecies och varieteter anförda formerna. Då en och annan önskat, att flertalet varieteter skulle uteslutas på den grund, att det ändå vore omöjligt anföra »alla möjliga» sådana, hafva andre åter ansett, att de gamla varieteterna borde tillökas med åtskilliga nya, mer och mindre utmärkta. En har velat hafva bort

de svenska genusnamnen såsom »ovetenskapliga» och omöjliga att få allmänt antagna; en annan deremot, att äfven hvarje art skulle förses med särskildt svenskt namn, i förmodan att botaniken derigenom kunde blifva mera »populär». En har ansett citater af figurer ur botaniska planchverk och exsiccatsamlingar icke vara på sin plats i detta arbete, en annan att alltför få dylika deri förekomma. Önskan har blifvit uttalad, att en *utförligare* redogörelse måtte lemnas för arternas utbredning inom hvarje landskap, än den förut i Handboken gifna; men från annat håll har utg. blifvit tillrättad, att göra denna samma redogörelse *mer summarisk*, än den varit förut, och att genom indragningar i densamma bereda bättre utrymme för korta beskrifningar af hvarje art, o. s. v.

När härtill kommer, att flere af dessa och andra desiderata skulle hafva tagit ett icke obetydligt utrymme i anspråk, men Förläggaren deremot mångfaldiga gånger såsom en hufvudsak yrkat på hushållning med utrymmet, på det att arket och i följd deraf bokhandelspriset för nya upplagor ej måtte behöfva ökas, torde det för hvaroch en ligga i öppen dag, att utg., äfven med bästa vilja och om han fränsagt sig sjelf alla slags åsikter i dessa fall, omöjligen kunnat förena alla sins emellan så stridiga önsknningar och gå dem alla till mötes. Men, då han är öfvertygad, att de alla varit förestafvade af sann välvilja och rent intresse för bokens fullkomnande, om ock åsikterna om sättet för detta syftes vinnande äro snart sagdt lika många som botanisterna sjelfva, och då mången af dessa önsknningar väckt utg:s uppmärksamhet på brister, som kunde och borde afhjelpas, förringas ingalunda genom deras olikartade beskaffenhet hans tacksamhet till alla dem, som velat skänka honom ett oegennyttigt biträde.

Några för Skandinavien under sista året nyfunna växter af större intresse, om hvilkas upptäckande underrättelse icke hunnit utg. förrän på nya året, då redan den egentliga floran var färdigtryckt, upptagas under form af tillägg efter registret, der äfven några tryckfel anmärkas.

Emedan bokens sednare del, innefattande Mossorna, först något längre fram utgifves och denna gång blifvit helt och hållet omarbetad, anser sig utg. böra beledsaga densamma med ett särskildt förord, hvari redogörelse skall lemnas för behandlingen af dit hörande växter.

Örebro i Mars 1870.

Carl Hartman.



## Förkortningar af Författarenamn. \*)

- Ach.* — E. Acharius.  
*Adans.* — M. Adanson.  
*Afx.* — Afzelius, Ad. och P. C.  
*Ag.* — C. A. Agardh.  
*Ahlqv.* — A. Ahlqvist.  
*Ahnf.* — N. O. Ahnfelt.  
*Ait.* — V. T. Aiton.  
*Al. Br.* — Alex. v. Braun.  
*All.* — C. Allioni.  
*Almqv.* — S. Almqvist.  
*Anders.* — Georg Andersson.  
*Ands.* — N. J. Andersson.  
*Andrz.* — A. Andrzejowski.  
*Ankarcr.* — J. Ankarcróna.  
*Ant.* — Franz Antoine.  
*Ard.* — P. Arduino.  
*Aresch.* — Areschoug, J. E. och F. C.  
*Arn.* — Walker-Arnott.  
*Arrh.* — J. P. Arrhenius.  
*Aspegr.* — G. A. Aspegren.  
*Ax. Bl.* — Ax. Blytt.  
  
*Bab.* — C. Babington.  
*Backh.* — James Backhouse,  
*Balb.* — J. Balt. Balbis.  
*Barkh.* — Barkhausen.  
*Baumg.* — J. C. G. Baumgarten.  
*Bechst.* — J. M. Bechstein.  
*Beck.* — J. Becker.  
*Bell.* — L. Bellardi.  
*Ben.* — Beneken.  
*Berggr.* — S. Berggren.  
*Bergstr.* — C. E. Bergstrand.  
*Berk.* — M. Berkeley.  
*Bernh.* — J. J. Bernhardt.  
*Bert.* — Ant. Bertoloni.  
*Bess.* — Bald. Besser.  
*Beurl.* — P. J. Beurling.  
*Bich.* — J. E. Bicheno.  
*Big.* — Jac. Bigelow.  
  
*Billb.* — J. G. Billberg.  
*Biv.* — A. Bivona Bernardi.  
*Björnstr.* — F. J. Björnström.  
*Bland.* — O. C. Blandow.  
*Bl.* — M. N. Blytt.  
*Bl. & Fing.* — Bluff & Fingerhut.  
*Bong.* — H. G. Bongard.  
*Bor.* — A. Boreau.  
*Borkh.* — M. B. Borkhausen.  
*Bouch.* — J. A. G. Boucher.  
*Br.* — Rob. Brown.  
*Br. & Sch.* — Bruch & Schimper.  
*Br. eur.* — Bryologia europæa.  
*Br. germ.* — Bryologia germanica.  
*Brid.* — S. E. Bridel.  
*Burb.* — J. C. Buxbaum.  
*Bönn.* — C. M. F. v. Bönninghausen.  
  
*Campd.* — F. Campdera.  
*Cass.* — H. Cassini.  
*Cav.* — A. J. Cavanilles.  
*Cederstr.* — E. C. J. Cedersträhle.  
*Cham.* — A. v. Chamisso.  
*Clairv.* — De Clairville.  
*Coss. & Germ.* — E. Cosson & E. Germain.  
*Coult.* — Th. Coulter.  
*Curt.* — W. Curtis.  
*Cust.* — Custor.  
  
*DC.* — A. P. De Candolle.  
*Deinb.* — Deinböll.  
*Desf.* — R. L. Desfontaines.  
*Desp.* — N. Desportes.  
*Desv.* — A. N. Desvoux.  
*Deth.* — G. G. Detharding.  
*Dew.* — C. Dewey.  
*Dicks.* — J. Dickson.  
*Dill.* — J. J. Dillenius.  
*Drej.* — S. T. N. Drejer.  
*Drum.* — J. L. Drummond.

\*) Både de, som förekomma i första och andra (moss-)delen, upptagas här i ett sammanhang.

*Dub.* — J. E. Duby.  
*Düb.* — M. W. v. Düben.  
*Dum.* — B. C. Dumortier.  
*Dur.* — Durieu de Maisonneuve.

*E.B.* — English Botany.  
*Ehrh.* — F. Ehrhart.  
*Eis. & Sturz.* — G. Eisen och A. Stux-  
 berg.

*Ekstr.* — E. V. Ekstrand.  
*Endl.* — Steph. Endlicher.

*Fisch.* — F. Fischer.  
*Fl.D.* — Flora Danica.  
*Fl.N.* — Flora Norvegica.  
*Fl.Wett.* — Flora der Wetterau.  
*Flod.* — Floderus, Ali och M.  
*Flüg.* — J. Flügge.  
*Forb.* — J. Forbes.  
*Fors.* — J. H. af Forselles.  
*Fr.* — Elias Fries.  
*Frist.* — R. F. Fristedt.  
*Fröl.* — J. A. Frölich.  
*Fürrn.* — A. E. Füllrohr.

*Gärtn.* — J. Gärtner.  
*Gaud.* — J. Gaudin.  
*Gil. och Gilib.* — J. E. Gilibert.  
*Gm. och Gmel.* — Gmelin, J. G. och C. C.  
*Gochn.* — F. C. Gochnat.  
*Gold.* — Goldie.  
*Goldb.* — K. L. Goldbach.  
*Good.* — S. Goodenough.  
*Gorsk.* — Gorski.  
*Goss.* — C. A. Gosselman.  
*Gren. & Godr.* — M. Grenier & M. Godron.  
*Grev.* — R. K. Greville.  
*Griseb.* — A. Grisebach.  
*Gümb.* — Theod. Gümbel.  
*Günth.* — Chr. Günther.  
*Gunn.* — J. E. Gunner.  
*Guthn.* — Guthnick.  
*G. v. Ced.* — G. v. Cedervald.

*H. och Hedw.* — J. Hedwig.  
*Hall.* — A. v. Haller.  
*Hamm.* — O. Hammar.  
*Haw.* — A. H. Haworth.  
*Hay.* — F. G. Hayne.  
*Hell.* — F. X. Heller.  
*l'Her.* — l'Heritier.  
*Heynh.* — G. Heynhold.  
*Hitchc.* — E. Hitchcock.  
*Hn.* — Hartman, C. J. och C.  
*H.N.* — Herbarium Normale.  
*Hoffm.* — G. F. Hoffman.  
*Holmgr.* — Hj. Holmgren.  
*Hook.* — W. J. Hooker.  
*Hop.* — D. H. Hoppe.  
*Horn.* — J. W. Hornemann.  
*Hornsch.* — F. Hornschuch.

*Hub.* — J. W. P. Hübener.  
*Huds.* — W. Hudson.

*J. och Juss.* — A. L. de Jussieu  
*Jacq.* — N. J. Jacquin.  
*Jens.* — Th. Jensen.  
*Jord.* — H. Jordan.  
*Jur.* — J. Juratzka.

*K.* — J. Koch.  
*Kaulf.* — G. F. Kaulfuss.  
*Kindb.* — N. C. Kindberg.  
*Kit.* — Waldstein och Kitaibel.  
*Kr.* — T. O. B. N. Krok.  
*Krock.* — A. J. Krock.  
*Kröningsv.* — C. G. Kröningsssvärd.  
*Kühl.* — Kühlewein.  
*Kütz.* — F. T. Kützing.  
*Köl.* — G. L. Koeler.  
*Köll.* — J. L. Kölle.

*L. och Lin.* — Carl v. Linné.  
*L. d. y.* — C. Linné d. yngre.  
*Læst.* — Læstadius, L. L. och C. P.  
*Lagg.* — F. Lager.  
*Lam.* — J. B. Monet de Lamarck.  
*Lap.* — Ph. Pic. Lapeyrouse.  
*Larss.* — L. M. Larsson.  
*Lax.* — E. Laxman.  
*Led.* — C. F. Ledebour.  
*Leffl.* — J. A. Leffler.  
*Lehm.* — J. G. C. Lehmann.  
*Lej.* — A. L. S. Lejeune.  
*Less.* — C. F. Lessing.  
*Ley.* — F. W. v. Leysser.  
*Lge.* — J. Lange.  
*Lightf.* — J. Lightfoot.  
*Lilj.* — S. Liljebäck.  
*Lindb.* — S. O. Lindberg.  
*Lindbl.* — A. E. Lindblom.  
*Lindeb.* — C. J. Lindeberg.  
*Lindenb.* — J. B. Lindenber.  
*Lindgr.* — Sv. J. Lindgren.  
*Lindl.* — J. Lindley.  
*Lk.* — H. F. Link.  
*Loes.* — J. Loeselius.  
*Lois.* — J. L. A. Loiseleur Deslongchamps.  
*Lor.* — P. G. Lorentz.  
*Loud.* — J. C. Loudon.  
*Lundm.* — J. D. Lundmark.  
*Lönnr.* — K. J. Lönnroth.

*Mart.* — C. P. Martius.  
*MB.* — F. Marschall a Biberstein.  
*Med.* — F. C. Medicus.  
*Meisn.* — C. F. Meisner.  
*Menz.* — A. Menzies.  
*Mer.* — F. V. Mérat.  
*Mert.* — F. C. Mertens.  
*Mey.* — Meyer, C. A. och E. H.  
*Mich.* — P. Micheli.

- Michx.* — F. A. Michaux.  
*Mielichh.* — Mielichhofer.  
*Mik.* — Mikan.  
*Mill.* — Ph. Miller.  
*Mitt.* — W. Mitten.  
*MK.* — Mertens & Koch.  
*Montag.* — B. Montagne.  
*Moris.* — R. Morison.  
*Mühl.* — H. Mühlenberg.  
*Müll.* — Müller, C. och O. F.  
*Murr.* — J. A. Murray.  
*Myr.* — C. G. Myrin.  
*Möhr.* — P. G. H. Möhring.  
  
*Nag.* — Karl Nägeli.  
*Neck.* — N. J. de Necker.  
*N. v. Es.* — C. G. Nees von Esenbeck.  
*Nestl.* — C. G. Nestler.  
*Nordst.* — C. F. O. Nordstedt.  
*Norm.* — J. M. Norman.  
*Not.* — J. de Notaris.  
*Nutt.* — Th. Nuttall.  
*Nyl.* — F. Nylander.  
*Nym.* — C. F. Nyman.  
  
*Ols.* — P. Olsson.  
*Osbeck.* — P. Osbeck.  
  
*Pall.* — P. S. Pallas.  
*Panz.* — G. W. Panzer.  
*Parl.* — Fil. Parlatore.  
*Parn.* — R. Parnell.  
*PB.* — Paliset de Beauvois.  
*P. Br.* — Patr. Browne.  
*Pers.* — C. H. Persoon.  
*Peterm.* — W. L. Petermann.  
*Pfeif.* — L. Pfeiffer.  
*Poir.* — J. L. M. Poiret.  
*Poll.* — J. A. Pollick.  
*Pourr.* — P. A. Pourret.  
  
*Rabenh.* — L. Rabenhorst.  
*Reb.* — J. F. Rebentisch.  
*Reich.* — Reichenbach, H. G. L. och Gust.  
*Relh.* — R. Relhan.  
*Ren.* — F. Renealm.  
*Retz.* — A. J. Retzius.  
*R. Hn.* — R. Hartman.  
*Rich.* — L. C. Richard.  
*Rostk.* — F. G. Rostkov.  
*Rottb.* — Chr. Fr. Rottböll.  
*Roz.* — F. Rozier.  
*RS.* — Roemer & Schultes.  
*Rudb.* — O. Rudb.  
*Rupr.* — F. J. Ruprecht.  
*Röhl.* — J. C. Röhring.  
  
*Salisb.* — R. A. Salisbury.  
*Saut.* — A. Sauter.  
*Schag.* — J. A. Schagerström.  
*Scheuchz.* — J. Scheuchzer.  
  
*Sch. och Schimp.* — W. P. Schimper.  
*Sch. & Spenn.* — Schimper och F. K. L. Spenner.  
*Schied.* — C. J. W. Schiede.  
*Schk.* — Chr. Schkuhr.  
*Schlecht.* — D. v. Schlechtendal.  
*Schleich.* — J. G. Schleicher.  
*Schleid.* — M. J. Schleiden.  
*Schmid.* — C. C. Schmidel.  
*Schnitzl.* — Ad. Schnitzlein.  
*Schrad.* — H. A. Schrader.  
*Schreb.* — J. C. D. v. Schreber.  
*Schult.* — J. A. Schultes.  
*Schum.* — C. F. Schumacher.  
*Schwagr.* — F. Schwagrichen.  
*Schweig. & Körst.* — Schweiger & Körte.  
*Schwein.* — L. D. v. Schweinitz.  
*Scop.* — J. Scopoli.  
*Seid.* — T. Seidel.  
*Ser.* — N. C. Seringer.  
*Sibth.* — J. Sibthorp.  
*Sieb.* — F. W. Sieber.  
*Sill.* — O. L. Sillén.  
*Sjöstr.* — M. G. Sjöstrand.  
*SM.* — Sebastiani & Mauri.  
*Sm.* — Smith, Christ. och J. E.  
*Somf.* — S. C. Sommerfeldt.  
*Sond.* — W. Sonder.  
*Spreng.* — Curt Sprengel.  
*Sternb.* — C. v. Sternberg.  
*Stev.* — C. Steven.  
*St. Hil.* — A. de St. Hilaire.  
*Sull. och Sulliv.* — W. S. Sullivant.  
*Sutt.* — C. Sutton.  
*Sw.* — O. Swartz.  
*Sw.B.* — Svensk Botanik.  
  
*Tayl.* — Th. Taylor.  
*Ten.* — M. Tenore.  
*Theod.* — K. F. Thedenius.  
*Theor.* — G. R. A. Theorin.  
*Th. Fr.* — Th. M. Fries.  
*Thom.* — E. Thomas.  
*Thor.* — J. Thore.  
*Thuill.* — J. L. Thuillier.  
*Thunb.* — C. P. Thunberg.  
*Tourn.* — J. P. de Tournefort.  
*Tratt.* — L. Trattinick.  
*Trin.* — C. B. Trinius.  
*Turcz.* — N. Turczaninow.  
*Turn.* — Daws Turner.  
*Turr.* — A. Turra.  
  
*Ust.* — P. Usteri.  
  
*Vaill.* — Seb. Vaillant.  
*Vent.* — Etienne P. Ventenat.  
*Vill.* — D. Villars.  
*Viv.* — D. Viviani.  
  
*Wahlb.* — P. F. Wahlberg.



*Wahlst.* — L. J. Wahlstedt.  
*Waldst.* — se *Kit.*  
*Wallm.* — J. H. Wallman.  
*Wallr.* — F. G. Wallroth.  
*Web.* — G. H. Weber.  
*Weig.* — C. E. Weigel.  
*Weih.* — A. Weihe.  
*Weis.* — F. W. Weiss.  
*Wend.* — G. F. W. Wenderoth.  
*Wendl.* — J. C. Wendland.  
*Wess.* — C. J. Wessén.  
*Westerl.* — C. A. Westerlund.  
*Wg.* — G. Wahlenberg.  
*Wib.* — Chr. Wibell.

*Wich.* — M. Wichura.  
*Wikstr.* — J. E. Wikström.  
*Willd.* — C. L. Willdenow.  
*Wils.* — W. Wilson.  
*Wimm.* — Fr. Wimmer.  
*Wistr.* — J. A. Wiström.  
*With.* — W. Withering.  
*Wm.* — se *Wikstr.*  
*Wm.* — Weber & Mohr.  
*Wulf.* — Xav. v. Wulfen.

*Zett.* — Zetterstedt, J. W. och J. E.

*Ångstr.* — Joh. Ångström.

## Öfriga förkortningar och tecken. \*)

a. — allmän.  
 afd. — afdelning.  
 auth. — autentika exemplar.

b. blr — blå blommor.  
 Back. — Backar.  
 Bergsr. — Bergsrötter.  
 Betesm. — Betesmarker.  
 bl. — blad.  
 blomk. — blomkorg.  
 blr — blommor.  
 Blek. — Blekinge.  
 Boh. — Bohuslän.  
 br. blr — bruna blommor.

Dal. — Dalarne.  
 Dik. — Diken.

enl. — enligt.  
 ex. — exemplar.

f. — figur. Då *Herbarium normale* (H.N.)  
 åberopas: fascikeln.  
 f. — såsom mått: fot.  
 Fig. — Figur.  
 Finnm. — Finnmarken.  
 Fjv. eller Fjellv. — Fjellväxt.  
 Fukt. — Fuktiga ställen.  
 följ. — följande. } (Art eller slägte.)  
 föreg. — föregående. }  
 förf. — författaren.

g. blr — gula blommor.  
 Gestr. — Gestrikland.  
 g.g. — Gästgifvaregård.

Gottl. — Gottland.  
 gr. blr — gröna blommor.  
 Gård. — Gårdar och Byar.

h. — häfte.  
 Hafsstr. — Hafsstränder.  
 Hall. — Halland.  
 Hed. — Hedar.  
 Helsl. — Helsingland.  
 Herb. — Herbarium.  
 Herjed. — Herjedalen.  
 hv. blr — hvita blommor.

Jtl. eller Jemtl. — Jemtland.

K:a — Kyrka.  
 Källdr. — Källdrag.

Lerj. — Lerjord.  
 lin. — linier (längdmått).  
 Lpl. — Lappland.  
 Lpm. — Lappmark.  
 Lul. — Luleå.

Medelp. — Medelpad.  
 mell. — mellan, mellersta.  
 meränd. — merändels.

N. — Norge.  
 n. — norra.  
 n. — nästan.  
 N. F. — Naturliga familjen.  
 Ner. — Nerike.  
 Nordl. — Norska Nordlanden.  
 Norrl. — Sv. Norrland.

\*) De förkortningar, som icke här upptagas, upplysas lätt af texten och sammanhanget.

odl. — odlad.  
omkr. — omkring.  
omv. — omvänt.  
Ost-Finm. — Ost-Finnmarken.

qv. — kvarter (längdmått).

r. — rar.  
r. blr — röda blommor.  
Romsd. — Romsdalen.  
Rosl. — Roslagen.  
rödl. — rödlätta nära hvita blommor.

Sk. — Skåne.  
Skand. — Skandinavien.  
Smål. — Småland.  
sn — socken.  
st. — ställen.  
st. bland Norska växtställen — stift; t. ex.  
Bergens stift.  
storl. — storlek.  
stränd. — stränder.  
Stånd. — Ståndare.  
Sv. — Svensk; Sverige.  
Södml. — Södermanland.

t. — (efter Fig.) tabell.  
t. — tum.  
Tellem. — Tellemarken.  
Trondhj. — Trondhjem.

Um. — Umeå.  
Uppl. — Uppland.  
utg. — utgifvaren.  
Utl. — Utländsk.

v. — vestra.  
vanl. — vanligtvis.  
Var. — Variation eller Varierar.  
Vatt. — Vatten.  
VB. — Vesterbotten (landskapet, icke länet).  
Verm. — Vermland.  
Vest-Finm. — Vest-Finnmarken.  
Vestml. — Vestmanland.  
VG. — Vestergötland.  
viol. blr — violetta blommor.  
Vät. — Våta ställen.  
Väg. — vid vägar.

Åkerr. — Åkerrenar.  
Åkr. — Åkrar.  
Ångml. — Ångermanland.

Äng. — Ängar.

ö. — östra.  
öfr. — öfriga, öfrigt.  
ÖG. — Östergötland.  
Öl. — Öland.

⊙ — enårig rot.  
⋈ — tvåårig rot.  
⌘ — flerårig rot.  
⌘ — träd eller buske.  
⌘⌘ — småbuske, eller buskväxt närmande sig till ört.  
♂ — hanblomma eller hanväxt.  
♀ — honblomma eller honväxt.  
0 (noll) — utmärker, att delen saknas.

\* — i marginalen, framför artnamnet, att arten är funnen endast i Norge.

† — i marginalen, att växten ej är egentl. Skandinavisk, utan i nyare tider förvildad.

× — i marginalen, att växten är en hybriditet.

1, 2, 3 etc. efter varaktighetstecknet utmärker de månader, i hvilka växterna blomma; hos Kryptogamerna, när frukten mognar.

— (minus) — i diagnosen betecknar, att delens form varierar mellan de båda utmärkta extremerna; t. ex. äggrundt—afslånga; att delen stundom är äggrund, stundom afslång eller närmande sig den ena eller andra formen.

— vid växtställen, att örten blifvit funnen i och mellan de uppgifna orterna, hvarvid dessas ordning tillkännager den förmodade riktningen af växtens utbredning.\*) — Der detta tecken saknas, äro blott strödda ställen, der den träffas, bekanta.

\*) T. ex. *TILIA parvifolia* Ehrh. (Sk.—Ångml. Dal. Verm. Boh. etc.) d. v. s. Linden, såsom ett sydligt träd, upphör vid östra kusten i Ångermanland, inuti landet i Dalarne och Vermland att växa vild, samt går vid vestkusten upp i Bohuslän.

— *FAGUS sylvatica* L. (Sk.—ÖG. VG. Boh.) Boken sprider sig från Skåne, på östra sidan till ÖG., på vestra sidan till Bohus; längre nordligt saknas den.

— *CAREX globularis* L. (Lpl.—Gestr. Vestml. Nerike Verm. Dalsl. VG. Smål.) Från sitt nordliga stamhåll sprider sig denna starr icke längre ned än till nämnda provinser.

# ÖFVERSIGT AF SLÄGTEN

ENLIGT DET LINNEISKA SEXUALSYSTEMET.

---

## 1 KLASSEN

### MONANDRIA.

#### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 1 **SALICORNIA.** Blommor *utan kalk*, hvarje inom ett grönt, köttigt skärmfjäll, tillsammans bildande *en trind blomkolf*. Ståndare 1—2. Märke 2—*flerklufvet*. Frukt: fröblåsa. *Köttig, ledad, bladlös hafsstrandväxt*. — Pag. 185.
- 2 **HIPPURIS.** Blomhülle bildande *en omärklig kant* på fruktämnets topp. Ståndare fästade på fruktämnet. Märke *enkelt*. Frukt: enfröig nöt. *Vallenväxt med kransvisa blad*. — Pag. 143.
- 3 **ZOSTERA.** Ståndare och pistiller fästade skiftevis bredvid hvarandra på en fri, platt och jemnbred *blomkolf*, inom ett *slidlikt hölster*, täckta af 2 klaffar längs öfre bladytan. Märke *2deladt*. Frukt *nöttlik*. *Gräslika hafsväxter*. — Pag. 229.  
(*Alchemilla Aphanes* 4, 1.)

#### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(*Blitum virgat.* och *capit.* 5, 2. *Callitriche* 21, 1.)

---

## 2 KLASSEN

# DIANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.)

† Blommor utan hylle, inom en öppning i den bladlika stammens [stambladets] kant.

- 4 LEMNA. Stånd. 2, stund. 1. Frukt enfröig nöt ell. enrummigt, fåfröigt fröhus. *Små rundade ell. lancetlika, platta och bladlika, vanl. flytande växter med trådlika rötter hängande i vattnet.* — Pag. 223.

†† Hylle dubbelt, af foder och sambladig krona. Fruktämne 1.

\* Buskar, med regelbunden krona.

- 5 SYRINGA. Blomfoder otydligt, 4tandadt. Krona trattlik, likformigt 4klufven. Ståndknappar inneslutna i kronpipen. Fr. 2rummigt, 2fröigt fröhus. *Buske med motsatta blad.* — Pag. 56.

- 6 LIGUSTRUM. Foder och krona som hos föreg. Ståndknappar utskjutande. Frukt: 2rummigt, fåfröigt bär. *Buske som föreg.* — Pag. 56.

\*\* Örter, med oregelbunden krona.

- 7 VERONICA. Foder 4deladt. Krona hjul- ell. något trattformig, med 4, olikformigaflikar. Fr. 2rummigt fröhus. *Örter med mest motsatta blad.* — Pag. 62.

- 8 PINGUICULA. Foder 5deladt. Krona läppformig gapande, med sporre. Stift omärkligt. Fröb. enrummigt, öppnande sig i toppen. *Blad endast vid roten, och ensamma skafade blr.* — Pag. 70.

- 9 UTRICULARIA. Fod. 2bladigt. Krona läppformig maskerad, nedre läppen huflik, med sporre. Stift utdraget. Fröb. enrummigt, omkringskuret. *Vattenväxter med findelade blad; blr i klase.* — Pag. 69.

††† Hylle som i föreg. afd. Fruktämnerna, slutl. smånötter, 4.

- 10 LYCOPUS. Foder 5flikigt. Krona trattlik, 4klufven, med en större, urnupen flik. *Strandväxt med motsatta, n. parklufna blad, kransvisa blr.* — Pag. 49.

\*) Till andra klasser hörande växter med 2 ståndare äro: *Salicornia* 1, 1; *Cladium* och *Rhynchospora alba* 3, 1; *Senebiera didyma* och *Lepidium rud.* 15, 1; *Cypripedium* 20, 2; *Fragaria* 23, 2.

11 **SALVIA**. Fod. 2läppigt. Krons 2läppigt; öfre läppen hvalflik, hoptryckt. *Blad motsatta, blr kransvisa i toppen.* — Pag. 49.

†††† Hylle dubb., af foder och fribladig krona.

12 **CIRCEA**. Foder och krona 2bladiga; kronbl. 2delade. Frukt 2rumm. fröhus. *Lundväxter med motsatta blad, blr i klase.* — Pag. 142.

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(*Coleanthus* och *Anthoxanthum* 3, 2.)

---

### 3 KLASSEN

## TRIANDRIA.

1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Örter.

\* Hylle dubbelt, af foder och sambladig krona.

13 VALERIANA. Blomfoder bildande ett ringformigt bräm ofvanpå fruktämnet. Blomkrona trattlik, *olikformigt* 5klufven. Fr. nötlik, beklädd med det slutl. i *fjunlika* strålar upplösta blomfodret. *Växter med motsatta, mest parbladigt delade blad.* — Pag. 36.

14 VALERIANELLA. Foder med intet eller tandlikt bräm. Krona trattlik, *likformigt* 5klufven. Frukt: nötlik, *utan fjun. Blad motsatta hela.* — Pag. 37.

\*\* Hylle en enkel kronlik kalk.

15 IRIS. Blomkalk 6delad, med kort pip; *de yttre flikarne stora, tillbakaböjda, de inre uppräta. Stift kort. Märken kronbladlika. Fröhus 3rummigt. Växter med svärdlika omslidande blad, stora liljelika blr.* — Pag. 208.

16 CROCUS. Kalk 6klufven, med *mycket lång* pip och *likformiga* flikar. Stift *utdraget*. Märken uppåt vidgade tandade eller flikiga. Fröh. 3rumm. *Lökväxter.* — Pag. 209.

(*Montia* och *Koenigia* 3, 3. *Asperula tinct.* *Galium trifid.* o. *Alchem.*  
*Aphanes* 4, 1. *Empetrum* 22, 3.)

†† Halfgräs med ax ell. småax af tegellagda skärmsjäll.

\* Småax plattade, af 2radigt tegellagda skärmsjäll.

17 CYPERUS. Skärmsjäll *talrika* (16—24), i 2 tydligt *skiljda* rader, de 2—3 nedersta tomma. — Pag. 231.

18 SCHOENUS. Skärmsjäll *färre* (8—10), *de motsittande omslutande hvarandra* med kanterna, de 3—6 nedre tomma. — Pag. 231.

\*\* Ax eller småax trinda af rundtom tegel-lagda själl.

a — Kalkborst slutl. långa, släta.

19 ERIOPHORUM. Skärmsjäll *likformiga*. Kalkborst vid hvarje nöt *talrika*, slutligen utväxande till *mycket långa, ull-lika* hår. *Axen snart hvila af de ofta tumslånga håren.* — Pag. 234.

20 TRICHOPHORUM. Det *nedersta* skärmsjället *förlängdt med en grof och trubbig udd af axets längd*. Kalkborst vid hvarje nöt 4—6, längre än nöten ell. axet. *Strån tätt tufvade, nedtill fjälliga, öfversta fjället med ett syl-lik bladämne.* — Pag. 234.

b — Kalkborst korta, sträfvä ell. 0.

- 21 CLADIUM. De nedre 3—4 skärmfjällen *smärre och tomma*. Kalkborst 0. Ståndare 2. Nöten inom ett yttre, bräckligt skal. *Blad taggsågade*. — Pag. 231.
- 22 RHYNCHOSPORA. Skärmfjäll *som hos föreg.* Nöt *omgifven af* korta, sträfvä borst och upptill *med bihang* af stiftets quarsittande bas. *Spenstligt bladigt strå*. — Pag. 231.
- 23 HELEOCHARIS. Könlösa skärmfjäll 0, ell. 1—2, *större än de öfr.* Nöt och borst *som hos föreg.* Strån *bladlösa med ett ensamt ax i toppen*. — Pag. 233.
- 24 SCIRPUS. Skärmfjäll *som hos föreg.* Borst 0, eller korta och sträfvä. Nöt *utan* bihang. *Strå dels bladlöst, dels bladigt, dels en-, dels flerstigt*. — Pag. 232.  
(*Juncus conglom., effusus och supinus* 6, 1.)

+++ Gräs, med blr utan skärmfjäll.

- 25 NARDUS. Småax af 2 blomfjäll, ordnade till ett smalt, ensidigt ax. *Gräs med borstlika blad och bladlöst strå från rotstocken*. — Pag. 277.

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

+ Småax i öppen eller axlikt hopdragen vippa, enblommiga.

\* Småax utan skärmfjäll.

- 26 COLEANTHUS. Blomfjäll 2, det yttre med borst i spetsen, det inre 2köladt och urnupet mellan de 2 utlöpande sträfvä nerverna. Ståndare 2. Hinnfrukt fri, längre än blomfjällen. — Pag. 275.

\*\* Småax med 2 skärmfjäll; pist:s märken utskjutande vid blomfj:s spets.

- 27 PHLEUM. Skärmfjäll *fria*, liklånga, båda *med borstlikt utdragen ryggnerv*; blomfjäll 2, *utan* borst. *Något styfva gräs med cylindrisk, axlikt hopdragen vippa*. — Pag. 276.
- 28 ALOPECURUS. Skärmfjäll *nedtill hopväxta, utan* borst; blomfjäll ett enda, *försedt med ryggborst*. *Mjukare gräs än föregående, med likadan vippa*. — Pag. 276.
- 29 BALDINGERA. Skärmfjäll *fria*, kölade, *utan* borst; blomfjäll 2, *utan* borst, med små pensel-lika bifjäll [felslagna blr] vid basen. *Strandgräs med tålblommig vippa*. — Pag. 277.

\*\*\* Småax med 2, n. lika långa skärmfj.; pist:s märken utböjda vid blomfj:s bas.

a — Blomfjällen vid basen omgifna af långa hår.

- 30 PSAMMA. Både skärm- och blomfjäll *fasta*; det yttre blomfj. med en omärklig styf borst i spetsen. *Sandgräs med ax- eller lancettlik tål vippa*. — Pag. 270.
- 31 CALAMAGROSTIS. Blomfjäll *hinnaktiga*, det yttre med hårfin borst. *Blomn. mer och mindre utbredd vippa*. — Pag. 271.

b — Blomfj. utan omgifvande hår.

- 32 MILIUM. Skärmfj. med *rundad* rygg; det yttre blomfj. *konvext*, uppblåst, af fast [icke hinnaktig] beskaffenhet, *utan* borst. *Lundgräs med mycket gles vippa*. — Pag. 274.
- 33 CINNA. Skärm- och blomfjäll *örtartade* [gröna], med *hvas* rygg; de förra något längre; yttre blomfjället *med* kort, rak borst. *Stort och bredbladigt lundgräs med gröna småax*. — Pag. 274.
- 34 AGROSTIS. Skärmfjäll *köladt rännformiga*; blomfjäll 1, eller 2, olikstora, *hinnaktiga* [n. hvita]. *Småax än med, än utan* borst. — Pag. 273.
- \*\*\*\* Skärmfjäll betydligt oliklånga; märken som i föreg. afd.
- 35 APERA. Småax *med ett borstlikt ämne* till en andra blomma. Skärmfj. utan borst. Blomfjäll *örtartade* [gröna], det yttre med *lång hårlig* horst tätt under spetsen. *Skärm- och blomfjäll af lika beskaffenhet*. — Pag. 273.



- 36 STIPA. Småax utan ämne till en andra blomma. Skärmfjäll borstuddiga; yttre blomfjället slutl. styft, med *styf, ledad och vriden* borst. *Borsten n. quarterslång.* — Pag. 274.

(*Melica unifl., Anthoxanthum, Catabrosa, Colpodium.*)

†† Småax i öppen eller axlik vippa, flerblommiga.

\* Småax med antingen könlösa eller enkönade blr jemte de 2-könade.

a — Pist:s märken utskjut. vid blomf:s spets; småax 2blommiga.

- 37 SETARIA. Småax *omgifna af hårlika svepeborst* och förenade i *en enda*, tät trind axlik vippa. Skärmfj. oliklånga. Nedre blomman könlös, af hinnaktiga fjäll; den öfre af 2 läderaktiga fjäll, 2könad. — Pag. 275.

- 38 PANICUM. Småax *utan svepeborst*, bildande *flere smala ax* förenade i vippa. Skärmfjäll 2, olikstora, det inre *af småaxets längd*, 5nervigt med en kort borst ell. udd; yttre blomfj. nervigt, *med krökt borst*; för öfr. som föreg. — Pag. 275.

- 39 DIGITARIA. Småax *utan svepeborst*, bildande *flere smala ensidiga ax*, samlade n. i flock ell. qvast. Skärmfj. olikstora, det yttre litet ell. felslående, det inre *kortare än småaxet*, 3nervigt, borstlöst; *alla blomfj. borstlösa*; för öfr. som föreg. — Pag. 275.

b — Pist:s märken som i afd. a —; småax 3blommiga.

- 40 ANTHOXANTHUM. Det inre skärmfjället *dubbelt längre* än det yttre. Mellersta blomman liten 2könad, utan borst; sidoblarna *af ett fjäll, könlösa*, borstbärande. *Vippan smal, n. axlik.* — Pag. 277.

- 41 HERIOCHLOA. Skärmfj. *liklånga*. Den mellersta blomman 2könad, sidoblarna *hänbl.* Skärm- och blomfjäll *hinnspetsade.* — Pag. 277.

c — Pist:s märken utböjda vid blomf:s bas.

- 42 PHRAGMITES. Småax *mångblommiga*. Skärmfjäll olikstora, *kölade*. De öfre blrna *omgifna af hår*, 2könade, den nedersta tom ell. med blott ståndare, hårlös. Blomfj. utan borst. *Mycket högt och bredbladigt vallengräs med brun vippa.* — Pag. 270.

- 43 MELICA. Småax 1—2blommiga, med ett klubblikt ämne, i förra fallet till en andra — i sednare till en 3:dje blomma. Skärmfj. olikstora, *trindryggade*. Blomfj. *utan* borst. — Pag. 270.

- 44 HOLCUS. Småax 2blomm. Skärmfj. olikstora, *kölade*. Den öfre blomman med endast ståndare, och yttre fjället *borstbärande*; den nedre 2könad, utan borst. *Mjuka gräs.* — Pag. 270.

(*Avena elatior, Molinia.*)

\*\* Alla blr 2könade med tydlig borst [undant. *Avena elat.*, som vanl. har en hanblomma; ett par *Festuca* utan borst].

a — Skärmfj. af nedersta blommans längd ell. längre; yttre blomfj. i spetsen 2klufvet.

- 45 AVENA. Skärmfj. *trindryggade*. Yttre blomfjället *mer än* 5nervigt, med krökt ryggborst. *Vippan utbredd, stund. smal ell. axlik, af stora småax.* — Pag. 267.

- 46 TRisetum. Skärmfj. *kölade*. Yttre blomfj. *högst* 5nervigt, med ryggborst *vid ell. ofvan* midten. — Pag. 268.

- 47 AIROPSIS. Skärmfj. *trindryggade*. Yttre blomfj. *som hos föreg.*, med ryggborst *nedom* midten. *Småax knapp linjelånga.* — Pag. 268.

b — Skärmfj. som i afd. a —; yttre blomfj. icke 2klufvet.

- 48 CORYNEPHORUS. Småax 2blommiga. Skärmfjäll n. liklånga, längre än blrna; yttre blomfj. med en *på midten liksom skarfvad, mot spetsen tjockare, trubbig* ryggborst. *Tufvad sandgräs med vid basen håriga blr.* — Pag. 268.

- 49 VAHLODEA. Småax och skärmfj. som hos föreg. Yttre blomfjället styft *brosk-*

*artadt*, med *grof, finspetsad* ryggborst. Blrna vid basen omgifna af hår. *Plattbladigt fjellgräs med slak, brun vippa*. — Pag. 269.

- 50 AIRA. Småax 2—3blommiga. Skärmfj. som hos föreg. Blomfj. *tunna hinnaktiga*, det yttre med hel ell. fintandad spets, *hårfin* ryggborst. *Mest smalbladiga gräs*. — Pag. 269.

c — Skärmfj. alltid kortare än den närmaste blomman; yttre blomfj. hvassköladt.

- 51 DACTYLIS. Småax 3—7blommiga. Skärmfj. *mycket* olikstora; yttre blomfj. *5nervigt*, med kort borst i *spetsen*, inre fjället 2uddigt. Fruktämne *glatt*. — Pag. 258.

- 52 SCHEDONORUS. Småax 5—12blommiga. Skärmfj. *föga* olikstora; yttre blomfj. *mångnervigt*, med borst tätt *nedom* spetsen. Främne *hårigt*. Vanligen med *lutande eller slak vippa*. — Pag. 260.

d — Skärmfj. som i afd. c —; yttre blomfj. trindryggadt.

- 53 FESTUCA. Skärmfj. 1—3nerviga, det yttre *åtm. hälften* så långt som det inre. Yttre blomfj. med borst i *spetsen* [sällan utan]; det inre 2flikigt. [Blr 3—15.] *Vanl. med upprät vippa*. — Pag. 259.

- 54 VULPIA. Skärmfj. som hos föreg., det yttre 2 ell. flere gånger kortare än det inre. Yttre blomfj. med lång borst i *spetsen*. [Blr omkr. 6.] *Vippan smal*. — Pag. 260.

- 55 BROMUS. Skärmfj. 3—mångnerviga; yttre blomfj. med borst *nedom* spetsen. [Blr 5—15.] *Småax leml. stora*. — Pag. 261.

(Triodia, Koeleria i nästa afd.)

\*\*\* Alla blr 2könade [undant. *Molinia*, som har en könlös blomma], med ingen ell. omärklig borst.

a — Skärmfj. längre än de nedre blrna i småaxet.

- 56 TRIODIA. Skärmfj. af småaxets längd, *trindryggade*; yttre blomfjället *urnupet*, med en trubbig tand i urskärningen, utan borst, samt med 2 hårpenslar vid basen. *Nedliggande med smal klaselik vippa af 5—8 korta och tjocka småax*. — Pag. 267.

- 57 FLUMINIA. Skärmfj. olikstora, något kortare än småaxet, *kölade*; yttre blomfj. i spetsen *sargtandadt*, utan borst, med 2 hårpenslar vid basen. *Stort rörlikt vatten-gräs*. — Pag. 267.

- 58 KOELERIA. Skärmfj. som hos föreg.; yttre blomfj. i spetsen *helt*, med omärklig borst; det inre 2flikigt, med 2, sträfvä nerver. [Blr 2—4.] *Sandgräs, med smal, före och efter blomn. sammandragen axlik vippa*. — Pag. 267.

b — Skärmfj. kortare än de nedre blrna, olika stora.

- 59 MOLINIA. Skärmfj. *spetsiga hela*, med vanl. 3 kägellika åtskiljda blr, den öfversta meränd. smalare, könlös och lätt affallande; yttre blomfj. trindryggadt, *otydligt 3nervigt*, med trubbad, *icke* hinnaktig spets. — Pag. 266.

- 60 COLPODIUM. Skärmfj. som hos föreg., med 1—2, något skiljda aflånga blr; yttre blomfj. trindryggadt, *otyd.* 3nervigt, med trubbig *hinnaktig* spets. *Styft. bredbladigt fjellgräs, med smal, vanl. brun vippa*. — Pag. 266.

- 61 CATABROSA. Skärmfj. med *trubbad ell. sargad* spets; blr 1—2 [säll. 3] åtskiljda, aflånga; yttre blomfj. trindryggadt, 3nervigt, med sargad ell. snedt afskuren *hinnaktig* spets. *Mjuka, rent gröna, i förh. till storleken bredbladiga gräs*. — Pag. 266.

- 62 GLYCERIA. Skärmfj. som hos föreg., det yttre 1-, det inre 3nervigt; blr 2—13, utan hår vid basen åtskiljda, aflånga, alla fruktsamma; yttre blomfj. trindryggadt, 5—mångnervigt, för öfr. som föreg. *Vatten- och strandgräs med vippa af glesblommiga småax*. — Pag. 265.

c — Skärmfj. som i afd. b —, men n. lika stora [undant. *Poa annua*].

- 63 ARCTOPHILA. Skärmfj. *trindryggade*, med *trubbad* spets, det yttre 3-, det inre

5nervigt; blr 3—6, vid basen omgifna af styfva hår, åtskiljda; yttre blomfj. *trindryggadt*, n. inervigt, med *afrundad* spets. *Stort strandgräs, med långa slaka, hårfina vippgrenar.* — Pag. 264.

64 BRIZA. Skärmfj. *trindryggade*, hvällda, bredare mot den rundade spetsen, mångblommiga; yttre blomfj. *trindryggadt*, hvälldt, otydligt nervigt, *trubbigt* med hjertlik bas. *Småaxen glest sittande, vanl. hängande, n. hjertlika.* — Pag. 262.

65 POA. Skärmfj. *kölade spetsiga*, med 2—många tattsittande äggrunda blr; yttre blomfj. *köladt, spetsigt.* — Pag. 262.

(*Schedonorus, Festuca, Bromus secal.*)

+++ Småax med svepe, gytrade i axlik vippra, flerblommiga.

66 SESLERIA. Småax i rund ell. oval, tät vippra, med *svepe af tomma odelade fjäll* vid basen. Skärmfj. sylspetsade, 2—3blommiga; yttre blomfj. i spetsen försedt med *flere korta borst*, af hvilka ryggnervens är störst. — Pag. 275.

67 CYNOSURUS. Vippra tät, *ensidig*, af småax parvis förenade inom ett *pardeladt svepe*. Skärmfj. sylspetsade, 2—5blomm. Yttre blomfj. sylspetsadt. — Pag. 258.  
(*Setaria.*)

+++ Ledadt ax.

\* Småax en-, högst 2blommiga.

68 LEPTURUS. Ax smalt, n. syl-lik, med *ensamma* enblommiga småax, insänkta i hålor på axfästet. Skärmfj. 2, *sittande i bredd* och betäckande det *borstlösa* blomfj. — Pag. 257.

69 HORDEUM. Småax 3 *tillsamman* i hvarje ax-led, enblommiga; det mellersta 2-könadt, de 2 på sidorna vanl. hanblr. Skärmfj. 2, *långspetsade*; yttre blomfj. *långt borstspetsadt.* — Pag. 257.

70 ELYMUS. Småax 2—4 i *hvarje axled*, 2blomm., ell. *enblommiga med ett kvar-sittande skaft* till andra blomman. Skärmfj. 2, spetsade eller borstbärande, sittande *båda på yttre sidan* af småaxen. Yttre blomfj. med ell. utan borst. — Pag. 257.

\*\* Småax minst 3blommiga.

71 LOLIUM. Ax platt, 2sidigt, af 3—mångblomm. småax utan skaft, ett i hvarje axled, *vändande kanten* [ej sidan] *till* det gemensamma *fästet*. Skärmfjäll *ett enda, vid småaxets yttre kant.* — Pag. 257.

72 BRACHYPODIUM. Småax mångblomm., ett i hvarje axled, *med kort skaft*. Skärmfj. 2, *olikstora*; yttre blomfj. borstspetsadt. *Spensliga gräs med smalt glest ax.* — Pag. 258.

73 TRITICUM. Småax som hos föreg., *utan skaft*. Skärmfj. 2, *olikstora*, likformiga med yttre blomfjället [neml. i toppen kort borstbärande eller ej, efter som detta har borst eller icke]. *Temligen höga gräs med mer och mindre glest, 2sidigt ax af plattade småax.* — Pag. 255.

(*Alchemilla Aphanes* 4, 1. *Chenopod. polysperm.* 5, 2.)

### 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

74 KOENIGIA. Blomkalk *enkel kronlik*, djupt 3delad. Frukt: en af kalken innesluten nbt. — Pag. 178.

75 MONTIA. Blomfoder *2bladigt*. Krona *sambladig* trattlik, på en sida delad till basen med 5flikigt bräm. Fröhus 3skaligt, 3fröigt. — Pag. 173.

76 HOLOSTEUM. Foder *5deladt*. Kronbl. 5, *fria*, tandade. Stånd. 3—5. Fröh. i toppen 6tandadt, mångfröigt. *Blåaktig växt med motsatta blad.* — Pag. 128.  
(*Elatine* 8, 4. *Stellaria media* 10, 3.)

## 4 KLASSEN

# TETRANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Blomkorg af talrika små blr gytttrade på ett gemensamt fäste inom en flerbladig holk.

\* Frukstens topp naken [utan fruktkrona].

77 **GLOBULARIA.** Holkfjäll tegel-lagda. Blomfäste fjälligt. Blomfoder bägarlikt, inneslutande nöten. Blomkrona 2läppig flerklufven. *Blad hela skiftevisa.* — Pag. 73.

\*\* Frukstens topp med borstlik ell. hinnaktig fruktkrona.

78 **TRICHERA.** Holkfj. i en n. dubbel-krans. Blomfäste konvert, hårigt. Krona 4-klufven. Skalf. omkring toppen omärkligt hinnkantade samt derinom med en *mångstrålig* fruktkrona. *Stjelklblad motsatta; blomk. plattad.* — Pag. 35.

79 **SUCCISA.** Holk tegel-lagd. Fäste *kägellikt, fjälligt.* Krona 4klufven. Skalf. med *5flikig* toppkant, *5strålig* fruktkrona. *Bladen motsatta hela, blomk. klotrund.* — Pag. 35.

80 **SCABIOSA.** Holk n. enkel. Fäste *kägel-likt*, beklädt *med borstlika fjäll.* Krona 5klufven. Skalf. med *odelad* hinnkant omkring toppen, fruktkrona *5strålig.* — Pag. 36.

81 **DIPSACUS.** Holk tegel-lagd. Fäste *kägel-likt*, med *smala styfva stickande fjäll.* Krona 4klufven. Skalf. 4hörniga, med *omärkl.* hinnkant på toppen samt en *hinnaktig*, affallande fruktkrona. *Blomkorg vid mognaden taggig.* — Pag. 35.

†† Blr utan holk; fruktämne inom det sambladiga, mer och mindre djupt flikade blomhylllet.

\* Blomhylle dubbelt, af foder och krona.

82 **PLANTAGO.** Blr i *ax.* Foder 4deladt. Blomkrona trattlik 4klufven, *mycket kortare* än de långa ståndarne. Fukt: omkringskuret fröhus. *Örter med enkla blad [hos oss] endast vid roten.* — Pag. 73.

83 **CENTUNCULUS.** Blr *enstaka.* Foder 4—5klufvet. Krona klocklik 4—5klufven, *längre* än de inneslutna ståndarne. Fukt som hos föreg. *Mycket liten ört, med enkla blad.* — Pag. 71.

(*Gentiana* 5, 1. *Mentha* 14, 1. *Limosella* 14, 2. *Litorea* 21, 4.)

\*\* Blomhylle enkel kalk.

84 **SANGUISORBA.** Blr i *rundadt ax.* Blomkalk *kronlik* med 4deladt bräm, pipen slutl. tillhårdnande och inneslutande en *karpell.* *Ört med skiftevisa parbladiga blad.* — Pag. 148.

85 **ALCHEMILLA.** Blir i knippe. Kalk foderlik Sklufven, hvarannanflik mindre, stund. omärkl. Stift utgående n. från fruktämnets bas. Frukt: 1—2 karpeller. Ört med rundade flikiga ell. delade blad, små gylltrade blr. — Pag. 148.

86 **MAJANTHEMUM.** Blir i klase. Kalk kronlik, hjulformig 4delad, med tillbakaböjda flikar. Frukt 2rummigt bär. Enkel ört med hjertlika blad. — Pag. 215.  
(*Thesium* 5, 1. *Ulmus* 5, 2.)

+++ Blomkrona sambladig 4-säll. 3klufven ell. delad, fästad ofvanpå fruktämnets. Ört med 4—10 blad i krans.

87 **SHERARDIA.** Blomkrona trätlik, med tydlig pip, 4deladt bräm. Frukt: 2 sammanhängande småfrukter, hvarje med 3tandad topp. Blr utan skaft, inom samväxta svepeblad. — Pag. 37.

88 **ASPERULA.** Krona som hos föreg. 3—4flikig. Småfr. som hos föreg. med otandad topp. Blr kort skaftade, utan svepe. — Pag. 37.

89 **GALIAM.** Krona hjulformig, utan märklig pip, 3—4klufven ell. delad. Småfr. som hos föreg. — Pag. 38.

++++ Blomkrona fribladig.

90 **CORNUS.** Blomfoder 4tandadt, ofvanpå fruktämnets. Kronblad 4. Frukt: 2rummig stenfrukt. Blad motsatta hela. — Pag. 76.

(*Rhamnus* och *Evonymus* 5, 1. *Senebiera didyma* och *Draba muralis* 15, 1. *Cardamine hirsuta* 15, 2.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(*Alchemilla Aphanes* och *Galium* 4, 1. *Gentiana* 5, 1. *Ulmus* och *Cuscuta* 5, 2. *Chrysosplen. tetrandr.* 8, 2.)

## 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3 eller flere.

+ Blomhülle dubbelt.

91 **ILEX.** Blomfoder 4tandadt. Krona hjulformig, 4delad. Pist. med 3—4 märken utan stift. Bärlik stenfrukt med 3—4 nötlika frön. Buske ell. litet träd med läderaktiga, i kanten torntaggiga blad. — Pag. 76.

92 **RADIOLA.** Foder n. 4deladt, hvarje del 2—3flikig. Krona 4bladig. Fruktämne ensamt, med 4 stift, slutl. 8rummigt fröhus. Mycket liten klynnedlad ört. — Pag. 116.

93 **BULLIARDA.** Fod. 4klufvet. Krona 4bladig. Fruktämnerna 4, utan stift, slutligen lika många, flerfröiga småfrukter. Liten strandört med motsatta blad. — Pag. 140.

++ Blomhülle enkel foderlik kalk ell. 0.

94 **POTAMOGETON.** Blomkalk 4bladig. Fruktämnerna 4, utan stift, slutl. 4 med en läderaktig hud beklädda, oskaftade nötter. Vattenväxter med enkla blad. — Pag. 224.

95 **RUPPIA.** Blomkalk 0. Ståndarknappar utan strängar, fästade 2 och 2 på ett litet fjäll omkring axfastet. Pist. 3—7, slutl. lika många vanl. långt skaftade nötter. Saltsjöväxter med trådmala blad. — Pag. 228.

(*Cerastium tetrandr.* och *semidecandr.* *Saginæ* 10, 5.)

## 5 KLASSEN

# PENTANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Blomhülle enkel kalk.

- 96 GLAUX. Blomkalk klocklik 5klufven färgad. Frukt inom kalken, enrummigt, 5-väggigt fröhus. *Liten strandört med motsatta hela blad.* — Pag. 71.
- 97 THESIUM. Kalk trattlik 4—5klufven. Frukt ett enda frö inom kalkens tillhårdnade, nötlika bas. Ört med skiftevisa smala blad. — *Den Svenska arten med 4-klufven kalk och 4 ståndare.* — Pag. 179.  
(*Ulmus* 5, 2.)

†† Hülle dubbelt, af foder och sambladig krona.

\* Frukttännen, sedan smånötter, 4 i kronans botten. *Örter med strödda hela blad.*

a — Kronans svalg bart [utan knölar ell. fjäll]; smånötter släta.

- 98 ECHIAM. Blomfoder 5deladt. Krona n. klocklik, med olikformigt 5klufvet bräm. Smånötter benhårda. *Blr i sammansatt ax.* — Pag. 46.
- 99 LITHOSPERMUM. Blomfoder n. 5deladt. Krona trattlik, likformigt 5klufven. Smånött. benhårda. *Något sträfvä växter med lancellika blad.* — Pag. 46.
- 100 STENHAMMARIA. Foder och krona som hos föreg. Smånött. med tunnt hinnaktigt skal. *Glatt strandväxt med breda blad.* — Pag. 46.
- 101 PULMONARIA. Foder n. cylindriskt, 5kantigt, 5flikigt. Krona som hos föreg., med konkavt bräm. Smånött. glatta. *Något sträfhåriga lundväxter.* — Pag. 46.

b — Kronans svalg tillslutet af knölar ell. fjäll; smånött. taggiga.

- 102 CYNOGLOSSUM. Foder n. likformigt 5klufvet. Krona trattlik; svalget slutet af hvalfika knölar. Smånött. nedplattade, öfverallt taggiga. *Upp till gråaktigt sammetshårig ört.* — Pag. 47.
- 103 ECHINOSPERMUM. Foder och krona som hos föreg.; pipen n. tillsluten med fjäll. Smånött. 3kantiga, i kanterna taggiga. *Något styfva och sträfhåriga växter.* — Pag. 47.

c — Kronans svalg som i afd. h —; smånött. släta.

- 104 SYMPHYTUM. Foder likformigt 5deladt. Krona bägarlik, med svalget slutet af långa fjäll. Smånött. fästade medelst ett hål vid basen. *Sträfvä bredbladiga växter.* — Pag. 44.
- 105 ANCHUSA. Foder som hos föreg. Krona trattlik, med konkavt bräm och rak

pip; svalg. tillslutet med hvalfika *knölar*. Smånött. *kantiga*, fästade medelst ett hål vid basen. *Något stor och sträff ört*. — Pag. 44.

106 LYCOPSIS. Kronpipen *krökt*; för öfr. som föreg. *Mycket sträfhårig åkervväxt*. — Pag. 45.

107 MYOSOTIS. Foder *som hos föreg.* Krona *hjulformig* ell. trattlik; svalget *som hos föreg.* Smånött. *plattade*, fästade med basen vid ett *platt* fäste. — Pag. 45.

108 ASPERUGO. Foder slutl. *olikformigt* klufvet och *platt hoptryckt*. Krona *trattlik*; svalget *som hos föreg.* Smånött. *plattade*, fästade med sin öfre del vid ett *pelarlikt* fäste. *Slak snärjande ört, med fodret plattadt likt en gåsfo* omkr. *smånötlerna*. — Pag. 47.

\*\* Fruktämne ett enda, inom kronan, enrummigt.

a — Pistillens märke enkelt. Fröhus med centralt fröfäste.

α — Med bladig stjelk.

109 ANAGALLIS. Blomkrona *platt, hjulformigt 5delad*. Märke klotrundt. Fröhus *kringskuret*. *Grenig ört med hela blad*. — Pag. 71.

110 LYSIMACHIA. Krona *klock-* ell. *hjulformig*, djupt *5klufven*. Ståndarsträngar vid basen *samvdxta*. Märke föga vidgad, tvärhugget. Fröh. *5- ell. 10väggigt*. *Örter med motsatta eller kransvisa blad*. — Pag. 70.

111 NAUMBURGIA. Foder och krona meränd. djupt *6delade, bägarlika*. Stånd. vanl. *6, fria*, fästade på kronans bas. Märke och fröhus *som hos föreg.* *Vattenväxt med motsatta blad*. — Pag. 71.

β — Med bladen i rosett nedtill, och bladlös stängel.

112 HOTTONIA. Foder *5deladt*. Krona *fallik*, med *5deladt* bräm. Stånd. fästade i svalget. Märke klotrundt. Fröh. *affallande öppnadt*. *Vattenväxt med kammflikade blad*. — Pag. 72.

113 ANDROSACE. Fod. *5standadt*. Krona *trattlik*, med n. *äggformig, upptill sammandragen* pip, inneslutande ståndarne. Märke klotr. Fröh. *5väggigt*. *Ört med blr i flock*. — Pag. 72.

114 PRIMULA. Fod. *som hos föreg.* Kr. *tratt-* eller *fallik*, med *smal, öppen* pip, inneslut. ståndarne. Märke klotr. Fröh. *5- ell. 10väggigt*. *Örter med blr i flock*. — Pag. 71.

b — Märke 2klufvet. Fröhus med fröfästen på väggarne.

115 MENYANTHES. Fod. *5deladt*. Krona *trattlik*, med *kort* pip och vidgad, *invändigt hårigt* bräm. Stift *utdraget*. *Vattenväxt med blr i klase*. — Pag. 54.

116 GENTIANA. Foder 2—5klufvet. Krona *bägar-* ell. *trattlik*, 4—5flikig. Stånd. fästade ned i kronpipen, med *alltid raka* knappar. Stift *0*. *Örter med motsatta hela blad*. *Då hyllet är 4klufvet, äro ståndarne 4*. — Pag. 57.

117 ERYTHRÆA. Foder 5klufvet. Kr. *trattlik*, med *lång* pip, *5deladt*, n. *platt* bräm. Stånd. fästade nära svalget, med slutl. *spiralvridna* knappar. Stift *något utdraget*. *Örter som i föreg. släkte*. — Pag. 58.

\*\*\* Fruktämne ett, inom kronan, tvårummigt.

a — Frukten fröhus.

118 CONVULVULUS. Fod. *5deladt*. Krona *klocklik*, grundt *likformigt* 5flikad, *veckig*. Märke 2—3klufvet. *Slängerväxter med stora blr i bladveckan*. — Pag. 43.

119 DATURA. Fod. omvänt *bägarlikt, 5standadt*. Krona *trattlik* med stort *likformigt* och *klocklikt, veckigt* bräm. Fröh. *4väggigt*. *Bredbladig ört*. — Pag. 59.

120 VERBASCUM. Fod. djupt *5klufvet*. Krona n. *hjulformig*, med *kort* pip och *olikformigt* 5deladt bräm. Fröh. *öppnande sig i toppen*. *Höga enkla växter, med blr i ax*. — Pag. 60.

- 121 **HYOSCYAMUS**. Fod. båglik, med *vidgad* djupt *5standadt* bräm. Krons *trattlik*, med klocklikt *olikformigt* bräm. Fröh. öppnande sig med lock. *Klibbhårig ört*. — Pag. 59.

(*Erythraea* i föreg., *Azalea* i nästa afd.)

b — Frukten bär.

- 122 **LYCIUM**. Fod. båglik, *2läppigt*. Krons *trattlik*, med 5klufvet bräm. Ståndarknappar *fria*. Något *tornig buskväxt*. — Pag. 58.
- 123 **SOLANUM**. Fod. *likformigt* 5klufvet. Krons *hjulformig* 5klufven. Ståndarknappar *längsefter tätt förenade*. *Slingrande buskväxt*, eller *örter*, med *blir i knippen* eller *flockvisa från sidan af stjelen*. — Pag. 59.

\*\*\*\* Fruktämne inom kronan, flerrummigt.

- 124 **POLEMONIUM**. Foder djupt 5klufvet, *utan* foderholk. Krons med kort pip, *klocklikt*, 5deladt bräm. Ståndarnes fjäll-likas bas *fästad i kronpipen*. Fröh. 3rummigt. *Örter med parbladiga blad, talrika blir*. — Pag. 54.
- 125 **DIAPENSIA**. Foder 5deladt, *inom* en foderholk af 2—3 skärmbblad. Krons *fatlik*, 5klufven. Ståndarne *fästade mellan kronflikarne*. Fröh. 3rummigt. *Låg, tuffvad fjellväxt med enblommiga stänglar*. — Pag. 55.
- 126 **AZALEA**. Foder 5deladt, *utan* foderholk. Krons klocklik, 5klufven. Ståndarne *fästade i blommans botten*. Fröhus 2—3rummigt. *Låg fjellbuske*. — Pag. 169.

(*Rhododendrum* 10, 1.)

\*\*\*\* Fruktämne under blomman.

a — Krons likformigt 5flikig.

- 127 **SAMOLUS**. Blomfoder n. 5deladt. Blomkrons *fatlik*, med kort och vid pip, 5deladt bräm. Ståndare *fria*, *fästade midt emot kronflikarne*. Märke *odeladt*. Fröh. enrummigt, öppnande sig i toppen. *Strandväxt med skiftevisa blad*. — Pag. 71.
- 128 **CAMPANULA**. Fod. 5deladt. Kr. *klocklik* 5flikig. Stånd. *fria*, *fästade på fjäll i kronans botten*. Märke *3klufvet*. Fröh. 3rummigt [vanl. öppnande sig med *håll* på sidorna]. *Örter med fullkomligt klocklika, vanl. blå blir*. — Pag. 41.
- 129 **PHYTEUMA**. Fod. 5deladt. Kr. *5deladt*, med i början sammanhängande, *slutt. stjernlikt utbredda* flikar. Stånd. *fria*. Märke 2—3deladt. Fröh. 3rummigt. — Pag. 43.
- 130 **JASIONE**. Blir *samlade i blomkorg* med mångbladig holk. Fod. och krons 5delade. Ståndarknappar *med basen hopväxta*. Märke 2klufvet. Fröhus 2rummigt. *Ört med skiftevisa blad*. — Pag. 43.

b — Krons olikformigt 5flikig.

- 131 **LOBELIA**. Foder 5deladt. Kr. med snedt *2läppigt*, 5flikigt bräm. Ståndarknapp. *hopväxta*. Frukt fröhus. *Vattenväxt, med enkel stängel*. — Pag. 43.
- 132 **LONICERA**. Fod. mycket litet, 5standadt. Kr. n. *trattlik*, med *olikformigt* 5klufvet bräm. Stånd. *fria*. Frukt: bär. *Buskar med motsatta blad*. — Pag. 40.

(*Viburnum* och *Sambucus* 5, 3.)

+++ Krons af fria blad.

\* Örter, med oregelbunden krons.

- 133 **VIOLA**. Blomfoder 5deladt, med korta *bihang* nedåt. Blomkrons 5bladig, med sporre. Ståndarknappar *tätt förenade*. Fröh. enrummigt *3väggigt*. Örter med *stipler och oftast hjerlikas blad*. — Pag. 118.
- 134 **IMPATIENS**. Fod. af 2, *mycket små*, och ett stort *färgadt* blad med sporre. Krons 5bladig. Knappar *sammanhängande*. Fröh. med 5, från basen *elastiskt uppspringande* väggar. Ört med *ledad saftig stjeln*, *skiftevisa blad*. — Pag. 111.

\*\* Buskar, med regelbunden krons.

- 135 **EVONYMUS**. Fod. 4—5deladt. Kr. af 4—5 blad, *fästade på ståndarfästet*. Märke



otyd. *4flikigt*. Fröh. 4—5rummigt [rödt]. *Buske med motsatta hela blad, 4-kantiga grenar.* — Pag. 76.

- 136 **HEDERA**. Foder *5standadt*. Krona af 5 blad, fästade på *ståndarästet*. Märke odeladt. Fr. 5rummigt, 5fröigt bär. *Klängande buske med skiftevisa, flikiga blad.* — Pag. 77.
- 137 **RHAMNUS**. Fod. kort bägerlikt, *4—5flikigt*. Krona af 4—5 små fjäll-likade blad, fästade på *fodret*. Stånd. 4, 5. Märke urnupet eller flerdeladt. Frukt: 2—4 rummig bärlik stenfrukt, med 2—4 frön. *Buskar med hela blad, trinda grenar.* — Pag. 135.
- 138 **RIBES**. Fod. bägerlikt ell. skålformigt, *5flikigt*. Krona som hos föreg., 5bladig. Stift 2deladt ell. 2klufvet. Fr. *enrummigt, mångfröigt* bär. *Buskar med skiftevisa flikiga blad.* — Pag. 134.  
(*Parnassia* 5, 4. *Erodium* 16, 1. *Geranium* 16, 2.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

† Blomhylla enkel kalk.

\* Ört. Fruktämne med korta trådlika stift; frukt: rundadt frö inom en tunn hinna [fröblåsa].

a — Med 5 trådlika fjäll mell. ståndarne.

- 139 **HERNIARIA**. Blomkalk foderlik 5delad. Kronbl. förkrumpta till 5 trådlika fjäll. Fröblåsa löst inneslutande fröet. *Liten nedtryckt ört med strödda blad.* — Pag. 173.

b — Utan de trådlika fjällen; blomkalk foderlik, utan bihang.

- 140 **CHENOPODIUM**. Blomkalk 5delad. Frön inom en ganska tunn vidhängande fröblåsa, cirkelrunda, *alla plattliggande* [fästade med *sidan*, icke kanten] i botten af den 5kantiga kalken. *Bredbladiga örter, med små gytttrade blr.* — Pag. 184.
- 141 **BLITUM**. Lik föreg., men fröen antingen *alla, eller en del fästade på kant* i kalken [de öfriga i detta fall, med *sidan*, som hos *Chenop.*]. — Pag. 183.
- 142 **SCHOBERIA**. Kalk 5delad. Frön *plattliggande*, cirkelrunda *med en framskjutande haklik knöl* i kanten [af den spiralvridna brodden]. *Strandört med köttiga blad.* — Pag. 185.

c — Som föreg. *afd.*; blomkalk färgad, med ett bihang på fikarnes rygg.

- 143 **KOCHIA**. Kalk *5klufven*, slutl. med ett *hornlikt* bihang på fikarnes rygg. Brodden dubbelviken. *Hårig strandört.* — Pag. 184.
- 144 **SALSOLA**. Kalk *5bladig*, slutl. med ett *vinglikt* bihang på bladens rygg. Brodden spiralvriden. *Strandört med köttiga blad.* — Pag. 185.  
(*Polygonum* 8, 3.)

\*\* Träd. Fruktämne platt, i spetsen klufvet i 2, på insidan ludna märken; frukt: vingfrukt.

- 145 **ULMUS**. Blomkalk trattlik *flikig färgad* [rödaktig]. Vingfrukt platt, enfröig. *Träd med oflikade blad, små gytttrade blr.* — Pag. 180.

†† Hylle dubbelt, af foder och sambladig krona; fruktämne inom hyllet.

- 146 **CYNANCHUM**. Blomfoder 5klufvet. Krona *hjulformig*, n. 5delad. Ståndarne *hopväxta* likt en pelare omkring pistillen. Frukt: 2 *fröhölsor*, med *fröfjun*. Ört med *motsatta blad.* — Pag. 57.
- 147 **CUSCUTA**. Foder 4—5klufvet. Krona *tratt- ell. klocklik*, 4—5klufven. Stånd. 4—5, fria. Frukt ett vid basen omkringskuret *fröhus*. *Trådlika bladlösa oäkta parasiter, med blr gytttrade i hufvud inom skärm.* — Pag. 43.  
(*Gentiana* 5, 1.)

+++ Hylle dubb., af foder [ofta otydligt] och fribladig krona, fästad ofvanpå fruktämnet. Frukt dubbel skalfrukt [af 2, slutl. från hvarandra lossnande delfrukt.] [*Umbellater.*]

\* Blr i hufvud ell. gytttrade med korta ell. inga skaft i enkla flockar.

148 ERYNGIUM. Blr tätt gytttrade på ett kägel-liket fäste i *ensamma hufvud*. Foder *5bladigt*. Kronbl. dubbelvikna inåt. Frukt *fjällig*. *Strandväxt med breda veckiga och tornflikiga blad.* — Pag. 84.

149 SANICULA. *Blomhufvud i flock*. Fod. *5bladigt*. Kronbl. med inböjd spets. Fr. *kroktaggig*. *Lundväxt med handdelade blad.* — Pag. 83.

150 HYDROCOTYLE. *Blomflock enkel* [af n. oskaftade blr]. Foder *omärkligt*. Kronbl. hela. Frukt platt, af med kanten sammanhängande, *glatta* delfrukt. *Trådläk, krypande vattenväxt med sköldlika blad.* — Pag. 84.

151 BUPLEURUM. *Flock n. enkel*, af blr dels med, dels utan skaft. Fod. *omärkligt*. Kronbl. hela inböjda. Fr. n. trind *småtaggig*. *Kustväxt med odelade smala blad.* — Pag. 83.

\*\* Blr skaftade i sammansatt flock. Delfrukt plattade från ryggen mot fogen.

a — Foder tydligare, 5standadt. [Kronbl. genom spetsens inböjning omv. hjertlika.]

152 LASERPITIUM. Delfr. konvexa, med 4, *bredt vingkantade* åsar samt under dessa liggande oljekanal. *Med allmänna och enskilda svepen.* — Pag. 79.

153 HERACLEUM. Delfr. platta ovala, med *tydliga korta klubblika* oljeränder mellan de 3, *ganska låga* åsarne. *Utan allm. svepe.* — Pag. 79.

154 PEUCEDANUM. Delfr. plattade elliptiska, med inre, *utanpå icke synliga*, oljekanal och *låga trubbiga* åsar. *Med allm. svepe.* — Pag. 80.

b — Fodertänder otydliga; kronbl. gula ell. blekgula.

155 PASTINACA. Kronblad äggrundt aflånga, kölade inrullade. Delfr. *platta ovala*, med *tydliga* n. till basen nående *oljeränder* mellan de *ganska låga* åsarne. *Allm. och enskilda svepen 0.* — Pag. 79.

156 ANETHUM. Kronbl. rundade, med inböjd spets. Delfr. *plattade ovala*, med breda platta kanter och till basen nående *oljeränder* mellan de *något upphöjda* och *hvarsa* åsarne. *Svepe 0.* — Pag. 79.

157 LEVISTICUM. Kronbl. rundade med en liten inböjd udd. Delfr. *ovala konvexa*, med *håga och tunna* åsar samt oljekanal. *Med allm. svepe.* — Pag. 69.

158 SILAUS. Kronbl. omv. äggrunda, med inböjd spets. Delfr. *aflånga, lågt konvexa* med upphöjda *hvarsa* åsar, *utan* oljeränder. *Allm. svepe 0.* — Pag. 81.

c — Fodertänder otydliga; kronbl. hvita.

159 IMPERATORIA. Kronbl. omv. *hertlika*, med inböjd udd. Delfr. *plattade*, vid basen och i spetsen *intryckta*, med upphöjda åsar samt oljekanal. *Glatt växt, utan allm. svepe.* — Pag. 80.

160 CONIOSELINUM. Kronbl. omv. *hertlika*. Delfr. *högt konvexa* [n. halstrinda], med *håga hvarsa* åsar och 3 *fina* oljeränder i åsdälderna. Stift *icke* utvecklade under blomningstiden. *Flock mångstrålig; allm. svepe 0.* — Pag. 81.

161 SELINUM. Kronbl. *som hos föreg.* Delfr. med en *oljerand* i hvarje åsdäld, för öfr. *som hos föreg.* Stift *fullt* utvecklade vid blomningen. *Flock och svepe som hos föreg.* — Pag. 80.

162 ANGELICA. Kronbl. *aflångt lancetl.*, *spetsade*. Delfr. *plattade ovala*, med upphöjda *hvarsa* åsar och oljekanal. *Allm. svepe 0, ell. affallande.* — Pag. 80.

\*\*\* Blomflock sammansatt. Delfruktar med hög rygg [frukten lika bred eller bredare mellan delfr:s rygg än vid fogen].

a — Frukt klotrund—afslång, glatt. Allm. och enskilda svepen 0.

163 APIUM. Foder omärkligt. Kronblad äggrunda med inrullad spets. Frukt. n. *klotrund*, med upphöjda åsar *samt* olje kanaler. — Pag. 82.

164 ÆGOPodium. Fod. omärkligt. Kronblad omv. hjertlika. Fr. *äggformig*, med upphöjda släta åsar, *utan* olje kanaler. — Pag. 82.

165 CARUM. Fod. och kronbl. som hos föreg. Fr. *afslång*, med upphöjda trubbiga åsar *samt* *ensamma* olje kanaler. — Pag. 82.

166 PIMPINELLA. Fod. och kr. som hos föreg. Fr. *rundadt äggformig*, med platta randlika åsar *samt* *flere* olje kanaler bredvid hvarandra. *Ört* med *en gång parbladigt delade* blad. — Pag. 82.

b — Frukt klotrund—afslång, glatt. Allm. svepe 0, ell. snart affallande.

167 CICUTA. Fod. *tydligt*, 5standadt. Kronbl. omv. *hjertlika*. Frukt *klotrund*, med breda släta åsar och mellanliggande oljeränder. *Stor vattenväxt*. — Pag. 82.

168 CORIANDRUM. Fod. och kr. *som hos föreg.* Frukt *fullkomligt klotrund*, *ihållig*, med 10 låga, något hvassa åsar, *utan* oljeränder. *Stora kanbl.* — Pag. 77.

169 OENANTHE. Fod. och kr. *som hos föreg.* Fr. *afslång* refflad, med olje kanaler. — *Vattenväxter*. — Pag. 81.

170 HELOSCIADIUM. Fod. *otydligt*, 5standadt. Kronbl. *ägggrunda* raka. Frukt *elliptisk tvärhuggen*, plattad från sidorna, med upphöjda åsar, *samt* olje kanaler. *Krypande ell. flytande vattenväxt*. — Pag. 83.

171 ÆTHUSA. Fod. *omärkligt*. Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. *äggformig*, med höga kölförmiga åsar *samt* olje kanaler. *Glänsande glatt ört*. — Pag. 81.  
(*Selinum*, se ofvan.)

c — Frukt rundad—afslång, glatt. Med både allm. och enskildt svepe.

172 CONIUM. Fod. *omärkl.* Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. *rundadt äggformig*, med upphöjda *rynliga* åsar, *utan* olje kanaler. *Svepen mångbladiga*. — Pag. 77.

173 PLEUROSpermum. Fod. *tydligt*, 5standadt. Kronbl. omv. äggrunda, *platta*. Fr. *äggformig*, med 5 *upplåsta* kölade yttre åsar utanpå 5 smärre inre, *samt* mellanliggande olje kanaler. *Hög växt med mångbladiga svepen och oledad stielk*. — Pag. 77.

174 HALOSCias. Fod. *som hos föreg.* Kronbl. omv. äggrunda med inböjd spets. Fr. *afslång*, med höga hvassa åsar *samt* olje kanaler. *Glatt kustväxt*. — Pag. 81.

175 SIUM. Fod. *som hos föreg.* Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. *elliptiskt oval*, med *trubbiga* åsar *samt* olje kanaler. *Vattenväxter*. — Pag. 83.

176 FALCARIA. Fod. och kr. *som hos föreg.* Fr. *uppåt bredare*, n. *klubblik*, med *trubbiga* åsar, och olje kanaler. *Grenig ört*. — Pag. 83.

177 BUNium. Fod. *omärkligt*. Kr. som hos föreg. Fr. *äggformig*, *uppåt spetsad* mot de 2, kägellika stiftfötterna, med *upphöjda randlika* åsar, *samt* olje kanaler. *Enkel stielk med allm. svepe af 1—3 blad*. — Pag. 82.

d — Frukt n. äggformig, hårig ell. taggig.

178 DAUCUS. Fod. *5standadt*. Kronblad omv. *hjertlika*, oliformiga. Frukt oval, *utan* spröt, med olje kanaler och *borstlaggiga* åsar, *nåstan släta åsdalder*. *Ört med tät blomflock, pardelade svepeblad*. — Pag. 79.

179 LIBANOTIS. Fod. af 5, *utdragna* tänder. Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. n. äggformig, *utan* spröt, *öfverallt luden*, med *trubbiga* åsar *samt* olje kanaler. *Ört med tät blomflockar, hela svepeblad*. — Pag. 81.

- 180 **TORILIS.** Fod. och kronbl. som hos föreg. Fr. n. äggformig, utan spröt, med borsttaggiga åsdålder, nästan släta randlika åsar. Sträfs ört, med hela svepeblad. — Pag. 78.
- 181 **ANTHRISCUS.** Fod. omärkl. Kronbl. omv. äggrunda. Fr. äggformig, kroktaggig, med kort, glatt spröt, utan åsar och oljekanal. Utan allm. svepe. — Pag. 78. (*Sanicula*, se ofvan.)

e — Frukt smal, lancettlik—jemnbred; allm. svepe 0.

- 182 **CEREFOLIUM.** Fod. omärkl. Kronbl. omv. äggrunda ell. något hjertlika. Frukt lancettlik glatt, med kort, kantigt spröt, utan åsar och oljekanal. Glatta ell. mjukhåriga örter. — Pag. 78.
- 183 **CHÆROPHYLLUM.** Fod. och kr. som hos föreg. Fr. lancettlik jemnbred, glatt, utan tydl. spröt och åsar, med oljekanal. Något stråfhåriga örter. — Pag. 78.
- 184 **SCANDIX.** Fod. och kr. som hos föreg. Fr. jemnbred, kortare än det mycket långa styvhåriga sprötet. Åsar platta, åtskiljda af fårör, hysande oljekanal. Något spåd, n. glatt ört, med stull. 2 tum långa frukter. — Pag. 78.
- 185 **MYRRHIS.** Fod. otydl. 5standadt. Kronbl. omv. hjertlika. Fr. lancettlik glatt, utan spröt, med högt kölade, ihåliga åsar, utan oljekanal. Ört med tumslånga frukter. — Pag. 77.

(*Oenanthe* och *Falcaria*, se ofvan.)

### 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

- 186 **VIBURNUM.** Blomfoder 5standadt. Kronsambladig 5klufven klocklik [de könlösa kantbladen i blomknippet större och plattade]. Frukt: bär med ett enda frö. Buske med motsatta flikiga blad. — Pag. 36.
- 187 **SAMBUCUS.** Fod. som hos föreg. Kr. sambladig skål-lik 5flikig. Fr. bär med 3 frön. Ört ell. buske med motsatta parbladigt delade blad. — Pag. 36. (*Holostium* 3, 3. *Polygonum avicul.* 8, 3. *Stellaria media* 10, 3.)

### 4 Ordn. TETRAGYNIA. Pist. 4.

- 188 **PARNASSIA.** Blomfod. 5deladt. Kronsambladig. Stift. 0. Honingsfjäll 5, kantade med knoppbärande strålar [falska ståndare]. Frukt enrummigt fröhus. — Pag. 121.

### 5 Ordn. PENTA—DECAGYNIA. Pist. 5—10.

- 189 **ARMERIA.** Blomkorg med små blr inom holk. Foder bägarlikt, hinnaktigt, 5-tandadt. Kronsambladig 5deladt. Frukt enfröig fröblåsa, affallande öppnad. Tuffvade örter med trådmala blad, enblomstrig stängel. — Pag. 74.
- 190 **STATICE.** Blomax i grenigt knippe; för öfr. som föreg. Kustväxter med breda rotblad, bladlös stängel. — Pag. 74.
- 191 **DROSEREA.** Fod. 5deladt. Kr. 5bladig. Frukt: enrummigt, mångfröigt fröhus. Kärrväxter med glandelhåriga blad, bar stängel. — Pag. 121.
- 192 **SIBBALDIA.** Fod. 10klufvet, hvarannan flik mindre. Kronblad 5. Frukt: talrika karpeller på ett plattadt fäste. Liten fjellört. — Pag. 155. (*Linum* 16, 1.)

### 6 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

- 193 **MYOSURUS.** Blomfoder 5bladigt, förlängdt nedom fästpunkten. Kronblad 5, med en honungshåla på klon. Frukt: talrika karpeller på ett utdraget fäste. Liten enblommig ört med trådlika rotblad. — Pag. 92.

## 6 KLASSEN

# HEXANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Liljor med kronlik blomkalk och 3rummigt fruktämne under kalken.  
[Enblommiga lökväxter.]

194 GALANTHUS. Kalk *fribladig*, af 3 yttre *större*, och 3 inre *hälften kortare* tvärbuggna blad. Blomning med hölster. — Pag. 209.

195 LEUCOJUM. Kalk *fribladig*, klocklik, af 6, *likformiga* blad, *utan* bikrons. Blomn. med hölster. — Pag. 209.

196 NARCISSUS. Kalk *sambladig* fatlik, med 6deladt bräm och en klocklik *bikrona* i pipens svalg. Blomn. med hölster. — Pag. 209.

†† Liljor som föreg., med fruktämne inom kalken.

\* Lökväxter; ståndarknapparne fästade med sidan vid strängen.

197 ALLIUM. Blr i flock, *inom hölster* af hinnaktiga blad. Kalk af 6, stundom vid basen något sammanhängande blad. Märke enkelt. *Blomflocken hos en del arter fullsatt med knopplökar.* — Pag. 212.

198 MUSCARI. Blr i klase, *utan* hölster. Kalk *sambladig*, klotformig, 6tandad. Märke enkelt. *Bladlös stängel.* — Pag. 214.

199 LILIUM. Blr *utan* hölster. Kalkblad 6, *fria*, med en *honungsfäll* nära basen. Märke *3kantigt*. *Bladig stjerk, stora blr i flock ell. klase.* — Pag. 211.

200 FRITILLARIA. Blr *utan* hölster. Kalk klocklik, af 6 *fria* blad, med en *afhäng honungshåla* nära basen. Pist. med 2—3deladt märke. *Bladig stjerk och en enda stor blomma.* — Pag. 211.

201 ORNITHOGALUM. Blr *utan* hölster. Kalk 6bladig ell. 6delad, *utan* honungshåla. Märke tvärhugget ell. något klubblikt. *Blr i flock eller klase på bladlös stängel.* — Pag. 213.

\*\* Lökväxter; knappar fästade med basen, uppräta.

202 TULIPA. Kalk klocklik 6bladig. Pistill *utan* stift, med 3klufvet märke. Frön platta. *Ört med föga bladig stjerk, en enda stor blomma.* — Pag. 211.

203 GAGEA. Kalk 6bladig. Pist. med stift och n. *helt* märke. Frön trinda. *Blr n. i flock med skärblad, eljest bladlös stängel.* — Pag. 213.

\*\*\* Växter med rotstock: frukt: bär.

204 CONVALLARIA. Kalk *sambladig*, klock- eller rörformig, 6tandad. Stift *utdraget*. *Bladlös stängel med klase, ell. bladig stjerk med blr i bladvecken.* — Pag. 214.

205 SMILACINA. Kalk n. platt, af 6, fria blad. Stift kort, syl-lik. Blad breda stjelk-omfatt., blr i klase. — Pag. 215.

206 ASPARAGUS. Kalk klocklik, djupt 6delad. Stift kort, med 3deladt märke. Grenig, bladig växt, med små borstlika blad. En del blr enkönade. — Pag. 214.

\*\*\*\* Växter med rotstock; frukt: fröhus.

207 ANTHERICUM. Kalk n. platt, 6bladig. Stånd. glatta. Stift utdraget trådlikt. Frön kantiga. Örter med stängel. — Pag. 213.

208 NARTHECIUM. Kalk som hos föreg. Ståndarsträng. ludna. Stift kort, syl-lik. Frön med borstlikt bihang. Blad smala, svärdlika; blr i klase. — Pag. 217.

+++ Blr med ingen ell. enkel kalk, tätt gytttrade på en tjock blomkolf.

209 CALLA. Blomhölster enbladigt, på insidan färgadt [hvit]. Kalk 0. [Ståndare af obestämdt antal fästade omkring fruktämnena]. Frukt: saftiga bär, gytttrade på kolfven. Vattenväxt med hjertlika blad. — Pag. 223.

210 ACORUS. Hölster 0. Blomkalk enkel foderlik 6bladig. Frukt: torra, slutl. enrummiga bär. Vattenväxt, med svärdlika blad, och blomkolfven på siängeln sida. — Pag. 223.

++++ Gräslika släkten; kalken 6bladig foderlik [grön ell. brun].

211 JUNCUS. Pistill med stift och 3:ne trådlika märken. Fröhus 3rummigt, mångfröigt. Inga ell. trådsmla blad och på ena sidan klufna bladslidor. — Pag. 217.

212 LUZULA. Fröh. enrummigt, 3fröigt; för öfr. som föreg. Plattbladiga växter, med hela bladslidor. — Pag. 221.

++++ Släkten med blomfoder och vanl. med krona.

213 BERBERIS. Foder och krona 6bladiga, fästade under fruktämnat. Frukt 1—2fröigt bär. Buske med knippvisa blad. — Pag. 96.

214 PEPLIS. Foder klocklikt, veckigt, 12tandadt, hvarannan tand mindre, ofta otydlig. Kr. ingen ell. 6bladig. Frukt mångfröigt fröhus. Vattenväxt. — Pag. 140.  
(Naumburgia 5, 1. Trientalis 7, 1.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

215 OXYRIA. Blomkalk enkel foderlik 4bladig: 2:ne blad utväxande med och betäckande den plattade vingfrukten. Märken 2, pensel-lika. — Pag. 178.  
(Ulmus 5, 2. Polygona 8, 3.)

## 3 Ordn. TRI—HEXAGYNIA. Pist. 3—6.

+ Frukt en ensam enfröig nöt.

216 RUMEX. Blomkalk enkel foderlik 6bladig: 3:ne blad utväxande med och betäckande den trekantiga nöten. Märken 3, pensel-lika. Örter med spridda blad och vid lederna stipelslidor. — En del arter äro tvåbyggare. — Pag. 175.

++ Frukt af 3—6, mer ell. mindre hopväxta småfrukter.

\* Kalk sambladig.

217 COLCHICUM. Kalk kronlik, med klocklikt 6deladt bräm, och lång pip. Småfr. 3, vid basen hopväxta. Lökväxt med en stor blomma framkommande om hösten före bladen. — Pag. 215.

\*\* Kalk fribladig.

218 TRIGLOCHIN. Kalk foderlik, af 3 yttre och 3 inre blad, hvarje inneslutande en n. stränglös ståndarknapp. Pist. 3 eller 6, utan stift. Småfr. 3 ell. 6, enfröiga, ända upp hopväxta. Trådlika rotblad, blr i axlik klase. — Pag. 217.

219 SCHEUCHZERIA. Kalk n. kronlik 6bladig. Ståndare med tydl. sträng. Pist. 3—6,

*utan stift. Småfr. 3—6, uppblåsta, 1—2fröiga, blott nedtill hopväxta. Vattenväxt med halfstrinda blad, blr i klase. — Pag. 216.*

220 TOFIELDIA. Blr med 3klufvet *svepe*. Kalk kronlik 6bladig. Strängar och stift tydliga. Småfr. 3, nedtill hopväxta, mångfröiga. Små svärdlika rotblad, blr i ax. — Pag. 217.

221 VERATRUM. En del blr genom felslagning *enkönade. Svepe 0*. Småfr. 3, nedtill något sammanhängande; för öfrigt som föreg. Stor fjellväxt med breda blad och stora blr i klasar. — Pag. 215.  
(Elatine 8, 4.)

#### 4 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

222 ALISMA. Blomkalk af 6 blad, de 3 yttre foderlika, de 3 inre kronlika. Fr.: talrika, enfröiga karpeller. Vattenväxter med stängel, hela blad. — Pag. 216.  
(Sempervium 11, 4.)

## 7 KLASSEN

## HEPTANDRIA.

## 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 223 TRIENTALIS. Blomsfoder 7—6—5deladt. Krona till basen 7—6—5delad, *regelbunden*, plattad. Fröhus enrummigt, *mångfröigt*, af 7—8, snart affallande skal. Frön på centralfäste, hvita, spetslikt punkterade. Ört. — Pag. 70.
- 224 ÆSCULUS. Fod. 5standadt. Krona 5bladig, *oregelbund*. Ståndare nedböjda. Fröh. läderartadt, *taggigt*, som fruktämne 2—4rummigt, men moget vanl. enrummigt, med ett stort nötliskt frö, sällan flere. Träd. — Pag. 84.

2 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.  
(*Sempervivum* II, 4.)

---



## 8 KLASSEN

# OCTANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Fruktämne inom blomman.

225 DAPHNE. Blomkalk enkel kronlik, *trattformig*, 4klufven. Fr. bärlik stenfrukt. *Låg buske med blr på bar qvist.* — Pag. 180.

226 ERICA. Blomfoder 4deladt, *kortare* än den *äggformiga*, 4tandade kronan. Fröhus med skiljeväggar hängande fast vid sidoväggarne. *Låga buskar med barrlika blad i krans.* — Pag. 169.

227 CALLUNA. Fod. 4deladt, *färgadt, längre* än den *klocklika*, djupt 4klufna kronan. Fröh. med skiljeväggar häng. fast vid centralfästet. *Låg buske med barrlika blad.* — Pag. 169.

(*Ulmus* 5, 2. *Polygonum* 8, 3. *Elatine* 8, 4. *Monotropa* 10, 1. *Acer* 23, 2.)

†† Fruktämne under blomman, slutl. bär; kronan sambladig.

228 VACCINIUM. Blomfoder 4klufvet. Krona *klocklik* 4flikig. Stånd.-knappar med *otydliga* sporrar. *Nedligg. buske med läderaktiga, alltid grönskande blad.* — Pag. 168.

229 OXYCOCCUS. Fod. 4klufvet. Krona *hjulformig* 4delad, med *tillbakaböjda*flikar. Knappar 2hornade, *utan* sporrar. *Nedligg. buskväxt, med qvarsittande blad; blr på långa skaft.* — Pag. 168.

230 MYRTILLUS. Fod. helt, ell. 4flikigt. Kr. *klot-* ell. *äggformig*, 4—5tandad. Knappar 2hornade, *med* 2 sporrar på ryggen. *Låga småbuskar, som falla bladen.* — Pag. 168.

††† Fruktämne under blomman, slutl. fröhus; kronan fribladig.

231 EPILOBIUM. Fod. djupt 4klufvet, med *kort bärlik* bas. Kr. 4bladig, *regelbund.* Stånd. och pist. *upprätta.* Fröh. långt skidformigt, 4väggigt, *med fröfjun.* Örter *med motsatta, hela blad, röda, säll. hvita blr.* — Pag. 140.

232 CHAMÆNERION. Krona 4bladig, *oregelbund.* Stånd. och pist. *nedböjda.* För öfr. som föreg. *Blad strödda.* — Pag. 140.

233 OENOTHERA. Foder trattlikt, *med lång pip*, 4deladt bräm. Krona 4bladig, *regelb.* Stånd. och pist. *upprätta.* Fröh. som föreg., *men utan fjun.* *Skiftevisa blad, stora gula blr.* — Pag. 140.

(*Ulmus* 5, 2. *Polygonum* 8, 3. *Monotropa* 10, 1. *Acer* 23, 2.)

### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

234 CHRYSOSPLENIUM. Blomhylla enkelt, 4klufvet, invändigt [gul-]färgadt. Frukt: 2-skligt, mångfröigt fröhus. — Pag. 138.

(*Ulmus* 5, 2. *Polygona* 8, 3. *Acer* 23, 2.)

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

- 235 FAGOPYRUM. Blomkalk enkel kronlik, djupt 5delad. Ståndare 8. Fruktämne 1, med 3 trådliska stift och klubblika märken. Frukt: 3kantig nöt med brodd i *midten* och *invikna* hjertblad. *Enåriga örter, med stipelsidor.* — Pag. 173.
- 236 POLYGONUM. Blomkalk som hos föreg. Stånd. 5—8. Fruktämne 1, med 1—3, fria ell. hopväxta stift. Fr. 3kantig nöt, med brodd *på sidan* och *platta* hjertblad. *Stipelsidor.* — Pag. 174.

(*Elatine* 8, 4.)

4 Ordn. TETRA—PENTAGYNIA. Pist. 4, 5.

- 237 PARIS. Kalk *enkel foderlik*, af 4 stora och 4 inre, n. trådsmla blad. Ståndarsträngar *förlängda uppom knappen*. Frukt: 4rummigt bär. — Pag. 215.
- 238 ADOXA. Blomfoder 2—*3klufvet*, omkransande fruktämnet. Krona 4—*5klufven*. Fr. 3—5rummig bärlik. *Blr i ett n. 4sidigt hufvud.* — Pag. 84.
- 239 ELATINE. Foder 3—*4klufvet*. Krona 3—*4bladig*. Stånd. 3, 6 ell. 8. Märken 3, 4. Fr. 3—4rummigt *fröhus*. *Små strandväxter med motsatta blad. Under vattenet felas vanl. kronbl.* — Pag. 133.

5 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.  
(*Sempervivum* 11, 4.)

## 9 KLASSEN ENNEANDRIA.

1 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

(*Polygonum Bistorta* 8, 3)

2 Ordn. HEXAGYNIA. Pist. 6.

240 BUTOMUS. Blomkalk kronlik 6bladig. Fruktännen och småfrukter 6, mångfröiga.  
*Hög vattenväxt, med smala 3kantiga blad; blomslock i stängelns spets. — Pag.*  
216.

(*Sempervivum* 11, 4.)

---

## 10 KLASSEN

# DECANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Blomkrona sambladig.

- 241 ARCTOSTAPHYLOS. Blomfoder 5klufvet. Krona *äggformig*, inneslutande frukt-  
ämnet. Ståndarknappar *2sporrade*. Frukt 5rummigt, 5fröigt bär. *Nedligg. ris-*  
*aktiga buskväxter*. — Pag. 168.
- 242 ANDROMEDA. Foder 5deladt. Krona *äggformig* ell. *klocklik*. Knappar rundade  
ell. elliptiska, *2sporrade*. Frukt 5rummigt *fröhus*, med på midten bristande skal.  
*Blr på utdragna skaft*. — Pag. 169.
- 243 PHYLLODOCE. Fod. 5deladt. Krona *äggformig*. Knappar n. cylindriska, *utan*  
sporrar. Frukt 5rumm. *fröhus*, öppnande sig i skalens kant. — Pag. 169.
- 244 RHODODENDRUM. Fod. 5klufvet. Krona *trattlik*. Ståndarne *utan* sporrar. Frukt  
som hos föreg. — Pag. 169.

(Vaccinium 8, 1.)

†† Krona fribladig.

- 245 LEDUM. Blomfoder *ganska litet*, *5standadt* [brunludet]. Krona 5bladig. Stånd-  
knappar i spetsen *snedt 2poriga*. Fröhus af 5, från basen lossnande rum. *Ända*  
*upp bladig stjelk; blr i flock*. — Pag. 170.
- 246 PYROLA. Fod. *hjulformigt*, *5deladt*. Krona och stånd. *som hos föreg*. Fröh.  
5rummigt, uppbristande i kanterna. *Nedtill bladig stjelk; blr vanl. i klase, säll.*  
*i flock ell. en enda*. — Pag. 170.
- 247 MONOTROPA. Fod. och kr. *bägarlika*, *båda färgade* [gula]. Sidoblorna af 4  
foder- och kronblad samt 8 ståndare; toppblomman af 5, med 10 stånd. Stånd-  
knapp. med en halfmånlik *vårsprunga*. Fröh. 4—5rumm. *Bladlös parasit, med*  
*blr i klase*. — Pag. 171.

(Geranium 16, 2.)

### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

† Blomhylle enkelt, foderlikt.

- 248 SCLERANTHUS. Hyll sambladigt 5standadt. Fr. enfröig, nötlik, inom hyllets till-  
hårdnande bas. *Små greniga växter, med motsatta n. syl-lika blad*. — Pag. 173.

†† Blomhylle dubbelt, af foder och fribladig krona.

- 249 SAXIFRAGA. Foder klocklikt, 5klufvet. Krona 5bladig, fästad på fodret. Fröhus

*Drumligt, öppnande sig mellan de 2 hornlika stiften, med fröen på skiljeväggen. Örter med skiftevisa, hela ell. flåkiga blad.* — Pag. 135.

- 250 TUNICA. Birna gyttade inom ett gemensamt svepe af stora broskaktiga fjäll. Blomfod. rörformigt. Kronblad 5, med lång, smal klo. Fröh. enrumm., 4skaligt, med centralfäste. Bladen smala motsatta. — Pag. 124.
- 251 DIANTHUS. Svepe 0. Fod. cylindriskt, 5standadt, med foderholk vid basen. Kronbl. och frukt som hos föreg. Blad som hos föreg. — Pag. 124.
- 252 SAPONARIA. Svepe och foderholk 0. Kr. och fr. som hos föreg. — Pag. 124.
- 253 GYPSOPHILA. Svepe och foderholk 0. Foder klocklikt, 5flikigt. Kronbl. 5, nedåt afsmalnande, utan tydlig klo. Fröh. som hos föreg. — Pag. 124.

### 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

† Blomfoder sambladigt.

- 254 SILENE. Blomfod. bägar- ell. äggformigt, 5standadt. Kronblad 5, med lång klo. Fröh. enrummigt, 6skaligt. Örter med motsatta hela blad, bägarlika blr. — Pag. 122.

†† Blomfoder fribladigt.

- 255 STELLARIA. Kronblad 5, djupt 2klufna ell. 2delade. Fröh. enrumm., 6skaligt, med talrika, små frön. Örter med motsatta, hela blad, stjernlika blr. — Pag. 125.
- 256 HALIANTHUS. Kronbl. 5, odelade, med utdragen bred klo. Honungsglandler utmärkt stora, skiftevisa med ståndarne. Fröhus 3skaligt, med få (omkr. 6), stora frön. — Pag. 129.
- 257 ARENARIA. Kronbl. som hos föreg., utan märklig klo och glandler. Fröh. 6skaligt; frön talrika. Smärre örter med något breda blad. — Pag. 129.
- 258 LEPIGONUM. Kronbl. som hos föreg. Fröh. 3skaligt; frön oftast med en ringformig kant. Örter med trädsmala blad samt stipler. — Pag. 132.
- 259 ALSINE. Blr och fröh. som hos föreg. Frön utan ringkant. Små örter, med blad som föreg., men utan stipler. — Pag. 129.  
(*Cerastium trigynum* 10, 4. *Myricaria* 16, 2.)

### 4 Ordn. PENTAGYNIA. Pist. 5.

† Blr med ett ensamt fruktämne. [Blad motsatta.]

\* Blomfoder sambladigt.

- 260 AGROSTEMMA. Foder läderaktigt, med 5, långa, n. bladlika flakar. Kronblad 5. Märken öfverallt stråfhåriga. Fröh. enrummigt, mångfröigt. — Pag. 123.
- 261 VISCARIA. Foder hinnaktigt, 5standadt. Kronbl. 5. Fröh. nedtill flerrummigt, mångfröigt. — Pag. 123.
- 262 MELANDRIUM. Fod. som hos föreg. Kronbl. 5, 2klufna. Tvåbyggare. Fröh. enrummigt, öppnande sig med 10 tänder, mångfröigt. Frön utan hinnkant. — Pag. 123.
- 263 VAHLBERGELLA. Fod. och kronbl. som hos föreg. Blr samkönade. Fröh. som hos föreg. Frön med hinnkant. — Pag. 123.
- 264 LYCHNIS. Fod. 5standadt. Kronbl. 5, 4klufna. Blr samkönade. Fröh. enrumm., öppnande sig med 5 tänder, mångfröigt. — Pag. 123.

\*\* Blomfoder fribladigt.

- 265 MALACHIUM. Kronbl. 5, djupt 2klufna. Fröhus af 5, i spetsen 2flikiga skal. Slak och bräcklig ört. — Pag. 125.
- 266 CERASTIUM. Kronbl. som hos föreg. [sällan hela]. Fröh. i spetsen likformigt 10-tandadt. Örter med ovala—jemnbreda blad, n. stjernlika blr. — Pag. 127.

267 SPERGULA. Kronbl. 5, *hela*. Fröb. öppnande sig *med 5 skal*. Frön plattade, *med en ringformig kant*. *Trådlika, skenbart kransvisa blad*. — Pag. 131.

268 SAGINA. Fod. 4—5bladigt. Kronbl. 4—5, *hela* [stundom 0]. Fröb. öppn. sig med 4—5 skal. Frön *utan ringkant*. *Mest syl-lika blad*. — Pag. 130.  
(*Adoxa* 8, 4. *Arenaria ciliata* 10, 3. *Oxalis* 16, 2.)

†† Blr med flere fruktämnena. [Blad skiftevisa.]

269 SEDUM. Blomfoder och krona af 5 blad. Småfrukter 5, mångfröiga. *Örter med tjocka och köttiga, oftast trinda blad*. — Pag. 138.  
(*Geranium* 16, 2.)

5 Ordn. POLYGYNIA. Pist. 6—12.

(*Sempervivum* 11, 4.)

---

## 11 KLASSEN

### DODECANDRIA.

#### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 270 **ASARUM.** Blomhylla en *enkelt*, båglik, 3klufven, invändigt färgad kalk. Fröhus under kalken, 6rummigt. *Låg enblommig ört.* — Pag. 179.
- 271 **LYTHRUM.** Blomhylla *dubbelt*. Blomfoder båglik, 12tandadt. Kronbl. 6. Fröh. inom blomman, 2rummigt. *Blr i ax.* — Pag. 140.  
(*Reseda* II, 3.)

#### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

- 272 **AGRIMONIA.** Blomfod. 5klufvet. Kronblad 5. Ståndare 12—20. Fodrets pip slutl. inneslutande 1—2 karpeller, ofvanpå betäckt med borst. *Örter med skiftevisa parbladigt delade blad, blr i klasar.* — Pag. 148.

#### 3 Ordn. TRI—TETRAGYNIA. Pist. 3—4.

- 273 **RESEDA.** Blomhylla *dubbelt*. Blomfod. 4—6deladt. Kronbl. 4—6, olikstora, smalflikiga. Ståndare 12—24, fästade på ett skifligt fäste, äfven bärande det 3—6kantiga fruktämnet. *Stift 0. Fröhus öppet i toppen, enrummigt. Örter med skiftevisa blad, blr i ax ell. klase.* — Pag. 85.
- 274 **EUPHORBIA.** Blomhylla *enkelt* klocklikt, 8—10flikigt, med hvarannan slik kronbladlik, platt utböjd. Stånd. 12—20 oliktidiga, med ledad sträng. *Stift 3, med klufna märken. Fruktämne 3knöligt, 3rumm., slutl. skiljande sig i 3 karpeller. Örter med skiftevisa hela blad, blr i flock.* — Pag. 171.

#### 4 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många (6—12).

- 275 **SEMPERVIVUM.** Blomfoder 6—12deladt. Kronblad, ståndare och fruktämnena 6—12. *Ört med tjocka platta blad i rosett vid roten, blr i flocklikt närmade klasar.* — Pag. 138.

## 12 KLASSEN

## ICOSANDRIA.

## 1 Ord. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 276 PRUNUS. Blomfoder 5klufvet. Kronblad 5. Fruktämne inom blomman. Stenfrukt saftig. *Buskar ell. träd med hela sågade blad.* — Pag 156.  
(*Cratæus* 12, 2.)

## 2 Ord. DI—PENTAGYNIA. Pist. 2—5. \*)

- 277 COTONEASTER. Blomfoder 5klufvet, med slutl. *köttiga* likar. Kronbl. 5. Stift 2—3. Frukt af det slutl. bärlika blomfodret, inneslutande 2—3 *nöttika*, *upptill åtskiljda* rum, fästade vid insidan af det i *toppen öppna* båret. *Buske med helbräddade blad, 1—3blomm. klasar.* — Pag. 145.
- 278 CRATÆGUS. Fod. med 5 *tunna* likar. Kronbl. 5. Stift 1—3. Fr. som hos föreg. med 1—3, *nöttika* rum, *fast sammanhängande* med hvarandra och med det *slutna* båret. *Buskar med stikiga blad, blr i flocklik qvast.* — Pag. 145.
- 279 SORBUS. Fod. och kr. *som hos föreg.* Stift 2—4. Fr. bärlik, mjölig, med 2—4, *hinnväggiga*, 2fröiga rum. *Träd med sågade, stikiga ell. parbladiga blad, iå blomqvast.* — Pag. 144.
- 280 PYRUS. Fod. och kr. *som hos föreg.* Stift 5. Fr. *äpple ell. päron*, saftig, med 5, *hinnväggiga* 2fröiga rum. *Träd med hela ell. sågade blad, blr i flock.* — Pag. 144.

## 3 Ord. POLYGYNIA. Pist. många. \*\*)

† Blomfoder 5-, sällan 6—7klufvet.

- 281 SPIRÆA. Foder 5—7klufvet. Kronblad 5—7. Fruktämnen 5—12, *inom blomman*, slutl. lika många, 2—4fröiga fröih. *Örter ell. buskar, med hela ell. parbladigt delade blad, blr i knippe ell. spira.* — Pag. 155.
- 282 ROSA. Fod. 5klufvet. Kronbl. 5. Fruktämnen *talrika*, slutl. lika många, *enfröiga karpeller*, *inom fodrets äggr. ell. klotformiga*, slutl. färgade, *bärlika pip* [nypon]. *Buskar med parblad. blad och vid skafstet fästade stipler.* — Pag. 146.
- 283 RUBUS. Fod. 5klufvet. Kronbl. 5. Fruktämnen *talrika*, *utanpå ett torrt fäste*, slutl. bildande en *hallonfrukt*, sammansatt af *enfröiga små stenfrukter*. *Örter ell. buskar, med 3—7fingrade, säll. enkla ell. parbladiga blad, n. fria stipler.* — Pag. 149.

\*) Hela Ord. utgör Fam. *Pomaceæ*.

\*\*) Hela Ord. tillhör Fam. *Senticosæ*.



†† Foder 10-, säll. 8klufvet, hvarannanflik mindre.

- 284 FRAGARIA. Kronbl. 5, omv. *äggrunda*. Frukt bärlik [smultron], af många små karpeller utan spröt, insänkta i ytan af det *svamplikt uppsvällda saftiga, frånskiljbara fästet*. *Örtor med 3fingerade blad, krypande örtrefvor*. — Pag. 152.
- 285 POTENTILLA. Kronbl. 5, säll. 4, omv. *hjärtliska* ell. *rundade*. Frukthäste torrt, konvext, med många karpeller utan spröt. *Örtor, sällan buskar, med parblad. ell. fingerdelade blad*. — Pag. 152.
- 286 COMARUM. Kronbl. 5, *lancettlika, spetsiga*. Frukthäste torrt, svamplikt uppsvällt, med många karpeller utan spröt. — Pag. 152.
- 287 GEUM. Kronblad 5, *rundade* ell. omv. *äggrunda*. Frukthäste torrt, med många, långt och krokuddigt sprötspetsade karpeller. — Pag. 155.

††† Foder likformigt 8—10klufvet.

- 288 DRYAS. Kronblad 8—10, omv. *äggrunda*, vanl. grundt intryckta i spetsen. Fruktor med mycket långt, mjukhårigt spröt. *Fjellört med enkla blad, ensam blomma på stängel*. — Pag. 155.

## 13 KLASSEN

# POLYANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Kronblad 4.

- 289 **PAPAYER.** Blomfoder *2bladigt*, snart affallande. Fruktämne *klubblikt—klotrunt*, med sköldlikt märke, utan stift. Fröh. *likt fruktämnet*, enrummigt, med ämnen till skiljeväggar och öppnande sig med flere håll under märkets kant. *Örtler med hvit mjölksaft, fikiga blad, stora blr.* — Pag. 96.
- 290 **GLAUCIUM.** Fod. *som hos föreg.* Fruktämne *hornlikt* med fikigt märke, omärkl. stift. Fröh. *mycket långt skidformigt, 2rummigt*, med svampaktigt tjock skiljevagg. *Kustört med stora blad och blr, gul mjölksaft.* — Pag. 97.
- 291 **CHELIDONIUM.** Foder och fruktämne *som hos föreg.* Fröh. *skidformigt, enrummigt*, med ämnen till skiljevagg. *Ört med gul mjölksaft, smärre blr.* — Pag. 97.
- 292 **ACTÆA.** Fod. *4bladigt*, affall. Fruktämne *äggformigt*, med ovalt märke, utan stift. Frukt *enrummigt* bär med 2sidigt fästade frön. — Pag. 96.

†† Kronblad 5.

- 293 **HELIANTHEMUM.** Blomfoder af 3 inre och 2 yttre, smärre blad. Kronblad 5. Fröhus 3skaligt, med 1—3, *flerfröiga* rum. *Örtler ell. småbuskar, med motsatta blad.* — Pag. 118.
- 294 **TILIA.** Foder *likformigt 5bladigt*, affallande. Kronbl. 5. Stift trådlikt, med 4—5 klufvet märke. Frukt affallande öppnad, [hos de Sv. arterna] enrummig, *enfröig*. *Träd med hjertl. blad.* — Pag. 112.

††† Kronblad många.

- 295 **NYMPHÆA.** Foder *4bladigt, grönt*. Kronbl. i flere rader. Ståndare med kronbladlika strängar, fästade på fruktämnet. Märke sköldlikt, utan stift. Frukt affall. öppnad. Frön inom en nättlik hinna. *Vattenväxter med stora ensamma hvila, säll. röda blr.* — Pag. 86.
- 296 **NUPHAR.** Fod. *5bladigt, färgadt* [gult]. Kronbl., märke och frukt som hos föreg. Stånd. fästade under fruktämnet. Frön utan näthinna. *Vattenväxter som föreg., med gula blr.* — Pag. 86.

(Parnassia 5, 4. Delphinium 13, 2.)

### 2 Ordn. DI—PENTAGYNIA. Pist. 2—5. \*)

- 297 **DELPHINIUM.** Blomfoder stort, kronlikt, färgadt, 5bladigt, *öfversta bladet med ho-*

\*) Denna och följ. Ordn. omfattar Fam. *Ranunculaceæ*.

*nungssporre*. Krona 1bladig, med sporre innesluten i öfre foderbladets. Karpeller 1—3. — Pag. 95.

298 **ACONITUM**. Foder som hos föreg.; öfr. bladet *hjelmlikt*, inneslutande 2:ne, skaf-tade horn-ell. *strullika kronblad* [honungsgömmel]. Karp. 3—5. *Örter med hand-lik klufna ell. delade blad, blr i klasar*. — Pag. 95.

299 **AQUILEGIA**. Foder som hos föreg. af *likformiga* blad. Kronbl. 5, utdragna nedåt i lika många sporrar. Karp. 5. — Pag. 95.

(*Reseda* 11, 3. *Hypericum* 18, 1. *Stratiotes* 22. 7.)

### 3 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

† Hylle enkelt kronlikt.

300 **THALICTRUM**. Blombylle 4bladigt, *smärt affallande*. Karp. flere, kantiga, *en-fröiga*, utan spröt. *Örter med parbl. delade blad på korta slidor, små blr i klasar*. — Pag. 92.

301 **PULSATILLA**. Hylle 5bladigt. Karp. talrika, i hufvud, *enfröiga*, med *långt, fjun-hårigt spröt*. *Örter med parbl. delade rotblad, stängel med en stor blomma och fndeladt svepe*. — Pag. 94.

302 **ANEMONE**. Hylle 5—10blad., med 3bladigt svepe ned på stängeln, ell. foderlikt under blomman. Karp. som hos föreg., utan spröt. *Örter med 3flikiga ell. 3-, säll. flerfingradt delade blad*. — Pag. 93.

303 **CALTHA**. Hylle 5—6bladigt. Svepe 0. Karp. flere, förenade i kransform, *mång-fröiga*. *Vattenört med hela blad*. — Pag. 95.

(*Trollius* i nästa afd.)

†† Blr med foder och krona.

\* Blomfoder stort, färgadt, 10—16bladigt; karp. *flerfröiga*.

304 **TROLLIUS**. Kronbl. små, knappt längre än ståndarne, *tunglika*, med honungshåla ned mot basen. Karp. talrika. — Pag. 95.

\*\* Blomfod. 3—5bladigt; karp. *enfröiga*.

305 **FICARIA**. Fod. 3bladigt. Kronbl. 7—10, med en *fjällbetäckt* honungshåla på klon. Karp. flere *enfröiga*, *nöttika*, utan stift. — Pag. 91.

306 **RANUNCULUS**. Foder 5-[säll. 3-]bladigt. Kronbl. 5, säll. flere, med honungshåla, *omgifven ell. täckt med fjäll*, på klon. Karp. med kort stift, för öfr. som föreg. *Örter med hela och smala, ell. mer och mindre delade stjelkblad*. — Pag. 87.

307 **BATRACHIUM**. Fod. 5bladigt. Kronbl. 5, säll. flere, med *naken* honungshåla på klon. Karp. med kort ell. intet stift, *smårynliga* på ytan. *Vattenörter, oflast med fndelade blad nedtill*. — Pag. 90.

308 **ADONIS**. Fod. 5bladigt. Kronbl. 10—20, utan honungshåla. Karp. talrika *en-fröiga*. *Stora ensamma blr i grenarnes topp*. — Pag. 94.

## 14 KLASSEN

# DIDYNAMIA.

### 1 Ordn. GYMNOSPERMIA. \*)

Frukt af 4 smånötter.

† Pist. med odeladt mærke.

- 309 **VERBENA.** Foder n. likformigt 5klufvet. Kronan olikformigt 5flikad, med ståndarne dolda i pipen. Pist. med klubblikt mærke. Nötter i början inneslutna i en snart bristande fröblåsa. — Pag. 56.

†† Pist. med 2deladt mærke.

\* Foderflik. 5, n. likformiga; kronans öfre läpp lägre än den nedre.

- 310 **MENTHA.** Kr. n. likformigt 4flikad med en urnupen flik. Ståndare åtskiljda, med parallela knapprum. Blr kransvisa, stundom i bladvecken, stundom i ax ell. hufvud. — Pag. 47.

- 311 **ELSHOLTZIA.** Kr. som hos föreg. Stånd. åtskiljda, med nedtill fränstående knapprum. Blr i tätta ax, med rundade blomskärm. — Pag. 47.

- 312 **TEUCRIUM.** Kr:s öfre läpp 0, ell. egentl. 2delad, med flikarne lagda till den nedre, derigenom 5flikiga läppen; dennes mellersta flik mycket större och rundad. Blr i krans eller klasar, utan andra skärm än bladen. — T. Scorod. har 2-läppigt foder. — Pag. 53.

- 313 **AJUGA.** Kr:s öfre läpp liten, 2standad, den nedre 3flikig, mellanfliken störst, urnupen. Upprätta örter, med kransvisa blr i bladvecken, utan skärm. — Pag. 53.

\*\* Foderflik som i föreg. afd.; kronans öfre läpp högre än den nedre.

a — Kronans öfre läpp n. platt.

- 314 **GLECHOMA.** Fod. 15nervigt. Kr:s öfre läpp omv. hjertlik, 2flikig; den nedre 3-klufven, mellanfliken platt, urnupen. Ståndarknappar parvis hopstående. Krypande ört. — Pag. 50.

- 315 **NEPETA.** Fod. upphöjdt 15nervigt. Kronans öfre läpp urnupen, den nedre 3-klufven, sidoflikarne utböjda, mellanfliken vidgad konkav naggad. Ståndknapp. åtskiljda. Blr gytttrade på de motsatta grenarne, med lancettl. skärm. — Pag. 50.

- 316 **ORIGANUM.** Foder 10nervigt, tillslutet med hår. Kronans öfre läpp 2flikig; den

\*) Hela Ordn., med undantag af *Verbena*, utgör Familjen *Labiata*.

nedre n. *likformigt* klufven i 3, *hela* flikar. Stånd.knapp. åtskiljda. *Blr i små knippen förenade till qvast, med ovala skärm.* — Pag. 49.

b — Kronans öfre läpp hvalflik, den nedres sidoflikar trubbiga.

α — Smånötternas toppyta afrundad, glatt.

317 BALLOTÅ. *Fod. upphöjdt 10nervigt, trallikt.* Kronpipen *rak*; öfre läppen naggad; den nedre 3flikig, med bred och urnupen mellanflik. Stånd. *raka.* *Blr på korta kransvisa skäft i bladvecken och toppen; skärm n. borstlika.* — Pag. 51.

318 BETONICA. *Fod. otydligt nervigt, klocklikt.* Kronpipen *krökt* framåt; öfre läppen hel; den nedre med 3, n. lika långa flikar. den mellersta bredare, hel. Stånd. *raka.* *Blomkransar gytttrade till ett ax; skärm åggrunda.* — Pag. 51.

319 STACHYS. *Fod. som hos föreg.* Kr:s pip n. *rak*; öfre läppen hel, den nedre 3flikig, mellanfliken omv. hjertlik ell. åggrund. Knapp. *glatta*, slutl. *böjda åt sidorna*, öppnande sig med en *långdremna.* *Blomkransar närmade i ett något småbladigt ax.* — Pag. 51.

320 GALEOPSIS. *Fod. med 5 gröfre, upphöjda nerver, rörformigt.* Kr:s öfre läpp hel; den nedre med en *ihålig knöl* mellan sidoflikarne och den breda, n. tvärhuggna mellanfliken. Knappar *håriga*, rummen öppnande sig med en *tvärdremna.* *Blr i åtskiljda ell. närsittande kransar, med lancetl. skärm.* — Pag. 53.

β — Smånötternas toppyta platt, småluden.

321 LEONURUS. *Fod. 5kantigt.* Krona *hårig*; öfre läppen smal, odelad; den nedre 3klufven, med smala flikar, sidoflik. nedböjda. Stånd. *långt utskjutande.* *Blomkrans i bladvecken.* — Pag. 51.

c — Kronans öfre läpp hvalflik; den nedres sidoflikar spetsiga ell. mycket små tandlika.

322 GALEOBOLON. *Fod. med 5 gröfre nerver.* Kr:s öfre läpp lång, framböjd, hel; den nedre med 3, *hela spetsiga* flikar, mellanflik. *föga större* och n. *likformig* med sidoflik. Nötternas toppyta plattad och glatt. *Blr kransvisa med borslika skärm.* — Pag. 52.

323 LAMIUM. *Fod. som hos föreg.* Kr:s öfre läpp hel; den nedres sidoflik. *mycket små tandlika*, mellanflik. *stor*, omv. hjertlik ell. åggrund, vid basen mycket smal. Nött. som hos föreg. *Blr i hufvud ell. kransvisa, med inga ell. borslika skärm.* — Pag. 52.

\*\*\* Foderflikar 10, hvarannan mindre.

324 MARRUBIUM. Kronans öfre läpp smal 2klufven, den nedre 3klufven. Befruktndelarne inneslutna i kronpipen. Nötter tvärhuggna. *Styf växt med mycket låda blomkransar.* — Pag. 53.

\*\*\*\* Foder 2läppigt [d. v. s. klufvet i 2 större, hela ell. flikade delar].

a — Ståndarne parallela.

325 SCUTELLARIA. Fodrens läppar *hela tvärhuggna*, den öfre med en platt, ihålig knöl på ryggen. Kronans öfre läpp hvalflik 3flikig; den nedre odelad. *Strandväxter med parvisa blr, lång plattad krona.* — Pag. 50.

326 PRUNELLA. *Fod:s öfre läpp bred, likformigt 3tandad*; den nedre smalare, 2flikig. Kr:s öfre läpp hvalflik *hel*; den nedre 3klufven. Ståndarsträngar i spetsen 2flikiga med knapp på ena fliken. *Blomkransar i tätt hufvud, med njurlika skärm.* — Pag. 50.

327 DRACOCEPHALUM. *Fod:s öfre läpp 3klufven med mycket bredare mellanflik*; den nedre 2delad. Kr:s öfre läpp urnupen, den nedre 3flikig; mellanfliken längre. *Blomkrans. närmade, stundom i axform; skärm åggrunda.* — Pag. 51.

b — Ståndarne icke parallela.

328 THYMUS. *Fod:s öfre läpp likform. 3flikig*; den nedre 2delad. Kr:s öfre läpp kort,

rak och urnupen; den nedre 3klufven med *hela* flikar. Ståndarknappar *åtskiljda*. *Nedligg. risaktiga växter med blr i hufvud.* — Pag. 41.

- 329 CALAMINTHA. Fod. *krökt*. Ståndarknapparne *samsötande* under kronans öfre läpp; för öfr. som föreg. *Blr i krans, med på undre sidan bukigt foder.* — Pag. 49
- 330 CLINOPODIUM. Foder *krökt*; öfre läppen likformigt 3uddig; den nedre delad i 2 horstlika flikar. Krs öfre läpp 2flik.; den nedre 3flikig, med *urnupen* mellanflik. Knapp. *som hos föreg. Blomkransar i hufvud med svepen af talrika borst.* — Pag. 50.

(*Teucrium Scorodonia* se oöfvan.)

## 2 Ordn. ANGIOSPERMIA. \*)

Frukt ett fröhus.

† Blomfoder 4klufvet; krona inneslutande fruktämnet.

\* Fjälliga parasitväxter, utan blad. Fröhus enrummigt.

- 331 OROBANCHE. Blomfod. *olikformigt* 4klufvet, på ryggsidan eller både på rygg- och framsidan deladt till basen. Krona bärbarlik med 2läppigt, veckigt bräm; öfre läppen meränd. *urnupen*; den nedre 3flikig. Märken 2, skifflika. *Parasiter på rötter af andra växter, hinnfjälliga ända till roten.* — Pag. 68.
- 332 LATHRÆA. Fod. *likformigt* 4klufvet, färgadt. Krs öfre läpp n. hvalflik *hel*; den nedre grundt 3flikig. Märke *enkelt*. *Parasit på rötterna af Hassel, Asp m. fl. trädslag.* — Pag. 68.

\*\* Bladiga örter. Fröhus 2rummigt. [Blad motsatta.]

- 333 EUPHRASIA. Kronans öfre läpp *hvalfd, 2flikig*, kortare än den nedre; denna 3-klufven, flikarne *urnupna*. Ståndarknappar *inneslutna* i öfre kronläppen, med i *kanten hvitludna* rum. Frön *många*, strimmiga. — Pag. 66.
- 334 ODONTITES. Krs öfre läpp *tvärhuggen* och öppen; nedre läppen med 3 *hela* flikar. Ståndarknapp. *utskjutande, glatta*. Frön *många*, strimmiga. *Blr i ensidiga klasar.* — Pag. 65.
- 335 BARTSIA. Krona *som hos föreg.* Knappar *öfverallt hvitludna*. Frön *många*, med flere breda vingkanter. *Fjell- eller kärrväxt med enkla stjelkar.* — Pag. 65.
- 336 RHINANTHUS. Fod. samt krs öfre *hjelmlika*, fram till 2standade läpp *plattade från sidorna*. Knapp. *hvitludna*. Frön *många*, platta, vingkantade. *Örter med gula blr i ax.* — Pag. 66.
- 337 MELAMPYRUM. Krs öfre läpp *hvalflik hel*, med uppviken kant; den nedre 3-flikig. Knapp. *löst sammanhängande*. Frön 1—2 i *hvarje rum*, kupiga och släta. *Blr i ax med stora skärm, ell. parvisa i bladvecken.* — Pag. 67.

†† Blomfod. 5flikigt [hos *Sceptrum* och *Pedicul.* stundom flerflikigt]; krona inneslutande fruktämnet.

\* Ståndarknapparnes rum vid basen spetsiga.

- 338 SCEPTRUM. Fod. 5flikigt. Krona djupt 2läppig, *tillsloten* af de hopböjda läpparne; öfre läppen *hjelmlik*, den nedre 3flikig. Fröhus n. *klotrundt*, öppnande sig tvärsigenom *båda* kanterna. Frön *med en vid*, veckig, *genomskinlig* och närligt punkterad *hinna*. — Pag. 66.
- 339 PEDICULARIS. Fod. 5klufvet ell. 5standadt. Krona *öppen*, med läppar i öfr. som hos föreg. Fröh. *af långt ell. äggrundt*, snedspetsadt, öppnande sig i *den konvexa kanten*. Frön *täta* med ojemnt ell. punkteradt skal. *Kärr- ell. fjellörter med skiftevisa parklufna blad.* — Pag. 67.

\*\* Knapprummen vid basen afrundade.

- 340 DIGITALIS. Krona *bärbarlik öppen*, på undre sidan bukig, med *olikformigt*, grundt

\*) Med undantag af sista släktet *Linnaea* tillhöra alla Familjen *Personatae* L.

*4flikigt bräm. Ståndare nedböjda. Märke 2deladt. Ört med skiftevisa blad, stora blr i klase. — Pag. 61.*

341 LIMOSELLA. Kr. klocklik, n. likformigt 5klufven. Märke enkelt. Fröh. enrummigt. *Liten vattenört med blomskafi från roten. — Pag. 65.*

342 LINARIA. Kr. 2läppig, tillsluten af nedre läppens hvalfika bas; öfre läppen upprät, 2klufven, den nedre med honungssporre. Fröh. 2rumm., oordenligt bristande i toppen. — Pag. 61.

343 ANTIRRHINUM. Kr. som hos föreg. med ett knölformigt honungsgömmе i stället för sporre. Fröh. 2rumm., öppnande sig med 3 hål i toppen. Ört med motsatta blad, stort, 5deladt blomfoder. — Pag. 61.

344 SCROPHULARIA. Kr. med klotrund pip och ett kort olikformigt 5klufvet bräm, utan särskildt honungsgömmе. Fröh. 2rummigt. Större örter med motsatta blad, små blr. — Pag. 61.

(Verbena 14, 1.)

+++ Krona ofvanpå fruktämnet.

345 LINNÆA. Fod. 5deladt. Krona klocklik, n. likformigt 5flikig. Frukt: yngre 3-, slutl. enrummigt, enfröigt fröhus. Krypande skogsväxt. — Pag. 40.

## 15 KLASSEN

### TETRADYNAMIA. \*)

#### 1 Ord. SILICULOSÆ.

Skidor korta.

† Frukt [nöt-skida] affallande oöppnad, näml. hela skidan ell. hvar rum för sig.

\* Skida affallande odelad.

346 NESLIA. Skida *klotrund*, ung 2rummig, med hinnaktig försvinnande skiljevägg, *slutl. enfröig*. Frön med ryggliggande rotämne. *Upprät ört med små gula blr och skidor i långa klasar.* — Pag. 105.

347 BUNIAS. Skida *äggformig, sned och ojemn*, spetsig, snedt 2rummig, *2fröig*. Frön med inrullade hjertblad och ryggligg. rotämne. *Styf och sträfs ört med gula blr.* — Pag. 105.

348 ISATIS. Skida *aflång ell. något vigglik, platt*, slutl. enrumm. och *enfröig*. Frön med ryggligg. rotämne. *Hängande skidor.* — Pag. 105.

349 SENEBIERA. Skida *bred*, af 2, i *bredd satta, enfröiga* rum, affallande tillhopa eller hvar för sig oöppnade. Frön som hos föreg. *Nedligg. greniga örter med pardelade blad, mycket små hvita blr, som hos en art sakna kronblad och knappar på de längre ståndarne.* — Pag. 107.

\*\* Skida delande sig på tvären i 2, hvar för sig affall. rum.

350 CRAMBE. Skidans öfre rum *stort klotrundt köttigt, enfröigt*; det nedre smalt, *ofruktligt*. Frön med veckliggande rotämne. *Kustväxt med stora blad, hvita blr.* — Pag. 105.

351 CAKILE. Skidans öfre rum *utdraget, åkantigt, spetsigt, enfröigt*; det nedre *enfröigt*. Frön med kantliggande rotämne. *Nedliggande kustväxt med rödaktiga blr.* — Pag. 105.

(*Senebiera* i föreg. afd., *Raphanus* i nästa Ord.

†† Skida öppnande sig med 2 skal och smal skiljevägg [utgörande skidans minsta diameter].

\* Skidans rum 1- ell. 2fröiga.

352 TEESDALIA. Kronbl. *olikstora*. Skida *omv. hjertlik*, med kölade *2fröiga* rum, utan vingkant. Frön med kantliggande rotämne. — Pag. 107.

353 HUTCHINSIA. Kronbl. *likstora*. Skida *oval*; för öfr. *som föreg.* — Pag. 107.

354 LEPIDIUM. Kronbl. som hos föreg. Skida *ovalt äggrund, ell. bredare* och något

\*) Hela klassen utgör Familjen *Crucifera* DC.



hjärtlik, med *enfröiga* rum. Frön med ryggliggande rotämne. *En art har inga kronbl. och blott 2 ståndare.* — Pag. 106.

\*\* Skidans rum mångfröiga.

355 CAPSELLA. Skida *omv. hjert- ell. vigglik*, tvärhuggen *plattad*, utan vingkant. Frön med ryggligg. rotämne. — Pag. 106.

356 THLASPI. Skida *rund ell. omv. hjertlik*, *plattad*, med *vingkantade* rum. Frön med kantligg. rotämne. — Pag. 106.

357 SUBULARIA. Skida *oval* med *hel spets* och *bålrika ovingade* rum. Frön med veckliggande rotämne. *Strand- ell. vattenväxt.* — Pag. 107.

+++ Skida som i föreg. afd., med bred skiljevägg.

\* Skidan upplåst [ungef. lika tjock som bred].

358 COCHLEARIA. Skida *oval ell. klotrund*, med *kort*, på skiljeväggen *qvarsittande stift*, 2—mångfröiga rum. Frön med kantliggande rotämne. *Glatta kustörter med hvita blr.* — Pag. 108.

359 CAMELINA. Skida *omv. ägg- ell. päronformig*, med spröt af det *med skalen af-fallande* stiftet, mångfröiga rum. Frön med ryggligg. rotämne. *Åkerväxter med gula blr.* — Pag. 108.

\*\* Skidan plattad.

360 ALYSSUM. Ståndarsträngarne med ett *tand- ell. borslikt bihang*. Skida *rundad*, med utdraget stift, 2fröiga rum. Frön med kantliggande rotämne. — Pag. 108.

361 FARSETIA. Sträng. med ett *tandlikt bihang*. Skida *elliptisk*, med utdraget stift, mångfröiga rum. Frön som hos föreg. *Större, bladig, gråluden ört.* — Pag. 108.

362 DRABA. Ståndare [stund. 4] *utan bih.* Skida *oval—af-lång*, hel i spetsen, med *ganska kort*, stund. omärkligt stift, mångfröiga rum. Frön som hos föreg. *Mest smärre örter, de flesta fjellväxter med hvita, sällan gula blr.* — Pag. 108.

363 LUNARIA. Stånd. *utan bih.* Skida *oval*, hel i spetsen, med något *utdraget* stift och fästad *med en fot* vid skaftet. Frön *platta* med kantligg. rotämne. *Lundört med stora blad, violetteröda blr.* — Pag. 107.

(*Nasturtium* och *Braya* i nästa Ordn.)

## 2 Ordn. SILIQUOSÆ.

Skidor långa.

† Skida af 2, längsefter uppbristande skal.

\* Skida 4kantig af kölade skal.

364 HESPERIS. Blomfoder tillslutet. Pistillens märke af 2 *upprätta skiffliga stikar*. Skida jemnbred, *rundadt* 4kantig. Frön enradiga, med ryggliggande rotämne. — Pag. 100.

365 ERYSIMUM. Fod. tillslutet. Märke *urnupet*, med *omärkligt stift*. Skida jemnbred, *kvadratisk* 4kantig. Frön släta *af-långa*, i öfr. som föreg. *Örter med teml. smala blad.* — Pag. 100.

366 ALLIARIA. Fod. tillslutet. Märke *odeladt*, *tvärhugget*, med *ganska kort* stift. Skida *som hos föreg.* Frön vågigt refflade, cylindriska; i öfrigt som föreg. *Skugg-ört med breda, odelade blad.* — Pag. 101.

367 BARBAREA. Fod. tillslutet. Märke *n. helt*, med *något utdraget* stift. Skida jemnbred *utdragen*, *plattadt* 4kantig. Frön enradiga, med kantliggande rotämne. *Örter med stikiga blad.* — Pag. 103.

368 MELANOSINAPIS. Fod. *öppet*. Märke *n. helt*, med *utdraget* stift. Skida *kort*, *n. quadr.* 4kantig, med *sprötligt* stift. Frön enradiga, med veckliggande rotämne. — Pag. 99.

**\*\* Skida trind ell. plattad af konvexa skal.**

a — Skidans skal utan tydlig ryggnerf.

369 DENTARIA. Foder *tätt tillslutet*. Skidan jemnbred lancettlik, med elastiskt uppspring. skal, *tjock* skiljevägg, kort stift. Frön *enradiga*, med kantliggande rotämne. *Lundört med parbladigt delade blad, knopplökar i öfre bladvecken*. — Pag. 101.

370 CARDAMINE. Fod. n. *öppet*. Skida *utdragen* jemnbred, med elastiskt uppspringande eller tillbakarullade skal, *hinnaktig* skiljevägg. Frön *som hos föreg. Ört*er med *mest parbladigt delade* [en art med *hela*] blad. — Pag. 101.

371 NASTURTUM. Fod. n. *öppet*. Skida *kort* [rund, ell. 2—5 gånger längre än bred], mer och mindre plattad. Frön n. *2radiga*, med kantligg. rotämne. *Ört*er med *mer och mindre delade* blad. — Pag. 104.

b — Skida med tydligt ennerviga skal och utdraget sprötliskt stift [flere gånger längre än skidans bredd].

372 BRASSICA. Foder *meränd. tillslutet*. Skidan med grofådriga skal. Frön *enradiga klotrunda*, med veckliggande rotämne. *Stjelkomfatt. blad*. — Pag. 99.

373 ERUCASTRUM. Foder n. *tillslutet*. Frön *afstånga ell. åggrunda*, något *plattade*, för öfr. som hos föreg. *Pardelade blad*. — Pag. 99.

c — Skida med skal som afd. b —, och kort stift [icke längre än skidans bredd].

374 DILOTAXIS. Foder *öppet*. Skida n. jemnbred, något plattad. Frön något plattade, *2radiga*, med veckliggande rotämne. *Nästan pardelade blad*. — Pag. 99.

375 TURRITIS. Fod. *slutet*. Skida *lång plattad 2eggad*. Frön *2radiga*, med kantligg. rotämne. *Stjelkomfattande, hela blad*. — Pag. 103.

376 ARABIS. Fod. *slutet*. Skida *utdragen* plattad med n. helt märke och omärkligt stift. Frön *enradiga*, med kantligg. rotämne. *Hela ell. något flikiga blad*. — Pag. 102.

377 BRAYA. Fod. *slutet*. Skida *kort, n. trind* med urnupet märke och kort stift. Frön *2radiga*, med ryggligg. rotämne. *Lägre fjellört, med smala hela blad*. — Pag. 101.

d — Skida med minst 3nerviga skal.

378 SINAPIS. Foder *öppet*. Skida *trind*, med 3—5nerviga skal, *utdraget sprötliskt* stift, helt märke. Frön *enradiga*, med veckliggande rotämne. *Flikiga blad*. — Pag. 99.

379 SISYMBRIUM. Fod. n. *öppet*. Skida *utdragen*, n. *trind*, med 3nerviga skal, *kort* stift, helt ell. urnupet märke. Frön *enradiga*, med ryggligg. rotämne. *Delade ell. flikiga blad*. — Pag. 100.

†† Skida icke uppbristande på längden, utan affallande ledvis.

380 RAPHANUS. Foder *tillslutet*. Skida *afång* eller jemnbred, *trind* [slut. hopdraget ledad mellan fröen]. Frön med veckliggande rotämne. — Pag. 105.

## 16 KLASSEN

## MONADELPHIA.

## 1 Ord. PENTANDRIA. Ståndare 5 (näml. med knappar).

- 381 LINUM. Blomfoder och krona 5bladiga. Stånd. 5. *Stift* och märken 5, *fria*. Fröh. *utan spröt*, af 5, 2klufna skal, 10rummigt, med ett frö i hvarje rum. *Smala strödda ell. motsatta blad*. — Pag. 116.
- 382 ERODIUM. Fod. och kr. som hos föreg. Ståndarsträngar föga hopväxta, 5 med knappar, 5 utan. Stift *hopväxta* med det *sprörlika* fruktfästet, med 5 märken. Karpeller 5 i *krans*, enfröiga, med vid mognaden *korkskruflikt vridna* stift, fästade vid spetsen af sprötet. *Delade ell. flåkiga blad, blommor i flock*. — Pag. 116.  
(*Lysimachia* 5, 1. *Geranium pusill.* i n. Ordn.)

## 2 Ord. DECANDRIA. Stånd. 10.

- 383 GERANIUM. Blomfod. och krona 5bladiga. Ståndarsträngar föga samväxta. Pist. *hopväxta* med det *sprörlika* fruktfästet, med 5 märken. Karp. 5 i *krans*, enfröiga, med vid mognaden *urfsjäderlikt* tillbakarullade strängar, fästade vid spetsen af sprötet. *Flåkiga ell. delade blad, vanl. parvisa blr.* — Pag. 114.
- 384 OXALIS. Fod. 5deladt. Kronbl. 5, vid basen något förenade. Ståndarsträngar vid basen mer och mindre samväxta. Pist. med 5, *fria* stift. Fröh. *5rummigt*, mångfröigt. Frön med fröhylla. *Örter med 3fingrade blad*. — Pag. 116.
- 385 MYRICARIA. Fod. 5deladt. Kronbl. 5. Ståndarstr. samväxta till öfver midten. Pist. *utan spröt och stift*. Fröh. 3kantigt, *enrumm.*, 3skaligt. Frön med fröfsjun. *Buske med mycket små, enkla blad, blr i ax.* — Pag. 172.  
(*Sarothamnus*, *Genista*, *Ononis* och *Anthyllis* 17, 3.)

## 3 Ord. POLYANDRIA. Stånd. många.

- 386 LAVATERA. Blomfoder 5klufvet, omgifvet af en 3klufven foderholk. Kronbl. 5. Stift *talrika*. Karpell. enfröiga, tätt förenade i en nedplattad kaklik *krans*. *Stor ört, med flåkiga blad*. — Pag. 112.
- 387 MALVA. Foderholk 3bladig; för öfr. som föreg. *Örter med flåkiga eller delade blad*. — Pag. 113.
- 388 ALTHÆA. Foderholk 6—9klufven; för öfr. som föreg. *Mjukt hvitluden ört, med flåkiga blad*. — Pag. 113.

## 17 KLASSEN DIADELPHIA.

### 1 Ordn. HEXANDRIA. Stånd. 6.

- 389 **FUMARIA.** Blomfoder 2bladigt, affallande. Krona af 4; olikformiga, i spetsen hopslutna blad; det ena med kort, punglik sporre. Ståndarsträngar samväxta i 2 stammar, hvarje med 3 knappar. Frukt n. klotrund, nöllick, enfröig. *Greniga örter med enkel trådsml rot.* — Pag. 98.
- 390 **CORYDALIS.** Fod. 2bladigt, snart affallande. Krona och stånd. som hos föreg. Frukt flerfröig, 2skalig baljlik. *Enkla örter, med lökformig knölstam och sammansatt rot.* — Pag. 97.

### 2 Ordn. OCTANDRIA. Stånd. 8.

- 391 **POLYGALA.** Blomfoder af 3:ne smärre ofärgade och 2 stora vinglika färgade blad. Krona af 5, sinsemellan och med ståndarne samväxta [i spetsen franskantade] blad. Fröhus platt, i spetsen urnupet, 2rummigt. — Pag. 110.

### 3 Ordn. DECANDRIA. Stånd. 10. \*)

† Alla ståndarsträngarne nedtill hopväxta [jugen fri].

- 392 **SAROTHAMNUS.** Blomfoder 2läppigt af en öfre, omärkligt 2tandad och en nedre 3tandad läpp. Kronans köl trubbig. Stift långt, ringformigt omböjd, på ryggen hårigt. *Buskväxt, med 3fingrade blad.* — Pag. 166.
- 393 **GENISTA.** Fod. 2läppigt, djupt 5tandadt. Kronköl n. rak, trubbig. Stift uppstigande, syl-lik glatt. *Låga busklika växter med enkla blad.* — Pag. 166.
- 394 **ONONIS.** Fod. likformigt 5klufvet. Kronköl sprötspetsig. Stift glatt. *Blad 3-fingrade.* — Pag. 167.
- 395 **ANTHYLLIS.** Fod. uppblåst, 5tandadt, slutl. inneslutande baljan. Kronköl böjd spetsig. *Blad parbladiga.* — Pag. 167.

†† De 9 nedre strängarne hopväxta, den öfversta fri.

\* Blad parbladiga med uddblad.

a — Baljan enfröig, affall. öppnad, ell. ledad flerfröig, affall. ledvis.

- 396 **ONOBRYCHIS.** Blomfoder djupt och n. likformigt 5klufvet. Kronans köl trubbig, mycket längre än de små vingarne. Balja enfröig, plattad och nätligt rynkig. — Pag. 160.

\*) Hela Ordn. omfattar Linnés familj *Papilionaceæ*.

- 397 CORONILLA. Fod. n. klocklikt, *Standadt*, kortare än kronbladens åtskiljda klor. Kronkölen *sprötpetsig*. Balja utdragen *ledad flerfröig*, slutl. bristande tvärt af i lederna. *Låg buske*. — Pag. 160.
- 398 ORNITHOPUS. Fod. cylindriskt, *Standadt*, längre än kronbladens klor. Kronköl rundadt *trubbig*. Balja *som hos föreg.* — Pag. 160.  
b — Baljan öppnande sig på längden med 2 skal.
- 399 ASTRAGALUS. Fod. 5stand. Kronköl *trubbig*. Baljans undre, fröfästet motsatta, fog invändigt bärande en smalare ell. bredare, *ofullkomlig* skiljevägg. *Hufvudlika blomklasar*. — Pag. 161.
- 400 PHACA. Fod. och kr. *som hos föreg.* Baljans undre fog *utan spår till skiljevägg. Fåpariga blad*. — Pag. 161.
- 401 OXYTROPIS. Kronköl *med en klotlik udd* i spetsen; för öfr. *som föreg.* *Mångpariga blad*. — Pag. 162.  
\*\* Blad parbladiga, utan uddblad.  
a — Utan klänge.
- 402 OROBUS. Blomfodrets 2 öfre tänder olikformiga och korta i jemförelse med de 3 nedre. Märket jemnbredt, konvext, på öfre sidan finludet, på den undre glatt. *Bladen med endast ämne till klänge*. — Pag. 158.  
b — Med långt klänge; 1—2- säll. 3pariga blad [undant. *Lath. marit.*].
- 403 LATHYRUS. Fodrets 2 öfre tänder kortare. Märke n. jemnbredt, *oköladt, ofvanpå platt* och hårigt, under glatt. *Blomskåft mångblommiga*. — Pag. 157.
- 404 PISUM. Fod. med n. lika långa tänder. Stift på framsidan *högt köladt*, med från sidorna *plattadt* märke. *Ört med få blr.* — Pag. 157.  
c — Med långt klänge; minst 3-, oftast flerpariga blad.
- 405 VICIA. Fods 2 öfre tänder kortare. Märke n. jemnbredt, *platt*, på undre sidan eller på båda ludet. Baljan *sprötpetsad*. *Bladen med klänge undant. V. Orobus*. — Pag. 158.
- 406 ERVUM. Fod. 5flikigt, med de öfre tänderna något mindre. Märke *trindt*, med *klotrund* luden spets. Baljan *trubbig*. *Späda örter med små blr.* — Pag. 160.  
\*\*\* Blad 3fingrade.  
a — Kronans köl *trubbig*.
- 407 MELILOTUS. Blomf. 5standadt. Blomkrona med kölen slutande tätt till seglet, *snart bortfallande*. Balja äggformig *rak 1—2fröig, längre än fodret*, slutl. *uppristande. Blr i klasar*. — Pag. 163.
- 408 TRIFOLIUM. Fod. 5standadt. Kr. som hos föreg., *qvarsittande*. Balja *1—4fröig, affallande öppnad, täckt af fodret* ell. den vissnade kronan. *Blr i vanl. låla hufvud*. — Pag. 164.
- 409 MEDICAGO. Fod. 5flikigt. Krona *bortfallande*. Balja *krökt*, mån- ell. snäckformig, *mång-, säll. ifröig, längre än fodret*. *Blr i klase ell. hufvud*. — Pag. 163.  
b — Kronans köl *sprötpetsig*.
- 410 LOTUS. Fod. 5flikigt. Strängar uppåt vidgade. Balja jemnbred, *trind* och n. rak, *mångfröig, längre än fodret*. *Blr ensamma ell. i hufvud*. — Pag. 162.
- 411 TETRAGONOLOBUS. Baljan med 4, *smalt vingade kanter*; för öfr. som föreg. — Pag. 162.

18 KLASSEN  
POLYADELPHIA.

1 Ordn. POLYANDRIA.

Ståndare många.

- 412 **HYPERICUM.** Blomfoder 5deladt. Krona 5bladig. Ståndarsträngar vid basen för-  
enade i 3 eller 5 knippen. Frukt: 3rummigt, mångfröigt fröhus. *Örtar med hela*  
*motsatta blad, 3:ne stift.* — Pag. 117.
-

## 19 KLASSEN

### SYNGENESIA. \*)

#### 1 Ordn. MONOCLINIA.

Alla med befruktningsdelar försedda blommor 2könade. (*Polygamia æqualis* L. undant. *Echinops* och *Centaurea*.)

† Alla blommor i blomkorgen tunglika, 2könade.

\* Skalkfrukter med fjäderlikt fjun.

a — Alla ell. diskblrnas skalkfr. med skaftadt fjun.

413 TRAGOPOGON. Blomholk *enkel*, af 8—12 jemnhöga blad. Alla skalkfrukter med skaftadt fjun. Blomfäste bart. *Holkfjäll liklånga, bladlika*. — Pag. 16.

414 HYPOCHÆRIS. Holk *tegellagd*. *Diskblrnas* skalkfr. med skaftadt fjun. Fäste *fjälligt. Nästan bladlös stjelk*. — Pag. 34.

b — Skalkfrs fjun oskaftadt.

415 SCORZONERA. Holk *tegellagd*. De yttre fj. kortare och bredare än de inre *hinnkantade, utan foderholk*. Fäste bart. *De flesta bladen samlade vid stjerkens bas*. — Pag. 16.

416 LEONTODON. Holk *tegellagd*. De yttre fjällen *smalare* än de inre, *utan foderholk*. Fäste bart. *Stjelken bladlös, 1-fåblomstrig*. — Pag. 34.

417 PICRIS. Holk *enkel*, af jemnhöga fjäll, *med slaka foderholkfjäll* vid basen. Fäste bart. *Bladig ört*. — Pag. 17.

\*\* Skalkfrukter med hårlikt fjun.

a — Frukthjernet skaftadt.

418 TARAXACUM. Blomholk af jemnhöga, något hopväxta fjäll, med foderholkfjäll vid basen, *mångblommig*. Skalkfr. n. *trinda*, med *långt* skaftadt fjun. Fäste bart. — Pag. 34.

419 LACTUCA. Holk n. *cylindrisk*, med tegellagda fjäll vid basen, *fåblommig*. Skalkfr. *platt*, med kort fjun. Frukthj. fäste bart. — Pag. 16.

b — Frukthjernet oskaftadt.

420 SONCHUS. Holk *vidgad vid basen, öfverallt tegellagd*. Skalkfr. *plattade*, med fjun af *mjuka ull-lika, lätt affallande* hår. Fäste bart. — Pag. 15.

421 MUGGEDUM. Holk n. *cylindrisk*, med tegellagda fjäll vid basen. Skalkfr. *plattade*. Fjun af raka, *något styfva*, tydligt sträfvå hår. Fäste bart. *Blå blr*. — Pag. 15.

\*) Hela denna klass tillhör Richards Familj *Synantheræ* ell. Linnés *Compo itæ*.

Hartman, *Skandinaviens Flora* (10:de uppl.).

422 **HIERACIUM.** Holk *tegellagd*. Skalf. *trinda* ell. *flerkantiga*, 'jemntjocka med fjun af hår som hos föreg. Fäste bart. *Dels flerblomstrig stjeln, dels bladlös ell. enblomstrig stängel.* — Pag. 18.

423 **CREPIS.** Holk *enkel*, vid basen omgifven af något fränstående foderholksfjäll. Skalf. *trinda*, *uppåt smalare*, med mjukhårigt fjun. Fäste bart. — Pag. 17.

\*\*\* Skalfrukter utan fjun.

424 **ARNOSERIS.** Holk *enkel* af *talrika* jemnhöga kölade fjäll, med *omärklig* foderholk. Skalf. med *hinnaktig* fruktkrona på toppen. Fäste bart. — Pag. 35.

425 **LAPSANA.** Holk som hos föreg. af 8—10 fjäll. Skalf. *utan* fruktkrona. Fäste bart. — Pag. 16.

426 **CICHORIUM.** Holk som hos föreg., med *utdragen* foderholk. Skalf. med *tandad* fruktkrona. Fäste *fjälligt*. *Stora blomkorgar med blå blr.* — Pag. 15.

†† Alla blommorna rörformiga, 2könade.

\* Blomkorg klotrund utan holk. (*Polyg. segregata* L.)

427 **ECHINOPS.** Hvarje blomma försedd med ett af fjäll sammansatt foder. Skalf. med en hårbräddad hinnkant på toppen. Blomfäste *fjälligt*. *Tistel-lik, utan annan holk än några nedböjda fjäll vid blomkorgens bas.* — Pag. 11.

\*\* Blomkorg med holk af hvassa, meränd. stickande fjäll.

a — Fruktfjunet hårligt, stråft.

428 **LAPPA.** Holk n. klotrund, af *krokuddiga* fjäll. Fruktfj. *borstligt*. Fäste *fjälligt*. *Storbladiga växter med blomkorg., hvilkas holk hakar sig fast vid mjuka föremål.* — Pag. 14.

429 **ONOPORDON.** Holk n. klotrund, af *rakt tornuddiga* fjäll. Fäste *bart*, ojemmt af hinnkantade gropar. *Stjelen bredt vingad.* — Pag. 12.

430 **CARDUUS.** Holk klotrund ell. rundadt äggformig, af uddhvassa fjäll med *rak*, vanl. stickande udd. Fäste beklädt med *hårlika* fjäll. *Tistlar med röda ell. viol. blr.* — Pag. 12.

b — Fruktfjunet fjäderligt.

431 **CIRSIUM.** Holk *klot-* eller *aggformig*, af uddhvassa, meränd. stickande fjäll, med *rak* udd. Fäste beklädt med *hårlika* fjäll. *Tistlar med röda, violetta, sällan gula blr.* — Pag. 13.

432 **CARLINA.** Holk *skål-lik* *vidgad*; dess *yttre* fjäll med *raka* taggar i spetsen och kanterna; de inre färgade oväpnade. Fäste besatt med *syl-rika enkla* ell. *flerkluvna* fjäll. *Tistel med blekgula blr.* — Pag. 12.

\*\*\* Blomk. med holk af mjukare fjäll.

a — Skalf. med fjun i spetsen.

433 **SERRATULA.** Holk n. cylindrisk, af tegel-lagda fjäll. Fjun af *likformiga* sträfvå borstlika hår. Fäste *borstfjälligt*. — Pag. 12.

434 **SAUSSUREA.** Holk som hos föreg. Fjun af *olikformiga* hår, de inre mjuka fjäderlika, omgifna af kortare, borstlika. Fäste *borstfjälligt*. *Ståndarknappar med långa hår vid basen.* — Pag. 12.

435 **EUPATORIUM.** Holk af små tegel-lagda fjäll. Blomkronans bräm *mycket grundt* *flikadt*; märken *långt* *utskjutande*, trådlika. Skalf. n. *trinda* ell. *kantiga*, med stråft hårligt fjun. Fäste *bart*. — Pag. 10.

436 **LINOSYRIS.** Holk, fruktfjun och *fäste* som hos föreg. Kronans bräm *kluvet till midten*, med *föga* *utskjutande* lancettlika märken. Skalf. *plattade*. — Pag. 10.

b — Skalf. med 2—4, styfva och fintaggiga borst kring spetsen.

437 **BIDENS.** Holk af jemnhöga fjäll, vid basen omgifven af en stor foderholk. Skalf.



stora plattade, tvärhuggna. Fäste platt, fjälligt. *Fukt- ell. vattenörter med mot-satta blad, enstaka blomkorgar.* — Pag. 1.  
 (Centaurea nigra; Senecio vulg., Inula Conyza, Matr. discoidea, varr. af Senec. Jacobaea, Aster och Matricaria.)

+++ Kantblommor könlösa. (*Polyg. frustranea* L.)

- 438 CENTAUREA. Blomholk tegel-lagd. Kantblir större, med snedt flerklufvet bräm. Fäste borstfjälligt. *Örter med n. klotrund holk af sargade fjäll. C. nigra sak-nar vanl. de könlösa blrna.* — Pag. 11.

## 2 Ordn. POLYCLINIA.

Diskblommorna 2könade; kantblirna endast med pistill. \*)

(*Polygamia superflua* L. undant. *Filago*.)

† Alla blrna rörformiga.

\* Alla skalfr. utan fjun.

- 439 TANACETUM. Blomholk halft klotrund, af tegel-lagda fjäll. De få honblirna satta i kanten, 3flikiga, de 2könade 5flikiga. Skalfr. 5kantiga, med hinnaktig frukt-krona. Blomfäste bart. *Blomkorg. i qvastlik samling.* — Pag. 3.

- 440 ARTEMISIA. Holk skål- ell. bågarklik, af tegel-lagda fjäll. Honblir med ganska liten ofstikad krona, blandade med de 2könade 5flikiga. Skalfr. plattadt 3kantiga, utan frukt-krona. Fäste bart ell. hårigt. *Örter med flerdelade blad, små blomkorg. vanl. i klasar.* — Pag. 3.

\*\* Alla skalfr. med fjun; blomfäste bart.

- 441 HELICHRYSUM. Holk af tegel-lagda torra hinnaktiga fjäll. Honblirna få, i en enkel rad i kanten. Skalfr. med fjun af jemnfina hår. *Hvitullig ört, med glän-sande gula eternellblir.* — Pag. 6.

- 442 GNAPHALIUM. Holk af tegel-lagda fjäll, utan foderholk. Honblir i kanten, fler-radiga. Skalfr. som hos föreg. *Smalbladiga örter med små gytttrade blom-korgar.* — Pag. 6.

- 443 ANTENNARIA. Han- och honblommor på olika stånd (2byggare). Hanblirnas kor-gar med fjun af i spetsen tjockare hår. *Blomk. i qvast.* — Pag. 7.

\*\*\* Diskblirnas skalfr. med, honblirnas utan fjun; fäste fjälligt.

- 444 FILAGO. Holk konisk af jemnhöga fjäll med en vanl. 5bladig foderholk. Honblir trådliska, utan frukt-fjun. Diskblirnas skalfr. med hårligt fjun. *Hvit- eller gråhudna örter med små, gytttrade blomkorgar.* — Pag. 7.  
 (*Pelasites* i nästa afd.)

++ Diskblommor rörformiga, kant- ell. strålblir tunglika.

\* Skalfrukter med hårligt fjun; holk n. enkel af liklånga fjäll.

a — Pist:s märken jemnbreda, med en hårtofs i spetsen.

- 445 ARNICA. Blomholk af 2 rader jemnhöga fjäll. Strålblir i spetsen djupt 3—4-tandade, med ståndarsträngar utan knappar i svalget. Blomfäste utan fjäll, *sträff* af korta hår. — Pag. 4.

- 446 CINERARIA. Holk af talrika jemnhöga fjäll i enkel rad, utan foderholk. Strålblir 3—4tandade utan ståndarämnen. Fäste bart, *glatt.* — Pag. 5.

- 447 SENECIO. Holk af jemnhöga fjäll i enkel rad, med foderholk vid basen. Strålblir som hos föreg. Fäste bart. *Örter med parflikiga, säll. odelade blad. Strålblirna felslå icke sällan.* — Pag. 5.

\*) De 2könade blrna felslå stundom till ena könet, hvarigenom 2- och mångbyggare uppkomma.

b — Pistis märken n. klubblika, tätt vårtprickiga, med glatt spets.

448 TUSSILAGO. Blomkorg ensam af flerradiga, utdraget tunglika honblir i kanten, 2kånade rörformiga på disken. Fäste bart. Vårddxt med fjällig stängel, sednare utväxande stora rotblad. — Pag. 11.

449 PETASITES. Blomkorgar flere, i en del på olika stånd mest honblir, i andra mest 2kånade; stråblir korta ell. inga. Fäste bart. Örter med fjällig stängel, stora rotblad. — Pag. 10.

\*\* Skalkfrukter med hårligt fjun; holk tegel-lagd af oliklånga fjäll.

a — Stråblirna af samma färg som diskblirna.

450 PULICARIA. Stråblirna föga längre än diskblirna. Ståndarknappar med 2 borst vid basen. Fruktsjunet vid basen omgifvet af en krans korta fjäll. Fäste bart. — Pag. 8.

451 INULA. Stråblir utdragna talrika. Knapp. och fäste som hos föreg. Skalkfr. med likformigt fjun [utan fjäll]. Uppräta örter med gula blr. — Pag. 8.

452 SOLIDAGO. Stråblir utdragna, få [6—9]. Knapp. utan borst. Skalkfr. med fjun som hos föreg. Fäste bart, punkteradt. — Pag. 10.

b — Stråblirna af annan färg än diskblirna.

453 ASTER. Stråblir talrika, i en enkel rad [blå ell. hvita]. Knapp. utan borst. Skalkfr. plattade. Fäste bart, gropigt. — Pag. 9.

454 ERIGERON. Stråblir i flere rader inom hvarandra, med trådsmlt tunglikt bräm [rödletta ell. hv.]. Knapp. utan borst. Skalkfr. plattade. Fäste punkteradt. Örter med smala blad, blomk. ensamma ell. i klase. — Pag. 9.

\*\*\* Skalkfrukter utan fjun; fäste täckt med långa fjäll.

455 ACHILLEA. Holk äggformig. Stråblommor med kort bräm [föga längre än bredt]. Blomk. i n. jemnhög qvast. — Pag. 3.

456 ANTHEMIS. Holk platt ell. skål-lik. Stråblir utdragna. Grenar enblomstriga. — Pag. 2.

\*\*\*\* Skalkfrukter utan fjun; fäste bart.

457 BELLIS. Holk af en dubbel krans liklånga, helt och hållet gröna fjäll. Skalkfr. utan åsar. Fäste slutl. koniskt. Bladen hela. — Pag. 8.

458 MATRICARIA. Holk af oliklånga, tegel-lagda, hinnkantade fjäll. Skalkfr. med 3 ell. 5 åsar. Fäste som hos föreg. Bladen parbladigt findelade. — Pag. 2.

459 CHRYSANTHEMUM. Holk som hos föreg. Skalkfr. med 5 ell. flere åsar. Fäste slutl. konvext. Blad hela ell. bredflikiga. — Pag. 2.

## 20 KLASSEN

### GYNANDRIA. \*)

#### 1 Ord. MONANDRIA. Ståndarknapp 1.

† Knapp upprätt, med hela basen sammanflytande och orörligt fästad på pistillen.

\* Läpp med utdraget och smalt, sporrlikt honungsgömmе [undant. *Gymnad. albida*].

460 ORCHIS. Läpp mer och mindre *flikig*. Knappens rum nedtill förenade i en *gemensam glandel-lik pung* ofvanför märket, inneslutande de 2 pollenmassornas *åtskiljda fötter*, som hvar för sig kan utdragas. — Pag. 201.

461 ANACAMPTIS. De 2 pollenmassorna sammanhängande med en *gemensam fot*, innesluten i en *glandel-lik pung* ofvanför märket; för öfr. som föreg. *Åxet halft klotrundt, lått*. — Pag. 203.

462 GYMNADENIA. Läpp bred *3klufven*. Knapp *utan pung* för pollenmassornas *lått sittande fötter*. *Åxet utdraget*. — Pag. 203.

463 PLATANThERA. Läpp *odelad, jemnbred*. Pollenmassornas fötter fästade vid hvar sin af 2:ne *glandler, åtskiljda af det mellanliggande märket*. *Blad 2, ell. 1*. — Pag. 204.

\*\* Läpp med kort och vidgadt, punglikt honungsgömmе.

464 COELOGLOSSUM. Läpp *jemnbred*, i spetsen *3standad*. Pollenmassornas fötter *utan pung*. — Pag. 204.

465 NIGRITELLA. Läpp vänd uppåt, *odelad åggrund*; för öfrigt som *Orchis*. — Pag. 204.

\*\*\* Läpp utan sporr- ell. punglikt honungsgömmе.

466 OPHRYS. Kalk *öppen*. Läpp *4flikig*. Pollenmassornas fötter *åtskiljda i hvar sin pung*. — Pag. 204.

467 CHAMEORCHIS. Kalk *hjelmlikt sluten*. Läpp n. *odelad*. Pollenmassor som hos föreg. — Pag. 205.

468 HERMINIUM. Kalk *klocklikt sluten*. Läpp *3klufven*, vid basen *skål-likt fördjupad*, Pollenmassornas fötter *åtskiljda*. — Pag. 205.

\*) Hela Klassen, med undantag af 3:dje Ord., tillhör Linnés och Jussieu's familj *Orchideae*.

†† Knapp fri och mer ell. mindre rörlig.

\* Läpp med djupt sporr- ell. punglikt honungsgömmе.

469 CALYPSO. Läpp *stor, skolik*, med bräm och *dubbel sporre framtill*. Könpelaren lång, med bladlika vingkanter. Pollenmassorna 4, klubblika, *oskaftade*. *Enbladig och enblommig*. — Pag. 207.

470 EPIPOGIUM. Läpp *3flikig*, med *punglikt* honungsgömmе, *vänd uppåt*. Pollenmassorna *långt skaftade*, sammanhängande, inneslutna i den snart affallande lockformiga knappen. *Bladlös, fjällig och flerblommig*. — Pag. 207.

\*\* Läpp med grundt eller otydligt honungsgömmе.

a — Läppen genom en inskränning från sidorna afdelad i en fördjupad bas och en odelad skifva.

471 CEPHALANTHERA. Könpelaren rak, *utdraget jemnbred* [minst 4 gr längre än diam.]. Pollenmassorna n. jemntjocka, *föga klubblika*. Fruktämne *oskaftadt*, vridet. *Bladiga med upprätta blr.* — Pag. 205.

472 EPIPACTIS. Könpel. *kort*. Pollenm. *klubblika*. Fruktämne *med vridet skaft*. *Flerbladiga med n. hängande blr.* — Pag. 206.

b — Läppen icke afdelad, i spetsen djupt 2klufven.

473 LISTERA. Läpp vid basen n. *platt*. Könpel. *kort*, förlängd till ett fjäll-liket stöd bakom knappen. *Med 2, n. motsatta blad.* — Pag. 206.

474 NEOTTIA. Läpp vid basen *skål-lik* fördjupad. Könpel. *utdragen*, slutande vid knappen. *Bladlös, fjällig.* — Pag. 206.

c — Läppen icke afdelad, i spetsen hel.

475 GOODYERA. Läpp *odelad*, vid basen skål-lik fördjupad, *vänd nedåt*. Ståndarknapp fästad *med skaft* vid könpelarens rygg. Pollenmass. *kort klubblika*. *Flerbladig, med smalt ax.* — Pag. 205.

476 MALAXIS. Läpp *odelad*, *vänd uppåt*. Könpel. *ganska kort*, med *lockformig* knapp på toppen. Pollenmass. sammanhängande, *klubblika* 2delade. *Nedst 1-3bladiga med rikblommigt ax.* — Pag. 207.

477 STURMIA. Läpp *som hos föreg.* Könpel. *utdragen*, något framkrökt, upptill vingkantad, med knapp *som hos föreg.* Pollenmassor *klotrunda*, 2 i hvarje rum. *Fåblommigt ax.* — Pag. 207.

478 CORALLORHIZA. Läpp *grundt 3flikig*, mellanflik. *stor odelad*. Könpel. *som hos föreg.*, längsefter konkav. Knappens rum delade tvärsöfver i 2 smärre rum, hvarje med en *klotrund* pollenmassa. *Bladlös.* — Pag. 208.

## 2 Ordn. DIANDRIA. Ståndarknappar 2.

479 CYPRIPIEDIUM. Blomkalk 5bladig [de 2 nedre bladen hopväxta]. Läpp skoformig uppblåst. Knappar fästade å ömse sidor om det sköldlika märket. *Bredbladig ört.* — Pag. 208.

## 3 Ordn. HEXANDRIA. Ståndarknappar 6.

480 ARISTOLOCHIA. Blomhylla enkelt kronlikt, sambladigt rörformigt [med snekt, enläppigt bräm] ofvanpå fruktämnet. Stånd.-knappar insänkta i det 6flikade märkets sidor. Fröhus 6rummigt, mångfröigt. — Pag. 179.

## 21 KLASSEN

### MONOECIA.

#### 1 Ord. MONANDRIA. Ståndare 1.

- 481 ZANNICHELLIA. ♂: Blomkalk 0. — ♀: Fruktämnen 4—7, hvarje med stift. Frukt: 4—7, halfmånlika smånötter. Vattenväxter med skiftelevisa blad. — Pag. 228.
- 482 CALLITRICHE. Kalk 0, eller i dess ställe 2 hvita skärblad. — ♀: Fruktämne åknöligt, med 2 trådlika stift. Frukt: 4, sammanhängande, slutligen åtskildja smånötter. Vattenväxter med motsatta blad. — Pag. 199.  
(Zostera 1, 1. Typha 21, 3. Pinus 21, 6.)

#### 2 Ord. DIANDRIA. Stånd. 2.

(Lemna 2, 1. Typha 21, 3.)

#### 3 Ord. TRIANDRIA. Stånd. 3.

- 483 KOBRESIA. Småax i ett ensamt, eller flere gyttfede, sammansatta ax; hvarje småax i förra fallet af 1 ♂ och 1 ♀ blomma, — i det sednare honblommiga småax nedtill och hanblommiga i axets topp. ♂blr af 1, ♀blr af 2 fjäll. Frukt: 3kantig nöt. Fjellgräs med trådsmla blad och strån, liknande följslägte. — Pag. 254.
- 484 CAREX. Blr i ax. ♂: Ax fjäll 1. Kalkfjäll 0. — ♀: Ax fjäll 1. Kalkfjäll 1, flasklikt, genom mynningen i toppen framsläppande den inneslutna pistillens 2—3 märken; slutl. bildande ett fruktgömmen omkring nöten. Gräslika växter. — Obs. Kalkfjället kallas i artbeskrifningarne fruktgömmen. — Pag. 235.
- 485 TYPHA. ♂ och ♀blr skiljda i 2 särskilda cylindriska ax rundt omkring strået, banaxet ofvan honaxet. Blomkalk af hårlika borst. Frukt en långskaftad nöt. Vattenörter med svärdlika blad. — Pag. 229.
- 486 SPARGANIUM. ♂ och ♀blr skiljda i flere, klotrunda ax. ♂blr af ett obestämdt antal fjäll. — ♀ af 3—4, vigglika fjäll. Frukt nötklik, vanl. utan skaft. Vattenväxter med flere ax. — Pag. 229.  
(Eriophorum 3, 1. Amaranthus 21, 5.)

#### 4 Ord. TETRANDRIA. Stånd. 4.

† Örter.

- 487 URTICA. ♂: Blomhylla enkelt, foderlikt ådeladt. — ♀hylla enkelt, af 2 stora och 2 små blad, slutl. omgifvande nöten. Brännborstiga örter. — Pag. 181.

- 488 LITORELLA. ♂: Blomhylle *dubbelt*. Foder 4deladt. Krona trattlik med 4deladt bräm. — ♀ [oskaftade i bladvecken vid roten]: foder 0, i dess ställe ett 2—3-bladigt svepe. Krona sambladig hinnaktig 2flikig. Frukt nölik. *Liten strandört med syl-likä blad och en långskaftad hanblomma.* — Pag. 74.

†† Träd ell. buskar.

- 489 ALNUS. ♂: Hänge af sammansatta sköldlika, på undre sidan 3blommiga fjäll. Hyll 4deladt. — ♀: Kort hänge af tegel-lagda 2blommiga fjäll, slutligen tillhårdnande och bildande en liten kotte. *Träd ell. buskar, blommande på bar qvist.* — Pag. 196.

### 5 Ordn. PENTANDRIA. Stånd. 5.

- 490 AMARANTUS. Blomhyll enkelt 3deladt, hinnaktigt. Stånd. 3. Stift 2—3. Frukt: enfröig fröblåsa. — Pag. 181.  
(*Bryonia* 21, 7. *Atriplex* 23, 1.)

### 6 Ordn. POLYANDRIA. Stånd. flere än 5.

† Örter, med dubbelt blomhyll.

- 491 SAGITTARIA. Foder och krona *3bladiga*. Stånd. och pistiller *talrika*. Fr. af *talrika*, blås-lika enfröiga småfrukter, gytttrade på ett, rundadt fäste. — Pag. 216.
- 492 MYRIOPHYLLUM. Foder och krona *4taliga*; det förra hos ♂ 4deladt, hos ♀ 4-tandadt; den sednare 4bladig, snart affallande. Stånd. 4—8. Fruktämne 4knöligt, med 4 ludna märken, slutl. delbart i 4 *smånötter*. — Pag. 142.

†† Örter, med enkelt ell. intet blomhyll.

- 493 CERATOPHYLLUM. Blomhyll foderlikt, *mångbladigt*. Ståndare 12—20, n. *utan* strängar. Pist. 1, med syl-liket stift. Frukt: enfröig *nöt*. — Pag. 200.
- 494 POTERIUM. Blr gytttrade i *hufvud*. Hyll foderlikt, med *4deladt* bräm. Stånd. 20—40, med *långa* strängar. Stift pensel-lika. Frukt af 3—4 karpeller *inom* hyllets tillhårdnande bas. — Pag. 148.
- 495 ARUM. Blr i *kolf*, inom ett stort enbladigt, strutlikt hölster, hanblorna ofvan honblorna. Stånd. *utan* strängar. Pist. *utan* stift. Frukt enrummigt *bär*. — Pag. 223.

††† Löfträd och buskar. [♂blr i hänge.]

\* Frukt: 1—2 nötter inom ett svepe [bägarfoder].

- 496 QUERCUS. ♂hänge *cylindriskt*. Hyll af 5—12 fjäll med lika många ståndare. — ♀hyll af tegel-lagda fjäll, slutl. sammanväxande till *en skål under* nöten. Frukt: *nöt* [ållon]. — Pag. 186.
- 497 FAGUS. ♂hänge n. *klotrundt*; hyll *klocklikt*, 4—6klufvet, med 8—12 ståndare. — ♀svepe 4klufvet, 2blommigt, slutl. *läderaktigt* och *alldeles omslutande* de 2 nöterna. — Pag. 186.
- 498 CORYLUS. ♂hänge *cylindriskt* af 3flikiga fjäll, mellersta fliken störst, betäckande sidoflikarne. Hyll 0. Stånd. omkring 8, fästade under hängfjällen. — ♀fjäll 2blommiga. Stift 2. Frukt: *nöt, omgifven af stora flikiga svepeblad*. — Pag. 186.
- 499 CARPINUS. ♂hänge n. *cylindr.*, af *enkla* fjäll. Hyll 0. Stånd. 8—24, fästade vid fjällets bas. — ♀fjäll 2blomm. Stift 2. Frukt en ensam *nöt, omfattad af de slutl. vinglika fjällen*. — Pag. 186.

\*\* Frukt: plattad, fri vingfrukt.

- 500 BETULA. ♂hänge cylindr., af sammansatta sköldlika, på undre sidan enblommiga fjäll, med 3bladigt hyll. Stånd. 4—6, upptill 2klufna, med ett knäpprum på hvar flik. — ♀hänge af tegel-lagda platta, slutl. affallande fjäll, hvarje med 3 fruktämnena, slutl. vingfrukter. *Blr och bl. samtidiga*. — Pag. 195.

++++ Barrträd.

- 501 PINUS.  $\sigma$ hänge af talrika ståndarknappar, fästade hvarje vid ett fjäll, utan hylla. —  $\varphi$ kotte af tegel-lagda fjäll, slutl. utväxande och tillhårdnande, hysande hvart och ett 2 nakna frön. — Pag. 197.

### 7. Ordn. SYNGENESIA.

En del ståndare sammanväxta.

- 502 BRYONIA. Blomfoder 5flikigt, ofvanpå fruktämnet. Krona 5delad. Ståndare 5, hopväxta i 3 stammar [en fri]. — Stift 3deladt. Frukt: bär med 5—6 plattade frön. *Klångande ört.* — Pag. 134.

## 22 KLASSEN

## DIOECIA.

## 1 Ord. MONANDRIA. Stånd. 1.

- 503 NAJAS. Blomkalk enkel flasklik, inneslutande befruktn.-delarne och upptill samman-  
dragen till en 2—3flikig hals. ♂knapp 4rummig, slutl. söndersprängande kalken i  
3—4 flikar. — ♀fruktämne utan stift och märke, slutl. bildande en nöt, innesluten  
i och affallande med kalken. *Blr i stjälklederna.* — Pag. 210.  
(*Salix purpurea* 22, 2.)

## 2 Ord. DIANDRIA. Stånd. 2.

- 504 SALIX. Blr i hängen af enkla tegel-lagda fjäll, hysande befruktn.-delarne samt 1—2  
honungsglandler i st. för kalk. Fröhus 2skaligt, enrummigt; frön med fjun. *Träd  
ell. buskar med odelade blad.* — *Stånd. stundom 1 ell. 3, hos en art 4—8.* —  
Pag. 188.

(Fraxinus 23, 2.)

## 3 Ord. TRIANDRIA. Stånd. 3.

- 505 EMPETRUM. Fod. och krona 3bladiga. ♀märke sköldlikt och omkring 9stråligt.  
Frukt: bär med omkr. 5 frön. *Var. med 2kånade blr.* — Pag. 171.  
(*Eriophorum* 3, 1. *Salix triandra* och *undulata* 22, 2. *Juniperus* 22, 8.)

## 4 Ord. TETRANDRIA. Stånd. 4.

- 506 VISCUM. Blomhylla enkelt kronlikt 4deladt. ♂knappar fästade på hyllebladen. —  
Märke knopplikt, n. utan stift. Frukt ett enfröigt bär, under blomman. *Klynne-  
grenig parasitbuske på Ask, Ek m. m.* — Pag. 39.
- 507 HIPPOPHAE. ♂hylla enkelt foderlikt 2deladt. — ♀hylla klubblikt urnupet, med  
hornlikt, utskjutande märke. Fr. falsk stenfrukt. *Hafsstrandsbuske med torniga  
qvistar.* — Pag. 180.  
(*Rhamnus cathart.* 5, 1. *Urtica dioica* 21, 4. *Salix pentand.* 22, 2.  
*Myrica* 22, 6.)

## 5 Ord. PENTANDRIA. Stånd. 5.

- 508 HUMULUS. ♂: Blr i greniga, glesa klasar; blomhylla enkelt foderlikt 5deladt. —  
♀blr i ax af omkring pistillen strutlikt hopvridna fjäll Stift 2. Frukt: en skrynk-  
lig fröblåsa, affallande med det nötlika fröet. — Pag. 181.  
(*Ribes alp.* 5, 1. *Salix pentand.* 22, 2. *Myrica* 22, 6.)

## 6 Ord. HEXANDRIA. Stånd. omkr. 6.

- 509 MYRICA. ♂- och ♀hängen af platta tegel-lagda enblommiga fjäll. Stånd. 4—6,



säll. flere. Märken 2. Frukt: kotte af små enfröiga, falska stenfrukter. *Starkt luktande blad.* — Pag. 197.

(*Rumex scutal.*, *thyrsoid.*, *Acet.* och *Acetosella* 6, 3.)

## 7 Ordn. OCTANDRIA—POLYANDRIA.

Stånd. 8 och deröfver.

† Träd.

- 510 **POPULUS.** Blr i hängen af tegel-lagda fjäll, hvar och ett hysande ett enkelt strut-ell. skål-lik hyllefjäll, hvari befruktn.delarne äro fästade. Märken 2, 2—4klufna. Fröhus enrummigt, 2skaligt; frön med tjun. *Träd med blr på bar qvist.* — Pag. 187.

†† Örter.

- 511 **RHODIOLA.** Blomhylla *dubbelt*. Foder 4deladt. Krona 4bladig. Stånd. 8. Pist. 4. Karpeller 4, uppbristande på inre sidan. — Pag. 138.
- 512 **MERCURIALIS.** Hylle *enkelt foderlikt* 3deladt. Stånd. 9—12. Stift kort, 2deladt, med 2 märken. Fröb. 2knöligt, 2rummigt, 2fröigt. *Örter med motsatta blad.* — Pag. 172.
- 513 **STRATIOTES.** Hylle *dubbelt*. Foder 3deladt. Krona 3bladig. Stånd. *många*, en del utan knappar. Honblrna med 6, 2delade stift, 6kantigt frukttämne under blomman och *många* ofruktsamma ståndare. Frukt bärlik grumm. *mångfröig. Aloe-lik vattenväxt med långa taggsågade blad.* — Pag. 209.
- 514 **HYDROCHARIS.** Hylle *dubbelt*. Foder och krona 3bladiga. Stånd. 9 med, och 3 utan knappar. Blrorna med 6 stift och 2klufna märken, samt 3—6 trådlika ståndar-ämnen. Frukttämne under blomman, slutl. bärlik, grummig, *mångfröig. Vattenört med hjertlikt rundade flytande blad.* — Pag. 209.  
(*Silene acaulis* 10, 3. *Melandrium* 10, 4. *Rubus Chamæmorus* 12, 3. *Salix pentand.* 22, 2. *Myrica* 22, 6. *Acer* 23, 2.)

## 8 Ordn. MONADELPHIA.

Ståndarsträngar hopväxta.

- 515 **JUNIPERUS.** ♂: Kottelik gyttring af sköldlika fjäll, hvarje med 3—6 knappar på bakre kanten utan hylle. — ♀kotte af tegel-lagda fjäll, slutl. hopväxande till en torr bärlik 3fröig kotte [bärkotte]. — *Buske ell. litet träd med syl-lika barr, blå bärlika frukter.* — Pag. 198.
- 516 **TAXUS.** ♂: Ståndarknappar omkr. 8, *kranvis fästade* på undre sidan af sköldlika skafade fjäll. — ♀blr *ensamma* med ett otydligt ringformigt hylle, slutl. *enfröig*, nötluk frukt, innesluten i det strål-lik utvidgade bärlika hyllet. *Litet träd ell. buske med 2sidigt fästade, platta barr.* — Pag. 198.

## 23 KLASSEN

# POLYGAMIA.

### 1 Ordn. MONOECIA.

Enkönade blr på samma stånd som de 2könade.

- 517 **PARIETARIA.** Blomkalk enkel klocklik 4klufven. Stånd. 4. Pist. med *enkelt* stift och sköldlikt, hårkantadt märke. Frukt en i kalken innesluten nöt. *Ört med helbräddade blad, små gröna blomsamlingar.* — Pag. 181.
- 518 **ATRIPLEX.** 2könade blr med enkel foderlik 5delad kalk, 5 stånd. och 2deladt stift. — ♀kalk 2delad ell. djupt 2klufven, platt-tryckt, inneslutande det fria, på kant stående, plattade fröet, omgifvet af en tunn skorplik fröblåsa. *Örter med små, oskaftade, gröna blomsamlingar.* — Pag. 181.
- 519 **HALIMUS.** 2könade blr som hos föreg. — ♀kalk platt-tryckt, omv. hjertlik, grundt 2flikig, med frö som hos föreg. omgifvet af en hinnaktig fröblåsa. *Kust-örter med spadlika helbräddade blad; gyltrade blr.* — Pag. 183.  
(*Holcus, Hierochloa, Avena elat. och Hordeum* 3, 2. *Poterium* 21, 6.  
*Empetrum* 22, 3. *Fraxinus* och *Acer* 23, 2.)

### 2 Ordn. DIOECIA.

Enkönade blr på olika stånd med de 2könade.

- 520 **FRAXINUS.** *Blomhülle O.* 2könade blr af 2 stånd. med korta strängar; 1 pistill med 2klufvet märke. — ♂blr af 2 stånd. utan strängar. Frukt plattad vingfrukt, med ett bihang i spetsen. *Träd med parbladiga blad.* — Pag. 56.
- 521 **ACER.** *Blomhülle dubbell.* Foder 5deladt. Kronblad 4—5. Stånd. 8—10. Pist. med 2 märken. — ♂blr: ståndare med långa strängar, omärklig felsläende pistill. ♀blr med utdragen pistill, felsläende knappar med korta strängar. Frukt 2fröig vingfrukt, med bihang åt begge sidor. *Träd med handlikt flikade blad.* — Pag. 84.  
(*Empetrum* 22, 3.)

## 24 KLASSEN

## CRYPTOGAMIA.

## 1 Ordn. FILICES. Ormbunkväxter. \*)

† *Equisetaceæ*. Bladlösa växter med ledad stam och slidor vid lederna; i toppen ett ax af sköldlika fjäll med sporgömmen på undre sidan.

522 *EQUISETUM*. Groddkorn [sporer] försedda med 2, klubblika elastiska springtrådar. *Stjelkar trinda refflade, enkla ell. kransgreniga*. — 285.

†† *Marsileaceæ*. Växter utan annan stam, än en trådlik rotstock, som bär enstaka sittande blad och vid dessas bas kortskaftade fruktgömmen.

523 *PILULARIA*. Fruktgömmen klotrunda 4rummiga, 4skaliga, innehållande sporgömmen af 2 slag. *Blad trådlika*. — Pag. 287.

††† *Isoëtæ*. Växter med mycket kort och hoptryckt, n. skiflik rotstock, som bär ett enda bladknippe, och sporgömmen inom bladens bas.

524 *ISOËTES*. Sporg. inom sjelfva bladens bas, en del innehåll. stora, en del ytterst fina sporer. *Blad syl-lika, inv. 4tipiga, vid basen lökformigt vidgade*. — Pag. 287.

†††† *Lycopodiaceæ*. Växter med mångbladig stam och sporgömmen antingen i bladvecken eller i ax af tegel-lagda fjäll.

525 *LYCOPODIUM*. Sporgömmen likformiga njurlika, alla med fina pulverlika sporer. *Blad styfva, barrlika*. — Pag. 288.

526 *SELAGINELLA*. En del sporgömmen njurlika med fina sporer; andra 3—4knöliga med 3—4, stora sporer. *Mjuk, nedtill grenig ört*. — Pag. 289.

††††† *Polypodiaceæ*. [Jemte följ. afdelning *Filices veræ*]. Växter med rotstock och ett ell. flere, ofta talrika stamblad, med sporgömmen på bladens baksida ell. kant, hos *Osmunda* gytttrade i skiljd vipplik samling.\*\*)

\* Sporgömm. med tydlig ring, samlade i plättar ell. linier på bladens baksida.

a — Fruktplättar runda, utan svepefjäll.

527 *POLYPODIUM*. Plättar vanl. åtskiljda ell. slutl. något sammanflytande. *Stambladet enkelt och pardeladt, ell. flere gånger sammansatt*. — Pag. 278.

\*) Linnés *Filices* bestå af så olikbildade familjer, att de hafva högst få karakterer gemensamma, hvarför vid examineringen alla afdelningarnes eller familjernas karakterer måste jämföras.

\*\*) Sporgömmet omgifves af en ledad, elastisk ring, som vid mogningen brister och klyfver det i 2 delar; hos *Osmunda* finnes blott ämne till denna ring. Hela växten ofvan jord liknar vanligen ett blad [stamblad], med underjordisk stam ell. rotstock; ofta bär detta blad fröredningen, samlad i runda ell. linieformiga fruktplättar på baksidan, mer sällan i kanten. Dessa plättar äro antingen bara, eller täckta med ett hinnaktigt svepefjäll, som hos äldre plättar, hvilka stundom sammanflyta, ofta hopkrymper och blir otydligt.

b — Fruktplätt. rundade, med svepefjäll.

- 528 **ASPIDIUM**. Plätt. *åtskiljda*. Svepefjället fästadt *midt i plätten*, sköldlikt, med rundtom fri kant. *Stambl. en gång ell. dubbelt parbladigt*. — Pag. 279.
- 529 **POLYSTICHUM**. Plätt. *åtskiljda*. Svepe fästadt *med ett veck i plättens kant*, njurlikt rundadt. *Stambl. som hos föreg.* — Pag. 279.
- 530 **CYSTOPTERIS**. Plätt. *åtskiljda*. Svepe n. skål-likt, fästadt *under plätten* och i början betäckande densamma med sin fria hinnaktiga kant. *Svepe snart förkrympt och otydligt*. — Pag. 280.
- 531 **WOODSIA**. Plätt. *snart sammanflytande, omgifna af skålformiga, hårlíkt fransiga svepen*. *Bladen meränd. slutt. bruna, och ludna på baksidan*. — Pag. 280.

c — Fruktplätt. aflånga—jembreda, med svepefjäll.

- 532 **ASPLENIUM**. Plätt. *aflånga—jembreda*; svepe af samma form, fästadt *med långsidan vid plättens yttre kant* och öppnande sig från bladnerven. *Stambladet mer och mindre sammansatt*. — Pag. 281.
- 533 **SCOLOPENDRIUM**. Plätt. jembreda, med 2 *svepen* fästade *å ömse sidor om plätten* och öppnande sig från dennes medel-linie. *Stambladet enkelt och odeladt*. — Pag. 282.

d — Fruktplätt. sammanhäng. i en oafbruten linie längs bladkanten, utan svepefjäll.

- 534 **PTERIS**. Plätt. täckta af den tillbakavikna hinnaktiga bladkanten. — Pag. 282.
- \*\* Sporgömm. med tydlig ring på baksidan af egna, med de öfriga något olika, fruktbärande blad.
- 535 **BLECHNUM**. Fruktblad *en gång pardelade*, med 2:ne, jembreda parallela, snart sammanflytande plättar på hvarjeflik, *täckta med ett jembredt svepe*. — Pag. 283.
- 536 **ALLOSORUS**. Fruktblad *flere gånger sammansatta*; plätt, som hos föreg. täckta af bladflikarnes omvikna kanter, *utan särskildt svepe*. — Pag. 283.
- 537 **STRUTHIOPTERIS**. Fruktbl. *en gång pardelade*. Plättar under bladflikarnes omvikna och inskurna kant, slutt. *betäckande flikarnes hela baksida*, med ett snart afvallande svepe. — Pag. 282.

\*\*\* Sporgömm. med tydlig ring; plättar knopplika, fästade i bladens kant.

- 538 **HYMENOPHYLLUM**. Plättar inneslutna af 2 svepefjäll. — Pag. 283.

\*\*\*\* Sporgömm. med otydlig ring, gytttrade i axgrenig vippa [bildad af de öfversta, smärre bladparen, hvilkas baksida täckes af frukt-plättarne].

- 539 **OSMUNDA**. Sporgömm. kortskäftade, nätlikt strimmiga, med ämne till ring, och öppnande sig med en längdremna. — Pag. 283.

+++++ *Ophioglossæ*. Växer med 1—2 ofruktsamma blad, nedom det till ett enkelt ell. sammansatt ax omvandlade fruktbär. bladet; sporgömm. utan ring.

- 540 **BOTRYCHIUM**. Sporgömm. oskäftade, *icke* sammanhängande, i ett *grenigt* ax och öppnande sig till midten med en tvärremna. *Det gemensamma skaflet bärande 1—2; mer och mindre delade ofruktsamma blad*. — Pag. 284.

- 541 **OPHIOGLOSSUM**. Sporgömmen oskäftade, *sammanhängande*, i ett *enkelt*, 2sidigt ax och öppnande sig med en tvärremna. *Skaflet med ett odeladt ofrukts. blad på sidan och ett ensamt ax i toppen*. — Pag. 285.

# FRIES' NATURLIGA SYSTEM.

## A. COTYLEDONEÆ.

Växter, med frön, som innehålla eller vid groningen utveckla hjertblad och brodd. —  
Hafva blommor med 2 bestämda kön, häraf kallade *Phanerogamæ* L., och i sin byggnad tydliga kärl: *Vasculares* DC. \*) samt blad med klyföppningar.

### I. DICOTYLEDONEÆ.

Växter med 2:ne hjertblad. — *Exogeneæ* DC. ell. utanpå tillväxande, emedan de, som hafva flerårig stam [träd och buskar], föröka denna efter hela sin längd genom nya tydliga vedlager eller årsringar, de yngre lagda utanpå de äldre.

#### Ser. 1. COROLLIFLORÆ.

Blomkrona sambladig, med ståndarne fästade på sin insida.

1 Kl. SEMINIFLORÆ: kronan fästad ofvanpå fruktämnet.

1 Ordn. Med samgömmig frukt. \*\*)

1 Fam. *Synantherææ* [*Compositæ* L.]. Ands. N. F. t. 1, f. 1—5.

2 — *Dipsacææ*. — Ands. t. 1.

3 — [*Ambrosiaceææ*]. — t. 1.

4 — *Valerianeææ*. — Ands. t. 2, f. 1, 2.

\*) Så väl i dessa bestämningar, som i all klassifikation af växterna finnas undantag; således sakna några få *Phanerogamer* hjertblad, t. o. m. ett par släkten bestämda ståndare; några sakna kärl, hvilka åter träffas hos de till *Cryptogamerna* räknade *Ormbunkarne*; *Mossorna* hafva 2:ne kön o. s. v.

\*\*) Ordningarne i den af Fries gifna klaven utmärkta med a, — b, — c — äro i alla Hjärtbladsväxternas klasser de samma, ehuru en eller två kunna saknas i Skandinaviska florran; de äro byggda på fruktens beskaffenhet och 3 till antalet.

- a: Samgömmig frukt: flere kransvisa småfrukter, samväxta sinsemellan till en odelbar frukt.
- b: Skiljdömmig: småfrukter flere, åtskiljda, hvarje af ett skal [ett kring fröfästet hopväxt fruktblad].
- c: Enkelgömmig: frukt af flere med kanterna sammanväxta skal ell. fruktblad och med fröfästen längs skalens insida eller ett centralt.

- 2 Ord. Skiljdgömm. frukt.  
 5 Fam. *Rubiaceæ*. — And. t. 2.
- 3 Ord. Enkelgömm. frukt.  
 6 Fam. *Loranthaceæ*. — And. t. 2.  
 7 — *Caprifoliaceæ*. — And. t. 2.
- 2 Kl. ANNULIFLORÆ: kronan fästad rundtomkring [ej under] fruktämnet, öppen i botten.
- 1 Ord. Samg. frukt.  
 8 Fam. *Campanulaceæ*. — And. t. 3.  
 9 — *Lobeliaceæ*. — t. 3.  
 10 — *Convolvulaceæ*. — And. t. 3.
- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
 11 Fam. *Boragineæ*. — And. t. 3.  
 12 — *Labiataæ*. — t. 4, f. 1—8.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
 13 Fam. *Menyantheæ*. — And. t. 4.  
 14 — *Polemoniaceæ*. — And. t. 4, f. 1, 2.
- 3 Kl. TUBIFLORÆ: kronan fästad under fruktämnet, slutet i botten.
- 1 Ord. Samg. frukt.  
 15 Fam. *Oleineæ*. — And. t. 5.  
 16 — *Verbenaceæ*. — t. 5.
- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
 17 Fam. *Asclepiadeæ*. — And. t. 5.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
 18 Fam. *Gentianeæ*. — And. t. 5.  
 19 — *Solanaceæ*. — And. t. 6.  
 20 — *Personataæ*. — t. 5, f. 1—4.  
 21 — *Lentibulariaceæ*. — t. 6, f. 1, 2.  
 22 — *Primulaceæ*. — t. 6.  
 23 — *Globulariaceæ*. — t. 6.  
 24 — *Plantagineæ*. — t. 6, f. 1, 2.  
 25 — *Plumbagineæ*. — t. 6.

## Ser. 2. THALAMIFLORÆ.

Blomkrona af flere fria blad; ståndare fästade jemte kronbladen på ett eget fäste.

- 4 Kl. DISCIFLORÆ: ståndare och kronblad fästade på kanten af en, öfver eller omkring fruktämnet befintlig disk.
- 1 Ord. Samg. frukt.  
 26 Fam. *Corneæ*. — And. t. 7.  
 27 — *Celastrineæ*. — t. 7.
- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
 28 Fam. *Araliaceæ*. — t. 7.  
 29 — *Umbelliferæ*. — t. 8.  
 30 — *Adoxææ*. — t. 7.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
 31 Fam. *Acerineæ*. — And. t. 8.  
 32 — *Resedaceæ*. — t. 8.
- 5 Kl. SERTIFLORÆ: stånd. och kronblad fästade rundtomkring ell. på fruktämnets bas.
- 1 Ord. Samg. frukt.  
 33 Fam. *Nymphæaceæ*. — And. t. 9.
- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
 34 Fam. *Ranunculaceæ*. — And. t. 9, f. 1—4.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
 35 Fam. *Berberideæ*. — And. t. 9.  
 36 — *Papaveraceæ*. — t. 9.  
 37 — *Fumariaceæ*. — t. 10.  
 38 — *Cruciferaæ*. — t. 10, f. 1—7.

39 Fam. *Polygalæ* — Ands. t. 10.

40 — *Balsamineæ* — t. 10.

6 KL. COLUMNIFLORÆ: stånd. fästade under frukttämnet på ett punkt- ell. pelar-  
likt fäste.

1 Ordn. Samg. frukt.

41 Fam. *Tiliaceæ*. — Ands. t. 11.

2 Ordn. Skiljdg. frukt.

42 Fam. *Malvaceæ*. — Ands. t. 11.

43 — *Gruinales*. — t. 11, f. 1—3.

3 Ordn. Enkelg. frukt.

44 Fam. *Hypericineæ*. — Ands. t. 11.

45 — *Cistineæ*. — t. 11.

46 — *Violarieæ*. — t. 12.

47 — *Droseraceæ*. — t. 12.

48 — *Silenaceæ*. — t. 12, f. 1. 2.

49 — *Alsineæ*. — t. 12, f. 1—3.

50 — *Elatineæ*. — t. 12.

### Ser. 3. CALYCIFLORÆ.

Blomkrona af fria blad, jemte ståndarne fästade på blomfodret.

KL. FAUCIFLORÆ: ståndarne fästade i fodrets svalg vid öfre kanten af den tunna  
torus.

1 Ordn. Samg. frukt.

51 Fam. *Cucurbitaceæ*. — Ands. t. 13.

52 — *Ribesiaceæ*. — t. 13.

53 — *Rhamneæ*. — t. 7.

2 Ordn. Skiljdg. frukt.

54 Fam. *Saxifrageæ*. — Ands. t. 13.

55 — *Crassulaceæ*. — t. 13.

3 Ordn. Enkelg. frukt.

56 Fam. *Lythrarieæ*. — Ands. t. 13.

57 — *Onagrarieæ*. — t. 14.

58 — *Haloragææ*. — t. 14.

8 KL. ROSIFLORÆ: stånd. fästade vid den ringformigt uppsvällda öfre kanten af  
torus.

1 Ordn. Samg. frukt.

59 Fam. *Pomaceæ*. — Ands. t. 14.

2 Ordn. Skiljdg. frukt.

60 Fam. *Senticosæ*. [*Rosaceæ* Juss.] — Ands. t. 15, f. 1—4.

3 Ordn. Enkelg. frukt.

61 Fam. *Drupaceæ*. — Ands. t. 14.

62 — *Papilionaceæ*. — t. 15, f. 1—6.

9 KL. CENTRIFLORÆ: ståndarne fästade i fodrets botten vid en punktlig ell. omärklig  
torus.

1 Ordn. Samg. frukt.

63 Fam. *Ericineæ*. — Ands. t. 16, f. 1—3.

64 — *Empetreaæ*. — t. 16.

2 Ordn. Skiljdg. frukt.

65 Fam. *Euphorbiaceæ*. — Ands. t. 16.

3 Ordn. Enkelg. frukt.

66 Fam. *Tamariscineæ*. — Ands. t. 17.

67 — *Portulacaceæ*. — t. 17.

68 — *Paronychieæ*. — t. 17.

69 — *Polygoneæ*. — t. 17.

Hartman, *Skandinavians Flora* (10:de uppl.).

v

## Ser. 4. INCOMPLETÆ.

Blommor ofullständiga, utan egentliga kronblad, endast med enkel kalk, af fjäll o. s. v.

## 10 Kl. BRACTEIFLORÆ: blomkalk enkel, bildad af flere i krans samväxta skärblad.

## 1 Ord.. Samg. frukt.

70 Fam. *Aristolochiaceæ*. — Ands. t. 18.

71 — *Santalaceæ*. — t. 18.

72 — *Thymeleæ*. — t. 18.

73 — *Elæagneæ*. — t. 18.

## 3 Ord. Enkelg. frukt.

74 Fam. *Ulmaceæ*. — Ands. t. 19.

75 — *Urticaceæ*. — t. 19, f. 1, 2.

76 — *Amarantaceæ*. — t. 19.

77 — *Chenopodiaceæ*. — t. 19.

## 11 Kl. JULIFLORÆ: blommor skiljddönade, förenade i ett hänge, utan annan kalk än fjäll och dyl.

## 1 Ord. Samg. frukt.

78 Fam. *Cupuliferæ*. — Ands. t. 20.

## 3 Ord. Enkelg. frukt.

79 Fam. *Salicinæ*. — Ands. t. 20.

80 — *Betulineæ*. — t. 20.

81 — *Myriceæ*. — t. 20.

82 — *Coniferæ*. — t. 20, f. 1—3.

---

83 — *Equisetaceæ*.\*) — t. 21.

## 12 Kl. NUDIFLORÆ: blommor utan hylle, sittande utan skaft i bladvecken.

## 2 Ord. Skiljdg. frukt.

84 Fam. *Callitrichineæ*. — Ands. t. 21.

## 3 Ord. Enkelg. frukt.

85 Fam. *Ceratophylleæ*. — Ands. t. 21.

---

86 — *Characeæ*.\*\*) — t. 21.

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

Växter med 1 hjertblad. — *Endogeneæ* DC. inuti tillväxande genom lagrens rätning inåt, ehuru de sedan tränga utåt och förlora sig, utan tydlig ringar, i de yttre lagren.

## 13 Kl. FRUCTIFLORÆ: blomkalken med ståndarne fästade ofvanpå fruktämnet.

## 1 Ord. Samg. frukt.

87 Fam. *Orchideæ*. — Ands. t. 22, f. 1—5.

88 — *Irideæ*. — t. 22.

89 — *Narcissineæ*. — t. 22.

---

\*) Upptages i detta verk bland *Filices*.

\*\*) Afhandlas ej i detta verk, såsom närmast hörande till *Algæ*.



- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
90 Fam. *Hydrocharideæ*. — Ands. t. 22.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
91 Fam. *Najadeæ*. — Ands. t. 22.
- 14 Kl. LILJIFLORÆ: kalk af 3 ell. 6 [fria eller hopväxta] blad, jemte ståndarne fästade under fruktämnet.
- 1 Ordn. Samg. frukt.  
92 Fam. *Liliaceæ*. — Ands. t. 23, f. 1—4.  
93 — *Colchicaceæ*. — t. 23.
- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
94 Fam. *Alismaceæ*. — Ands. t. 23, f. 1—3.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
95 Fam. *Nartheciaceæ*. — Ands. t. 23.  
96 — *Juncaceæ*. — Ands. t. 23.
- 15 Kl. SPADICIFLORÆ: kalk 0, 4bladig, ell. af fjäll, hår ell. dyl. Blommor uta skaft.
- 1 Ordn. Samg. frukt.  
97 Fam. *Aroideæ*. — Ands. t. 24, f. 1, 2.
- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
98 Fam. *Potamogetoneæ*. — Ands. t. 24.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
99 Fam. *Typhaceæ*. — Ands. t. 24.  
100 — *Cyperaceæ*. — t. 24, f. 1—3.
- 16 Kl. GLUMIFLORÆ: Gräs. Blommor bildande småax af skiftevisa yttre och inre fjäll.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
101 Fam. *Gramineæ*. — Ands. t. 25, f. 1—10.

## B. NEMEÆ.

Växter utan verkliga frön, blott med enkla groddkorn, som utväxa till en groddtråd, utan hjertblad och verklig brodd: *Acotyledoneæ* Juss. — Hafva inga ell. mikroskopiska, stånd. och pist. motsvarande befruktningsdelar; häraf kallade *Cryptogamæ* L. Såsom bestående af blott cellväf utan spiralkärl [undant. *Filices*], höra de till *Cellulares* DC.

### III. HETERONEMEÆ.

Växter med rot och stam, den sednare försedd med tydliga, gröna blad. Groddtråden utvecklar en plattad del, kallad *proembryo* (förgrodd).

- 17 Kl. FILICES: försedda med tydliga kärl; befruktningsorganer på förgrodden.
- 102 Fam. *Polypodiaceæ*. — Ands. t. 26.  
103 — *Ophioglosseæ*. — t. 26.  
104 — *Marsileaceæ*. — t. 26.  
105 — *Isoeteæ*. — t. 26.  
106 — *Lycopodiaceæ*. — t. 26.
- 18 Kl. MUSCI: växter af blott celluler, endast med spår till kärl; befruktningsorganer på den utvecklade växten.
- 107 Fam. *Bryaceæ*. — Ands. t. 27, f. 1—7.  
108 — *Sphagnaceæ*. — t. 27, f. 5, c.  
109 — *Hepaticæ*. — t. 27, f. 1—4.

## IV. HOMONEMEÆ.\*)

Rot, stam och blad icke skiljda [sällan gröna]. Groddtråd utan förgrodd.

19 Kl. ALGÆ: det vegetativa systemet [örten] öfvervägande, utgörande på en gång rot, stam och blad. Lefva af det omgifvande medium, vattnet, omedelbart ell. i luften.

110 Fam. *Lichenes*. — Ands. t. 28.

111 — *Byssaceæ*. — t. 28.

112 — *Fucaceæ*. — t. 28.

113 — *Ulvaceæ*. — t. 28.

114 — *Diatomaceæ*. — t. 28.

20 Kl. FUNGI: fröredningen öfvervägande; det vegetativa insänt i det ämne, hvarpå växten förekommer, och hvaraf den lefver.

115 Fam. *Hymenomyces*. — Ands. t. 29.

116 — *Discomycetes*. — t. 29.

117 — *Pyrenomyces*. — t. 29.

118 — *Gasteromyces*. — t. 29.

119 — *Hyphomyces*. — t. 29.

120 — *Coniomyces*. — t. 29.

Till detta system har Prof. Fries sjelf endast lemnat en Klav, som blifvit utvecklad af sednare författare, hvilkas arbeten ligga till grund för ofvanstående förkortade framställning. Sjelfva Klaven, hvari de 3 ordningarne\*\*) äro utmärkta med bokstäfverna a — b — c —, är vigtig äfven därför, att den åskådligare än hvarje annan framställning visar familjernas så väl närmare som aflägsnare frändskaper [affinitet och analogi]. Den större råder mellan de familjer, som i samma klass föregå och efterfölja hvarandra, — den sednare, eller analogien, eger rum mellan ordningarne [a — c] så väl i de bredvid hvarandra stående, som i de föregående och efterföljande klasserna i samma longitudinella serie. Sålunda äro 29 *Umbellifera* närmast beslägtade eller affina till *Araliaceæ* och *Adoxææ*; — analoga till *Ranunculaceæ*, *Rubiaceæ* och *Saxifragææ*. 87 *Orchidææ* affina till *Iridææ* och *Narcissinææ*; — analoga till *Liliaceæ*, som stå i samma ordning, men olika klass.

## A. COTYLEDONEÆ.

## I. DICOTYLEDONEÆ.

## Ser. 1. COROLLIFLOREÆ.

1 Kl. *Seminifloræ*.

- a. 1 *Synantherææ*.
- 2 *Dipsaceæ*.
- (3 *Ambrosiaceæ*.)
- 4 *Valerianææ*.
- b. 5 *Rubiaceæ*.
- c. 6 *Loranthaceæ*.
- 7 *Caprifoliaceæ*.

2 Kl. *Annulifloræ*.

- a. 8 *Campanulaceæ*.
- 9 *Lobeliaceæ*.
- 10 *Convolvulaceæ*.
- b. 11 *Boraginææ*.
- 12 *Labiataæ*.
- c. 13 *Menyanthææ*.
- 14 *Polemoniaceæ*.

3 Kl. *Tubifloræ*.

- a. 15 *Oleineæ*.
- 16 *Verbenaceæ*.
- b. 17 *Asclepiadææ*.
- c. 18 *Gentianeæ*.
- 19 *Solanaceæ*.
- 20 *Personateæ*.
- 21 *Lentibulariææ*.
- 22 *Primulaceæ*.
- 23 *Globulariææ*.
- 24 *Plantaginææ*.
- 25 *Plumbaginææ*.

\*) Till denna Afdelning hörande familjer afhandlas icke i detta verk.

\*\*) Prof. Fries har i den ursprungliga klaven i *Flora Scanica* äfvensom i v. Dübens Handb. i Växtrikets Nat. Familjer (Stockh. 1841) endast 3 Ordningar, neml. Familjer med *fructu holocarpæ*, fr. *schizocarpæ* och fr. *syncarpæ*; till dessa hafva i Schaga och Arrhenii framställning ännu 2ne Ordningar tillkommit.

## Ser. 2. THALAMIFLORÆ.

4 Kl. *Discifloræ*.

- a. 26 Corneæ.
- 27 Celastrinæ.
- b. 28 Araliaceæ.
- 29 Umbelliferæ.
- 30 Adoxæ.
- c. 31 Acerinæ.
- 32 Resedaceæ.

5 Kl. *Sertifloræ*.

- a. 33 Nymphæaceæ.
- b. 34 Ranunculaceæ.
- c. 35 Berberidæ.
- 36 Papaveraceæ.
- 37 Fumariaceæ.
- 38 Crucifær.
- 39 Polygalæ.
- 40 Balsaminæ.

6 Kl. *Columnifloræ*.

- a. 41 Tilliaceæ.
- b. 42 Malvaceæ.
- 43 Grinales.
- c. 44 Hypericinæ.
- 45 Cistinæ.
- 46 Violariæ.
- 47 Droseraceæ.
- 48 Silenaceæ.
- 49 Alsinaceæ.
- 50 Elatinæ.

## Ser. 3. CALYCIFLORÆ.

7 Kl. *Faucifloræ*.

- a. 51 Cucurbitaceæ.
- 52 Ribesiaceæ.
- 53 Rhamnæ.
- b. 54 Saxifragæ.
- 55 Crassulaceæ.
- c. 56 Lythariæ.
- 57 Onagrariæ.
- 58 Haloragæ.

8 Kl. *Rosifloræ*.

- a. 59 Pomaceæ.
- b. 60 Senticosæ.
- c. 61 Drupaceæ.
- 62 Papilionaceæ.

9 Kl. *Centrifloræ*.

- a. 63 Ericinæ.
- 64 Empetræ.
- b. 65 Euphorbiaceæ.
- c. 66 Tamariscinæ.
- 67 Portulacaceæ.
- 68 Paronychiæ.
- 69 Polygonæ.

## Ser. 4. INCOMPLETE.

10 Kl. *Bracteifloræ*.

- a. 70 Aristolochiaceæ.
- 71 Santalaceæ.
- 72 Thymelæ.
- 73 Elæagnæ.
- c. 74 Ulmaceæ.
- 75 Urticaceæ.
- 76 Amarantaceæ.
- 77 Chenopodiaceæ.

11 Kl. *Julifloræ*.

- a. 78 Cupuliferæ.
- b. 79 Salicinæ.
- 80 Betulinæ.
- 81 Myricæ.
- 82 Coniferæ.

(83 Equisetaceæ.)

12 Kl. *Nudifloræ*.

- b. 84 Callitrichinæ.
- c. 85 Ceratophyllæ.

(86 Characeæ.)

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

13 Kl. *Fructifloræ*.

- a. 87 Orchidæ.
- 88 Iridæ.
- 89 Narcissinæ.
- b. 90 Hydrocharidæ.
- c. 91 Najadæ.

14 Kl. *Liliifloræ*.

- a. 92 Liliaceæ.
- 93 Colchicaceæ.
- b. 94 Alismaceæ.
- c. 95 Nartheciaceæ.
- 96 Juncaceæ.

15 Kl. *Spadicifloræ*.

- a. 97 Aroidæ.
- b. 98 Potamogetonæ.
- c. 99 Typhaceæ.
- 100 Cyperaceæ.

16 Kl. *Glumifloræ*.

- c. 101 Graminæ.

## B. NEMEÆ.

## III. HETERONEMEÆ.

17 Kl. *Filices*.

- 102 Polypodiaceæ.
- 103 Ophioglosseæ.
- 104 Marsileaceæ.
- 105 Isoetæ.
- 106 Lycopodiaceæ.

18 Kl. *Musci*.

- 107 Bryaceæ.
- 108 Sphagnaceæ.
- 109 Hepaticæ.

## IV. HOMONEMEÆ.

19 Kl. *Algæ.*

- 110 Lichenes.
- 111 Byssacæ.
- 112 Fucacæ.
- 113 Ulvacæ.
- 114 Diatomacæ.

20 Kl. *Fungi.*

- 115 Hymenomycetes.
  - 116 Discomycetes.
  - 117 Pyrenomycetes.
  - 118 Gasteromycetes.
  - 119 Hyphomycetes.
  - 120 Coniomycetes.
-

# SVERIGES OCH NORGES VÄXTER

EFTER FRIES' SYSTEM.

## I. DICOTYLEDONEÆ.

### 1 Serien: COROLLIFLORÆ.

#### 1 KLASSEN

#### SEMINIFLORÆ.

- 1 Fam. **SYNANTHEREÆ** Rich. Blommor gyttrade inom en gemensam holk, bildande en blomkorg. Ståndare fästade i den sambladiga kronans pip, med knapparne hopväxta omkring stiftet. Frukt sittande under kronan, enfröig, samt oskiljbart omsluten af fodret [skalfrukt]. Fröhvite 0 \*).
- 1 Flocken **Corymbiferae** Juss. Blrna antingen rörformiga i blomkorgens midt och tunglika i dess kant [strålblr], ell. stundom alla rörformiga. Stiftet cylindriskt, icke uppsväldt ell. ledadt.
- a) **Senecionidæm.** Stiftets 2 likar [märkena] jemnbreda, med en hårpensel i spetsen.
1. **BIDENS** Lin. Brunskära.
- 1 **B. tripartita** L. bladen *skaftade*, meränd. 3klufna ell. 3delade med inskurna och tandade likar; blomkorg. utan strålblommor, *uppråta*; skalfrukter med 2—3 borst. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.2178. H.N.f.16, n:o 1.
- \*frondosa* Retz. bl. vanl. 3-5delade; blomkorg. mer utbredda med mycket stora yttre holkblad. Fig. H.N.f.16, n:o 2.
- Våta st. a. (Sk.—Um. Lpm.—N. — \* Sk. och Hall. enl. Retz. Obs.; trol. mångenstäd. med hufvudformen.) *Folshög, stund. ett par tum hög med odelade bl.* \*, ell. *B. platycephala* Oerst., är en medelform till följ. art, som den, då bl. äro odelade, rätt mycket liknar, ehuru till hufvudsakl. karakterer knappt skiljbar från föreg.
- 2 **B. cernua** L. bladen *odelade halftomfattande*, lancettlika—jemnbreda sågade; blomk. *lutande*; fruktborster vanl. 4. ☉ 7, 8, g. blr. —  $\beta$  *radiala*: med utdragna strålblr. Fig. Fl.D.481.

\*) I de familjer, der fröhviten icke nämnes, finnes den alltid.

Våta st. (Sk.—Helsl. Medelp. Sundsvall enl. J. A. Leffl. Ångml. Thorsåker sn. Verml. Boh. Hall. Öt. Gottl. — N. —  $\beta$  Sk. — Södm. Stockh. Helsl. Mo sn: J. A. Wistr. Vestml. Ner. Verml. Boh. Hall. — N. söd. del.) Var. stund. enblomstrig och ett par tum hög: *B. minima* L. —  $\beta$  är *Coreopsis Bidens* L.

## 2. CHRYSANTHEMUM Lin. Prestkrage.

† Skalkfrukt naken [utan fruktkrona].

- 1 *C. segetum* L. bladen halftomsfattande, vid basen sågade, mot spetsen flåkiga och tandade; holkfjällen bredt äggfunda. ☉ 7, 8, g. strålblr. Fig. Sv.B.496. Fl.D.995. Åkr. odl. st. (Sk.—Ångml. VB. Neder-Kalix. Vestml. Verml. Dalst. Boh. Gottl. Sparsam ell. sällsynt ofvan Skåne. — N.) Blåaktigt grön, till alla delar glatt, med stora guldgula blomkorgar.
- 2 *C. Leucanthemum* L. de nedre bladen skaftade spadlika, de öfre halftomsfattande, lancetlika sågade, vid basen flåktandade — n. parklufna; holkfj. lancetlika. 2 7, hv. strålblr. Fig. Sv.B.346. Fl.D.994. Torra st. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. — N. till Nordl.) Var. nångång i Sk. och Blek. utan strålblr:  $\beta$  *flosculosum* Aspegr., samt mer och mindre hårig. — *Leucanthem. vulgare* Lam.

†† Skalkfrukt med krona: *Pyrethrum* Sm.

- 3 *C. Parthenium* Pers. bladen parbladigt delade; likarne inskurna, de öfre sammanflytande; blomkorg. i qvastlik samling. 2 7, 8, hv. strålblr. Fig. Sv.B.285. Fl.D.674. Byar etc. r. (Sk.—Uppl. Nerike och Verml. Boh. Troligen öfverallt förvildad. — N. Tellemarken.) Saknar stundom strålblr. — *Matricaria* L. *Leucanthemum* Godr. & Gren.

## 3. MATRICARIA Lin. Sötblomster, Baldursbrå.

† Blomfästet inuti tätt; skalkfr. med 3 åsar: Baldursbrå.

- 1 *M. inodora* L. bladen dubb. parbladigt delade med smalt jemnbreda, n. trådsmla likar; skalkfrs topp hinnkantad. ☉ 6—8, hv. strålblr. —  $\beta$  *borealis*: holkfjällen dubb. större, aflånga, med bred svart hinnkant. Fig. Fl.D.696. Reich. Corymbif. i D.Fl.t.985, f. 1. \**maritima* L. bladflik. kortare, trinda och köttiga. Fig. Reich.t.985, f. 2. H.N.f.12, n:o 2. Odl. st. a., \*hafsstr. (Sk.—Lpl.—N. —  $\beta$  N. Trondhjem. — \* Sk.—Boh. Smål. Öro: Scheutz; Kalmar. Stockh. yttre skärg. — N. till Finn.) Bladflik hos hufvudformen platta på undre sidan. Varierar utan strålblr. — *Tripleurospermum* C. H. Schultz och ed. 9. *Pyrethrum* Sm. \* är vanl. lågväxt ell. nedligg. med smärre blomkorgar, och synes vara var. *salina* Wallr. ell. åtminstone derifrån knappt skiljbar.

†† Blomfästet ihåligt; skalkfr. med 5 åsar: Sötblomster.

- 2 *M. Chamomilla* L. bladen dubb. parbl. delade med trådsmla likar; blomkorg. långt skaftade, med strålblr; diskblr 5tandade; skalkfrs topp utan hinnkant [krona]. ☉ 6, 7, hv. strålblr. Fig. Sv.B.50. Fl.D.1764. Torra, odl. st. (Sk.—nor. Ångml. Själevad. Jemt. Pit. Lpm. Kuorokveik. Sällsynt norr om Dalelven. — N. till Hedemarken och efter kusten till Trondhj.) Har en stark sötaktig lukt. En var. med färre och nedböjda strålblr är *M. suaveolens* L.FlSu. och Herb.
- 3 *M. discoidea* DC. bl. som föreg.; blomkorg. kort skaftade, utan strålblr; blr 4tandade; skalkfr. med omärklig krona. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Reich.t.997, f. 2. H.N.f.14, n:o 5. Gator, odl. st. r. (Uppl. Uppsala, på gator och gårdar i Fjordingen samt i Bot. trädg.; vid Simtuna prestg. — N. Christiania, vid Mellemtöjen.) Vanligen mer grenig än föreg., som den liknar till lukten. Blomfästet spetsigt kagellikt. — *Cotula matricarioides* Bong.

## 4. ANTHEMIS Lin. Åkerkullor.

- 1 *A. tinctoria* L. bladen parbladigt delade, småbladen parklufna ell. djupt sågade, under tilltryckt håriga; blomfästet slutl. kullrigt med lancetl. fjäll; skalkfr. med hinnaktig,

odelad fruktkrona. 24 6.7. —  $\beta$  *discolor*: bladen n. glatta; strålblirna hvita. Fig. Sv.B.62. Fl.D.741. H.N.f.6, n:o 1.

Torra st. åkr. (Sk.—*Ängml.* och *Jemtl.* Öl. *Gottl.* — N.)  $\alpha$  har vackra höggula strålblr, hvilka någongång saknas. — *Cota tinet.* Gay.  $\beta$  *A. maritima* Retz.

- 2 *A. arvensis* L. bladen parbladigt delade; småbladen enkelt ell. dubbelt parklufna, med inskurna flikar; blomfästet slutl. n. kägellikt, med lancettlika fjäll; skalfr. med plattad topp, på längden förade af sitta åsar.  $\odot$  5—7, hv. strålblr. —  $\beta$  *agrestis*: skalfr. med trubbig toppkant; bladen mer findelade. —  $\gamma$  *salina*: bladflikarne köttiga; stjelken nedligg. Fig. Fl.D.1178. H.N.f.15, n:o 1.

Åkerren.  $\alpha$   $\gamma$  hafstr. (Sk.—VB.—N.— $\gamma$  Hall. Varberg. Sk. Ystad. Köpingsås gamla utlopp.) Bladflikarne hos  $\alpha$  bredare, mer blåaktiga, skalfr:s topp omgifven af en kvassare kant;  $\beta$  har gröna, smalare bladflikar: *A. agrestis* Wallr.

- 3 *A. Cotula* L. blomfästets fjäll jemnbreda; skalfr. med rundad naken topp, småknaggligt strimmande; för öfr. som föreg.  $\odot$  5—9, hv. strålblr. —  $\beta$  *salina* Lindeb. nedliggande med köttiga bladflikar. Fig. Sv.B.429. Fl.D.1179.

Byar, gat. (Sk.—Uppsala. Dal. Smedjebacken. Vestm. Verml. nära Carlstad. Boh. Boh. Öl. *Gottl.* — N. —  $\beta$  Boh. Möllö.) Bladflikarne n. syl-lika. Hela växten illaluktande. — *Marula fetida* Cass.

### 5. ACHILLEA Lin. Nysört (1), Rölleka.

- 1 *A. Ptarmica* L. bladen hela. n. jemnbreda, kvass-sågade, glatta; blomkorgar i qvastlik samling. 24 7, 8, hv. strålblr. Fig. Sv.B.207. Fl.D.643.

Fukt. st. (Sk.—Hels. *Ängml.* Hernön: Stud. H. W. Arnell. Dal. söd. delen. Verml. Boh. *Gottl.* Storugns i Lärbro, samt i Väskinde sn enl. G. v. Cederv. — N. till Trondhj. stift.) Blomkorg. mindre talrika, men mycket större än hos följ.

- 2 *A. Millefolium* L. bladen parbladigt delade, med pardelade och inskurna flikar; blomkorg. i tät, qvastlik samling. 24 7—9, hv. ell. rödl. strålblr. —  $\beta$  *lanata*: stjelk, blad och holk ullhåriga. —  $\gamma$  *sordida*: stj. ullhårig; blad och blomsaml. småludna; strålblirna något gulaktiga. —  $\delta$  *setacea*: spenslig, med dubb. smärre blomk. borstlika bladflikar. —  $\epsilon$  *alpestris*: bladen mer sammansatt delade; blomk. större med bredt svartkantade holkfjäll. Fig. Sv.B.74. Fl.D.737.  $\beta$  Reich.t.1028,f.2;  $\delta$  f.1 och H.N.f.12, n:o 3.

Torra st.  $\alpha$ ,  $\beta$  hafstr. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  Smål. Örö: Scheutz; Kalmar. ÖG. Gräsmarö m. fl. st. i skärg.: Kindb. Boh. Koön vid Marstrand. Öl. *Gottl.* —  $\gamma$  Skåne. Hall. Hasslöv: Theor. —  $\delta$  Sk. Stockh. på Adelsön och Björkö. —  $\epsilon$  N. Finm. Trondhj. st. Molde.) Var. i hög grad, afven med röda strålblr.

### 6. TANACETUM Lin. Rensana.

- 1 *T. vulgare* L. bladen parbladigt delade; småbladen parklufvet inskurna och sågade. 24 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.81. Fl.D.871.

Torra st. (Sk.—Um. Lpm. och VB. — N. till Finm.) Alnshög och derutöfver; bladen ofta krusiga, lukta starkt. — *T. boreale* Fisch., som af Fr. i S.V.Sc. upptages såsom varietet, skiljer sig enl. Ledeb. Fl.Ross. med skalfr. utan fruktkrona.

### 7. ARTEMISIA Lin. Malört, Gråbo.

† Blomfästet hårigt: *Absinthium* Gertn.

- 1 *A. Absinthium* L. stjelken upprätt; rothbladen 3dubbelt pardelade, stjelklbladen mindre delade med lancettlika flikar, alla bl. tätt gråludna; blomkorg. i ensidiga klasar, kort skaftade, nedhöjda, n. klotrunda. 24 8, g. blr. Fig. Sv.B.106. Fl.D.1654.

Byar etc.  $\alpha$ . (Sk.—Hels. *Ängml.* Bjerträ och Långsele. Dal. Verml. Öl. *Gottl.* — N.) Omkring olnshög; skärmbbladen hela. — *Absinth. vulgare* Lam.

- 2 *A. rupestris* L. stjelken uppsitigande; alla bladen parbladigt delade med smalt jemnbreda flikar; rothbladens hela eller 3delade, gleshåriga; blomkorg. som hos föreg. stora. 24 7, 8, g. blr. Fig. Lin. *Gottl.* resa. Sv.B.317. Fl.D. suppl.1,t.25. H.N.f.4, n:o 2. Kalkberg r. (Öl. *Gottl.*) 1—2 qv. hög; kufsrudklasen antingen enkel med blomkorgar på 1—3 liniers skaft, eller delad i smärre klasar med ganska korta bl.skaft; stjelklbladen knappt en half tum långa kammtikt fikade.

†† Blomfästet glatt: *Abrotanum* Fr.

\* Blomkorg. rundade, med glatt ell. gleshårig holk.

- \*3 *A. norvegica* Fr. stjelen uppböjd, n. enkel; bladen parbladigt delade i hela eller åter delade, under håriga flikar; blomkorg. halfrunda, nedböjda, på långa enblomstriga hvitulliga skaft i stjelen spets och bladvecken. 24 8, g. blr. Fig. Fl.D.801. H.N.f.4, n:o 1.

Fjellv. r. (N. Dovre, öfver allt på fjellen vid Kongsvold och Drivdalen. Romsdalen. i Eikisdalen.) *Har sällan mer än 4—6 blomkorg., upplattade n. en half tum vida och således de största i släktet, med bredt hinnkantade mörka holkfjäll.* — *A. rupestris* Fl.D.

*A. laciniata* W. stj. n. upprät; bladen parbladigt delade; rotbladens flikar pardelade, stjelklbladens djupt parklufna, med smala spetsade gleshåriga flikar; blomkorg. klotrunda, lutande, kort skaftade, i uppräta mångblomstriga klasar. 24 8, g. blr. Fig. Fl.D. suppl.1, 26. H.N.f.4, n:o 3.

Torra st. r. (Öl. Borgholm; Skogsby-bet i Thorslunda; Albrunna i söd. Möckleby; Gösslunda i Hulterstad m. fl. st.) — *A. tanacetifolia* Retz.

- 5 *A. campestris* L. stj. uppböjd ell. uppstigande; bladen parbladigt delade, med flerdelade, vanl. glatta, n. trådsmla flikar; blomkorg. rundadt äggformiga, lutande, ganska kort skaftade, i ensidiga klasar. 24 7—9. —  $\beta$  *sericea*: bladen silkesludna. Fig. Fl.D.1175.

Torra back. (Sk.—Gestr. och Vestml. VG. Boh. på Nordkoster; Tanum sn. — N. Tönsberg, Christiania—Ringerige. —  $\beta$  Sk. ÖG. Omberg; Kindb. Uppsala, Slottsbacken. Boh. n. Grebbestad enl. Leml. Öl. Goutl.) *Blomkorg. mycket små brunaktiga, glatta.*

\*\* Blomkorg. aflånga, med tät hvitluden holk.

- 6 *A. vulgaris* L. stj. upprät; bladen dubbelt pardelade, med lancettlika inskurna spetsade flikar, under hvitludna; blomkorg. något lutande, n. oskaftade i mångblomstr. klasar. 24 8. —  $\beta$  *coarctata*: bladen med smälare, under snöhvitt ulliga flikar; klasarne sammandragna, täta uppräta. Fig. Sv.B.417. Fl.D.1176.  $\beta$  Lin. Inst. Skrift.t.1. Reich.t.1038.f.2.

Åkerren, etc. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. Lul. Lpm. Storbacken: C. Indeb. — N. till Finnm. —  $\beta$  Hafsstr. Blek.—Helsl. VB. Neder-Kalix. Öl.) 1—2 alnar hög; än med mörkbrun stjolk och bruna blr, än med ljus stjolk och gulare blr.

- 7 *A. maritima* L. stj. uppstigande; bladen parbladigt delade, på begge sidor hvitludna med hela eller 3delade jemnbreda trubbiga flikar; blomkorg. som föreg., än uppräta, än nedböjda. 24 8, 9, g. blr. —  $\beta$  *suffruticosa*: stj. träaktig, högre och n. upprät, med utböjda klasar och nedböjda blomkorg. Fig. Sv.B.323. Fl.D.1655.  $\beta$  H.N.f.4, n:o 4. Hafsstr. r. (Sk. vest. kusten. Öl. Goutl. —  $\beta$  Sk. vest. kusten. Hall. Varberg. Boh. Vinga och kringligg. öar; Tanum sn. Sör Edsvik. Blek. på öar utanför Thorshamns udde. Smål. Kalmar; Vestervik på Gränsö.)  $\beta$  är ofta 2—3 quart. hög grenig: *A. salina* Liljebl.

## 8. ARNICA Lin. Hästfåbla.

- 1 *A. montana* L. stj. 1—3blomstrig jemte blomholken glandelhårig; bladen motsatta, äggrundt aflånga, gles tandade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.185. Fl.D.63.

Skogsäng. (Sk.—Uppl. Helsl. Kråkfåla i Jettendal: C. O. Berg; Letsberg i Ljusdal: J. A. Wistr. Dal. Hedemora. Vestml. Lillhärad. Ner. Verm. Boh. Sällsynt i norra och östra prov. — N. söd. delen upp till Bergen och Ringeboe. Molde.) *Nära alnshög växt, med stora blomkorg., brandgula blr.*

- 2 *A. alpina* Murr. stj. alltid enblomstrig, upptill jemte blomholken tät hvitullig; bladen motsatta lancettlika, smalspetsade, n. helbräddade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.699. Fl.D.1524. H.N.f.12, n:o 5.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka. Lul. Lpm. Qvikkjokk, Sähkok, Ruonas, Tjägneres, Welkespuolda, samt öst. om Rissajokk; Njuonjes vid Tarrajokk: H. Widm., och Tjakkeli vid Laidare: C. Ind. Pit. Lpm. Kåbrenoiwe, vid Laiselfven. — N. Finnm. Fjellet Sakkabani vid Kaafjorden: Th. Fr. och E. Henschen; Flöjffjellet



vid Tromsøe.) *Quartershög med ljusgula blr.* — *A. montana*  $\beta$  L. *A. angustifolia* Fl.D.

## 9. CINERARIA Lin. Nocka.

- 1 *C. palustris* L. stjelen *låtbladig*; *alla bl. likformiga*, lancettlika, bugtigt tandade — n. helbräddade, jemte stjelen *småtudna*, endast de nedre skaftade; blomkorg. i qvast af *flerblomstriga* skaft; skalfr. *glatta*. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.737. Fl.D.573. H.N.f.1, n:o 5.

Kärräng. torfgrävar. (Sk. Blek. vest. delen: Gosselm. Smål. vid Röja sjö i Gamleby sn; Skir nära Vexjö; Wide i Ljuder m. fl. ställen: Scheutz. Hall. Vindrarps och Renneslöf snr: Theor.; Halmstad: Söndrum. VG. Vartofta i Åsaka sn vid Barnesjön. Öl. vid Beteby i Mörbylånga etc.) *Othonna* L.Fl.Su. *Senecio* DC.

- 2 *C. campestris* Retz. stj. *glesbladig*; rothbladen kort skaftade *aggrunda* otydl. tandade; stjelen oskaftade, de öfre *jembreda*, alla jemte stjelen *hvitulliga*; blomk. i qvast af enblomstr. skaft; skalfr. *styfhåriga*. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D.1177. H.N.f.1, n:o 6.

Torra st. r. (Sk. vid Lödöeström från Lackalänge till hafvet; Landskrona vallar; Axelvold nära Dufek; Ignaberga kyrkogård och kalkbrott; Dysjöbro i Annelöf sn etc.) *Cin. alpina* L. Herb. alp.  $\gamma$  L.Sp.Pl. och Fr.S.V.Sc. *C. integrifolia* E.B. *Senecio* DC.

## 10. SENECEO Lin. Kors-ört, Stånds.

† Strålblr utdragna, horisontalt utstående: Stånds.

\* Bladen odelade.

- 1 *S. paludosus* L. bladen smalt lancettlika spetsade, hvass-sågade, under småtudna ell. flockulliga, säll. glatta; blomkorg. i utbredd qvast; skalfr. småtudna. 2 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.736. Fl.D.385. H.N.f.2, n:o 2.

Våta st. stränd. r. (Sk. Christianstad flerst. enl. F. Aresch.; Lillö- och Råbels-sjön; mell. Rönne Mölla och Brännestan på holmar i Rönneån; mell. Gullarp och Bosarp; Ramstorp i Torlösa sn etc.) *Stjelen enkel upprätt, 3—6 fot hög.*

\*\* Bladen pardelade; alla skalfr. glatta.

- 2 *S. aquaticus* Murr. rotbl. och de nedre stjelenbl. hela ell. lyrförmigt pardelade med stor, aflångt ägggrund, säll. något hjertlik, tandad ändflik och aflånga sidoflikar; blomkorg. i qvast af uppräta grenar. 2 8, g. blr. Fig. Sv.B.681. Fl.D.784. H.N.f.3, n:o 2.

Fukt. st. r. (Hall. nor. del. Boh. i söd. skärg. VG. Gräfsnäs; Göteborg. Dalsl. Baldernäs: Stud. G. Thorstenson. Smål. Vestervik? Götll. Halvede i Hogrån, och Koparfve i Ruthe enl. G. v. Cederv. — N. Drammen; Aalesund: Doc. P. Olsson.) *Liknar följ., men har större blomkorg., samt rotbl. med stor odelad ändflik, små, stundom inga sidoflikar. Var. med ända till spetsenflikade blad. — S. erraticus Bert., skild med vidt utstående grenar i blomqvasten och hjertlik ändflik på rotbl., växte förr i Sk. vid Yngsjö, men är enl. F. Aresch. ej i sednare tider återfunnen.*

\*\*\* Bladen pardelade; alla ell. en del skalfr. håriga.

- 3 *S. Jacobæa* L. bladen lyrförmigt pardelade, med mot spetsen vidgade, inskurna och tandade flikar; blomkorg. i tät mångblomstrig qvast; diskblirnas skalfr. *stråfhåriga*, kanthblirnas glatta. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.606. Fl.D.944. H.N.f.14, n:o 3 [var.].

Tor. st. (Sk.—Uppl. Gefle, vid Nyberg, Holmsund etc. Medelp. Sundsvall, på ballast: C. Ind. Angml. Hernön; Säbrå sn: H. W. Arnell. Dalsl. Boh. Öl. Götll. — N. Drammen; Holmestrand till Bergen.) *Var. med ända till spetsen pardelade blad och med stor odelad, tandad ändflik; rotbl. vanl. af sednare formen. Saknar stundom strålblr, såsom ex. i H.N.*

- 4 *S. erucifolius* L. bladen pardelade ända till spetsen, med jembreda inskurna spetsade flikar; blomkorg. som hos föreg.; foderholken näende till blomholken midt; alla skalfr. stråfhåriga. 2 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.607. Fl.D.1885. H.N.f.1, n:o 4.

Jordvallar etc. r. (Sk. Malmö; mell. Lund och Dalby; Trolleberg; Skifarp; Getinge etc.) *Bladflikarne ofta tumslånga, omkr. 1 linie breda, med 2—3, spetsade småflikar, mest i undre kanten. — S. tenuifolius Retz. och Jacq. Linnés ursprungliga, i Sk. Resan omnämnda erucif. är, enl. hans Herbar., en form af S. silvaticus.*

- 5 *S. vernalis* WK. rotbladen små omv. äggrunda, inskurna och tandade; stjelkl. aflånga, parklufna ända till spetsen, med äggrunda, trubbiga och krusigt tandade flikar; blomkorg. i fåblomstrig qvast; foderholk. flere gånger kortare än blomholken; alla skalfr. stråfhåriga.  $\odot$  5, 6, g. blr. Fig. Reich.t.959,f.2.  
Odl. st. r. (Sk. vid Fogelsång 1864 enl. F. Aresch.) Ull. ex., de enda utg. sett. 1—2 qv. höga, dels enkla, dels långt ned greniga. Liknar till bladen arter i följ. afd.
- †† Strålblr korta och tillbakarullade ell. inga: Korsört.
- 6 *S. viscosus* L. bladen djupt parklufna klubbhåriga; blomkorg. upprätta, med tillbakarullade strålblr; foderholken näende öfver den klubbhåriga blomholkens midt; skalfr. glatta.  $\odot$  7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1230.  
Gat. etc. r. (Sk.—Uppsala. Helsl. Segersta sn enl. Lemm. Ångml. Ytter-Lännäs sn, tillfäll. Södra Dal. VG. kring Göteborg. Boh. Tryggön: Doc. Olsson. Hall. Öl. Böda. Gottl. — N. Christiansand—Christiania.) Hela växten klubbhårig.
- 7 *S. silvaticus* L. bladen parklufna glandelbräddade; blomk. upprätta, med mycket korta tillbakarullade strålblr; foderholken 3—5bladig, knappt näende öfver den glatta blomholkens botten; skalfr. finhåriga.  $\odot$  7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.869, 791.  
Svedjel. berg. etc. (Sk.—Helsl. Ångml. Säbrå och Ulånger; Ytterlännäs enl. Lemm. Dal. Verm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Söndmör.) Strålblrna ganska korta, stundom inga.
- 8 *S. vulgaris* L. bladen stjelkomf. parklufna; blomkorg. lutande, meränd. utan strålblr; foderholkens fjäll omkr. 10, svartspetsade, näende öfver blomholkens bas; skalfr. finhåriga:  $\odot$  6—10, g. blr. Fig. Sv.B.353. Fl.D.513.  
Odl. st. a. (Sk.—Um. Lpm. VB. nor. del. — N. till Finnm.) Har någongång korta strålblr.

#### 11. HELICHRYSUM Gært. Hedblomster.

- 1 *H. arenarium* DC. bladen gråulliga, de nedre spadlika, de öfre smalt lancettlika; blomkorg. i tät rundad qvast. 24 7—9. Fig. Sv.B.658. Fl.D.641. H.N.f.2, n:o 1.  
Sandhed. (Sk. Hall. Blek. särd. i vest. delen. Smål. Vissefjerda söd. om Emmeboda. Öl. mellan Färjestaden och Thorslunda, samt vid Glömminge m. fl. st. Gottl. Hense sn.) Blomkorg. af en skinande citrongul, stund. pomeransgul färg [*β aurantiacum* Pers.]. — *Gnaphalium* L.

#### 12. GNAPHALIUM Lin. Noppa.

† Blomkorg. gytrade i hufvudlika (rundade) samlingar.

- 1 *G. luteoalbum* L. stjelken slak, oftast enkel; rotbl. n. tunglika, stjelkl. omfattande, lancettlika, alla hvitulliga; blomkorg. gytrade till ett ell. flere hufvuden i stjelkens spets; skalfr. glatta, grynprickiga.  $\odot$  8. Fig. Fl.D.1763. H.N.f.1, n:o 1.  
Fukt. st., vägkant. r. (Sk. Skanör; Fåsterbo; Lilla Hammar. Blek. Hörby. Smål. vid Hosmo och söd. Hagby. Öl. mångenst. på vest. sid.; på den östra vid Långöre kapell enl. Sjöstr.) Blrna gula; holkfj. glänsande hvitgula.
- 2 *G. uliginosum* L. stjelken uppstigande, meränd. grenig, ullig [hos \*nud. glatt]; bladen smalt lancettlika, spetsiga mjukludna; blomkorg. gytrade i stjelkens spets och bladvecken; skalfr. glatta [ell. finhåriga], släta.  $\odot$  7, 8. Fig. Fl.D.859. H.N.f.10, n:o 2.  
\*nudum Hoffm. hela växten späd och fullkomligt glatt. Fig. Reich.t.948,f.3. H.N.f.12, n:o 6.  
\*pilulare Wg. skalfr. stråfva af korta hår. Fig. Wg.Fl.L.t.19.  
Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. — \*nud. Hafsstr. Sk. Kullaberg nära Mölle. Hall. Falkenberg. Blek. Ronneby nära Djupafors. Smål. Kalmar. Öl. — \*pil. VB.) Var. från tumshög och enkel [\*pygmaeum Wess.] till quarterslång och mycket grenig; blomk. små och bruna.
- 3 *G. supinum* L. stj. slak, trådläk, med grenskott vid roten; bladen jemnbreda spetsiga ulliga; blomkorg. i stjelkens spets och stund. i öfre bladvecken; skalfr. glest stråfhåriga. 24 7, 8, br. blr. — *β fuscum*: blomkorg. klaselik gytrade, de nedre skaftade. Fig. Sv.B.716. Fl.D.332. H.N.f.6, n:o 2.

Fjellv. (*Lpl.—Herjed. — N.*) *Vanl. fingerhög, 1—8blomstrig. — G. procumbens L. Herb. G. alpinum Fl.D. β G. fuscum W.*

†† Blomkorg. samlade mot stielkens spets i ett bladigt ax.

- 4 *G. silvaticum L.* stielken uppstigande, styf enkel och mångbladig; bladen jemnbreda, under mjukludna; skalfr. något sträfv. 24 8, br. blr. Fig. Fl.D.1229.  
Torra st. (*Sk.—Lpl. — N. till Nordl.: Norm.*) *Stielken fothög, något nedligg. vid basen, sedan upprät, utan grenskott. Har enl. Läst. vissa år i VB. en höstform, som ganska mycket närmar sig till föreg.*
- 5 *G. norvegicum Gunn.* stielken som föreg. mer upprät; bladen smalare ell. bredare lancetlika, på båda sidor flockulliga, de mellersta störst; skalfr. som föreg. 24 7, 8, br. blr. Fig. Fl.D.254. H.N.f.14, n:o 7.  
Fjelltr. (*Lpl.—Dal. Ångml. Tåsjö. — N.*) *Skiljd från föreg. med mer sammanhängande och tjockare ax, bredare blad; grenskott 0.*

### 13. ANTENNARIA Gärtn. Kattfotsört.

- 1 *A. dioica Gärtn.* grenskottens blad spadlika, nervlösa ell. 1-nerviga, und. hvitl., ofvanpå meränd. glatta; stielkbl. jemnbreda spetsiga; blomkorg. i qvast; holkfjällen i spetsen rundade, på utsidan något konvexa. 24 5, 6, hv. ell. r. blr. Fig. Sv.B.148. Fl.D.1228.  
Tor. back. a. (*Sk.—Lpl. — N.*) *Vanl. blott några få tum hög, men stund., särd. i fjelltrakter, fothög med mer än tumslånga blomkorgskäfst. En dylik form med ofven öfver bladytan smulden är Gnaph. hyperboreum Don. — Gnaphalium L.*
- 2 *A. alpina [L.]* grenskottens bl. tunglika, i öfr. som hos föreg.; stielkbl. lancetlika; blomk. i qvast; holkfj. spetsiga [hos ♂ trubbiga] platta, med utstående spets. 24 6, 7, grågr. blr. Fig. H.N.f.3, n:o 1.  
Fjellv. (*Lpl.—Herjed. — N.*) *Vanl. något mindre än föreg., men var. som denna. Hanväxten ytterst sällsynt, funnen 1842 af L. L. Läst. liknar i allt annat hanväxten, men har bredare, trubbiga och i spetsen något färgade holkfjäll. — Gnaph. L.*
- 3 *A. carpatica Bl. & Fing.* alla bl. smalt lancetlika spetsade, 3nerviga, på begge sidor småulliga; blomk. gytttrade i tät qvast; holkfj. platta, hos ♂ trubbiga, hos ♀ spetsiga. 24 6, 7. Fig. Wg.Fl.Carp.t.3. Fl.D.suppl.98. H.N.f.11, n:o 2.  
Fjellv. r. (*Torn. Lpm. Kåbdåvanka; fjellet Moskana: C. P. Läst. Lul. Lpm. vid nor. sidan af Kerkeware; Puolaure; Wassja Walleware; Welkespuolda etc. Pit. Lpm. Wuopmekets-tjokko vid Pjeskejaure; Staika och Sartaajokk, samt Metjirpakte på Sulitälma; Kasak etc.: H. Widm. — N. Finnm. Tsatsa; Kautokeino; Maals-elven, på fj. Mauken, samt Sör-Reisen, på Middagsfjeld: Norm. Nordl. Salten.*) *Honväxtens blomkorg. slutt. i mera utbredd qvast, hvita af det långa och fina fruktsjunet, hvilket deremot i hanväxtens blomk. är kort, mot spetsen klubblikt. — A. alp. Gärtn. Gnaph. Wg.*

### 14. FILAGO Lin. Musört.

- 1 *F. germanica L.* stj. slutt. upptill klynnedelad; bladen lancetl. — jemnbreda, ulliga; blomkorg. i klotrunda oskäftade gytringar i toppen och grenvecken; holkfj. syl-spetsade; skalfr. hvitprickiga. ☉ 7. — β *apiculata*: bl. bredare, mer gröna; holkfj. i spetsen röda. Fig. Sv.B.661. H.N.f.6, n:o 3. β Fl.D.997.  
Åkr. fält, r. (*Sk. Ystad, Dalköpinge; Trelleborg; Skanör; Roslätt; Skabersjö etc. Hall. Hasslöt.*) *Blrna brunaktiga; holkfj. långa gulglänsande, hos hufvudf. med gul spets. — F. pyramidalis L. Fl. Su. Gnaphalium, tillika med de följ., Willd. Gifola Cass. β F. apiculata Sm.*
- 2 *F. montana L.* stj. enkel ell. skiftevis grenig, med uppräta grenar; bladen som hos föreg.; blomkorg. ulliga, gytttrade på grenarnes sidor och spets; holkfj. trubbade; skalfr. prickiga. ☉ 6, 7. — β *arvensis*: gren. utdragna, endast mot spetsen bärande blomkorgar. Fig. Sv.B.659. H.N.f.1, n:o 2; f.7, n:o 2. β Fl.D.1275.  
Sandback. a. (*Sk.—VB. Dal. — N. — β Sk. Blek. Smål. i Kalm. län; i Alfvestad i Vexjö län enl. Scheutz. Dal. Husby sn. Boh. Skaftö. Strömstad; Foss sn och vid sjön Bullaren: Lem. Öl. — N. Christiania.*) *Blrna föga symbara, gulaktiga. — Oglifa Cass. β F. arvensis L. Fl. Su. och Herb.*

- 3 *F. minima* Fr. stj. enkel ell. vid basen och i spetsen grenig; bl. n. jemnbreda grå-ludna, tilltryckta; blomk. gytttrade i toppen, *kägellika*, slutl. föga ludna; holksf. *trub-bade*; skalfr. *slåta*. ☉ 7, 8, gulakt. blr. Fig. Sv.B.660. Fl.D.1276. H.N.f.1, n:o 3. Back. sandfält, r. (Sk—ÖG. VG. och Boh. Dalsl. Färglanda sn. Öl. Gottl. — N. Arendal; Lillesand; Mandal.) 2—6 tum hög, mycket spädare än de föreg.; bladen 3—4 lin. långa, n. legellagda. — *F. arvensis* Wg. *Gnaph. montanum* Fl.D.

b) *Asteraceæ*. Stiftets 2 släktar jemnbreda, upptill finludna.

### 15. *INULA* Lin. Alant, Krisgräs.

† Strålblr 0.

- 1 *I. Conyza* DC. stjelen upprät, grenig, med vanl. talrika blomkorg. i qvastlik samling; bladen äggr. lancettlika, glest tandade, under grå-ludna, de nedre skaftade; holksf:s spets utsperrad. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.622. H.N.f.16, n:o 6. Tor. st. r. (Sk. på en pilvall nära Trolleberg vid Lund enl. F. Aresch.) *Inemot alns-hög växt med rödbrun stjeln och holk. — Conyza squarrosa* L.

†† Strålblr utdraget tunglika.

\* Skalfr. 4kantiga.

- 2 *I. Helenium* L. bladen stjelnkomsatt, äggrunda, ojemna, under ludna; holksf. äggrunda; skalfr. glatta. 2 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.55. Fl.D.728. Fukt st. vid byar, r. (Sk.—Uppl. Vestml. och Ner. VG. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. söd. om Visby; Lem. Troligen öfverallt förvildad. — N. söd. delen: Ax. Blytt.) 2 alnar hög, med mycket stora blomkorgar, grön holk. — *Corvisartia* Mer.

\*\* Skalfr. trinda.

- 3 *I. Britannica* L. stjelen upprät luden; bladen stjelnkomsf., lancettlika spetsade naggsågade, under ullhåriga, stund. n. glatta; holksf. lancettlika; skalfr. håriga. 2 8, 9, g. blr. Fig. Fl.D.413. H.N.f.4, n:o 5. Fukt st. r. (Sk. Christianstad, mångenst. enl. F. Aresch.; Krageholm, vid sjön; Hö-köping, s. om Gessie m. fl. st. Smål. Jönköping. Hall. Skottorp och Dömmestorp; Theor. Öl. särd. nor. del. Gottl. När, Hemse, Roma, Fårön etc.) *En mer luden form är γ stricta* Wg. Var. stundom med enblomstrig stjeln och smala, föga håriga blad.

- 4 *I. salicina* L. stj. upprät glatt; bl. stjelnkomsf., lancettlika, spetsade glatta, upphöjdt ådriga, i kanten fintaggiga, utböjda; blomkorg. 1 ell. flere, de yttre slutl. längre skaftade; holksf. aflånga; skalfr. glatta. 2 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.786. H.N.f.14, n:o 2. Ängsback. (Sk.—Uppl. Dal. Husby sn, en holme i Amungen. Ner. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N.) Var. låg och enblomstrig på Öl. Bladen stundom glest småsågade.

- 5 *I. ensifolia* L. stj. uppstigande; bl. föga omfattande, n. jemnbreda, spetsade, sträf-ell. hårbräddade, glatta, utstående, n. parallellt nerviga; blomk. meränd. en enda; holksf. äggrundt lancettl.; skalfr. glatta. 2 8, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.t.24. H.N.f.14, n:o 1.

Kalkberg, r. (Gottl. Bunge sn, på skarpa kalkstenslättar, kallade Träskhedarne, bland enbuskar; Fleringe sn, vid Hessele. Fordom äfven  $\frac{1}{4}$  mil öst. om St. Ibre i Hangvar enl. uppgift af Rosén, men der aldrig återfunnen.) Gottl. ex. äro mindre ofta, än ulländska, flerblomstriga.

### 16. *PULICARIA* Gärtner. Loppört.

- 1 *P. vulgaris* Gärtner. stjelen nedligg. ell. upprät, upptill finluden; bladen stjelnkomsf. aflånga vågbräddade, finludna; stråblarna ganska korta. ☉ 7—9, g. blr. Fig. Sv.B.738. Fl.D.613. H.N.f.15, n:o 2. Fukt. st. (Sk. allm. Hall. Blek. Smål. från Blekingsgränsen upp till Kalmar: Scheutz. Öl.) *Inula Pulicaria* L.

### 17. *BELLIS* Lin. Tusenskön, Vetteljus.

- 1 *B. perennis* L. stängeln enblomstrig; bladen omv. äggrunda, glest naggsågade. 2 6—10, hv. ell. rödl. strålblr. Fig. Sv.B.238. Fl.D.503.

Fålt och fukt. äng. (*Sk.* allm. *Blek.* vest. delen. *Smål.* Kalmar; Stensö etc. *Hall.* Hasslöf och Karup; *Theor.* *Öl.* *Gottl.* Förvildad flerest. i mell. Sv. — *N.* Christian-sands st.) *Tvufvig med fingerhåga stänglar, och bladen i rosett.*

18. *ASTER* *Lin.* Strandkil.

- 1 *A. Tripolium* *L.* bladen n. jemnbredt lancettlika, helbräddade, glatta och köttiga; blomkorg. i qvast med äggr. holkfjäll.  $\gg$  7, 8, b. strålbl. —  $\beta$  *arcticum* *Th. Fr.* stj. lågväxt och stadig, delad n. ända från basen i jemnhöga grenar. *Fig.* Sv.B.470. *Fl.D.*615. *H.N.f.*16, n:o 5.

*Hafsstr. (Sk.—Helsl. VB. Nordmaling. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Till Trondhj. —  $\beta$  N. Ost-Finm. vid Jarfjorden: E. Hensch. enl. Th. Fr.) Har stund. hvita stråtblr; någongång saknas de aldeles.*

19. *ERIGERON* *Lin.* Binka.

† Stjelken mångblomstrig, öfverallt tydligt hårig.

- 1 *E. acris* *L.* mjukhårig; rotbladen tunglika, stjelkbl. lancettlika, helbräddade; blomkorg. n. i enkel klase; holken gråtluden; strålblrna knappt längre än disklbrna.  $\gg$  2, 7, gred. ell. rödl. strålblr. —  $\beta$  *glomeratus*: blomkorg. mer kortskafade och gytttrade, den i stjelkens spets. dubh. större. —  $\gamma$  *ruber*: blomk. små, med längre röda strålblr. —  $\delta$  *grandis*: blomk. stora på långa skaft; strålblr som  $\gamma$ . *Fig.* *Reich.* t.917, f.2. *Tor. äng., back. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  Lpl. — N. Nordl. Finm.) Var. från fot-hög till några få tum hög, enkel ell. grenad till basen, med större och mindre blomkorgar o. s. v.*

- \*2 *E. rigidus* *Fr.* hårig och sträf; stjelken enkel, djupt färad och kantig; rotbladen små, omv. äggrunda, afsmaln. till skaft; stjelkbl. oskafade, n. 3nerviga, något styfva, helbräddade; blomkorg. i klase; blomholken svart, mycket gleshårig; strålblrna utstående, längre än disklbrna; de inre af dessa trådlika.  $\gg$  r. ell. hv. strålblr. *Fig.* *Fl.D.*2595.

*Fjelltr. r. (N. Från Filefjeld, Nystuen till Nordl.) 1—2 fot hög, enkel och utan rot-skott; rotbl. föga större än E. uniflori; blomkorgen i stj:s spets mycket stor, de på sidan smärre på enkla och utdragna, n. liklånga skaft; holken endast med ett ell. annat hår. — Allt enk. Fr.; osedd af utg.*

†† Stj. mångblomstrig, glatt ell. n. glatt.

- 3 *E. Mülleri* *Lund*: stj. glatt och slät; bladen jemnbredt lancettlika, glatta, stundom hår-bräddade; blomkorg. i enkel ell. grenig klase, med kortare sidogrenar och glest småhårig holk.  $\gg$  7, rödl. strålblr. *Fig.* *Fl.D.*874. *Reich.* t.916, f.1. *H.N.f.*8, n:o 1, högra ex.

*Back., fjelltr. r. (Torn. Lpm. Jukkasjärvi och vid Tornio träsk. Lul. Lpm. Snjårak och Nammats vid Quikkjokk; Tjårris vid Njåtnosäddo: H. Widm. Um. Lpm. Kat-tisavan, Berglunda. Ängml. Tåsjö m. fl. snr. VG. Bastungen nära Venersborg. Boh. Uddevalla. — N. Christiania, Dröbak; Gudbrandsdalen, mell. Laurgaard och Rundene; Bergens st.) Norska och Boh. ex. föga skiljda från E. acris, dock ut-märkta af sin glatthet, från följ. med mera klaselik blomställning af kortare, ofta färbomstriga skaft, tydligare hårig holk. Norrländska ex. närma sig deremot mera följ. art, från hvilken de af Ands. troligen med rätta, anses ej skiljbara. — E. dröbachensis Fr. och trol. Fl.D. E. elongatus Fr.S.V.Sc.p.3.*

- 4 *E. elongatus* *Led.* stj. n. glatt; bladen aflångt jemnbreda, 3nerviga; blomkorg. på enkla utdragna skaft, med längre strålblr. n. glatt, glandelprickad holk.  $\gg$  7, 8, r. ell. hv. strålblr. *Fig.* *Fl.D.Supp.* 1, t.23. *H.N.f.*8, n:o 1, venst. ex.; f.15, n:o 3 [var.].

*Fjelltr. (Torn. Lpm. Nuljalaki. Rect. For. Lul. och Pit. Lpm. Jemtl. Herjed. VB. nor. del t. ex. Huuki gästgg.; Kengis. Medelp. Viksjö sn enl. Leml. Helsl. Loos sn, nedom Carlsberget och vid Tenskog: J. A. Wistr. — N. Finm. — Dovre. Österdalen, på Tvårfjeld i Tryssild sn etc.) 2—3 qv. hög; skiljd från föreg. med föga annat än holken, som synes beströdd med prickar, hvilka vid stark för-storing visa sig vara korta glandelhår, några få stund. utväxande till vanliga hår. — E. politus Fr.S.V.Sc.*

††† Stjelken 1—3blomstrig.

- 5 *E. alpinus* *L.* rotbladen tunglika, något spetsiga; blomkorg. 1—3; holken af jemn-

- bredt lancettlika fjäll, ludna af otydligt ledade hår; strålblirna utdragna.* 24 7, 8, r. säll. hv. strålblr. Fig. Fl.D.292. H.N.f.8, n:o 2.
- Fjelltr. (*Lul. Lpm.* Njuonjes; Säbkok: Ahrl. enl. Ands. *Jeml.* i gränssjellen samt kring Åreskutan; Frösön, på Kungsgårdens södra äng. *Herjed.* Midtåklappen, Axhögen etc. — *N. Finnm.* — Vang i Valders.) 5—10 tum hög med brun stielk, stora vackra blomkorg., af hvilka de nedre, då flere finnas, hafva långa, n. upprätta skaft. Då blomk. är ensam, är den n. dubbelt större: var. *macrocephalus*.
- 6 E. *uniflorus* L. rotbl. spadlika trubbiga; blomk. ensam; holken af bredt lancettlika fjäll, ullhåriga af tydligt ledade hår; strålblirna utdragna. 24 7, 8. —  $\beta$  *pulchellus*: holken violett- ell. svartbrunt luden. Fig. Fl.D.1397. H.N.f.8, n:o 3.
- Fjellv. (*Lpl.*—*Herjed.* — *N.*) 2—5 tum hög, vanl. med grön stielk, högst säll. 2 blomkorgar. Strålblirna hvita, nångång rödlätta.

## 20. SOLIDAGO Lin. Guldris.

- 1 S. *Virgaurea* L. stj. något kantig, med tätsitt., upprätta blomkorgsklasar i grenarnes spets; bladen lancettlika, de nedre sågade. 24 7—9, g. blr. —  $\beta$  *litoralis*: rotbl. qvar-sittande, bredt lancettl. spetsiga; blomsamlingen aflång tät, med större blomkorgar. —  $\gamma$  *arctica*: stj. låg (5—7 t.), med utdragna enblomstriga fjälliga skaft; rotbl. qvarsitt., n. tunglika, omärkligt naggade. Fig. Fl.D.663.
- Back. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* —  $\beta$  *Smål.* i skären, t. ex. Örö. — *Stockh.* skärg., på Muskön. *Hall.* Särö; samt *Boh.* Vinga, Tjörn enl. Leml. —  $\gamma$  *Herjed.* Skarffjellet: Stud. S. Axell enl. G. v. Ced. — *N. Finnm.*).

## 21. LINOSYRIS Cass. Guldborste.

- 1 L. *vulgaris* Cass. bladen tririka, smalt jemnbreda glatta; holkfjällen tilltryckta, med utstående spets. 24 8, 9, g. blr. Fig. Fl.D.Suppl.1,t.22. H.N.f.4, n:o 6.
- Tor. st. r. (Öl. på många st. från Föra sn ned till öns söd. udde enl. Sjöstr. Fordom äfven på Lilla Carlsons vid Gottl.) Var. till storleken, fr. 4—8 tum; bladen fin prickiga; blomkorgssamlingen tät qvastlik. — *Chrysocoma Linosyris* L.
- c) **Eupatoriaceæ.** Stiftets flikar klubblika, på utsidan vårtprickiga.

## 22. EUPATORIUM Lin. Floksblomster.

- 1 E. *cannabinum* L. bladen motsatta, kort skaftade, 3—5fingradt delade i lancettlika sågade flikar, den mellersta längst; blomkorg. få-[5—6]-blommiga. 24 7, rödl. strålblr. Fig. Fl.D.745. H.N.f.16, n:o 4.
- Stränd. bland buskar etc. r. (*Sk.*—*Gestr.* Vestml. Ner. Verml. Boh. Hall. Öl. — *N. Brevig*; Langesund.) Örtan lik hampa, 3—4 fot hög, med stor tät qvast af små blomkorgar. På grenar, som framskjuta om hösten, äro bladen stundom odelade, ägggrundt lancettlika.

## 23. PETASITES Neck. Skräp.

† Blomkorg. utan tunglika strålblr; bladbasens flikar afrundade.

- 1 P. *officinalis* Mönch: bladen hjertlika, något buktiga, med större och mindre tänder, under gråhudna; blomkorg. i äggformig ell. utdragen klase. 24 4, 5, rödl. blr. Fig. Sv.B.224. Fl.D.842. H.N.f.1, n:o 7.
- Gård. stränd. etc. (*Sk.*—*Uppl.* Vestml. Ner. Verml. Sunne sn; Sund. på Näset. Hall. Trol. fordom odlad, särdeles i de öfre prov. — *N. Skien*; Christianssand; Flekkerøe; Bergen etc.) Den allmänaste formen har blirna till större delen 2könade: P. *hermaphrodita*; sällsyntare är honväxten, hvars blomk. äro smärre, i utdragen klase och med få ell. inga 2könade blr: P. *hybrida*. — P. *vulgaris* Desf. *Tussilago Petasites* L. — Anm. Stängeln hos alla arterna fjällig; rotbladen framskjuta först efter blomningen och blifva ofta mycket stora.
- 2 P. *alba* Gärtner. bladen njurtlikt rundade buktiga, med större och mindre uddhessa tänder, under hvitludna; blomkorg. i tät qvastlik samling. 24 4, 5, hvitakt. blr. Fig. Fl.D.524. H.N.f.2, n:o 3.
- Skugg. stränd. r. (*Sk.* flerst. vid Ringsjön; Fogelsång; Köpingsådal; Gunnaröd m. fl. st. i söd. och vest. delen enl. F. Aresch. — *N. Christianssand* vid Tjos.) Var. som föreg. — *Tussilago* L.

†† Blomkorg. med korta strålblr; bladen n. triangelformiga: *Nardosmia* Cass.

- 3 *P. spuria* Reich. bladen *triangelformigt* njurlika, olikformigt småtandade, under täckta af snöhvitt ull, slikarne vid basen utsperrade, slåfna; blomk. i n. enkel qvast, med mycket korta strålblr. 24 4, 5, blekg. blr. Fig. Retz.Obs.1,t.2. Fl.D.1828. H.N.f.2, n:o 4.

Sandstränd. r. (Sk. vid Köpingsåns utlopp; Kåseberga och Sandhammar; Ringsjön m. fl. st.) *Kantblorna något bredare än diskblorna, n. tunglika. Var. som de föreg. — Tussilago* Retz.

- 4 *P. frigida* Fr. bladen *triangelformigt* hjertlika, bugtigt *inskurna* ell. *starkt* groftandade, under gråaktigt hvitludna; blomk. i enkel qvast, meränd. med korta strålblr. 24 5, 6, hvitg. och rödl. blr. Fig. Sv.B.680. Fl.D.61. H.N.f.14, n:o 8.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. Idre, trakten kring Löfåsen. Angml. Tåsjo m. fl. snr. Medelp. Torp sn: Reuterm. Helsl. Loos sn, n. om Kyrktjärn. — N.) 2—3 qv. hög. *Saknar stund. strålblr, då diskblorna variera från rörformiga slåfna till snedt uppspruckna, n. tunglika, i sednare fallet alstrande frukt. — Tussilago* L.

## 24. TUSSILAGO Lin. Hästhöfsört.

- 1 *T. Farfara* L. stängeln bladlös fjällig; bladen rundadt hjertlika, bugtiga och tandade; blomkorgen ensam, med utdragna strålblr. 24 3—5, g. blr. Fig. Sv.B.2. Fl.D.595. Leråkr. och stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Bladen visa sig först efter blomningen och blifva stult. quartersbreds.*

- 2 Flocken *Cynarocephalæ* Juss. Blrna rörformiga. Stifet upp emot märkena uppsväldt, omgifvet med en krans af hår.

## 25. ECHINOPS Lin. Bolltistel.

- 1 *E. sphærocephalus* L. bladen pardelade, under hvitludna, med bugtigt tandade och taggiga flikar; blomfodret vid basen omgifvet af horst. 24 7, 8. Fig. Fl.D.2179. Stenbundna st. vid gårdar etc. r. (Smål. Bjursund i Lofshammar: Stud. C. Willd enl. Scheutz. ÖG. mångest. såväl i nor. skogsbygden och öst. slättbygden, som i Åtvedatrakten, Stångådalens och vest. om denna: Kindb. Södm. Öst. Vingåker. Forssanäset: C. Indeb. Uppl. Uppsala slottsbacke. Troligen öfverallt förvildad.) *Liknar en vanlig tistel; blrna lätt fallande isär vid pressning, hvita med blågrå ståndarknappar.*

## 26. CENTAURÉA Lin. Knoppört, Klint.

† Fruktfunet af skalfruktens längd.

- 1 *C. Scabiosa* L. bladen *djupt pardelade*, stråfva, slikarne lancettl. ell. jemnbreda, inskurna och tandade; yttre holkfjällen äggrunda, afsmalnande till ett svart, kammligt borstbräddadt bihang; de inre smalare, med ett dylikt, något vidgad bihang. 24 7, 8, rödviol. blr. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1231.

Åkerren. back. (Sk.—Helsl. Festml. Skinnskatteberg. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl. Stegen enl. Norm.) *Älnshög och mera, med stor klotrund holk; blrna säll. hvita.*

- 2 *C. Cyanus* L. bladen *jemnbreda*, något *hvitulliga*, de nedre stund. pardelade; holkfjällen äggrunda, i kanten och spetsen hvita ell. bruna hinnaktiga borstågade; de inre mer utdragna, endast i spetsen sågade. 6, 7, blå, säll. hv. blr. Fig. Sv.B.52. Fl.D.993. Åkr. bland säden, a. (Sk.—VB. och Jemtl. — N.) *Älnshög, spenslig. Holkfjällen med mindre utvecklade bihang än de öfr. arterna.*

†† Fruktfunet kortare än halfva skalfr.

- \*3 *C. phrygia* L. bladen *äggrundt lancettlika*, småtandade, stråfva; yttre holkfj. med ett utböjt, n. sylformigt bihang, kammligt kantadt med svarta borst, längre än bihs bredd; de inre holkfj. med ett bredt, hårkantadt bih. i spetsen. 24 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.520. Reich.Cynaroc.t.764,f.2. H.N.f.13, n:o 3, 4.

Äng. i bergstr. r. (N. Christiansand, Hjelmeland i Ryefylke vid hafvet. Mandal.) *Har stora blomkorg., breda blads. — C. austriaca* W. enl. Fr.

- \*4 *C. nigra* L. bladen *lancettlika*, de nedre tandade; yttre holkfj. med ett lancettlikt bihang, kantadt som hos föreg. med borst dubbelt längre än bihangets bredd; inre

fjällens bihang som hos föreg.; *alla blrna meränd. likformiga och 2kånade*. 2 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.996. Reich.t.761.f.2. H.N.f.13, n:o 5.

Back. etc. r. (N. Christiansand vid Farsund. Bergen på Storöen och efter kusten upp till Snaasen.) *Liknar till örten följ., men saknar n. alltid de större kantblirna; de yttre holkfjällens bihang smala, de inres bredare än fjället, n. 3ängulära.*

+++ Skalfr. utan fruktfjun.

- 5 C. *Jacea* L. bladen lancettlika helbräddade ell. tandade, stund. smala och flikiga; holkfj:s bihang *kupigt, bredt och rundadt*, i kanten ojemnt sargadt. 2 7, 8, r. blr. — *β elata*: stjelen med utstående grenar; bladen smala fliktandade. Fig. Fl.D.519. *β* Reich.t.759.f.1,

Torra ängsgrenar, back. a. (Sk.—VB. och Jeml. — N.) *Holken tegelfärgad, stund. svartbrun med mer kammflikade fjäll och då tagen i Sv. för C. nigra.* *β* dr var. *decipiens* Fr.S.V.Sc. och Thuill.

## 27. SERRATULA Lin. Ängsskära.

- 1 S. *linctoria* L. de nedre bladen meränd. lyrformigt parklufna, med tätt hvass-sågade flikar; blomkorg. i qvast; holken n. glatt. 2 7, 8, viol. stund. hv. blr. Fig. Sv.B.170. Fl.D.281.

Skogsäng. (Sk.—Uppl. och Vestml. Dal. Boh. Hisingen, vid Nodre elf. Öl. Gottl.) Var. med odelade blad.

## 28. SAUSSUREA DC. Fjellskära.

- 1 S. *alpina* DC. bladen lancettlika—äggrunda, odelade, glest småtandade mjukludna; blomkorg. meränd. i tät qvast, med mjukluden holk. 2 7, viol. blr. Fig. Fl.D.37. H.N.f.15, n:o 4.

Fjelltrakt. (Lpl.—Dal. uti Idre. VB. Skellefteå. Ängml. Tåsjö och Långsele. Medelp. Torp sn; Söråker enl. Lem. Helsl. Loos sn flerstäd, — N.) *Hela växten oftast betäckt af ett ovanligt mjukt ludd.* — *Serratula* L. *Heterotrichum* Link.

## 29. CARLINA Lin. Stjertistel.

- 1 C. *vulgaris* L. bladen lancettlika, hela ell. inskuret tandade och taggiga, på undre sidan finulliga; sidoblokkorg. högre än den mellersta. 2 7, 8, blekg. blr. Fig. Sv.B.434. Fl.D.1174.

Back. (Sk.—Gefle och Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Tanum sn. — N.) Var. med enda blomkorg.

## 30. ONOPORDON Lin. Tistelhorre.

- 1 O. *Acanthium* L. stjelen bredt vingkantad; bladen buktigt tandade taggbräddade, under hvitulliga; holkfjällen utsperrade, styft tornuddiga. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.227. Fl.D.909.

Byar. (Sk.—Gefle. Boh. Koön. Öl. Gottl. — N.) *Ofta manshög, bredbladig, taggig växt.*

## 31. CARDUUS Lin. Tomtistel, Stingsel.

- 1 C. *nulans* L. bladen parflikiga och taggiga, med på stjelen afbrutet nedlöpande kanter; blomkorg. *lutande* åt sidan, *ensamma på utdragna oväpnade* skaft; yttre holkfjällen utsperrade, alla *tornuddiga*. 2 7, r. blr. Fig. Fl.D.675. H.N.f.7. n:o 5.

Torra st. r. (Smål. Kalmar. Uppl. Uppsala; Öfverboda i Elfskarleby sn. Gefle. Söderhamn. Medelp. Viksta varf enl. Lem. Ängml. Nyland i Ytter-Lännäs sn. Boh. Marstrand; Näsinga sn; Oroust, vid Mollösund; Lem. Öl. Horns Ladugård; Repplinge. Gottl. Visby. Roma etc. — N. Brevig. Trondhj. Knappt ursprunglig i Skandinavien.) *Stor, ganska taggig; blomkorgsskaften endast vid basen småbladiga.*

- 2 C. *acanthoides* L. bladen nedlöpande, djupt parklufna, med 2—3klufna, grofstorniga flikar, under gröna, på nerverna hvithåriga; sidoblokkorg. med inga ell. ganska korta, småbladiga och taggiga skaft; holken rundadt äggformig, af tornuddiga, något utstående fjäll. 2 7—9, r. blr. Fig. H.N.f.11, n:r 3.

Byar. (Sk. Blek. Ronneby. Smål. Kalmar. ÖG. Löfstads park och Brunneby i Vreta etc. enl. Kindb. Hall. Öl. Långlöt sn enl. Lem. Gottl. — N. Christiania.) *Liknar Cirs. arvense β, men skiljes lätt af sin ljusgröna färg och röda blr. De öfversta*



*blomkorg. mer närmade än de på sidan; holken gleshårig, n. glatt. — C. polyacanthos* Schreb.

- 3 *C. crispus* L. bladen nedlöpande, bredt lancettlika, inskuret tandade och mjuktaggiga, under meränd. *hvitulliga*; blomkorgskaften uppräta 1—3blomstriga, n. bara. *småtaggiga*; holken n. klotrund, af lancettlikt syllika, *mykspetsiga* fjäll. 7, 8, viol. blr. Fig. Fl.D.621. H.N.f.11, n:o 4.

Åkerrenar etc. (Sk.—Lpl. — N. till söd. Finn.: Norm.) *Bladens undre sida stund. n. glatt.*

### 32. *CIRSIIUM* Hall. Tistel.

† Stjelken vingkantad af de nedlöpande bladen.

- 1 *C. lanceolatum* Scop. bladen parklufna, med 2klufna sperriga, tornuddiga flikar, på öfre ytan borstaggiga, under *hvitludna*; blomholk. *klotrund*, af *styft tornuddiga, utsidende*, ulliga fjäll. 7, 8, r. blr. — 5 *memorale*: bladen under *hvitulliga*; holken n. klotrund med finare, borstlika tornar. Fig. Sv.B.416. Fl.D.1173. β Reich. t.826,f.2.

Väg. a. (Sk.—VB. Skellefteå. Jemtl. till Hammerdal. — N.) *Carduus* L. *Cnicus* Willd. β *C. nemorale* Reich.

- \*2 *C. canum* MB. bladen aflånga — lancettlika, taggbräddade, under *glost ulliga*, de nedre parflikiga, de öfre tandade; gemensamma blomkorgskaften *utdragna, 1-säll. 3blomstriga*, de enskilda *korta*; holken äggformig, af lancettlika *tilltryckta* fjäll. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Jacq.A.1.42,43. Reich.t.828,829,f.1.

Skogsäng. r. (N. Romsdalen, Sætnæsflellet, på sluttningen midt emot Gröttens prestgård.) 2 alnar hög, med blr till storlek och utseende af *C. heteroph.* Mest utmärkt af roten, som består af ett knippe rotknölar af ett lillfingers storlek och form. — *Carduus* L. och Jacq.

- 3 *C. palustre* Scop. de nedre bladen n. pardelade med 2klufna ell. groftandade och taggiga flikar, ofvanpå håriga, under *gröna*; blomkorg. *gyttrade*; holken *äggformig*, af ägg- rundt lancettlika, *kortuddiga, tilltryckta* fjäll. 7, 8, viol. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.428. Fl.D.1341.

Väta äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Stjelken uppräkt, 1—3 alnar hög. — *Carduus* L. *Cnicus* Roth.

(*C. arvense* β *ferox*.)

†† Stjelken utan vingkanter; bladen icke nedlöpande.

\* Fruktstjunt alltid kortare än blomkronan.

a — Bladig stjelk; röda blr.

- 4 *C. heterophyllum* All. bladen *stjelkomsfattande*, bredt lancettlika, sågtandade ell. parflikiga, under *hvitludna*; blomkorg. 1—5, på *långa enkla skaft, utan skärm*; holken äggformig, af lancettlika *tilltryckta* fjäll med utstående något hvass udd. 2, 7, 8. Fig. Fl.D.109.

Fukt. äng. (Lpl.—Sk. Öl. Sällsyntare i de södra prov. — N.) Vanl. ett par aln. hög med mycket stora blomk. — *Carduus* L. *Cnicus* Willd.

- XC. *heterophyllo-acaule* Næg. stj. något utdragen, nedtill hvitluden; bladen *icke omsfattande*, parklufna, med aflånga 2klufna och tandade flikar, under mer och mindre *grå ell. hvitaktigt finludna*; blomk. 1—3, på *långa*, meränd. *något bladiga* skaft; holkf. äggformigt lancettlika, med *omärklig udd*. 2, 8, 9. Fig. Reich.t.854,f.1.

Äng. r. (Sk. Bjersjö ladugård: Stud. L. Schlegel enl. Lessl. VG. på Mösseberg bland *C. acaule* och *heteroph.*) Något lik *C. acaule* β, men 2—3 qv. hög, med *talrikare, mindre djupt delade* blad och *större blomkorg.*, som likna *C. heterophylli*.

b — Bladig stjelk; gula blr.

- XC. *oleraceo-heterophyllum* Næg. stj. *ända upp* bladig; bladen *omsfattande*, de nedre skaftade, hela ell. parklufna, med lancettlika hela flikar, under *hvila* af ett fint och tätt ludd; blomk. 1—3, *kortskaftade*, med n. lancettlika skärm af blomk:s längd; holkf. lancettlika med kort, böjlig tagg i spetsen. 2, 7, 8. Fig. Reich.t.857.

Äng. r. (VG. Mösseberg i Jätteneds hagar, bland *C. olerac.* och *heteroph.*) 3—4 fot

*hög, liknande C. heterophyll. med blomk. af C. olerac. Närmar sig än mera till den förra, än till den sednare.*

- 5 *C. oleraceum* Scop. bladen *med den hjertlika basen stielkomsfattande*, pardelade ell. parklufna, med hela sågtandade och taggbräddadeflikar, *under gröna*; blomkorg. flere, inom dgrunda, något färgade skärmbud; holksf. lancettlika, sylspetsade. 2 7, 8. Fig. Sv.B.698. Fl.D.860.
- Fukt. äng. r. (Sk. allm. Hall. Hallandsås; Hasslöv: Theor.; Halmstad. VG. Sköfde; Mösseberg. Blek. Sölvisborg sn. Smål. Kalmar, Skällby; Tofteryd enl. Leffl. — N. till Moe i Ringsager på Hedemarken; Hugelien i Land.) 1—3 fot hög. — *Cnicus* L.
- × *C. acauli-oleraceum* Næg. bladen *knappt* omfattande, parflikiga med aflånga grundt 2—3klufna taggbräddadeflikar; blomkorg. flere, meränd. med lancettlika skärm vid basen; holksf. lancettlika, uddspetsiga. 2 8, 9, hvitg. blr. Fig. Reich.t.858,f.2.
- Skogsäng. r. (Sk. Öfvedskloster; Lund. Resten och Fogelsång; Malmö; Rå etc.) *Storlek och utseende af föreg., men till bladen mer lik följ.; blomkorg. stund. utan skärm.* — *C. rigens* Wallr. *C. decoloratum* K. *Cnicus* Schiede.

c — Vanl. utan stielk; röda blr.

- 6 *C. acule* All. bladen kort skaftade, parflikiga, taggbräddade, med rundade, meränd. 3klufna tornuddigaflikar; blomkorgarnes skaft från rotstocken, korta och meränd. enblomstriga [β med bladig stielk]; holksfjällen lancettlika uddspetsiga tilltryckta. 2 7, violettröda blr. — β *caulescens*: stielken utdragen bladig, 1—flerblomstrig. Fig. Fl.D.1114. Reich.t.840,f.1; β f.2.
- Betesmark. r. (Sk. allm. — Södm. vest. Vingåker, nära Morganå; Nyköping, vid vägen till Arnö: C. Ind. Uppl. Enköping. Ner. Hökerkulla; Elgholmen i Kumla. VG. Boh. Wägga i Fossene: Doc. P. Olsson. Hall. Öl. Goutl.) *Blomkorgens skaft 1—3 tum högt; stielken hos β 1—2 qv. hög, vanl. 1—2blomstrig.* — *Carduus* L. *Cnicus* Roth.

\*\* Fruktsjun slutl. längre än blomkronan: *Breca* Less.

- 7 *C. arvense* Scop. stielken bladig; bladen lancettlika, parflikiga ell. tandade, taggbräddade, vågiga; blomkorg. i ojemn och gles qvast; holksfjällen tilltryckta med utstående, föga styf udd. 2 7, 8, gred. blr. — β *ferox*: bladen nedlöpande, nästan pardelade, med 2—3klufna sperrigaflikar. Fig. Fl.D.644. H.N.f.14, n:o 9 [var.].
- Odl. st. a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. Björkfors. — N. till Nordl.) *Bladen oflast lancettlika tandade, icke nedlöpande, hvidan stielken är trind och oväpnad, hvaremot den hos β är ganska taggig af de nedlöpande bladkanterna.* — *Serratula* L. *Cnicus* Sm.

### 33. LAPPÄ Adans. Kardborre.

- 1 *L. tomentosa* Lam. bladen hjertlikt ågrunda, under småulliga; blomkorg. i flocklik qvast; den klotrunda tåll spindelväfshåriga holken inre fjäll lancettlikt aflånga, trubbiga med udd, rödbruna. 2 7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.63. Fl.D.642 och 2423.
- Byar. (Sk.—Ängml. Sälls. norr om Uppl. och Vestml. — N.) *Arctium Bardana Willd. A. Lappa β L. — Som denna art och de följande ofta växa blandade, uppkomma talrika mellanliggande artförändringar. I alla fall nog närbeslägtade, såsom äfven Gartner Moe i Christiania bot. trädg. funnit allför väl bekräftadt (se Bot.Not.1867,p.133).*
- 2 *L. major* Gärtner. bladen hjertlika, under finludna, ell. nästan glatta; blomkorg. i qvast, utdraget skaftade; holken glatt, fjällen n. platta, i kanten hinnaktiga, de yttersta vid basen sammanväxta, de innersta lancettlika, syl-lik spetsade, i kanten släta, eller något sargade, af samma färg som de yttre. 2 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.2424. Reich.t.812,f.2.
- Byar. (Sk.—Uppl. Dal. Smedjebacken. Vestml. Strömsholm. Ner. Brohauemar. VG. Klnnekulle. Boh. mest på öarne. Hall. Vargagården i Tölö sn: Leffl. Goutl. Klinte sn.) *Har mycket större och vidare blomholk än de öfriga, glatt och vanligen grön. De yttre holksfjällens bas merändels uppsväld köttig och sammanhängande.* — *Arctium Lappa* L. jemte följ. *Lappa officinalis* Wallr.
- 3 *L. minor* DC. bladen hjertlikt ågrunda, under småulliga; blomkorg. klaslikt gylltrade ell. kortskaftade; holken glatt ell. något spindelväfshårig, af n. trinda, syllika fjäll, de inre färgade, i kanten fint tagghåriga. 2 7, 8, ljusr. ell. gred. blr. Fig. Fl.D.2662. Reich.t.811,f.1. H.N.f.13, n:o 6.

\**intermedia* Lge. högväxt och spenslig; blomkorg. stora, med slutligen äggformig holk. Fig. Fl.D.2663. Reich.t.812,f.1.

Byar, a., \* skugg. st. (Sk.—VB. — N. — \* Sk. flerst. enl. F. Aresch. och A. Falck. Smål. Korsberga: Scheutz; Kalm. län flerst. enl. Sjöstr. ÖG. Linköping: Alvastra etc.: Kindb.) *Dels lågdaxt, med små, yngre n. cylindriska, slutt. nedplattade blomk.; dels till alla delar större och närmade sig föreg., med mer klotrunda blomk.: β majuscula* Ed. 9. \* torde snarast vara en af lokalen beroende skuggform.

3 Flocken **Cichoriaceae** Juss. Alla blommorna 2kónade och tunglika. Stiftet icke uppsväldt eller ledadt.

### 34. CICHORIUM Lín. Vågvårda.

1 C. *Intybus* L. bladen nedåt parflikiga; blomkorg. parvisa, nästan utan skaft, i bladvecken. 2½ 7, 8, blå blr. Fig. Sv.B.56. Fl.D.907.

Åkerren. väg. r. (Sk. allmän på slätten. Smål. Kalmar, nära slottet; Vestervik och Törneshärad. Boh. Oroust, Röd i Morlanda; samt Hall. Särö: Leffm.; Fröllinge: Theor. Öl. Gottl. I de öfre prov. här och der förvildad. — N. Christiansand; Tellemarken; Eger; Christiania.) 1—2 *altar hög, med stora platta blomkorgar.*

### 35. MULGEDIUM Less. Tofta.

1 M. *alpinum* Less. bladen *lyrformiga*, med pil-lik, omfattande bas, ganska stor *triangelformig* ändflik; blomkorgsskaften *glandelhåriga* fjälliga, i nästan enkel klase. 2½ 8, blå blr. Fig. Sv.B.657. Fl.D.182.

Subalpin fjellv. a. (Lpl. och VB. — nor. Verml. Dal. och Held. — N.) Var. enl. C. Ind. i Lul. Lpm. med hv. blr. — *Sonchus* L. S. *cæruleus* Sm.

2 M. *sibiricum* Less. bladen oskaftade eller något omfattande, *lancellika* tandade eller *nedåt parflikiga*; blskaften fjälliga, jemte holken *glatta*, i *qvast*. 2½ 8, blå blr. Fig. Fl.D.suppl.1,t.21. H.N.f.3, n:o 5.

Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Kareauando; Jukkasjärvi etc. Um. Lpm. Lycksele, på öar i elfven. VB. Haparanda. Angml. Nordmaling vid Öhre elf nära Häknäs sågverk; Viksjö vid Mjellån. Medelp. vid Indalselven och Sättnaån, nära kyrkan. — N. Finnm. Tana-elfv; Karasjok: Norm.; Alken-elfv. Nordl. i Molselv-dalen.) *De öfre bladen n. helbräddade, de nedre ofta grofstandade.* — *Sonchus* L.

### 36. SONCHUS Lín. Mjölktistel.

1 S. *palustris* L. bladen nedåt parflikiga *med pil-lik bas*, spetsade stjelkomfattandeflikar; blomkorg. i flocklik qvast, med skaft och holk *svart glandelhåriga*; skalkfruktens långsgående åsar på tvären rynkiga. 2½ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1109. H.N.f.16, n:o 8. Hafsstr. bland buskar, r. (Saxaviken mellan Skåne och Blekinge, på en liten halfö midt emot Valjö gård.) *Manshög, med talrikare, men något smärre blomkorgar och blekare blr än följ., långa, tillbakaböjda bladflikar. Skalkfr. med 4 högre och flere mellanliggande smärre åsar.*

2 S. *arvensis* L. bladen nedåt parflikiga, med *hjerflik* omfattande bas, stundom odelade, uddtandade; blomkorg. som hos föreg., med skaft och holk *gult glandelhåriga*; skalkfr. som hos föreg. 2½ 7, 8, g. blr. — β *litoralis*: 1—3blomstrig, med glattare holk och blomkorgsskaft — γ *lavisipes* K. holk och blomkorgsskaft fullkomligt glatta. Fig. Fl.D.606. β H.N.f.16, n:o 7.

Odl. st. β hafsstr. a. (Sk.—VB. Boh. — N. till Nordl. Finnm. Hammerfest. Ost.-Finnm. — γ ÖG. Rejmyra: H. v. Post. Södm. Brännkyrke sn: G. v. Ced.) β, som växer på hafsstr., har smala, hela ell. kortflikiga, blad.

3 S. *oleraceus* L. bladen *lyrformigt* nedåt parflikiga och *mjukstandade*, *matt blågröna*; de stjelkomfattande flikarne *framstående*; blomkorgarnes skaft och holkens bas yngre *ulmjöliga*, slutt. *glatta*, säll. med några strödda glandelhår; skalkfr. åsar på tvären rynkiga. ⑦ 7—9, blekg. blr. Fig. Fl.D.682.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Um. Lpm. — N.) Bladen stund. n. hela.

4 S. *asper* Vill. bladen åggrundt aflånga, *hela* eller flikade, *styft uddtandade*, *glänsande*, basens flikar stjelkomfattande, *tillbakaböjda*; blomk:s skaft och holk som hos föreg.; skalkfr. åsar och yta släta. ⑦ 7, 8, blekgula blr. Fig. Fl.D.843.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Jeml. — N.) *Bladen ofvanpå mörkgröna, kantens änd-  
der stickande; skalfr. släta. med 3 upphöjda åsar på hvarje sida. — S. oleraceus  
γ och δ L.Fl.Su. S. fallax Wallr.*

### 37. LACTUCA Lin. Laktuk.

- 1 *L. Scariola L.* bladen *fasta*, vända n. på kant, nedåt parflikiga och tandade, *med tag-  
gig ryggner*; blomkorg. *mångblommiga*.  $\gg 7, 8, g.$  blr. Fig. Sv.B.715. Fl.D.1227.  
H.N.f.8, n:o 4, 5.
- Murar, åkerren. r. (Sk. Lund. Smål. Kalmar. ÖG. Nyqvärn vid Linköping: Kindb.)  
*L. virosa Liljebl. ed. 2.*
- 2 *L. muralis Don:* bladen *tunna, lyrformigt* nedåt parflikiga med stor, 3—5vinklig änd-  
flik, *utan taggar*; blomkorg. omkring *5blommiga*, i mycket gles samling.  $24, 7, 8, g.$   
blr. Fig. Fl.D.509.
- Klipp. och steniga lundar. (Sk.—Ångml. VB. Björkfors. Dal. Verml. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj. och Stördalen.) *Hög, men späd växt, med små blom-  
korgar. — Prenanthes L.*

### 38. LAPSANA Lin. Harkål.

- 1 *L. communis L.* de nedre bladen *lyrformiga*, med stor äggrund vinkeltandad ändflik,  
de öfre n. äggrunda; blomkorg. *talrika* i qvasilik samling.  $\odot 7-9.$  Fig. Fl.D.500.  
Odl. st. a. (Sk.—Ångml. Verml. — N. till Finn.) *3-6 kvarter hög, med små  
blomk., blekgula blr. Var. glatt och hårig: var. pubescens.*

### 39. TRAGOPOGON Lin. Hafrerot.

† Blr mer och mindre röda.

- †1 *T. porrifolius L.* bladen vid basen *vidgade*, jemnbreda platta, något styft raka; blrna  
kortare än den *8bladiga* holken; blomkorgskaften *upptä vidgade, uppblåsta*.  $\gg 6,$   
7. Fig. Fl.D.797. Reich.Cichoriac.t.1387,f.2 och 3.  
Vid gårdar, jordvall. r. (Sk. på Christianstads vallar; Malmö, vid och på vällen mell.  
slottet och Ribersborg; Kullaberg etc. *Blek.* Carlskrona, ymn. vid nya Dockan på  
kronovarvet. Smål. Öfverum och Oskarshamn: Scheutz. ÖG. Opphem i Tjärstad  
enl. Kindb. Hall. Varbergs fästn. Götll. Storugns i Lärbro: G. v. Cederv.) *Blrna  
violett-röda, bildande en platt blomkorg. Hybridiserar vid Carlskrona med T.  
pratensis enl. Gosselm.*
- 2 *T. crocifolius L.* bladen *ända från basen smalt jemnbreda*, platta, n. upprätta; blom-  
korgskaften n. jemntjocka; blrna kortare än den vanl. *5bladiga* holken.  $\gg 7.$  Fig.  
Reich.t.1388,f.1.  
Betesm. r. (Götll. Visby, på Snäckgärdet enl. ex. af Stud. R. Oldberg.) *Ältnshög, men  
spenslig, med mycket smala (en linie breda) blad och små blomk.; blrna mörkt  
purpur-röda med brämets spets gul.*
- †† Blr gula.
- 3 *T. pratensis L.* bladen fr. vidgad bas jemnbreda, *kölade*; blomkorgskaften nästan jemnt-  
jocka, de *yttre* blommorna i blomkorgen större, *af holkens längd*.  $24, 6, 7.$  Fig.  
Sv.B.146. Fl.D.906. H.N. f.15, n:o 5 [var. ochroleuc.].  
Ångar, trädgårdspark. (Sk.—Medelp. Sundsvall. Södra Dal. Verml. Boh. Öl. Götll.  
— N.) *Holkbladen omkr. 8. Var. med korta kantbl: brachyglossus, och stora  
blekgula: ochroleucus Fr.S.V.Sc., samt med vågbräddade blad.*
- 4 *T. minor Fr.* bladen från en kort, vidgad bas smalt jemnbreda utdragna *platta och  
slaka*; blomkorgskaften n. jemntjocka; alla blrna n. *dubb. kortare* än holken.  $24$   
 $6, 7, g.$  blr. Fig. Reich.t.1390,f.2. H.N.f.15, n:o 6.  
Lerjord, r. (Sk. i vest. delen. ÖG. kanalbank. mell. Berg och Brunneby, samt i Krigs-  
berg enl. Kindb. Södm. Gripsholm. VG. Göteborg, i Slottsskogen och nya Alléen, samt  
på Garne. — N. Christiania: Ax. Blytt.) *Blomk. mindre, blad. smala, qv.långt utdragna.*

### 40. SCORZONERA Lin. Kornfibla.

- 1 *S. humilis L.* stjelken 1—3bladig, i närheten af bladen ullig; rothbladen ovala — smalt  
lancettlika, med ulliga skaft; stjelbl. smärre och n. jemnbreda; blomkorg. 1—3;

yttre holkfjällen *små aggrunda — lancettlika*. 2, 6, 7, g. blr. —  $\beta$  *angustifolia*: rotbladen små lancettlika, åt båda ändar långspetsade. Fig. Sv.B.212. Fl.D.816;  $\beta$  1653. H.N.f.7, n:o 3.

Fukt. äng. (Sk.—Uppl. Södra Dal. och Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. nära Fredrikstad på Kragerön vid Fuglevig samt i Skjebergs sn.) Vanl. *enblomstrig*, men blir på feta ängar stor och *flerblomstrig*.  $\beta$  eller *S. plantaginea* Schleich., utmärkt af de smala bladen, öfvergår tydl. i *u.* Ex. i H.N. visa en medelform.

#### 41. PICRIS Lin. Bittermjölke.

- 1 *P. hieracioides* L. stjelken upprät, stråfhårig; bladen stjelkomfattande, lancettlika, bugtandade; blomkorg. i qvast, de mellersta på kortare skaft; foderholken fjäll något slaka. 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1522. H.N.f.1, n:o 8.  
Åkerrenar etc. r. (Sk. Skabersjö, Ramlösa, Belteberga, Hvidarp, Ousbyholm, Onslunda m. fl. st.) Liknar ett stort *Hieracium*.

#### 42. CREPIS Lin. Klofbla.

† Stjeln mångbladig; fruktsjun gulaktigt hvitt: *Aracium* Less.

- 1 *C. paludosa* Moench: glatt; rotbladen skaftade; stjelkl. hjertlikt omfatt., ovala ell. bredt aflånga, med något tillbakaböjda tänder, de nedre vid basenflikiga; blomkorg. i gles qvast, med svarthårig ell. n. glatt holk. 2, 7, g. blr. Fig. Fl.D.928. H.N.f.12, n:o 7.  
Fukt. skogsäng. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Utmärkt af sin glatthet och de stora, tunna bladen. — *Hieracium* L. och ed. 9. *Geracium* Reich. *Soyeria* Godr.

†† Stjeln mångbladig; fruktsjun rent hvitt.

\* Bladen stråfhåriga ell. ludna.

- 2 *C. biennis* L. bladen nedåt parflikiga stråfhåriga, de öfversta oskaftade lancettlika tandade; blomholken smått stråfluden, med på insidan håriga fjäll; skalfr. med tätt sittande, föga sträva åsar. 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.735. Fl.D.1997. H.N.f.2, n:o 5.  
Äng. jordvall. r. (Sk. allm. på slättbygdens åkrar enl. F. Aresch. Hall. Helmstad. Stockh. i Sollentuna. Uppl. Enköping; Sigtuna vid Vallby; Sollentuna; Borg i Frötuna sn enl. Leml.) Har dubbelt större blomkorgar än de 3 följ., med svartgrön holk och gula märken; bladflikarne ofta flerklufna.  
3 *C. nicæensis* Balb. bladen nedåt parflikiga, kort stråfludna, de öfre med pil-lik bas, jemnbreda helbräddade; holk glandelhårig, med på insidan glatta fjäll; skalfr. som föreg. 7, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.91. H.N.f.3, n:r 3.  
Äng. r. (Stockh. Gröndal, nära Ormsjön; Solna; på Agnesberg och Myrbaddet. Gottl. vid Klintehamn: Thed.) Till örten lik föregående, men mindre, holken konisk, n. lika tjock som hög; bladen i blomsaml. små ell. inga; blomk. till storlek lika följ.; märken gula, torra bruna.

\*\* Bladen glatta ell. n. glatta.

- 4 *C. tectorum* L. bladen lancettlika hela, tandade, eller parflikiga; de öfversta jemnbreda, merändels med den pil-lik basen stjelkomfattande; holken småluden, med på insidan håriga fjäll; skalfr. med gles, mycket sträva åsar. 6—9, g. blr. —  $\beta$  *segetalis*: späd, flomstrig med långa enblomstriga blomk.skaft; bladens bas smal, knappt pil-lik. Fig. Fl.D.501.  $\beta$  H.N.f.2, n:o 6.  
Åkerren. tak etc. a. (Sk.—VB. och Pil. Lpm. — N. till Finnm. —  $\beta$  Blek. Småll. Rosl. Boh. Gottl.) Vanl. alnshög, bladen stundom n. jemnbreda och hela, stundom djupt parklufna, med rakt utstående eller framåt riktade flikar; blomsaml. bladig. Var. på Öland fingerhög och nedtill grenig. — *Leonod. autumnale* Fl.D.  
5 *C. virens* L. bladen lancettlika, tandade ell. parflikiga, säll. n. hela, blågröna, de öfre med pil-lik bas, vanl. hyastt tandade vid basen; holken gleshårig, med på insidan glatta fjäll; skalfr. med glesa, dels släta, dels sträva åsar. 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.2544. Reich.t.1441.  
Odl. st. åkerren. r. (Öl. mellan Färjestaden och Thorslunda, upptäckt 1866 af Prof. Ands. Gottl. vid Visby i sedn. åren inkommen med gräsfrö enl. G. v. Cederv.) Blomkorg. små med blekgula blr.

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

+++ Bladlös stängel: *Intybus* Fr.

- \*6 *C. multicaulis* Ledeb. bladen aflångt spadlika, hela och glest tandade ell. n. lyrformiga, glatta; blomkorg. i *qvast*, med smalt cylindrisk holk; holkfjällen längs midten glandelhåriga och glest hvitulliga. ☉? 7, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.90. Bot.Not.1857, n:o 11. H.N.f.15, n:o 13.

Fjelltr. r. (N. Ost-Finnm. på förvittrad lerskiffer vid Meskelfvens utlopp i Varangerfjorden.) Mindre och mycket spådnare än följ. med långt skaftade rotblad och ofta flere stänglar från samma rot.

- 7 *C. præmorsa* Tausch. bladen aflånga, mot spetsen vidgade, helbräddade ell. glest småtandade, småludna; blomkorg. i *klaselik*, tät samling; holkfj. glatta ell. med några få hvita hår, utan *glandler*. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.942. H.N.f.13, n:o 28.

Ang. (Sk.—Gestr. och Dal. Ö. Gotl. — N.) *Hierac. præmorsum* L. *Geracium* Reich.

### 43. HIERACIUM Lin.) Hökbloomster.

† *Piloselloidea*: Stjelnk stängelformig med helbräddade ell. föga naggtandade, oskaftade ell. till ett kort vingadt skaft afsmaln. blad, mest samlade kring basen. Skalfruktur i toppen djupt refflade, med fina jemnhöga fruktsjun i enkel rad. Årstjelnkarne bildas ofta ur grenskott eller rosettbärande rotrefvor.

- A) St. 0—3bladig m. krypande bladiga grenskott ofvan marken och ofta m. bladlösa refvor under jordytan, hvilka i spetsen utveckla bladrossetter. De yttre rotbl. korta, omv. ågrunda—spadlika, oftast qvarsitt. vid blomningen (utom hos n:o 8—9). de inre o. stbl. tungt.-afl.-lancetl., breda i förhåll. till längden, alla på öfre sidan nakna. Rotstock lång, horisontelt krypande.

a) — *Pilosellina* Fr. St. låg, 0—1blad., enblomstr. ell. 1—2 ggr klynnegr. m. långa upprätta enblomstr. skaft. Fj. alltid stjernludna, de inre spetsiga.

- 1 *H. Pilosella* L. st. meränd. bladlös o. enblomstr. med grenskott; bl. ofvan gröna, under tät stjernh., hvit- ell. gråludna, på båda sidor o. i kant. långh.; fj. breda m. bred blek kant, de yttre något trubb. 2 6, 7. Bland dess talrika former äro följ. de utmärktaste: *α vulgare* Monn. bl. ghl., grskott långa, bl. hvitludna. — *β grandiflorum* DC. bl. stora ghl., grskott korta o. tjocka, bl. hvitludna. — *γ Pelelerinum* Monn. lik föreg., men bl., bl. o. stund. st. tät långh. — *δ nigrescens* Blytt högväxt m. stora långh. o. svart ghl. bl., utdragna grskott. — *ε flagellare* (W.) bl. stora, v. långh.; grskott utdragna v. blombar; bl. tunna, under glest stjernh., o. grönsakt.; st. långh., 2—3blomstr., vid basen stund. enbladig. — *ζ virescens* Gaud. bl. små: grskott utdragna; bl. som föreg.; st. v. klynnegr. — *α* Fr.H.N.f.6, n:o 4. H.Eur.exs.1; Lindeb. H.Scand.exs.1. — *γ* H.Scand.exs.2. — *ε* H.N.f.9, n:o 8.

Back. a. (Sk.—VB.) o. *Um. Lpm.* till 2000'. — *N.* till Ost-Finnm. — *β* Gotl. — *γ* särdeles vid kusten af Kattegat o. Nordsjön. — *δ* *N.* i fjelltr.: Græfsensåsen vid Christiania, Opdal. — *ε* Sk. Fogelsång. Smål. Femsjö, Grenna. Södm. Strengnäs.

\*) Detta släkte är redigeradt af C. J. Lindeberg.

För utrymmets besparande hafva följ. förkortningar blifvit använda: *blk.* = blomkorg, *blkek.* = blomkorgskaft, *ff.* = fjäll, holkfjäll, *frfj.* = fruktsjun, *gl.* = glandler, *h.* = hår eller hårig, t. ex. *ghl.* = glandelhårig, *krbr.* = kronbräm, *st.* = stängel, *stj.* = stjelnk, *naken* = utan stjernhår, *m. l. m.* = mer eller mindre, *v.* = vanligen m. fl. hvilkas betydelse lätt fattas af sammanhanget. Blomkorgarnes form är antecknad efter de icke fullt utslagnas, och holkfjällens efter de jemnhöga mellanfjällens hos yngre blomkorgar, då icke de »yttre» eller »inre» fj. särskildt nämnas. — Artbeskrifningarna äro till största delen tagna efter *levande vilda* exempl., några få eft. säkra herbarii-exempl., en (H. argent.) är afskrifven efter Prof. Fries. Det inskränkta utrymmet har dock nödgat förf. att göra beskrifningarna knapphändigare, än behöfvat af fullständighet inom detta släkte måhända fordrat. Af samma skäl har dels en mängd mer tillfälliga, dels flere utmärkte, men sällsyntare former måst utelämnas. Blott sådana nya arter hafva blifvit tillagda, som antingen ega en vidsträcktare och allmännare utbredning, eller sådana, som för vinnandet af en säkrare artdiagnostik måst afsondras från andra, med hvilka de varit sammanblandade. Vid artbenämningarna har nu rådande nomenklatur blifvit följd, der icke förf. med full visshet funnit den vara origtig. — Bland förkortningar må ytterl. nämnas: *H. Eur. exs.* = Fries' *Hierac. Europæa exsiccata* Upps. 1866, — *H. Sc. exs.* = Lindeb. *Hierac. Scand. exsiccata* 1 fasc. Göteborg. 1868.

*Hels. Söderhamn. Ner. vid Kärr i Wiby an; Aspa bruk. VG. Kinnekulle. Boh. — N. Mallö vid Grimstad. Bl. — Ner. Örebro. Uppl. Tible, o. Sk. Helsingborg: Almqv. — N. Christiania.) Var. mycket i afs. på storlek o. beklädnad. Kantblnns br. under rödrand., säll. ss. hos ♀, rent gult. De flesta formerna få stund. blom. graskott. = har hos oss hittills förväxlets med den Sydosteurop. *H. stoloniflorum* Kütz., som ej finnes i Skand.*

- \*2 *H. cernuum* Fr. st. vid basen enblad. m. korta grskott, långh., vid midten delad i 2—3, säll. flere långa enblomstr. skaft; bl. under blekgörna m. glest l. intet stjernludd, på båda sidor o. i kant. långh.; blk. stora m. smälare, n. mörkare o. smalkant. fj. 24. 7.  $\alpha$  *collinum*: mindre m. under rödrand. kantbl. o. stjernh. bl. —  $\beta$  *umbrosum*: större m. under gula kantbl. o. nakna bl. —  $\alpha$  H.N.f.15, n:o 12. H.Eur.exs.4. H.Sc.exs.3. Fjelltr. r. (N. vid Hugelien i Torpen, Langedalen, Stensåtsbygden, Eikjebakken m. fl. st. i Valders. Lesjeskogen vid Qvam o. Stuaflotten. Opdal vid Stensem: Ambr. Jönsson.) 2—3 qv. hög, öfverallt långh. Blomkorg. ej mer lutande (*cernua*) än hos de öfriga inom afdeln. Var. 1blomstr., utan grskott, säll. m. blom. grskott o. bladroseller. Liknar mycket *H. Pilos.* = flagellare, från hvilken den lättast skiljes genom kortare graskott, mer utspärr. blksk., mörkare, spetsigare och mer smalkantade fj. — *H. furcatum* Hn Ed. 4. — Står närmast den Sydeurop. *H. bifurcum* MB., till hvilken den fördes i H.N.

- 3 *H. auriculæforme* Fr. st. vid basen enbl. m. korta grskott, ofvan midten gr. i 2—3 långa (säll. flere klasiskt ställda o. kortare) blksk.; bl. blågröna ofvan nakna, under tunnt men tätt stjernludna, v. på båda sid. o. i kant. glesh.: blk. små m. fj. o. beklädn. ss. hos *H. Pilosella*. 24. 6, 7. —  $\beta$  *denigratum* Fr. st. glest långh.; blk. långh. m. täta mörka gl. — H.N.f.6, n:o 5. H.Eur.exs.9. H.Sc.exs.4 (båda formerna). Tor. fält, back. r. (Smål. Femsjö. Södm. Uppl. i Mälaretrakten. Göteborg. enl. Lemm. — N. Tönsberg på en bergås v. om staden. —  $\beta$  Uppl. vid Uppsala o. Ujorden vid Almarestäk.) Spenslig fingerhög—qvartershög, v. m. ett blksk. nära basen. Bl. stund. n. glatta. Kantbl. v. rödrandade. — Habituellt likt *magrare* form. af följ. men endast beslägtad med *H. Pilos.* = *virescens*, med hvilken den ofta förväxlas. Skiljd med mindre o. smälare blk., mindre, fastare o. blågröna bl.

b — *Auriculina* Fr. st.  $\frac{1}{4}$ —4 qv. hög. 0—3blad., få—flerblomstr. m. v. sammansatt qvast ell. oregebl. knippe, blksk. korta, uppstig. Fj. nakna l. glest stjernh. m. tydl. glatt kant, de inre trubbiga.

\* *pratensia*: stift alltid gula; krbr. å båda sid. gult; fj. med hinnakt., glatt o. blek topp.

- 4 *H. auricula* L. st. 1blad. m. långa grskott, 1—8blomstr. m. n. enkel flock; bl. blågröna, tunglika, mest trubbiga, på båda sid. nakna o. glatta, mot basen glest hårbrädd.; fj. n. nakna m. bred ljus kant. 24. 6, 7. —  $\beta$  *maius* Wg: 2—3 qv. hög, till alla delar gröfre, m. 4—8 blk. —  $\alpha$  H.N.f.6, n:o 6. H.Eur.exs.13. H.Sc.exs.5.  $\beta$  H.N.f.9, n:o 7. Ångsback. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till 4000'). Vanl. qvartershög med små blk. St. späd, glh. o. stund. glest korth., upptill stjernh. Var. på torra st. o. i fjelltr. fingerhög o. enblomstr. (H.N.f.11, n:o 14); på fukt. ång öfvergår den tydl. i  $\beta$ , som i Fr. *Symb.* fördes till *H. suecicum* Fr. Holkfj. bli i fjelltr. n. så mörka som hos *H. floribundum*.
- 5 *H. pratense* Tausch. st. 1—2blad. m. grskott o. stund. långskaff. bladros., mångblomstr. sammansatt qvast; bl. gröna, tunna, rotbl. spadl.—tungl. trubbl., stjb. lancettl. spetsiga, alla på båda sid. nakna (endast stjb. under svagt stjernh.) o. ofast glest långh., tätt hårbrädd.; fj. stjernh., långh. sårdel. mot spetsen, ljst glh., bredt ljuskant. 24. 6, 7. H.N.f.6, n:o 10. H.Eur.exs.18. H.Sc.exs.15.

Odl. st. r. (Förvildad h. o. d. från Sk.—Gestr. t. ex. Lund, Uppsala, Gefle. — N. Christiania.) St. 2—4 qv. hög, sårdel. mot toppen o. basen tätt mjukh., h. föga längre än stj.diametern, upptill afven glh. o. stjernh.

\*\* *aurantiaca*: stift rödbruna, kantblnns br. åtm. på undre sidan brandgult ell. rödrand., fj. m. hinnakt. glatt o. violett topp. St. åtm. i toppen ell. mot basen rödakt.

a) *glaucescentia*: st. 1—2 qv. hög, 1—2blad., med fasta, blek., ell. blågröna bl.

- 6 *H. floribundum* Wimm. st. 1—2blad., glest långh., uppåt glh. o. stjernh. m. utdragna,

spensliga grskott o. stund. långskaff. bladros., fåblomstr. m. v. enkel öppen qvast; bl. bredt tungl.—lancettl., de inre v. i toppen veckade, blekt blågröna, på båda sid. nakna o. glatta, på undre sidans medelnerv o. i kant., särd. mot basen, långh.; fj. bredt blek- de yttre n. hvit-kantade, endast mot basen glest stjernh., på den mörkgröna o. kölade ryggen gih. o. långh.; diskbl. gula, kantbl. br. under rödrand. 2 7, 8. — *β alpestre*: spåhare m. smärre blk., bl. kölade ofta vågbrädd. o. snedspetsade, st. stund. ända från basen röd. — *α* H.N.f.15, n:o 11. H.Eur.exs.14 o. 17. H.Sc.exs.6. — *β* H.N.f.13, n:o 8. H.Eur.exs.13, b. (und. H. Auric.), 14\*. H.Sc.exs.7. — \**stellatum* Lіндеb.: med högre korth. o. öfverallt stjernh. st.; gråblå, n. platta o. rätspets., under stjernh., kort hårbrädd. bl.; ljusare (rödgrå) stift o. gula kantbl. H.Sc.exs.8.

Fukt. äng. o. fjellider. (VB.—ÖG. Goutl.: hufvudformen i låglandet i mellersta Sverige o. sälls. i N. — *β* allm. i fjelltr. 1500'—2500'. — \* i fjelltr. r. N. Langedalen, Tonsaasen m. fl. st. i Valders. Drivstuen på Dovre. 1500'—3000'.) 1—2 qv. hög, få o. stor-blomstr. Var. sällan med rent gula kantbl. o. gula, blott i kant. mörkhåriga stift, hvilket enl. Wimm. lär vara det vanl. förhållandet i Schlesien. Anses ss. hybrid af H. Auricula o. H. pratense, hvilken senare dock hos oss nästan aldrig förekommer på samma lokaler. I fjelltr. förekomma flere ännu outredda former, som närma sig än H. decolorans, än H. dubium och synas vara hybrider af dessa. H. suecicum Fr. o. Hn. ed. 9; *β* H. floribundum Fr. o. Hn p. p. — \**stellat.* dr 2—3 qv. hög med korta, stund. felande grenskott o. blott upptill rödakt. st.

\*7 H. Blyttianum Fr. st. mot basen enblad., teml. tätt långh., uppåt gih. o. stjernh., m. grskott, fåblomstr. m. små kortskaff. blk. i enkel sammandragen qvast; bl. tungl.—lancettl., blågröna, nakna, vanl. på båda sid. glesh.; diskbl. röttoppade, kantbl. invändigt rödgrå, utvändigt rödrand. ell. rödvioletta. 2 7. H.N.f.13, n:o 7. H.Eur.exs.16. H.Sc.exs.14.

Fjelltr. r. (N. Hugelin, Stensætsbygden, Tonsaasen, Høgenesæter m. fl. st. i Valders.) St. spenslig, föga mer än quarternshög, stund. mot midten med ett mindre fjällformigt, under stjernh. bl., *β*—5blomstr. Grenskotten saknas aldrig, stund. utvecklas öfven långskaff. bladrosetter. Bl. vanl. små, blågröna o. ofta violett-fläckiga. Var. föga; på fukt. st. högre, med tunnare och grönnare bl., större o. flere blk. i något sammansatt qvast. — H. fuscum Fr. Symb. o. Hn. ed. 8, icke Vill. enl. Fr.

*β viridia*: st. 2—4 qv. hög, tätth., 1—3blad., med stora, tunna, på båda sid. håriga o. v. lifligt gröna blad.

8 H. decolorans Fr. p. p. st. 1—2blad., stråfh., säll. m. grskott, men alltid m. långsk. rosetter, flerblomstr. m. långt hvith., sammansatt, v. tät, n. flocklik qvast; bl. styfva o. v. gläns., n. omv. äggr.—af. lancettl., hårbrädd. o. på båda sid. glesh., nakna (utom det öfversta, under glest stjernh. stjblad); fj. lika med H. florib. men mer stjernh.; alla blr. inv. gula, kantbl. utv. rödrand. 2 7, 8. — *β serratum*: st. 1½—2½ qv. hög m. fåblomstr., n. enkel utspärrad qvast, bl. mycket breda, kölade o. ojemnt grofsågade. — *β* H.Sc.exs.9. H. suecicum v. alpigenum Fr. H.Eur.exs.14 b.

Fjelltr. r. (Herjed. mell. Funnesdalen o. Skarffjellet samt i öfre Ljusnedalen. — N. Nystuen i fjellierna vid björkgränsen på Lillefjeld. Dovre vid Drivstuen: Ambr. Jönsson enl. Fr. H. Eur. exs. — *β* Herjed.: J. Hulting. — N. vid Stensem i Opdal. 2000'—3000'.) 3—4 qv. hög, m. grof, tätt men kort stråfh., uppåt tillika stjernh., gih. o. rödakt. st., samt stora, breda o. lif. gröna bl. De yttre rotbl. vid blomningstiden bortvisnade. — Ofta förveklad med följ. o. med former af H. aurantiacum.

\*9 H. flammeum Fr. st. 2—3blad., kort stråfh. oftast utan grskott, men med långskaff. ros., fåblomstr. med korth., n. enkel kiaslik qvast, de nedre blksk. utdragna, v. enkla o. aflågnade; bl. mjuka, v. gläns., tungl.—lancettl., hårbrädd. o. på båda sid. korth., rotbl. nakna, stjbl. under stjernh.; fj. breda mörkgröna m. föga blekare kanter, gih., stjernh. o. glest långh.; diskbl. gula o. blott röttoppade, kantbl. inv. gula, utv. mörkt röd- ell. violett-randade. 2 7, 8. H.Sc.exs.10. H. decol. var. Fr. H.N.f.16, n:o 11. H. decol. flammeum Fr. H.Eur.exs.19\*.

Fjelltr. r. (N. Tonsaasen, Lillefjeld m. fl. st. i Valders. Dovre vid Drivstuen. Opdal flerst. 2000'—3000'.) St. 3—4 qv. hög men spenslig, beklädd ss. föregående. Bl. mjuka, tunna, långa, men föga breda, de yttre vid blomn. bortvisnade. Blk. små, smala, af n. samma storlek o. form som H. cymosi. Var. föga: på torra



st. mindre, mer stjernh. m. mindre och fastare bl. samt blekare blr. Lätt skiljd från föreg. genom n. dubbell smälare, mer korth. o. stjernh. st., mjukare o. smälare, mer stjernh. bl., smärre, smälare o. längre skaff. blk., smalkant. fj. o. mörkare kantbl. Stund. förväxlad med följande: »*H. aurantiacum* v. *bicolor*». *Auct. Scand.*

- 10 *H. aurantiacum* L. st. 2—3blad., tät längh., v. m. korta grskott o. bladros., mångblomstr., långt mörkh., sammansatt tät n. flocklik qvast, stund. m. de nedre blksk. aflägsnade, flerblomstr.; bl. mjuka, omv. äggr.—afl. lancettl., hårbrädd. på båda sid. glest längh., nakna, de öfre stjbl. under glest stjernh.; fj. breda, mörkgröna, v. m. tyd. blekare kant., tät och mörkt gih. och längh. samt, särd. mot basen, glest stjernh.; alla blr inv. mer ell. mindre rödakt., kantblr utv. mörkröda—violetteröda. 24 7. —  $\beta$  *glaucescens* Lindeb.: stor, robust, längh. o. mörkblomstr. ss. hufvudformen, men m. mindre blk. i mångblomstr., hvithårig, vanligen vipplik qvast; bl. mindre o. fastare, under något blå- ell. grågröna, liksom hela st. med täta stjernh.; fj. m. tydligare gröngula kanter, smalspetsade. Saknar vanl. både grenskott o. rosett. —  $\gamma$  *bicolor* All. till alla delar mer korth. och mjukh. o. ofta spädare än hufvudformen, m. v. mer fåblomstr. qvast; diskblr gula, blott rödtoppade, kantblr ofta något ljusare än hufvudformens. Har vanl. långskaft. rosetter. —  $\alpha$  H.N.f.10, n:o 9. H.Eur.exs.20. H.Sc.exs.11. —  $\beta$  H.Sc.exs.13. —  $\gamma$  H.Sc.exs.12.

Äng. i bergstrakter. (Hufvudf. förvild. h. o. d. i parker o. trädgårdar fr. Sk.—Uppl. o. i S. Norge. —  $\beta$  N. Hugelisatern, Stensåtsbygden m. fl. st. i Valders. 2000'. —  $\gamma$  Eksjö, Smedstorp m. fl. st. i norra Smålands högland. — N. Land vid Lie.) *Hufvudf.* stor, grof, öfverallt tät längh. m. mörka hår i blst. o. m. stora tunna bl. —  $\gamma$  har n. hårlösa blsgren.

B) St. 1—flerblad., utan ell. säll. m. korta, bladiga grskott (hos nr:is 12—15) o. n. oskaft. bladros. vid basen. De yttre rotbladen vid blomn. oftast bortvissnade, de inre och stjbl. lancettl.—jemnbreda, smala i förhåll. till längden. Rotstock kort, v. snedt nedstigande.

a — *præaltum*: st. 1—4 qv. hög, spenslig, 1—3blad., flerblomstr. m. vipplik, sällan n. flocklik qvast. Småblomstriga, blek- ell. blågröna arter med nakna (nr:is 11 o. 12) ell. glest stjernh. blad (n:o 13).

- 11 *H. hyperboreum* Fr. st. 1—2blad., sträf af glesa styfva hår längre än stängels diameter; de inre rotbl. o. stjbl. smala, tungl.-lancettl.-jemnbreda, spetsiga långspetsade, på båda sid. nakna o. glatta, i kant. o. på medelnerven glest styfh.; blk. cylindriska i fåblomstr., gles o. öppen vipplik qvast, med en ell. annan undre gren långt aflägsnad; fj. smala, trubbiga, violett- ell. svartgröna, smalkant., liksom de fina böjda blstr. o. blksk. nakna, m. glesa, långa hår o. korta gih. med rödgula knappar. 24 6, 7. H.N.f.13, n:o 9. H.Sc.exs.19.

Bergstrakt. r. (*Gottl.* på kalkklippor enl. Fr. — N. Langoe o. Brevig i Bradbergs amt. — Lom—Nordl. o. Finnm. flerst.) St. 1—2 qv. hög, spenslig o. flerböjd med de minsta blk. i stäglet. Bl. styfva, intensivt blågröna, stund. violettakt. Saknar alldeles stjernh. o. grenskott. — Var. blott i afseende på storlek o. blomrikhet: qvasten hos *magrære* ex. fåblomstr., kortgrenig. Mycket närbeslägtad med *H. florentinum* All., från hvilken den skiljes n. blott genom stängels beklådnad. — *H. præaltum* var. *piloselloides* Hn ed. 4 och Fr. Mant. 3.

- \*12 *H. præaltum* Vill. st. 2—3blad., glatt ell. glest styfh. (hos  $\beta$  tillika stjernh.); bl. lancettl. spetsiga, v. på båda sid. nakna o. glatta, i kant. o. på medeln. glest styfh.; blk. cylindr. i tät, vipplik qvast, de undre gren. stund. långt aflägsnade o. rätta; fj. smala, trubbiga, svartgröna m. tyd. blek kant, tillika med blstr. o. blksk. v. stjernh., glest längh. o. gih. 24 6, 7. H.N.f.6, n:o 7. —  $\beta$  *decipiens* Gren. st. o. bl. mer mjukh., de senare under äfven stjernh. H.N.f.6, n:o 9.

Bergstrakt. r. (N.  $\alpha$  osäker i Skand. Ex. i H.N. uppgifvas vara odlade af frö från Dovre, der växten likväl på de senare decennierna icke blifvit funnen. —  $\beta$  N. Reien i Slidne, Fröen i Gudbrandsdalen: Blytt. Öfre Romsdalen. Ex. från öfriga angifna lokaler tillhöra följ. — Skall äfven finnas vid Uppsala, der ex. i H.N. sägas blifvit insamlade.)  $\beta$  är smärlik *H. cymosum*  $\alpha$ , hvarifrån den lätt skiljes genom blomställn. o. beklådnad.

- \*13 *H. subpræaltum* Lindb. st. 2—3blad., glest o. kort finh. o. stjernh., stund. m. korta, sterila ell. blombar. småblad. grskott: stjbl. smala, jemnbr.-lancettl. spetsiga, under tydl. ofvan n. omärkligt stjernh., v. på båda sid. o. i kant. glest småh.; blk. anhängt cylindr. i fåblomstr., än vipplik än n. flocklik qvast; fj. breda, trubbb., svartgröna, n. kantlösa, liksom blstr. o. blsk. stjernh. o. ghl. 2 6, 7. H.Sc.exs.20. — *H. præaltum* \*stoloniferum Fr. H.N.f.14, n:o 12.

Bergstr. r. (*N. Tönte*, Kamphaug m. fl. st. i Nordmarken. Mistberget vid Eidsvold: Bl. Elstad i Gudbrandsdalen. Opdal på ångarna ofvan Stensemgårdarna. — 1000'—2000'.) St. 3—4 qv. hög, v. spdd o. flerböjd. Bl. teml. tunna, svagt blågröna, under stund. rodnande, v. uppstig. till stjelkens midt. Var. med fåblomstr. n. enkel qvast o. glesh. blk. (vid Stensem). Förvezlade med föreg:s β, från hvilken den lätt skiljes genom stjelkens o. bladens korta o. mjuka hårbeklädnad, de mjukare på öfra sid. stjernh. bl., den fåblomstr. o. mer sammanträngda blst., samt de bredare o. kortare fj. — Hos båda är ett ell. annat af de inre fj. spetsigt.

b — *cymosa*: st. v. 2—4 qv. hög, oftast grof, 1—flerbladig, v. mångblomstr. med sammansatt, m. l. m. flocklikt ell. qvastlikt knippe. Gräsgröna ell. gulgröna arter med på båda sid. stjernludna blad.

- 14 *H. dubium* L. st. 1—3blad., öfverallt stjernluden o. n. till basen ghl., oftast med kryp. grskott o. stund. m. skaft. rosetter; bl. ofvan rent gröna, under svagt blågröna, n. likform., smala, lancettl.-jemnbreda, ofta i kant. vågbräddade o. snedspetsade, v. på båda sid. h. o. stjernh.; blk. i flerblomstr. vipplik ell. stund. n. flocklik qvast, tillika m. blsk. stjernludna, tätt ghl. o. ofta äfven enkelh.; fj. breda, trubbb., med mörkgrön rygg o. v. breda, bleka kanter. 2 6, 7. — α *pubescens*: de utdragna, v. blekgröna bl. o. ofta äfven st. o. blk. kort mjukh., de senare stora, aflånga m. bred bas; grskott v. utdragna. — β *hirsutum* Hn: de v. jemna, gräsgröna bl., st. o. ofta äfven blk. långt stråfh., de senare som hos α, grskott v. korta, stund. felande. — γ *anceps* Lindb. finh. m. små, cylindr., vid basen smala blk., grskott utdragna, spåda.

Torra äng o. back. (Lpl.—Smål. Blek. Lyckeby: Ankarcrona. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finnm. — 1500'. — α allmänare i låglandet, β mer i fjelltr., γ på Grenna-plåten.) St. från quartershög, spenslig o. fåblomstr till alshög, grof o. mångblstr. v. med vipplik qvast o. en ell. annan aflågsnad blstr. Var. betyd. sår. i fjelltr., der många ännu föga kända former förekomma, än närm. sig till *H. florib.* \* *stellatum*, än *H. cymosum* α. — Låglandsform. af α äro ofta svårskiljda från *H. glomerat.*, men igenkännas lättast genom kortare, fåbladigare st. m. mer utdragna grskott, ofta vågbrädd. bl., större o. mörkare blk. m. bredare, mindre utdragna o. mer trubbb. (äfven de innersta), samt tydligare kantade fj. — γ närmast sig mycket *H. cymosum*.

- 15 *H. glomeratum* Froel. p. p. st. 2—5blad., kort mjukh., stjernh. o. n. till basen ghl., säll. m. korta, sterila ell. blombar. grskott: bl. ofvan gröna, under blek- ell. svagt blågröna, v. långt utdragna, de inre rotbl. o. stjbl. n. likform., lancettl.-jemnbreda, spetsiga, v. på båda sid. korth. o. stjernh.; blk. aflånga m. något vidgad bas, i mångblstr. vipplik ell. flockl. sammandr. qvast, tillika m. blsk. tätt stjernh. o. ghl.; fj. smala, mer ell. mindre utdragna till en smal men trubbb. spets. 2 6, 7. H.N. f.13, n:o 11; f.13, n:o 14 (»*H. cymosum*»). H.Eur.exs.34. H.Sc.exs.21.

Ang. etc. (Blek. Smål.—Hels. Ängml. VB. Boh. Klöfverön. Dalsl. Gottl. Ruthe, Lärbro etc.: Westöb. — N. södra delen, sälls. t. ex. Holmestrand, Dröbak, Gräfsen-aasen.) St. 3—4 qv. hög o. grof m. v. till midten uppstig. bl., rotbl. vid blomn. oftast förvisnade, blistålln. i början tätt m. kortskäft. blk., de nedre blsk. ofta aflågsnade, fj. stund. otydl. kantade, blott några af de innersta något spetsiga. Är en medelform mellan föreg. o. följandes β, från hvilka vissa former endast med svårighet kunna skiljas.

- 16 *H. cymosum* L. st. 3—6blad. öfverallt hårig, stjernluden o. upptill glest ghl.: bl. gröna, utdragna, lancettl.-jemnbreda. på båda sid. h. o. stjernh.; blk. cylindr. m. smal bas, oftast i regelb. flocklikt knippe med utdragna, hvitludna, glest långh. o. ghl. grenar o. blsk., tätt långh. o. stjernludna m. ghl. mest mot fjällens toppar; fj. smala v. m. mörkgrön rygg o. smala kanter, utdragna till en smal, trubbb. spets. 2 6, 7. — α *hispidum* Fr. st., sår. nedre delen, bl. o. blk. tätt mjukh., h. af st:s diameter, bl. ofvan mycket glest stjernh. — β *pubescens* Lindblom: st. upptill från midten glest

gh., tillika m. bl. kort mjukh., blk. små, smala m. glesa h., bl. ofvan tätt stjernh. — *γ Rothianum* (Wall.) hela växten tätt långh., blksk. utan fj. med glesa gh., blk. något större o. bredare än hos *α* o. *β*, i mer oregebl. qvastlikt knippe. *α* H.N.f.13, n:o 15; f.13, n:o 16 (»H. Sabia norveg.»). H.Sc.exs.23,24. — *β* H.N.f.13, n:o 12. H.Eur. exs.35. H.Sc.exs.22.

Äng. o. fjelltrakt. (Sk.—VB. — N. — Finnm. — *α* mest i de östra prov. t. ex. Blek. Lyckeby: H. G. Lübeck. Smål. först. enl. Scheutz o. Zett. ÖG. VG. Ner. Södm. Uppl. etc. — N. Christiania etc. till Finnm. — *β* r. i lågländet t. ex. Ner. Hardemo: Zett. Uppl. Signildsberg. — N. teml. allm. i de mellersta fjelltrakt. 1000'—2500' t. ex. Tonsaasen, Dovre, Opdal. — *γ* Öl. Borgholm. Smål. Urshult: Sch. ÖG. Berg i Vreta kloster sn: W. Oséen. VG. vid kanalen: Hn. etc.) 3—4 qv. hög, mycket sällan m. grskott, bl. vanl. samlade mot st:s nedre del, mera sällan (hos *forma aphyllopoda*) uppstig. öfver dess midt. De breda rotbl. qvarsitta ofta, särdeles hos *α*, vid blomn. — *α* H. Nestleri Vill. o. Ed. 8. — *β* H. glom. \**alpinum* Fr. Symb. — *γ* H. setigerum Tausch o. Ed. 9 p. p.

17 H. *setigerum* Fr. liknar i hög grad föreg. *γ*, från hvilken den svårigen kan skiljas ss. egen art. Utmärker sig genom högre o. kraftigare, tätt gråluden växt, bl. uppstigande öfver st:s midt. breda blk. i tätt sammandr. flocklikt ullh. knippe, samt breda, mycket trubb. fj. 24 7. H.N.f.13, n:o 13. H.Eur.exs.37. H.Sc.exs.25.

Torra ställ. r. (Förf. har sett säkra ex. endast från Mälartrakten, t. ex. Kungshamn vid Uppsala, Mörby holme i Skå sn.) 4—5 qv. hög, v. m. blom. grskott. Rotbl. vid blomn. vissnade. Blsk. o. fj. med glesa, n. omärkl. gh.

†† *Pulmonaria*: Stjelen vanl. bladig, med mer ell. mindre inskurna, vanl. tydligt skaftade blad och bladrosett från rothalsen; rotblad vid blomningen vanl. fortvarande; skalfruktur i toppen omgifna af en något uppsväld ring (under hvilken fruktens åsar och fåror upphöra) med styfva oliklånga fruktsjun; holkfjäll fåradiga, oregeblundet tegellagda.

A) *Alpina* Fr. yttre fj. utdragna, bild. en n. sammanhäng. spiral med de inre, alla svartgröna o. gh., utan tydl. stjernludd. Stj. till basen mer ell. mindre gh. Bl. åtm. i kant. fint, n. omärkl. gh. Krbr. utv. ell. blott i toppen hårigt.

\* Lågväxta, v. långh. arter, m. stora breda, rundade blk. m. de yttre fj. utstående.

18 H. *alpinum* L. stj. stängelform., stjernluden, mjukh. o. glest gh., 1—fåblomstr., 0—flerblad.; rotbl. små. öfvergående till vingade, v. utdragna skaft, de yttre qvarsitt., späd-ellipt., trubb., de inre tungt-lancettl. spetsiga, stjbl. föga utvecklade, uppt. fjällika, v. oskaft., alla på båda sid. glesh. o. meränd. helbrädd.; blk. stora, n. klotform. m. två bas, tätt silkesludna m. små gulakt. gl., yngre lutande; fj. svartgröna, olikform., de yttre breda fränstående m. uppböjda trubb. spetsar, de inre utdraget smalspetsade; krbr. v. ända till toppen glest långh.; stift mörka l. gula. 24 7—9. Fig. H.N.f.10, n:o 7, 8 (»H. nigrescens»); f.12, n:o 25; f.15, n:o 10. H.Eur.exs.1. — A) långhår., mjukblad. former m. långt silkesludna blk.: *α genuinum* Wimm. stj. 3—6 tum hög, 1—säll. 2blomstr., n. bladlös; rotbl. vågbrädd. veckade, v. rödlupna. — *β foliosum* Wimm. stj. fothög. 1—säll. 2blomstr., 2—4blad. m. jemnbr.-lancettl. stjbl.; bl. v. jemna, helbrädd., gröna. — *γ ramosum* Lindeb. stj. 1—2 qv. hög, ofta från basen delad i 3—5 långa upprätta böjda 1blomstr. skaft, 2—3blad.; bl. bredare, tandade. — B) korth., styfblad. former m. svartakt. blk.: *δ subnigrescens* Lindeb. v. delad från basen i långa utstående krökta, enblomstr. skaft; bl. breda, mindre nedlöp., v. djupt fliktand.; fj. smalare långspetsade. — *ε melanocephalum* Auct. stj. o. bl. s. *α*, de senare bredare o. mera tandade.

Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N. 2000'—4000'. — *α*, *γ* och *ε* på fjellplatåerna ofvan björkgränsen, *δ* i öfre björkregionen, *β* i gräsrika fjelldalar t. ex. Romsdalen, Opdalen. — *ε* Högsnyta, Fröstuehöe m. fl. st. på Dovre.) *Mångformigast inom släktet! Bland dess talrika, från snögränsen till barrträdgränsen förekommer ofta ofvanstående mest konstanta; de öfriga sammanflyta utan all gräns.* — *γ* H. *fuliginosum* Læst. p. p. — *δ* knappt skild från H. *rhaeticum* Fr. H.Eur.exs.5.

\*19 H. *eximium* Backh. stj. stjernluden, långh. o. glest gh., v. blott i toppen grenad i långa, upprätta 1blomstr. skaft, 2—3bladig; yttre rotbl. få, vissnande, de inre o.

stjbl. utdraget lancettl. spets., afsmaln. till korta, bredt vingade skaft, glest groftand. m. utspärrade tänd., på båda sid. glest långh. o. stjernh.; blk. n. klotrunda m. två bas, långt ullh. m. små ljusa gl., yngre något lutande; fj. som föreg. men mer smal-spets.; krbr. som föreg.; stift mörka. 2 8. H.Eur.exs.1.b.

Fjelltr. r. (N. Dovre. Drivstuen. Finnm.; Norman. — 2000'—3000'.) 1½—2 qv. hög o. stund. ända från basen grenad i upprätta n. jemnhöga grenar; bl. mjuka, 3—6 tum långa, vågbrädd. m. sned veckad spets, v. djupt fluktand. Blk. ofta större än hos föreg.

\*20 *H. personatum* Fr. stj. tätt stjernl. o. långh., 2—flerblomstr., 3—5blad.; rotbl. få, de yttre visnande, spadl.-tungl. lancettl. m. korta vingade skaft, stjbl. lancettl. oskaft., liksom de inre rotbl. styfva o. mot basen groft bugttandade; blksk. enkla, utstående o. uppböjda, hvitludna, långh. o. glest glh.; blk. bredt afl. med äggr. bas, tätt långh. m. små rödgula gl.; fj. svartgröna, de yttre breda, föga utstående, trubb., några få inre långspets.; krbr. som föreg.; stift gula. 2 7.

Fjelltr. r. (N. Hugelien i Torpen. 2000'.) 1—2 qv. hög, långt o. tätt krush., m. enkla utdragna, ofta småblad. blksk. i de öfra bladvecken, stund. fr. basen grenig m. 2—3blomstr. grenar. Bl. v. vågbrädd. o. veckade, under grågröna. Står nära *H. sudeticum* Sternb., från hvilken den skiljes genom längre hårlighet, mot basen afsmalnande bl. o. gula stift.

\*\* Högväxta, kort finh. arter m. smalare aflånga blk. m. tilltryckta fj.

21 *H. commutatum* Lindeb. stj. stängelf., glest stjernl. o. finh., enkel, 1—5blomstr., 0—1blad.; bl. tunna, på båda sid. glest o. kort krok., yttre rotbl. qvarstitt., rundade m. två bas, de inre ellipt.-lancettl., nedåt afsmaln., alla med långa n. ovingade, långh. skaft, mot basen v. djupt bugttand. m. breda utstående tänder; stjbl. stund. 1 närmare basen, lancettl., fätand. skaftadt; blksk. enkla, utstående o. bågliktt uppböjda, tätt stjernl., hvith. o. glest glh.; blk. afl. m. äggr. bas, tätt långh., m. små rödgula gl.; fj. tilltryckta, svartgröna, smala, långt utdragna, de yttre något trubb., de inre syllika o. långspets.; krbr. utv. föga glesk. m. korth. tänder; stift mörka. 2 7, 8. H.Sc.exs. 26 (»H. nigrescens»).

Fjelltr. (Teml. allm. i mellersta Skand. Fjellbygd. 2000'—4000'. Dal.—Herj. Midtdalen: S. Almqv. — N. Romsdalen, Dovre, Opdal.) Stj. v. 1½—2 qv. hög, kort finluden, bladlös. Bl. tunna, stund. kölade o. vågbrädd. Blk. smala, långskaftade yngre något lutande, med svartfotade långt hvitluppade hår o. föga märkbara gl. Fj. fåradiga o. mindre regelb. tegellagda än hos de öfriga alpina. Vanl. förväxlad med *H. alpinum* och *H. nigrescens*. Skiljes lätt fr. den förre genom mindre o. smalare blk., m. tilltryckta smala o. teml. likform. fj., högre st. m. stora breda bl.; från den senare genom längre gråludna blk. m. utdragna syllika, mer oregelbundet tegellagda fj. samt dessas o. skaftens beklädnad. — *H. nigrescens* Fr. omfattar former såväl af denna som *H. alpinum* o. *nigrescens* W. (Jmsf. *Symb.o.Epicr.*, H.N.f.10, n:o 8, Rchb.t.146 o.148!) — Synes okänd i ullandet; Förf. har icke anträffat exsicc. ell. beskrifningar, som motsvara denna.

22 *H. nigrescens* Willd. stj. glest stjernl. o. finh., enkel ell. fr. öfra bladvecken grenig, 2—flerblomstr., 1—3blad.; bl. som föreg. men rotbl. färre m. kortare, mer vingade skaft; blksk. enkla ell. klynegren., stjernl. m. täta mörka gl. o. svarta, endast kort hvitspetsade hår; blk. bredt afl. m. äggr. bas, svarta m. hår o. gl. ss. skaften; fj. tilltryckta, bredare o. mindre utdragna än hos föreg.; krbr. utv. n. glatt m. korth. tänder; stift mörka. 2 7, 8. — *a. humile*: låg, stängelf., upptill del. i 2—3 långa upprätta, blomstr. skaft. — *β submurorum*: reslig, v. grenig o. bladig, flerblomstr. m. de öfre blksk. bågliktt uppböjda: *H. atrat. subnigrescens* Fr. H.Eur.exs.91\*.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. — N. Finnm.—Dovre o. Romsdalen. 2000'—3000'. — *a* är en nordligare, *β* en sydligare form.) Stj. 2—3 qv. hög. Blomkorgarnes o. skaftens glandler transverselt ljusrandade, n. perlbandlika. — Stora mångblomstr. ex. förväxlas ofta med *H. murorum*, små o. fåblomstr. med *H. alp. melanocephalum*, från hvilken senare den lätt skiljes bl. *a.* genom alltid upprätta blk. (Af denna o. alla de föreg. alpina förekommer ofta formen stylosa med föga utvecklade krbr. kortare än stift.) — Ar enl. Koch, Wimm. m. st. den verkliga *H. nigrescens* Willd., hvarföre Förf. ej har velat utbyta detta i ullandet allmänt antagna namn mot det af Prof. Fries föreslagna *H. atratum*, som äfven omfattar mörkblomstr. former

af *H. alpinum* (se beskrifn. i *Symb.*) o. desutom blifvit användt för flere andra former.

- 23 *H. lingulatum* Backh. \**depilatum* Almquist. stj. glest stjernl. o. korth., fåblomstr., 3—5blad.; bl. teml. fasta, på båda sid. glest korth., n. helbrädd., rotbl. få vissnande, omv. äggr., kortskaff., stjbl. lancettl. oskaft.; blksk. enkla, räta o. upprätta, de nedre från bladvecken, stjernl., m. glesa mörka korta h. o. bleka gl.; blk. aflånga m. tvär bas, tätt beklädda med mörka, kort hvitspets. h. o. rödgula gl.; fj. mörkgröna tilltryckta, tegellagda, de yttre trubh., de inre spets.; krbr. o. stift som föreg. 24 8, 9. H.Sc.exs.27.

Fjelltr. r. (*Herj.* Ljusnestöten: S. Almqv. o. J. Hulting.) 2—3 *qv.* hög, mycket otik alla öfriga af denna *afd.* — *Afviker* från den Skottiska formen gm lägre växt, kortare hårbeklädnad o. mer glh. blkfoder.

B) *Oreadea* Fr.: Yttre fj. korta, färadiga; stjbasen o. rotblskaff. tätt styfhaar.; bl. v. läderart. o. styfva, under intensivt grågröna, ofvan i friskt tillstånd gulgröna, torkade blekgröna; kronbrämets tänder ofta på undre sidan småhår.; stift gula, vissnade n. rostbruna.

a — *scapigera*: stj. stängelf., 0—2blad. m. vid blomn. v. quarsitt. rotbl.

- \*24 *H. rupicolum* Fr. stj. stjernh., klynnegr. m. utstående 1—3blomstr. gr., 0—1blad.; rotbl. kortskaff., de inre äggr. ovala spets., mot den afsmaln. basen groftand., und. o. i kant. stråfh.; blksk. hvitludna m. glesa mörka gl., upptill fjälliga; blk. tätt stjernl. o. hvith. m. små otydl. gl.; fj. gröna smala, jemnbr. lancettl. långspets.; krbr. m. småh. tänder. 24 7. H.Eur.exs.72 (72 b. synes tillhöra en annan art).

Bergstr. r. (*N. Finnm.* Tanen etc.: Norman.) *Qvartershög, spenslig o. v. grenig m. små smala blk.; stjbas o. bladskaff. hvitulliga. I Boh. förekomma fleret. mycket närstående men flerbladigare former.* — *H. bifidum* Koch.

- 25 *H. pallidum* Biv. (enl. Fr.) stj. mer ell. mindre långh. uppåt stjernh. och glh., i toppen qvastlikt grenad, fåblomstr., 0—2blad.; rotbl. v. kort vingskaft., de inre äggr.-ovalabreddt lancettl., mot den nedlöp. basen v. groftand., und. o. i kant. stråfh.; blksk. stjernl., hvith. o. tätt glh., mot toppen fjälliga; blk. hvith., glest stjernh. o. glh.; fj. mörkgröna, v. blek-kant., lancettl., utdraget smalspets., de innersta v. sylspets.; krbr. ofta m. småh. tänder. 24 6, 7. H.N.f.10, n:o 6; f.13, n:o 17.

Bergstr. (*Blek.*—*Upl.* Hall. *Boh.* särdeles vid kusten. — *N.* till Finnm. Stiger i fjeldal. t. ex. Romsdalen, Drivdalen o. Sundalen till 1500') 1—2 *qv.* hög, v. grof o. fåblomstr. med stora breda blk. De inre fj. n. nakna, de yttre hvitkant. af stjernludd. Var. mycket till storlek, bladform o. beklädnad: stund. n. glatt, stund. öfverallt tätt långh. (= v. *crinigerum* Fr.). Innefattar flere ännu otillräckligt undersökta former. — *H. Schmidtii* Tausch.

b — *foliosa*: stj. flerblad. med få, vissnande rotbl.

\* Stjbl. smalt lancettl., under stjernhåriga.

- 26 *H. canescens* Schleich.? stj. nedtill långh., upptill stjernl., klynneblad o. v. grenig, fåblomstr., 2—5blad.; rotbl. få kortsk., de yttre tungl.-lancettl., de inre lancettl., alla nedlöp. o. småtand.; stjbl. utdraget lancettl., snedt långspets., v. oskaft., mot basen ofta flikand. m. utstående tänder, und. o. i kant. glest finh. o. tätt stjernl.; blksk. utdragna, trådsmla, stjernludna o. omärkl. glh., i spetsen 1—2fjälliga; blk. gråludna o. glest glh.; fj. mörkgröna, lancettl., jemnbreda, jemnt utdragna till en smal, n. trubh. hårtofsad spets; krbr. glatt. 24 6, 7. H.Sc.exs.28. — *β nudulum* Lindeb. spadare m. småtand. bl. o. glattare blk. H.Sc.exs.29.

Bergstr. r. (*α Små.* Grenna-åsen. Hall. vid »Insjöarne» i Lindome. — *β Hall.* Boh. o. angrens. del af VG.) Stj. 2—4 *qv.*, spenslig men styf, slät, enkel o. i toppen klynnebladell. från basen förgrenad i långa, vidjelika, bladiga, 2—4 blomstr. gr. — Bl. intensivt grå- ell. blågröna, styfva, läderart., v. kölade, stjbl. hos *α* 4—6 tum långa, mycket smala, ofta mot basen djupt bugtand. — Blk. v. mindre än hos följ., med tvär bas. Magrare former enkla 2—3blomstr. *Afviker* från den Syd-Europeiska formen (*H.Eur.exs.97*) genom större glatthet o. mindre tand. bl.

- 27 *H. saxifragum* Fr. stj. hår., uppåt tillika stjernh. o. gh., qvastlikt förgr., fåblomstr., 3—5blad.; bl. som föreg.; blksk. utdragna, stjernl. o. gh., uppåt fåfjälliga; blk. glest hvith. o. gh., föga stjernh.; fj. mörkgröna, lancettl., långt utdragna till en smal, n. trubbl., hårtofs. spets, de innersta v. sylspets.; krbr. stund. i toppen småh. 24 6, 7. H.N.f.12, n:o 17. H.Eur.exs.80, c. (80 o. 80 b. tillhöra en annan art.) H.Sc.exs.30, 31.

Bergstr. (*Blek.*—VB. särd. i de mellersta o. östra prov. Boh. Oroust, Koster, Strömstad m. fl. st. — N. till Finnmark. t. ex. Christiania, Kragerø, Grimstad, Romsdalen etc.) Stj. 2—3 *qv.*, *spenslig*, mot basen långh., enkel ell. från bas. gr. i långa vidjelika, utspärr., bladiga v. blomstr. grenar; blk. breda m. tvär bas. Oftast förvexlad m. föreg., från hvilken den skiljes genom hårig, nedåt sträf stj., tunnare o. mer hår. bl., något större o. bredare blk. m. mörkare, bredare o. teml. tvärt afsmalnande, föga stjernh. men mer gh. fj., samt tydl. gh. blksk. — Förveklas äfven ofta med smälblad. former af andra närstående arter ss. *H. pallidum*, *H. onosmoides* och *H. norvegicum*. Var. i afs. på storlek, förgrening o. beklädnad. Fj. stund. tydl. stjernh.

\*\* Stjbl. bredt ell. äggr. lancettl., under nakna.

- 28 *H. argenteum* Fr. stj. nedtill fåblad., styf o. n. glatt, m. blk. i grenig vippa på långa skaft; rotbl. skaft., stjbl. n. oskaft., lancettl. spets., på midten tand., blott hårbrädd.; blk. nakna m. glesa h. o. gl.; fj. breda, n. trubbl.; krbr. glatt. 24 7.

Fjelltr. r. (Uppgifves för Lul. Lpm. o. Finnmark. men utan speciellt växtställe.) Stj. 1—2 *fol* hög, vanl. m. få förkrympta bl., m. korgfoder n. ss. hos *H. gothicum*. Allt enl. Fries, osedd af Förf.

- 29 *H. Oreades* Fr. stj. långh. uppåt tillika stjernl., v. från midten vipplikt förgr., mångblomstr., 2—5blad.; rotbl. få, kort vingskaft., de yttre ellipt., trubbl. helbrädd., de inre äggr. ovala spets., småtand.; stjbl. bredt lancettl. spets. v. till midten glest groftand., de öfre oskaft., de nedre kortskaft., alla tunna, mjuka, und. o. i kant. långh. utan stjernludd; blksk. korta, hvitl. o. glest gh., upptill fåfjäll.; blk. tät hvith. o. fint gh., föga stjernl.; fj. mörkgröna breda, lancettl., utdragna till en något trubbl. hårtofsad spets; krbr. åtm. hos diskblorna m. korth. tänder. 24 6, 7. H.N.f.12, n:o 16. H.Eur.exs.81. H.Sc.exs.33.

Bergstr. r. (Östra Smål. ÖG. Söderköping. Uppl. Mälaretrakten t. ex. Stäket, Gottsundaberg etc. Boh. isynn. norra del. t. ex. Kosteröarne; Hogdal: A. W. Bolander; Näsinga sn. Båkungerbö vid Idefjorden, Öddö, Domsö. — N. Grimstad, Romsdalen  $\frac{1}{2}$  mil norr om Ormein.) Stj. 2—3 *qv.*, *grof* men *mjuk*, *säll*, *enkel*, *stund. ända från basen gr. i långa*, *bladiga*, 2—5blomstr. grenar m. stora, vida blk. Fj. liksom hos *H. saxifragum* v. nakna, de yttre blott i kanten o. de inre i spetsen stjernl. Rotbl. stora o. breda m. nedlöp. bas. Gl. hos denna o. följ. fina, n. omärkl., rödgula. Stund. lågväxt, fåblad. o. stängelf., smartlik (o. ofta förvexlad med) *H. pall. crinitig.*

- 30 *H. onosmoides* Fr. stj. långh. o. stjernl., i toppen qvastlikt förgr. ell. från midten vippgr., v. mångblomstr. o. mångblad.; bl. styfva, föröfr. s. föreg.; blksk. s. föreg. med 3—5 utböjda fjäll.; blk. tät hvith., fint gh. o. stjernl.; fj. s. föreg. men smälare o. mer stjernh.; krbr. s. föreg. 24 7, 8. H.N.f.13, n:o 20. H.Sc.exs.32.

Bergstr. r. (Boh. Uddevalla, Koster, Strömstad, Hogdal etc. — N. uester kusten t. ex. Christiania, Tönsberg, Kragerø; säll. in i landet t. ex. Gudbrandsdal. n. Rommen-gaard, aldrig i fjellen.) 2—3 *qv.* hög, *grof* o. *styf*, *särdeles vid basen*, *bladsk. o. bladens fästpunkter tätth.*; bl. und. *intensivt grå-ell. blågröna*, *fasta*, *vid midten v. groftandade*; blk. *aflånga m. smal bas o. blekkant.* fj.

C) *Vulgata* Fr.: Yttre fj. korta fåradiga; stjbasen o. rotblskaft. mjukhår.; bl. v. tunna o. mjuka (utom hos *H. bifid.*), und. v. blekgröna, ofvan rent gröna; kronbrämets tänder glatta; stiften v. från början rostbruna.

a — *Scapigera*: stj. stängelf., 0—2blad. m. vid blomningen quarsittande rotbl.

\* De flesta fjällen trubbiga.

- 31 *H. murorum* L. stj. nedtill mjukh. upptill stjernl., enkel ell. fr. öfre bladveck. gren., 0—2blad.; rotbl. smalskaft., de yttre små rundadt njurlika, de inre ellipt. äggr. trubbl.,

vanl. m. afrundad, två ell. hjertl. bas, mot basen m. ell. m. groftand., m. oftast utstående ell. nedåtvända tänd., stibl. v. 1 vid mitten af stj., skaft., äggr. spets., alla bladen tunna, mjuka, nakna, und. o. i kant. krush. m. långh. sk.; blist. fåblomstr., qvast- ell. säll. flocklik, m. v. 1blomstr. utspärr. o. båglik inböjda, hvitl. o. gih. sk.; blk. utdraget cylindr. m. smal bas o. färadiga, knappt tegellagda fj.; fj. smala n. jemnbreda, utdragna till en något trub. hårtofsad spets, de flesta jemnhöga i n. enkel krans, v. svartgröna o. nakna m. långskaft. mörka gl.; frj. hvitt. 24 6, 7. H.N.f.2, n:o 7. H.Eur.exs.85. — Var. *α silvaticum* L. blsk. o. fj. mycket gih., de senare åtm. på ryggen nakna; blist. v. qvastlik; bl. stora tunna m. två ell. intryckt bas. — *β umbelliferum*: blsk. o. fj. som föreg.; blist. n. flocklik; bl. n. afsmaln. mot basen. — *γ medium* (Jord.) blsk., fj. o. blist. som *α*; de inre rotbl. afsmaln. mot basen, v. fliktand. m. uppåtvända tänd. som stund. nedlöpa på det korta skaftet. — *δ sagittatum*: blsk. o. fj. föga gih., hvitl., de inre rotbl. utdragna n. spets., v. djupt groftand. mot den intryckta, n. spjutlika basen. — *ε nemorense* (Jord.): blsk. utdragna räta, tillika m. fj. tät stjernh. o. glest gih.; bl. små ellipt. långsk., mot den afsmaln. basen hvasstand. m. v. uppåt rigtade tänder.

Skogsäng etc. a. (*Sk.—Lpm.* — N. till Finnm. — *β* Fjelltr. *Herjed.*: Almqvist o. Hulting. — N. Dovre, Finnm.: Norman. — *γ Smål. ÖG.* — N. Nordl. o. Finnm.: Norman. — *δ Smål. Boh.* — N. Nordmarken, Tonsaasen. — *ε Smål.* i Vetterbergen.) *Stj. 3—4* qv. hög, mjuk, oftast enkel o. 1blad. *Utmärkt genom utspärr., vanl. båglik inböjda blsk., smala svartgröna o. gih. blk., samt stora tunna, lifligt gröna, långskaft. blad. Var. mycket i afs. på bladens form o. inskärn.; dn helbrädd. (var. integrifolium), dn paradelade med fristående flskar (var. dissectum). Stift stundom gula. Stibl. sällan glest stjernh.; rotbl. stund. rödfäckiga.*

\*32 *H. glauclum* Lindeb. stj. glatt, uppåt stjernh., enkel ell. från mitten gren., 1—3blad.; rotbl. få, afl. lancettl. spets., nedåt afsmaln. o. nedlöp. på det vanl. utdragna n. vingkant. skaftet, grundt naggtandade; stibl. bredt-jemnbr. lancettl., mot basen småtandade, det nedre kortskaft., alla n. läderart. o. n. glatta, ofvan blekgröna, und. intensivt grågröna; blist. fåblomstr. utspärr. qvastl., m. utdragna smala, n. inböjda, upptill stjernl. o. glest gih. blsk.; blk. äggr. cylindr.; fj. jemnbr. lancettl. utdragna till en n. trub. hårtofsad spets, svartgröna, tät stjernh. m. glesa mörka gl. o. få, svartfotade hår; fruktstj. hvitt. 24 7, 8.

Fjelltr. r. (N. Opdal på Säterängarne under Bratskarfven o. Thronsfjeldet, t. ex. Bakkesætern, Dörrumssætern, Stensem. Sogndal mell. Stören o. Insæt. Dovre vid Drivstuen.) *Utmärkt genom spad, glatt 1½—3* qv. hög, vanl. enkel o. fåblomstr. stj. med stora tunna, men styfva o. nakna blad o. små smala svartgråa blk. m. utdragna kantblommor.

33 *H. casium* Fr. stj. glest mjukh. ell. glatt, uppåt stjernl., v. enkel 0—2blad.; rotbl. kortskaft., de yttre små ellipt., de inre äggr. ovala spets., mot basen afsmaln. o. groftand. m. spets. uppåt rigtade tänder, v. nedlöp. på det vingade skaftet, stibl. äggr. lancettl., v. oskaft., alla bl. n. läderart. o. styfva, und. o. i kant. glesh. o. v. stjernh. m. långh. sk.; blist. v. fåblomstr. i n. enkel qvast m. utstående räta grenar o. blsk., de senare stjernl. glesh. o. föga gih.; blk. bredt afl. m. vidgad två bas o. flerradiga fj.; fj. v. bredt lancettl. m. föga utdragen n. trub. hårtofsad spets, mörkgröna, stjernl. m. glesa hår o. få gl.; fruktstj. ljust brungult. 24 6, 7. H.N.f.12, n:o 19, 20 (var. nemorum Fr.). H.Eur.exs.86, 86. b.

Äng. back. a. (*Sk.—Lpl.* — N. till Finnm. Stiger i fjelldal. till 2000'.) *Lätt skiljd från H. murorum genom fastare, grå- ell. blågröna bl. samt vida blk. m. flerradiga fj. Förveklas äfven med H. bifidum, från hvilken den skiljes genom högre, icke klynnegr. stj. o. trub. fj. Var. på skuggr. st. med grönare, tunnare o. djupflik. bl. (var. nemorum Fr.), på berg o. i fjelldalar m. svartgih. blk. o. blsk. (var. nigroglandulosum). Var. förförigt m. långsk. nakna bl., små blk., hvitt fruktstj.*

34 *H. fasciculare* Fr. stj. småluden o. stjernl., v. från midten utspärr. gren., 1—3blad.; rotbl. jemnbr. tungt-lancettl. groftand. ell. n. helbrädd., ofvan v. glatta hvitpunkt., und. småh. o. stibl. små lancettl., und. hår. o. stjernl.; blomk. i utspärr. v. vipplikt sammansatt qvast m. hvitl., glest gih., styfva skaft; blk. bredt afl. m. n. två bas; fj. bredt lancettl. trubh., ljusgröna, tät stjernluden, glest enkelh. o. föga gih.; fruktstj. ljusgult. 24 7. H.N.f.12, n:o 18 (»H. ramosum var.»). H.Sc.exc.38.

Berg r. (*Boh.* vid Uddevalla, Krokstad. — *N. Christiania* o. *Abbidiengen.*) *Vanl. lågväxt o. stängelformig m. talrika rotbl. o. få stjbl., stund. mer utdragen o. stjelfk. m. ört såsom H. anfractum och blomk. såsom H. cæsium.*

\*\* De flesta fj. sylspetsade.

- 35 *H. subcæsium* (*Fr.*) skiljd från *H. cæsium* genom kortare o. spädare stj., mindre, smalare o. styfvare bl., som mot den rundade, tvåra ell. hjertl. basen v. åro groftand. m. rätt utstående tänder o. icke nedlöpande på det smala skaftet, mindre blk., smalare syliskt utdragna fj. m. v. glatta spetsar; stift v. i början gula, vissnande rostbruna. 24 7, 8. *H.N.f.13, n:o 21* (ej normal!).

Bergstr. (*Smål. Hall. Boh.* — *N. h. o. d. i fjelldal. till 2000' t. ex. Lessjeskougen* vid Mölmen, Opdal vid Rise, Sundalen vid Gravaune.) *Låglandsformen, som liknar en medelform mellan H. murorum o. cæsium, har vanligen större o. tunnare bl., likn. dem hos H. murorum o. ofta håriga fjällspetsar. — Fjellformen står närmare H. bifidum, fr. hvilken den skiljes genom lägre o. spädare växt, mindre o. smalare blk. samt mindre bl. med tvär, ej nedlöp. bas.*

- 36 *H. bifidum* *Kit.* stj. nedåt mjukh., uppåt stjernl., klynnegr.. 1—2blad.; de yttre rotbl. små, rundade, snart vissn., de inre o. stjbl. äggr-lancettl. spets., skaft., alla styva läderart., mot den nedlöp. basen glest bugtand. m. v. n. vinkelrätt utstående tänder, und. stjernh. o. småh.; blstst. fåblomstr. i n. sammansatt klynnegr. qvast m. hvitl. n. glandellösa sk.; blk. stora, bredt afl. m. tvär bas; fj. lancettl. utdraget sylspets. m. ofast mörk o. glatt spets, v. svartgröna o. n. enfärgade, krush. m. glesa stjernh. o. gl.; stift gula ell. slutl. n. rostbruna. 24 7. — *β plumbeum* (*Fr.*): m. glattare fj., blygråa bl. o. från början mörka stift. *α H.Scand.exs.34. H. pallidum* *Fr. H.N.f.13, n:o 17 a. — β H.N.f.12, n:o 21. H.Eur.exs.90.*

Bergstr. r. (*Blek. Bustorp nära Ronneby: A. P. Winslow. Smål. Pustanäs i Malm-bäck, Vettersbergen. ÖG. Hästholmen, Omberg. — N. Christiania, Tönsberg, Molde, Lhadehammeren vid Trondhjem, Opdal mellan Rise och Aune 1500'.*) *Stj. 14—3 qv. hög, v. i toppen upprepadt klynnegr. med 1—2 utdragna grenar fr. bladvecken; bl. pergamentslika, und. blågröna o. tätt stjernh., ofvan gulgröna o. ofta purpurfläckiga, stund. bligrå, m. ell. m. fliktandade. — β öfvergå utan gräns i hufvudformen, med hvilken den växer på Ormöen vid Christiania.*

b — *foliosa*: stj. v. flerbladig m. få, vissnande rotbl.

- 37 *H. diaphanum* *Fr.* stj. glesh. upptill stjernl. o. ghl., enkel, 2—5blad.; rotbl. få, snart vissn., de inre äggr-ovala kortsk., stjbl. bredt lancettl. spets., de öfre oskaft., de nedre kortsk., alla tunna, grå- ell. blågröna, glestand., nakna, de nedre på båda sid. glesh.; blstst. flerblostr., utspärr., n. sammansatt qvast m. utdragna, stjernh. o. tätt ghl. sk.; blk. stora afl. m. bred bas; fj. flerrad. tegellagda, bredt lancettl. trubbb., svartgröna, enfärgade, v. nakna, m. talrika mörka gl.; frfj. ljust brungult; stift gula, slutl. mörkande. 24 7. — *β stenolepis Lindeb.* m. fåblomstr. enkel qvast o. smalare, mindre regelb. tegellagda fj. *α H.N.f.2, n:o 19. H.Scand.exs.35. — β H.Sc.exs.36.*

Bergstr. r. (*Smål. Femsjö. — N. Molde. — β N. vestkusten från Aalesund till Trondhjem.*) *Utmärkt genom stora svartgröna bredfj. o. ghl. blk., samt tunna, hårbrädd. blad.*

- 38 *H. vulgatum* *Fr.* stj. glatt ell. glesh., stjernl., m. ell. m. grenig, 3—flerblad.; rotbl. få, de yttre ellipt.-afl. trubbb., de inre ovala-lancettl. spets. småtand., nedlöp. på det korta bladsk., stjbl. äggr-ovala-lancettl., m. ell. m. tandade, de öfre oskaft., de nedre kortsk., alla bl. und. grå- ell. blågröna, glest korth. o. v. nakna, ofvan blekgröna o. v. glatta; blstst. v. mångblomstr., sammansatt o. vipplik, stund. enkel, fåblomstr. o. qvastlik, öppen m. upprätta grenar samt smala, hvitl. o. ghl. blksk.; blk. små, cylindr. m. äggr. bas; fj. smala n. jemnbreda, utdragna till en smal n. trubbb. spets, mörkgröna, mörkt ghl. o. enkelb. samt v. glest stjernh.; frfj. v. hvitt. 24 6, 7. *Var. α typicum* *Fr.* stj. slät, söga hårig, flerblad.; bl. smala, söga tand., nakna; blk. små m. ghl., n. nakna fj. — *β irriguum* *Fr.* skiljd från föreg. genom svartgröna, mycket ghl. fj. o. mer utspärrad qvast. — *γ latifolium* *Fr.* stj. sträf nedåt långh., fåblad.; bl. breda, ofta på båda sid. hår. o. und. stjernh.; v. groftand.; blk. större o. vidare m. täta stjernh. o. få gl. *α H.N.f.13, n:o 22. — β H.Sc.exs.37. — γ H.Eur.exs.96* (odlad).

Skog. äng. back. a. (*Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. Stiger i fjelldal. till 2500'. — β Boh. Kynnefjell. — N. Nordmarken, Valders.*) *Var. i hög grad från enkel,*



quartershög till månggrenig, halfannan åtn hög, — fåblad. ell. glest flerblad., med normalt tunna o. småtånd. ell. tjocka o. grofstånd. bl.; blk. normalt små, smala, mörka, variera större, vidare o. gråudna. — Innefattar flera, ännu otillräckligt granskade former, genom hvilka den närmar sig än *H. mur.* o. *cæsius*, än *Hieracia tridentata*.

- 39 *H. anfractum* Fr. skiljes från föreg. genom v. grenig o. flerböjd stj. m. utdragna lancettl.-jemnbr.-lancettl., groft bugtånd. bl., enklare o. fåblomstr. qvast m. styfvere, endast upptill n. fjälliga skaft o. mörkare frfj. 2 7, 8. Fig. H.N.f.16, n:o 10. *H. Eur.* exs. 98 (odlade).

Bergstr. r. (*Smål. vestra* o. *norra delen t. ex. Femsjö, Unnaryd, Malmbäck* vid Pustanäs, mellan Bellö o. Kråkhult. — *N. uppgifves utbredd ända till Ost-Finnm.*, men aldrig anträffad af Förf.) *Stj. än enkel, än grenig från basen. Bl. 3—5, långt utdragna o. tunna. Fj. v. bredare o. mer stjernh. än hos föreg. — Föga skiljd!*

+++ *Accipitrina*: Stjelken bladig, utan bladrossetter; rotbl. vid blomningen v. bortvisnade; holkfjällen än fåradiga (hos *Prenanthisidea*), än flerradiga m. ell. m. regelb. tegellagda (hos de öfriga); skalfrukter o. fruktsjun som föreg. afd.

A) *Tridentata* Fr.: stj. fler—mångbladig, med olikformiga fånerviga ej omfattande blad, ett ell. annat rotbl. vid blomningen stund. fortvarande; fj. flerradiga, de inre smalare. v. m. smal utdragen topp; krbr. glatt; skalfrukter svartbruna.

a — några af de inre fjällen sylspetsade:

\* Stiften gula; frfj. brungult.

- 40 *H. norvegicum* Fr. stj. mångblad. v. enkel m. fåblomstr. föga sammansatt bladlös qvast; bl. ovala-lancettl. spets. glest groft., alla oskaft. l. de nedre afsmaln. till korta skaft, under glest stråfh.; blksk. smala hvitl. glest enkelh. o. glh. m. 2—4 utst. fj. mot toppen; blk. medelstora aflånga m. tvårl. vidgad bas o. månggradiga fj.; fj. svartgröna enkelh. o. glest glh., de yttre enfärgade i kanten stjernh., mellanfj. blek-kantade nakna utdragna till en trub. hårtotsad spets. 2 7. H.N.f.13, n:o 25 (var.). — *β rufescens* Fr.: till alla delar glattare än hufvudformen m. större blk. o. bredare fj. samt utdraget lancettl. småtåndade bl. H.N.f.13, n:o 24.

Bergstr. r. (*N. ö. kusten fr. Christiania t. Christiansand. Föröfrigt m. sällsynt: endast i öfre Sundalen o. nedre Opdalen mell. Sliper o. Grauaune har Förf. träffat former, som med säkerhet höra hit. — Boh. Koön i Gunnarsdalen, Oroust vid Svanesund o. i Morlandadalen, Lysekil. — β Stockholm. Hall. vid Björkeris.*) *Stj. 3—5 qv. hög, sällan grenig, nedtill o. vid bladfästena m. l. m. stråfh., v. bladig till basen; bl. bredt ovala-smalt lancettl., v. styfva, åt båda ändar tillspetsade m. få grofva utst. tänder, und. grågröna; fj. (på press. exempl.) svartgröna m. bleka kanter, de yttre något utstående. β m. afvikande o. habituellt lik H. Friesii. Hör knappt hit, men ännu mindre till H. saxifr. — I Epicr. kallas fj. hos hufvudf. bleka, men i Symb. mörkgröna, ss. de ock dö på Prof. Fries' original-exempl., efter hvilka ofvanst. beskrifning är lagen.*

- 41 *H. macranthum* Lіндеb.: skiljes fr. föreg. (med hvilken den hittills varit förväxlad) gm tätbladig, nedåt ullh. stj., bl. tjocka v. styfva o. und. blågröna knappt hårbrådade m. grofva n. vinkelrätt utst. tänder, n. dubbelt större blk. m. blekare mer glh. o. längre utdragna fj. 2 7, 8.

Bergstr. r. (*Hall. norra delen. Boh. h. o. d. t. ex. Göteborg, Kungälv o. Marstrand, Hisingen, Koön o. Kosteröarna.*) *Stj. 1—5 qv. hög robust, nedåt intensivt rödblå, v. enkel m. fåblomstr. enkel bladlös qvast, de nedre bladen n. skaftade m. långh. skaft. Har n. de största blomkorgarna bland de skand. arterna.*

\*\* Stiften rostbruna; frfj. hvitt.

- 42 *H. lapponicum* Fr.: stj. fåbladig enkel m. fåblomstr. v. enkel qvast; bl. smalt-jemnbr. lancettl. m. få breda utst. tänder, oskaft. l. de nedre utdragna t. korta skaft; blksk. gråudna o. glest enkelh. n. fjällösa; blk. medelstora bredt afl. m. äggr. vidgad bas o. fåradiga fj.; fj. mörkgröna enfärgade, glest stjernh. o. enkelh. m. få gl., de yttre till-

tryckta trubbs. 24 7—9. H.N.f.16, n:o 9 (»H. goth. v. pseudolap.» Fr.), en form m. glattare mer utdragna fj.

Fjelltr. r. (Lpl. — N. Nordl. o. Finnm.) Stj. 1—3 qv. hög spenslig 4—6bladig m. tunna, under blågröna o. småh. bl. Blomqvasten gles klaslik m. de nedre utdragna skafsten v. fr. bladvecken. Ofta förvezlade m. magrare former af H. Friesii, hvarföre dess utbredning är osäker.

b — de inre fj. m. smal jemnbred m. l. m. trubbs. spets:

43 H. *rigidum* Hn: stj. flerbladig, enkel m. n. enkel bladlös qvast l. mot toppen grenad i qvastlik vipa; bl. glest groft., de öfre eggr. lancettl. långspets. oskaftade, de nedre ovals lancettl.—smalt lancettl. spetsiga, afsmalnande till ett m. l. m. utdraget skaft: blksk. smala n. jemntjocka, hvitl. enkelh. o. v. glh. m. 1—3 smala v. utstående fj.; blk. knappt medelstora cylindr. m. tvär slutl. vidgad bas oregelb. tegellagda fj.; fj. smala mörkgröna, alla enfärgade l. de inre blekare o. blekkantade, enkelh. o. glh., nakna l. föga stjernh., mellanfj. smalt lancettl. utdragna till en n. jemnbred trubbs. spets, de inre jemnbr. utdragna till en smal men n. trubbs. spets; stift alltid rostbruna l. i början gula; frfj. ljust brungult. 24 7. — *α genuinum*: stj. v. sträf, ofta grenig m. qvastl. vipa, styfva groftand. bl., mörkgröna enfärgade fj. — H. *rigid.* Fr. H.N.f.5, n:o 1. — *β tenuius* Hn: stj. v. slät o. enkel m. fäblomstr. qvast, v. tunna o. längre skaftade bl., blekgröna o. ljuskantade fj. — H. *rigid.* Fr. H.N.f.3, n:o 4. H. *tridentat.* Fr. H.N.f.12, n:o 14.

Back. o. lund. a. (Sk.—Lpl. — N. Stiger i fjeldalarna till 2000') Stj. 5—6 qv. hög. Var. i hög grad: nedåt mjukh. ell. sträfh., bl. bredt äggr-smalt lancettl. groftand ell. småt., på undre ell. båda sid. glesh., de nedre n. oskaft. ell. m. 1—2 tum långa skaft, fj. enfärgade ell. bredt ljuskantade, mycket håriga o. glh. ell. n. glatta, med utstående ell. tilltryckta spetsar. — H. *rigidum* Hn. enl. original-exempl. i hans herb. o. tårika ex. fr. af honom angifna växställen vid Stockholm, meddelade af Thed. och G. v. Cederv. — H. *vulg.* v. *tridentat.* Fr. Nov. 1 1819 (H. *rigid.* *β* Hn?). — Förenas i Nov. Ed. 2 1828 med H. Friesii Hn. — H. *rigid.* Fr. Mant. 2 1839 (H. *rigid.* *α* et *β* Hn). H. *tridentat.* Fr. Symb. et S. V. Sc. (H. *rigid.* *β* Hn). H. *rigid.* Fr. Symb. (omfattar både H. *rigid.* *α* Hn och H. Friesii H. pr. p.). H. *rigid.* Fr. S. V. Sc. (H. *rigid.* *α* Hn). H. *trident.* Fr. Epicr. (H. *rigid.* *α* et *β* Hn).

44 H. Friesii Hn. stj. s. föreg., mångbladig; bl. s. föreg. men alla oskaft. l. de nedre af smaln. t. korta skaft; blksk. hvitl. glest enkelh. v. glandellösa, tjocka uppåt vidgade med 1—3 v. tilltryckta fj.; blk. stora bredt cylindriska m. slutl. vidgad bas o. mång-radiga m. l. m. regelb. tegellagda fj.; fj. breda alla enfärg. o. trubbs. n. glatta l. enkelh. o. glh., säll. glest stjernh.; stift s. föreg.; frfj. något mörkare. 24 7, 8. — *α genuinum*: stj. v. slät o. n. glatt tätbladig, bl. n. glatta, de öfre med äggr. stund. något hjertl. bas, blksk. glandellösa, fj. v. n. glatta, glest stjernh. H. Friesii Hn. herb. H. *boreale* \* Friesii Fr. H.N.f.9, n:o 2. H. *rigid.* Fr. H.N.f.12, n:o 13 (det ena exempl.). — *β hirsutum* Hn: stj. sträf, särdeles nedåt tåth., glesbladig med bl. åtm. på undre sid. långh., fj. enkelh. o. glandelh. H. *boreale* v. *pumil.* Fr. H.N.f.2, n:o 14. »H. longifol. Læst.» Fr. H.N.f.12, n:o 15 (odlad).

Bergstr. (Smål.—Lpl. *α* Smål. Femsjö, Lidhult: Fr. Hall. Torpa: Fr. Boh. flerst., t. ex. Hisingen, Jonsered: Dr Winslow; Uddev. VG. C. Elgenstj. ÖG. Ner. Askers., Tiveden. Verml. Carlskoga: C. Reuterma. — N. s. delen t. ex. Krokklaven: Bl. — *β* Smål. Femsjö: Fr., Malmbäck. Boh. VG. »inter Wiken et Sjöstorp Hn herb». ÖG. Motala. Verml. Carlskoga: C. Reuterma. Stockholm: G. v. Cederv. Geste: Hn. Torn. Lpm. Karesuando: L. Læst. — N. Drivdalen.) Stj. 4—5 qv. hög, robust mångbladig, nedåt m. l. m. sträf o. hårig, med styfva v. oskaft., und. grågröna bl. Utmärkt med stora o. vida blk. (vanl. vidare än längden) m. breda trubbs. v. föga utdragna fj., hvarigenom den hufvudsakl. skiljes fr. H. *rigid.* *β* torde rättast böra afskiljas såsom egen art. — *α* H. *boreale* Fr. Nov. Ed. 1 et 2 (omf. öfven H. *rigid.* Hn). H. *boreale* et *lævigat.* Fr. Mant. 2. H. *gothicum* et *rigid.* pr. p. Fr. Symb. H. Friesii et *gothic.* Fr. S. V. Sc. H. *gothic.* et *rigid.* Fr. Epicr. Obs. H. Friesii *α* omfattar 2:ne former: den ena v. stor robust o. grenig med stora breda blkorgar o. breda korta fjäll, — den andra spåhare o. enklare med mindre blk. o. smälare, mer utdragna fj. Båda sammanlöpa dock genom

medelformer utan gräns. Den förra är Prof. Fries' senaste *H. rigidum* i *Epicr.*, den senare är hans *H. boreale olim*, numera *H. gothicum*.

- \*45 *H. truncatum* Lfndeb. stj. enkel m. enkel fåblomstr. qvast ell. stund. grenad fr. midten i flerblomstr. vippa, flerbladig; bl. som föreg., men glattare o. skarpt smätandade; blkskaften enkla hvitl. glandel-lösa, i toppen 1—3fjälliga, de nedre utdragna o. bågliket inböjda; blmkorg. som föreg.; fj. s. föreg. men mer stjernh. o. häriga ända till spetsen, alla trubbig; stift o. frfj. s. föreg. 247, 8. H.Scand.exs.45.

Fjelltr. r. (*N. Lessjeskougen, Romsdalen, Isfjordsdalen, Opdalen fr. 2500'* t. n. hafsytan.) Stj. 3—5 qv. hög, v. slät o. glatt, enkel ell. m. utdragna 1—3blmstr. grenar i öfre blvecken; bl. 5—9 v. korta o. breda, äggr.-bredd lancettl., säll. utdragna o. smalt lancettl., ofvan gulgröna, under grågröna stjernl. o. småh., de mellersta stund. n. omfattande, de nedre v. quarsitt. oskaft. ell. bredt kortskaft; blmkorg. vidare än längden, åt båda ändar tvärhuggna; fj. stund. glandel-lösa, stult. n. utstående.

B) *Prenanthoidea*: stj. få- ell. mångbl. m. olikform. bl.; stjkelbl. m. l. m. omfattande, rotbl. v. skaftade stund. fortvarande vid blomningen; fj. särådiga, de innersta smalare o. spetsiga, ell. bredare o. trubbig; krbrämets tänder, åtminstone diskblirnas, under småhåriga; skalfr. röd- ell. ljusbruna, ell. svartbruna (hos 49 o. 52).

a — *alpestris*: bl. glesnerviga, rotbl. vid blomningen ofta quarsittande; inre holkfj. spetsiga.

- 46 *H. dovense* Fr. stj. enkel m. fåblomstr. qvast, fåbladig; de öfre bl. äggr.—lancettl. v. glesst groftand. stjkelkomfattande, de nedre bredt lancettl. ell. aflånga, skaftade; blomkorg. medelstora aflånga m. två bas; fj. bredt lancettl., enkelh. gih. o. i kanten stjernh., de yttre mörkgröna enfärgade trubbig, mellanfj. blekkantade trubbig, några få inre smalare o. spets; blkskaft v. korta styfva hvitl. enkelh. o. gih.; skalfr. rödbruna; frfj. hvitt. 247, 8. H.N.f.11, n:o 12 (det ena exempl., det andra tillhör *H. sparsifol.*) H.Europ.exs.107. H.Scand.exs.39.

Fjelltr. r. (*Jemli. Herjed.: Almqv. och Hulting. — N. fr. Christianstrakten t. Ost-Finm. Från björkgränsen t. hafsytan.*) Stj. 3—4 qv. hög, sträf o. v. korth., säll. grenad i öfre bladvecken, 3—7bladig; bl. v. styfva, ofvan ljusgröna o. hvitprickiga samt ofta rödfäckiga, v. glatta, under blekt blågröna o. glesh., de nedre med m. l. m. utdragna vingkantade o. sidlikt omf. skaft, rotbl. stund. quarsitt. ellipt. trubbig. blågröna; fjällens glandler med rödgula knappar, blkskaftens mörka. Skuggformen har flerblomstrig sammansatt qvast o. stora tunna groftandade bl.

- \*47 *H. protractum* Fr. närbesläktad med föreg., men väl skiljd genom följ.: stj. v. grenad i utspärrad vippa; bl. tunna fint naggtandade, föga omf., under intensivt grågröna; blk. mindre med äggr. bas o. horisont. utböjda kantblir; fj. blekare stjernl. o. hårtofsade; korgskaften smala utdragna. 247, 8. — *α luteum*: gulblommig. H.Scand.exs.40. — *β ochroleucum*: m. hvitgula blir; blommor på samma lokaler senare än *α*. *H. dovr.* \* protr. Fr. H.N.f.15, n:o 9. *H. protractum* Fr. H.Europ.exs.130. H.Scand.exs.41.

Bergstr. r. (*N. mellersta vestkusten fr. Söndmör t. Trondhj.*) Stj. 3—5 qv. hög, spenslig o. böjd, stund. enkel o. fåblomstrig, men vanl. vippgrenad m. bågliket utböjda grenar (särdeles hos *β*), tillika med grenar o. blksk. kladd med lata mjuka horisont. hår, 5—7bladig m. n. helbräddade ofta rödfäckiga bl. Stiften variera rostbruna och rödgula.

- \*48 *H. filiforme* Lfndeb. stj. v. grenig fler—mångbladig; bl. v. bredt lancettl. spets. gles-tandade, alla oskaft. ell. de nedre utdragna t. korta omf. skaft; blomställn. i öppen sammansatt qvast ell. vippa m. smala hvitl. glandel-lösa smalfjälliga skaft; blmkorgar små smalt cylindriska m. äggr. bas. utblom. äggr. koniska; fj. svartgröna, de inre m. blekare kanter, stjernl. m. glesa enkla hår o. glandler, de yttre smala spetsiga, mellanfj. bredt lancettl. n. trubbig, de inre smalare o. sylspetsade; stift svartbruna; skalfr. stult. rödbruna; frfj. n. hvitt. 247, 8.

Bergstr. r. (*N. kring Moldeviken o. tillstötande dalar. Säger i Romsdalen till 2000'*.) Stj. 1—4 qv. hög, spenslig, stund. enkel, men v. grenad ofta ända fr. basen, med smala bladiga flerblomstr. grenar; bl. utdragna tunna stjernh., ofvan lif. gröna,

under blågröna o. småh. Rotbl. o. de nedre stjbl. vid blomningen v. vissnade. Var. med styfva rödfäckiga o. groft. bl. Utmärkt af de små smala blomkorgarne, de smala grenarne o. trådlika blkskaften. Liknar till örten *H. tridentata*.

b — *genuina*: bl. nätdriga, rotbl. vid blomn. oftast vissnade, inre holkfj. trubh.

- \*49 *H. elatum* Fr. stj. enkel, m. fåblomstr. qvast ell. mångblomstr. vippa m. korta utstående fterblomstr. grenar, mångbladig; bl. äggr.—bredt lancettl., de öfre helt omfatt. m. hjertl. bas o. uppåtvända öronflikar, de nedre afsmaln. till korta vingade omfatt. skaft; blomk. knappt medelstora, yngre smalt cylindr., utblommade bredt koniska, alla med äggr. bas; de yttre fj. mörkgröna enfärgade n. trubh., de öfriga blekare mot kanterna m. bred trubh. spets, alla stjeinh. gih. o. säll. enkelh.; stift mörka; skålf. slutl. svartbruna; frfj. ljusbrunt. 24 8. H.N.f.12, n:o 8 (odlad).

Fjelltr. r. (*N. Mistbjerget* n. Eidsvold, Nordmarken flerstädes, Hugelisetern, öfre Romsdalen.) Stj. 5—8 qv. hög, sträf o. långh., bl. stora tunna båglik utböjda, i kanterna veckade o. v. grofståndade, ofvan glatta, under långh., fj. m. gulröda glandler o. skull. uppsvällda ryggåsar.

- 50 *H. prenanthoides* Vill. stj. o. blmst. s. föreg.; de öfre bl. äggr. lancettl. m. hjertl. halbförfatt. bas, mellanbl. lancettl. v. sammandragna ofvan den vidgade stjelkomfatt. basen, de nedre mer o. mer utdragna t. vingade något omfatt. skaft; blomkorg., fjäll o. stift s. föreg.; skålf. slutl. gulbruna; frfj. hvitt. 24 8, 9. — *β rarifolium*: med små smala blomkorg. o. få (6—7) glesa bl., de öfre bredt lancettl. o. öronflikade, de nedre längskaftade. — *γ parviflorum*: med små blomkorgar o. glesa knappt öronflikade bl. H.N.f.12, n:o 9. H.Scand.exs.43.

Fjelltr. (*Jeml. Herjed. Ängml. Helsl. Gestr. Dal.* — *N. fr. Christianiatrakten* t Ost-Finnm. — *β Herjed. Rösvalen*: J. Hult. — *γ N. Öfra Romsd.* Högsnyta på Dovre. — Stiger på fjellen till björkgränsen, på vestkusten ner till hafvet, t. ex. i Lilldalen, Romsdals amt.) Stj. 3—7 qv. hög, v. slät, korth. o. tätbladig, m. kort qvastlik vippa. Vippgrenarne utstående fterblomstr. m. jemnhöga smala korgar på smala hvitl. o. gih. skaft. Bladen tunna, n. helbräddade ell. småståndade, ofvan gulgröna o. v. glatta, under intensivt grågröna, korth. o. lätt nätdriga. Var. med fåblomstrig enkel qvast, — med glandel-lösa korgar o. skaft, — med glatt stj. o. n. glatta bl. (*H.Scand.exs.44*), — med bredt hjertl.—smalt lancettl. bl.

- \*51 *H. prælongum* Lindeb. stj. enkel m. enkel fåblomstr. qvast ell. mångblomstr. vippa m. utstående bladiga grenar, mångbl.; bl. lancettl. långspets. skarptand., de öfre oskaft., mellanbl. n. omfattande, de nedre utdragna till vingade omfatt. skaft; blkskorgar små, yngre smalt cylindriska, utblommade koniska, alla m. äggr. bas; fj. fåradiga svartgröna n. enfärgade, gih. föga stjernh. o. enkelh., de yttre smala jemnbreda n. spetsiga, de öfriga lancettl. n. trubh.; blkskaften smala utdragna hvitl. o. glest gih., m. vidgad fjällig topp; stift rostbruna; skålf. slutl. ljus rödbruna m. släta åsar; frfj. n. hvitt. 24 8. H.Scand.exs.42.

Fjelltr. r. (*N. Nordmarken*, t. ex. Tönte, Liggern, Kamphaug. 1000'—2000'.) Stj. 3—9 qv. hög, spenslig, v. sträf korth. o. tätbladig; bl. utstående utdraget snedspetsade, under grågröna glesh. o. glest nätdriga, v. tunna o. grofsågade.

- 52 *H. strictum* Fr. stj. enkel m. fåblomstr. v. enkel qvast, mångbl.; de öfre bl. äggr. lancettl. oskaft., mellanbl. lancettl. n. omfatt., de nedre lancettl. kortskaft., alla n. styfva, ofvan lif. gröna o. glatta, under grågröna glesh. o. glest nätnerviga; blkskorgar stora, yngre bredt aflånga, utblommade halft koniska, alla m. två bas; fj. flerradiga svartgröna enfärgade trubh., glesh. gih. o. föga stjernh.; blkskaften v. enkla, styft uppsvällade o. n. räta, hvitl., enkelh. o. glest gih.; stift mörka; skålf. slutl. glänsande svartbruna; frfj. ljus gulgrått. 24 8, 9.

Fjelltr. r. (*Jeml.*—*N. Storli* i Merager; öfre Romsdalen o. Dovre i Drivdalen.) Stj. 3—6 qv. hög, sträf o. korth., tätbladig, med stora blkskorgar, föga längre än bredden. — *Beskrifningen är lagen est. exempl. fr. Drivdalen*, de enda Förf. träsfat, som med visshet kunna föras hit. Ex. i H.N.f.15, n:o 8 är odladt o. afviker gm rikblomstr. sammansatt qvast, ljusbruna frukter o. mer omfatt. blad.

C) *Fokiosa* (Fr.): stj. mångbl. m. n. likformiga, m. l. m. omfattande o. nåtådriga bl., de nedre vid blomningen bortvisnade; fj. månggradiga, de inre bredare, alla trubbiga; krbrämet glatt; stiften mörka.

- 53 *H. sabaudum* L. Spec. stj. enkel m. flerblomstrig bladig qvastlik vippa; bl. äggr. lancettl. tillspetsade, hvasst glestandade, de öfre n. omfattande, de nedre utdragna till korta vingade omfamt. skaft; blkorgar stora, bredt aflånga m. tvär bas; blkskaften stjernl. o. långh. m. få tilltryckta fj. mot toppen; fj. mörkgröna enfärgade, bredt lancettl. trubb., tilltryckta, v. nakna o. glest långh. utan glandler; skalfr. svarbruna; frsj. grågult. 24 8, 9. *H. boreale* Fr. H.N.f.11, n:o 10; f.12, n:o 12 (odlad).

Torra st. r. (N. i parken vid Bogstad n. Christiania. — Uppgifves äfven från Hörsnö på Gotl.) Stj. 3—6 qv. hög, stråf. o. stråfh., särdeles neddt o. vid bladfastena, teml. tätbladig; bl. tunna, ofvan lif. gröna ö. glatta, under grågröna o. glesh. m. stora glesa nätmaskor. — *H. boreale* Fr. Nov. Edd. 1 et 2 samt Mantl. och H.N.f.2 o. 9, afsåg uteslutande *H. gothicum* och *Friesii*. Men i Symb. och H.N.f.11 o. 12 öfverfördes namnet *boreale* på närv. art. hvarigenom en fullkomlig ovissheit om dess betydelse uppstått, i det somliga Förf. (t. ex. Koch, Schur) begagna det i dess ursprungliga, andra åler (*Grenier*, *Reichenb.*) i dess nyare betydelse. För att undanröja denna tvetydighet, torde det vara nödvändigt bortlägga namnet *boreale* (hvilket dessutom är söga lämpligt för en art, som knappt tillhör Norden) och återtaga artens äldre, af de flesta Förf. ännu begagnade, namn. Beskrifningen på *H. sabaudum* i Spec. Pl. passar förförigt, lika väl på denna art, som på *H. sabaud.* Fr.

- 54 *H. corymbosum* Fr. stj. v. mot toppen grenad i en mångblomstrig bladig vippa, tätbladig; bl. lancettl. spetsade hvasst glestandade, n. omfamt., de nedre s. föreg.; blkorgar medelstora afl. m. n. äggr. bas; blkskaften stjernl. o. omärkl. ghl., uppåt vidgade m. utstående fjäll; fj. mörkgr., de inre m. n. blekare kanter, lancettl. småh. o. mot basen n. stjernh., de yttre utstående; skalfr. mörkt rödbruna; frsj. s. föreg. 24 H.N.f.11, n:o 9. *H.Scand.exs.47* (ej normal).

Fjelltr. r. (Lpl. Ängml. Held. — N. fr. Nordmarken till Finnm.) Utmärkt gm styfva upphöjdt nåtådriga, under intensivt blågråa blad, mindre blomkorgar med äggr. bas och utstående fjäll, samt fjälliga blkskaft.

- 55 *H. crocatum* Fr. stj. grenad i få, v. enblomstr. styfva o. raka skaft fr. öfre bladvecken; bl. äggr.—jemnbr. lancettl. spetsiga, glestandade, omfamt., de nedre s. föreg.; blkorgar stora afl. med tvär bas; blkskaften s. föreg., m. få tilltryckta fj.; fj. mörkgröna enfärgade, bredt lancettl., nakna, på ryggen enkelh. o. glest ghl., tilltryckta; för öfrigt s. föreg. 24 8, 9. H.N.f.15, n:o 7. *H.Scand.exs.46*.

Fjelltr. r. (Lpl.—Herjed. o. Dal. — N. till Ost-Finm.) Vanl. fåblomstrig m. klastik qvast. Utmärkt af de stora breda, i båda ändar tvära, blomkorgarne. Var. glatt och hårig, med smalare och bredare blad, som v. äro mjuka och tunna med glest åderndt.

D) *Umbellata* Fr.: stj. tätbladig (ut. n:o 56) med smala glesnerviga aldrig stjelkomfamt. blad, de nedre s. föreg.; fj. fler- ell. månggradiga, de innersta n. smalare; krbrämet glatt.

- 56 *H. sparsifolium* Lindeb. stj. grenad i få utdragna enblomstriga båglik upprätta skaft; bl. glesa jemnbr. lancettl. glest småtandade o. spetsiga; blkorgar som föreg.; fj. sterradiga, mörkgröna enfärgade, de yttre trubb. öppna, ett par inre spetsiga. n. nakna, glest hvith. o. vid basen ghl.; stift mörkt; skalfr. svarthrua. 24 8, 9. *H.Scand.exs.48*. *H. gothicum-pseudonorvegicum* Fr. *H.Eur.exs.127* c.

Fjelltr. r. (Lpl.: Prof. N. J. Anders. — N. Opdalen—Guldalen, t. ex. Drivstuen, Rise, Wang. 1000'—3000'.) Stjelken 3—4 qv. hög slät stjernl. o. småh. med 5—9 spridda v. mjuka, utstående stjernh. o. korth. blad. Har n. de största blomkorgarne i släktet.

- 57 *H. umbellatum* L. stj. v. med flocklik vippa, tätbladig; bl. lancettl.—jemnbreda, glestandade spetsiga; blkorgar stora m. tvär bas; fj. månggradiga mörkgröna enfärgade, alla trubb., glatta ell. säll. finh. med utb. öjd spets. 24 7—9. — *β coronopifolium*: bl. tät gyttrade, n. jemnbreda m. några få långa tänder i kanten. — *γ pauciflorum*: bl. n. jemnbreda helbräddade; blkorgar få, på långa upprätta skaft. — *δ abbreviatum*: kvartershög m. elliptiska—aflånga trubb. blad, 1—4 blomk. — *ε litorale*: söga mer

Hartman, *Skandinavien Flora*, (10:de uppl.)

3

än kvartershög, nedliggande tätbladig med fåblomstrig flock. —  $\zeta$  *subboreale*: stjelen hög, upptill upplöst i en stor oregebl. vippa; fjällen bredare. H.N.f.9, n:o 1. —  $\epsilon$  H.Scand.exs.50.

Torra äng. o. back. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\delta$  Sk. —  $\epsilon$  Vestkusten allm. —  $\zeta$  VB. vid Storkåge.) Var. mycket: *fjällen stund. glesh., tilltryckta; stiften, särdeles på höstformer, mörka*

58 *H. æstivum* Fr. liknar till stielk och blad alldeles föreg., från hvilken den skiljes genom qvastlik vippa, smalare blåkorgar med äggr. bas och smalare tilltryckta håriga fjäll med n. blekare kanter och upptå vidgade fåfjälliga hvith. blkskaft. 247. H.N.f.11, n:o 5. H.Scand.exs.49 (en mycket afvikande form).

Äng. r. (Boh. Koön, Foss. ÖG. nära Vadstena. — N. vid Bogstad nära Christiania.) Stj. merändels sträf o. sträfh. \*)

#### 44. TARAXACUM Lin. Syst. N. ed. 1. Smörblomster.

1 *T. officinale* Web. bladen n. i rosett, nedåt parflikiga eller hela; blomkorgen ensam, på ett ihåligt skaft från bladrossettens midt. 244—10, g. blr. Fig. Sv.B.4. Fl.D.574.

\* *corniculatum* (Kitt.) fingerhög, med tunna nedåt rigtade bladflikar, upprätta, n. äggrunda foderholkfjäll, de egentl. holklbladen med en kort hornlik tand under spetsen. H.N.f.13, n:o 30, 31; f.15, n:o 14.

\* *palustre* (Sm.) blad. hela ell. djupt och smalt nedåt parflikiga, något köttiga; foderholkfj. äggr., tilltryckta. Fig. Fl.D.1708. H.N.f.13, n:o 29.

Gat. etc. a., *cornic.* på sandback., *pal.* på fukt. st. (Sk.—Lpl. — N.)  $\alpha$  till blomkorg och öfriga delar mycket större än varr. Foderholkfjällen slaka, meränd. nedböjda. — *Leontodon Taraxacum* L.Fl.Sw. — *T. cornic.* innefaller *T. lævigatum* och *obliquum* Fr. Nov. 2. *T. palustre* är *Leont. lividus* Kitt. och *L. salinus* Poll.

#### 45. LEONTODON Lin. Höstfåbla.

1 *L. hastilis* L. stängeln bar, enblomstrig; bladen lancettlika nedåt parflikiga; blomholkens bas äggrund. 246—8, g. blr. —  $\alpha$  *hispidus*: stråfhårig. —  $\beta$  *glabratus*: hela växten n. glatt. Fig. Sv.B.643. Fl.D.862. H.N.f.7, n:o 4.  $\beta$  Jacq.A.164.

Äng. och. betesm.,  $\beta$  skugg. st. (Sk.—Södm. Vester-Hanninge. Uppl. Skoklosters skolhus. Ner. Verml. Carlskoga. Dalsl. Örndalen i Ors sn; Edsholmen i Gunnarsnäs enl. Leffl. Hall. söd. del.: Theor. Ö. Gottl. Visby enl. Leffl. — N. Bergens stift vid Leervig på Storöen. —  $\beta$  Sk. mellan Krageholm och Snogeholm, Baldringe, Araslöf etc. Hall. Sperlingsholm. Smål. Kalmaretrakten; Fryeled; Näsbyholm; Stenbrohult; Östra och Vestra härader: Scheutz. ÖG. Öfverbo i Ö. Tollstad enl. Kindb.)  $\alpha$  *L. hispidum* L.  $\beta$  *L. hastile* L. *Apargia* Hoffm.

2 *L. autumnalis* L. stängeln bar, uppstigande, 1—flerblomstrig; bladen odelade ell. parflikiga, meränd. glatta; holkens bas småningom afsmalnande mot det upptill vidgade, fjälliga skaftet. 247—9, g. blr. —  $\beta$  *Taraxaci*: mest enblomstrig, med tjockt svartluden blomholk. Fig. Sv.B.642. Fl.D.1996.  $\beta$  Retz. fasc. 4, f.2. Fl.D.1523. H.N.f.12, n:o 26.

Betesmark. a.,  $\beta$  fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. — Herjed. — N.) Har än nära glatt, än småluden holk, samt fjälligt, upptå vidgad blomskaft. —  $\beta$ , som är 3—6 tum hög och n. upprät, blommar tidigare än  $\alpha$ . — *Apargia* Hoffm.  $\beta$  *Hieracium Taraxaci* L.Sp.Pl.ed.2 och Herb. Hierac. *Leontodontis* L.Favn.ed.2.

#### 46. HYPOCHÆRIS Lin. Slätterfåbla.

† Stielken sträf; fruktfjunets alla strålar fjäderlika: *Achyrophorus* Scop.

1 *H. maculata* L. stielken n. bar, 1—4blomstrig; rotbladen omv. äggrunda, tandade; blomholken sträfluden; alla skalfr. med skaftadt fjun. 247, 8, g. blr. —  $\beta$  *minor*: stielken enblomstrig, 7—9 tum hög. Fig. Fl.D.149; 901.

\*) Af hittills i Skandinavien flora vanl. upptagna arter hafva följande blifvit uteslutna: *H. stoloniflorum* Kitt. och *H. ramosum* Kitt., hvilka inkommit genom oriktig bestämning, samt *H. sabaudum* Fr. och *H. auratum* Fr. — af hvilka den förre blifvit förvildad vid Uppsala och Christiania, den senare vid Uppsala, men numera utgången.

Angsb. a. (Sk.—Um. Lpm. Herjed.—N. —  $\beta$  Smål. Ifla och Ljungby: Scheutz. VG. Kinnekulle. Södm. Vårdinge sn. Uppl. Rosl. Medelp.)  $\beta$  är *Apargia alpina* Swartz Sum.Veg.Sc.

†† Stäng. glatt; fruktf:s yttre strålar hårlika.

2 H. *radicata* L. stäng. bladlös, grenig; bladen *nedåt parflikiga* trubbiga *stråfhåriga*; holkfj. med en rad borst längs midten; *alla* skalfr. med *skafst*adt fjun. 2 7, g. blr. Fig. Sv.B.752. Fl.D.150. H.N.f.14, n:o 10.

Betesmark. r. (Sk. allm. Blek. Smål. Kalmar vid Hosmo och Ljungby; Vestervik; Jönk. vid Dunkahallar; söd. och vest. delen mångenstädes: Scheutz. Hall. Boh. VG. Öl. Gottl. Visby; Sanda och Eskelhem snr enl. G. v. Ced. — N. söd. och vest. del, t. ex. Arendal, Christiansand, Mandal, Bergen, Molde etc.)

3 H. *glabra* L. stäng. som hos föreg.; bladen bugtigt tandade ell. parflikiga, n. *glatta*; holken *glatt*; skalfr. i blomkorgens kant med *oskafst*adt fjun. 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.751. Fl.D.424. H.N.f.2, n:o 16.

Sand. st. åkr. helst nära hafvet, r. (Sk. Blek. i vest. delen. Hall. Boh. vid Svinesund. VG. Slättås i Larf sn: Joh. Hulting. Smål. Femsjö; sjön Bolmens stränd; Ljunga, Ljunghy och Rysby: Scheutz. Öl. Glömminge, samt mell. Runsbäck och Thorslunda. — N. sydöstra del, t. ex. Fredrikshall, Femsöe, Svinesund etc.) 1 åkrar *upprdt*, på stränder kull-liggande.

#### 47. ARNÖSERIS Gärtn. Klubb-fibla.

1 A. *pusilla* Gärtn. stängeln bladlös fåblomstrig, med klubblikt upplåsta blomkorgskäft. 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.201. H.N.f.2, n:o 17.

Åkr. väg. etc. r. (Sk. Blek. Hall. VG. Högstorp nära Vårgårda jernv.station: J. Hult. Smål. Fledingsstorp i Vissefjerda sn: Hosmo; Ljungby etc. Öl. Möllstorp i Algutsum sn. Gottl. Visby.) *Alla bladen vid roten, omv. ågrunda ell. tunglika, tandade.* — *Hyoseris minima* L. *Lapsana* Willd.

2 Fam. DIPSACEÆ Juss. Blommor gytttrade på ett gemensamt fäste inom holk [blomkorg]. Stånd 4, fria, fästade i kronans pip. Blomfoder dubbelt för hvar krona, det inre fästadt ofvanpå det enfroiga, slutl. nölika fruktämnet.

#### 48. DIPSACUS Lin. Kardtistel.

†1 D. *pilosus* L. stjelken taggig; bladen skafstade, ågrunda, meränd. med ett par bihanglikaflikar på skafstet; holkbladen nedböjda, af den klotrunda blomkorgens längd. 8, 9, hv. blr. Fig. Fl.D.1448. H.N.f.2, n:o 18.

Fukt. st. vid jordvallar etc. r. (Sk. omkring Lund och Ystad; vid Skreflinge enl. F. Aresch. ÖG. Söderköping enl. Kindb.) *Stundom manshög och deröfver; de öfre bladen sakna ofta bihang och äro då något hjertlikt ågrunda.*

#### 49. TRICHÉRA Schrad. Åkervädd.

1 T. *arvensis* Schrad. stjelken stråfluden; stjelkbladen djupt parklufna ell. inskurva, sällan hela; kantblirna oregelbundna, *större* än diskblirna. 2 7, 8. —  $\beta$  *integrifolia*: *alla bladen odelade anånga—lancettlika, sågade.* Fig. Sv.B.322. Fl.D.447.

Ång. åkerrenar, a. (Sk.—Jemtl. och VB. — N. till söd. Finn.: Norm. —  $\beta$  Sk. Ramlösa; Trollenäs etc. Smål. Ribbingsnäs i Barkeryd: Scheutz. Södm. Nyköping: C. Ind.; Södertelje enl. Leffl. Ner. vid Råå i Hammar sn. Gottl. Lummelunds bruk.) *Blirna blågredelina, stund. röda ell. hvita.* — *Knautia* Coult. *Scabiosa* L.

#### 50. SUCCISA Mönch. Knappvädd.

1 S. *pratensis* Mönch: stj. småluden; bladen odelade, de nedre bredt afånga, de öfre lancettlika; *alla* blirna *likformiga* i klotrund korg. 2 8, 9. Fig. Sv.B.422. Fl.D.279. Fukt. ång. betesm. a. (Sk.—Jemtl. och VB. — N. till Nordl.) *Blirna blå, säll. röda ell. hvita; rotstocken kort, nedtill liksom tvärt afhuggen.* — *Scabiosa Succisa* L.

51. SCABIÖSA *Lin.* Stjernvädd.

- 1 *S. Columbaria* *L.* stjelen *n. glatt*; rotbladen *lyrformiga*, stund. odelade sågade; stjelkbladen pardelade, med smalt jemnbreda flikar; kantblirna oregelbundna. 2 7—9. Fig. Sv.B.393. Fl.D.314.
- Torra st. r. (*Sk. Blek.* vid Siretorp i Mjellby sn. *Smål. Vexiö och Vedbo* härad; Ryhof nära Jönköping enl. Scheutz; Kalm. län, i Hyena och Thorsås snr enl. Ekstr. ÖG. Omberg, Linköping etc. *Södm.* öarne omkring Dalarön. *VG.* Falbygden. *Öl. Götll.*) *Blomkorg.* likna *Trichera* arv. till storlek och färg. — *Asterocephalus Wallr.*
- 2 *S. suaveolens* *Desf.* stjelen *gråluden*; rotbladen *lancettlika*, mot spetsen bredare, vanl. helbräddade; det öfr. som föreg. 2 7, 8. Fig. Sv.B.705. Fl.D.2282. H.N. f.1, n:o 9.
- Sandfält, r. (*Sk. Vidtsköffe, Veberöd, Gualöf, Årup* etc.) *Mindre än föreg, hvilken den liknar till blirna, och för hvars afart den blifvit ansedd.* — *Asteroceph. Wallr.*

- 3 *Fam. VALERIANEÆ Fr.* Blr i knippe. Stånd. 5 eller 3 fria. Fruktämne 3rummigt, ehuru 2 rum stundom felslå, i hvilket fall blott ett frö bildas. Märken 3 eller 1.

52. VIBURNUM *Lin.* Olvonbuske, Elnaträd.

- 1 *V. Opulus* *L.* bladen 3klufna hvasstandade, skaften upptill bärande vårtlika körtlar; blomknippets kantblr större, könlösa. 5 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.337. Fl.D.661.
- Skögsäng. (*Sk.—Um. Lpm. Boh. Öl. Götll.* — *N.* till Senjen.) *Manshög buske, med platta blomknippen, röda bär.*

53. SAMBUCUS *Lin.* Hyll.

- 1 *S. nigra* *L.* buske; bladen parbladigt delade med vanl. äggrundt lancettlika, sågade flikar; blomknippen 5stråliga. 5 7, hv. något gulakt. blr. Fig. Sv.B.33. Fl.D.545.
- Byar. (*Sk. Blek. Smål.* Kalmar; Vesterum. *Hall. Boh. Öl. Götll.* samt här och der förvildad upp till Uppl. och Verml. — *N.* södra delen af Christiania- och Christiansands st. upp till Valderhoug.) *Var. med flere gånger delade blad och smalt lancettlika flikar. Bären svarta.*
- 2 *S. Ebulus* *L.* ört; blad som hos föreg. med lancettlika spetsade, fint hvas-sågade flikar; blomknippen 3stråliga. 2 7, 8. Fig. Sv.B.271. Fl.D.1156. H.N.f.4, n:o 7.
- Fukt. st. r. (*Sk.* vid Christinehof nära Andrarum. *Blek. Carlshamn. Smål.* Eds kapell vid Vindö; vid Fredriksberg i Döderhults sn; Göljshult i Misterhults sn; Vester-vik, Norrlands äng. *Södm.* Strengnäs; Fogdö kyrkog.; Eskilstuna. *Stockh. Uppl.* Signildsberg enl. Leffl.) *Ell par alnar hög, med rödakt. blr och svarta bär.*

54. VALERIANA *Lin.* Vendelrot.

- 1 *V. officinalis* *L.* både stjelk- och rotblad parbladigt delade, säll. odelade; blirna 2-könade. 2 6, 7, rödl. ell. hv. blr. — *β angustifolia*: bladflikarne *n.* jemnbreda och helbrädd. — *γ integrifolia* *Led.*: alla bl. odelade, äggrunda, sågade. Fig. Sv.B.25. Fl.D.570. *β* H.N.f.11, n:o 15; *γ* f.16, n:o 13.
- \* *sambucifolia* *Mik.* rotstocken oftare med grenskott; bladflik. färre (3—5 par), bredare, aflångt äggrunda, groftandade. — *β simplicifolia* *F. Aresch.* de öfre stjelkbl. odelade, äggr. lancettlika. H.N.f.11, n:o 16.
- Stränd., kalktrakt., \* fukt. och skugg. st. (*Sk.—Lpl. och VB.* — *N.* till Ost-Finnm. — *γ Smål.* Vestervik, på Lucernholmen. — \* *Sk.—Lpl. och VB.* — *N.* — \* *β Sk.* Kropps sn, vid Björka enl. Aresch.) *Hufvudformen har vanl. flere, ända till 9 par, oftast lancettlika, dels n. helbräddade, dels sågade ell. tandade bladflikar, och är oftare utan grenskott; men förenas genom tydliga mellanformer med \*, som är en af lokalen beroende form.* — \* *V. sambucifolia* *ed. 9.*
- 2 *V. dioica* *L.* rotbladen *hela* och helbräddade, bredt skaftade, rundade ell. äggrunda; stjelkbladen parbladigt delade med stor ändflik; blirna 2byggare. 2 6, rödl. blr. Fig. Fl.D.687.



Fukt. Ång. (Sk. Hall. Boh. Blek. mot skånska gränsen. Smål. Tingsås: Scheutz. Öl. — N. södra del; dock osäker.) Växten blommande 5—7 tum hög, med större han- än honbl. r.

## 55. VALERIANELLA Mönch. Vårsallat.

- 1 V. *olitoria* Mönch: stjelken klynnedelad, med hufvudlikt gytttrade bl. i grenarnes topp; frukterna något plattadt klotrunda, med omärkligt foderbräm på toppen, invändigt med ett tomt, 2deladt rum. ☉ 5—8, ljusbl. bl. —  $\beta$  *lasiocarpa*: frukt håriga. Fig. Sv.B.232. Krook Mon.Val.t.4, f.40. Fl.D.1681. H.N.f.13, n:o 33.
- Grus, åkr. etc. (Sk.—Uppl. Vestm. Strömsholm. Boh. Öl. Gottl. — N. södra del: Christiansand, Arendal etc. —  $\beta$  Sk. Krageholm. Mälaren på Björkö. Gottl. Visby, på Snäckgårdet: Kr.) Stjelken grenad från midten eller längre ned; rotbl. n. omv. åggr., stjelkl. aflånga. — *Valeriana Locusta* L. *Fedia olitoria* Vahl.
- 2 V. *Morisonii* Koch: stjelken upptill klynnedelad, med bl. i toppen och öfre grenvecken; frukt äggformiga spetsade, med plattad framsida, snedt, 3—5standadt foderbräm på toppen, invändigt täta. ☉ 6, 7, ljusbl. bl. Fig. Kr.Mon.Val.t.1, f.6. Fl.D.738. H.N.f.4, n:o 8.
- Åkrar, r. (Sk. Malmö; Cimbrishamn. VG. Kinnekulle vid Skatelie nära Brattfors; Råbäck; Trollmen etc. Smål. Hosmo, Berge m. fl. st. nära Kalmar; Hvitabult i Linnaryd enl. Scheutz. Öl. Björnböfda, Repplinge etc. Gottl.) Stjelken högre, styfve, ehuru spåddare, och vanl. blott mot toppen grenig; bl. som hos föreg., men smalare. Var. med glatta och finhåriga frukter: *Fedia dasycarpa* Stev. — V. *dentata* ed. 9, ett mycket bortblandadt namn, som enl. Krooks Monogr. ursprungl. afser en utländsk art. *Fedia mixta* Wg.

- 4 Fam. RUBIACEÆ Juss. Blomfoder vidväxt det 2rummiga fruktlämnet, ofta med omärkligt bräm. Stånd. vanl. 4. Frukt 2knölig, affall. öppnad ell. i 2 delar.

## 56. SHERARDIA Lin. Madd.

- 1 S. *arvensis* L. bladen omkring 6 i kransen, i kanten styfhåriga, uddspetsiga; svepebladen vid basen hopväxta. ☉ 7, 8, b. bl. Fig. Sv.B.609. Fl.D.439.
- Åkr. (Sk.—ÖG. Södm. Vannala i vest. Vingåker. Rosl. Furusund; trol. diförd med ballast. Verm. Långnäs i Ölme härad. Dalsl. i Eds sn. VG. Kinnekulle; Göteborg: Leml. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. södra del: Christiania; Kirköe.) Blrna något gytttrade inom ett 6—8bladigt svepe.

## 57. ASPÉRULA Lin. Madra.

- 1 A. *tinctoria* L. bladen smalt jemnbreda, 4—6 i kransen \*), under något sträffa; blomknippena 3stråliga, med mest 3klufna kronor; frukten glatt. 2 6, 7, hv. bl. Fig. Sv.B.244. H.N.f.3, n:o 6.
- Back. r. (Sk. Christianstad, vid Uddarp [i sedn. tider ej återfunnen: F. Aresch.]. Smål. Uknä sn ej sälls. enl. Ekstr. ÖG. Ombergstrakten; Skenninge; Söderköping etc. Södm. Strengnäs. Stockh. Uppl. Uppsala; Ekolsund enl. Leml. Ner. Snallunda prestg., och Mossby i Kumla. VG. Halleberg; Åsaka i Vartofta härad. Öl. Gottl.) Rotstocken röd; örten svartnar lätt under torkning.
- 2 A. *odorata* L. bladen 8 i kransen, lancettlika; blrna i skaftade knippen; frukten sträffhårig. 2 5—7, hv. bl. Fig. Sv.B.218. Fl.D.562.
- Skugg. lund. (Sk.—Gestr. Helsl. Borgaberget i Forssa; Lindfallet i Enånger: Wistr. Ångml. Rödåsen i Nora sn: H. W. Arn. Jeml. Kall sn vid sjön Anjen; Frostvikens sn. Vestm. Ner. Verm. Öl. Gottl. — N. Holmestrand; Christiania; Bergen etc. till Trondhj. Nordl. Bejeren och Gildeskaal: Norm.) Torr vålluktande.

\*) Då i detta och följ. slägte antalet af blad uppgifves, förstås det vanligast förekommande; ofta kan på samma stånd ett ell. annat blad i hvarje krans saknas eller öfverskjuta det uppgifna medeltalet; vanl. äro de nedersta och öfversta kransarne fåbladigare.

58. GALIUM *Lin.* Måra.

† Bladen 4, högst 6 i krans; frukten stråfhårig.

- 1 *G. boreale* *L.* stjelen *upprät*, finhårig ell. glatt; bladen 4 i *kransen*, från bredare bas *lancettlika*, med 3 *hufvudnerv*, utan udd i spetsen. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B. 122. Fl.D.1024. H.N.f.15, n:o 15.

Back. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* till Finnm.) 2—3 *qv. hög*.

- 2 *G. rotundifolium* *L.* stjelen *slak*, *borsttaggig*; bladen 4 i *kransen*, äggformigt *cundade* härbräddade, med 3 *hufvudnerv* och udd i spetsen. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Jacq.A.94. H.N.f.4, n:o 9.

Tallback. r. (*Gottl.* vid vägskilnaden till Viklou och Vänge; Tjengdarfve i Sproge; Malmhagen vid Lill-Helvigs i Fohle; Hallbros slottsruin i Vesterhejde; ofvan Lummelund, i skogen öst. om vägen. *Öl.* Högby sn, vid byn Bäck, ymn.; vid Ramsnäs i Böda sn.)

- 3 *G. triflorum* *Mich.* stj. *slak*, *snärjande*; bladen 6 i *kransen*, aflängt *lancettlika*, med nedåtvända småtaggar på ryggnerven, framåt rigtade i kanten, *en enda* hufvudnerv och med udd i spetsen; blomskäften i bladvecken, vanl. 3blommiga. 2 7, 8. Fig. Sv.B.669. Fl.D.2045. H.N.f.3, n:o 8.

Bergstrakt. r. (*Um. Lpm.* Lycksele, vid Almycketjärn. *Ängml.* Sollefteå, i Djupdalen; Ramsele och Liden snr; Nora sn, Storön: Arn. *Medelp.* Norbyknöl; Borgsjö, i Randklöfven; Hälsjö sn enl. Leffl. *Held.* Gryttjesbergen i Delsbo; Offerberget i Undersvik; Hornslandet i Rogsta; Wistr. *Verm.* Valserudberget i Nyed; Torskeberget i Ullerud m. fl. st. *Ner.* vid Klockarhyttan i Kil sn: Stud. A. af Geijerstam. — *N.* Finnm. Kaafjorden. Nordl. Salten. Trondhj. st. Namse- och Sandöldalen. Ringelinge, Krokkleven. Christiania.) *Liknar till ört och lukt Asperula odorata; blrna hv. ell. grönaktiga.* — *G. suaveolens* *Wg.*

†† Bladen 4—6 i krans; frukten glatt.

\* Bladen utan udd i spetsen; frukten n. slät.

- 4 *G. trifidum* *L.* stj. nedliggande, n. *snärjande*; bladen 4 i *kransen*, aflängt *lancettlika*, olikstora, trubbiga; fruktämnet n. af den 3klufna *kronans storlek*. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.48. H.N.f.3, n:o 7.

Sanka sjöstr. och kärr, r. (*Lpl.*—nor. *Smål.* Jönköping; Axamo och Barkeryd: Scheutz. *Verm.* VG. Venersborgstrakten, Kasen. *Boh.* *Gottl.* — *N.* icke sälls.) *Spädare och stråfvare än följ., med mycket smärre, säll. 4klufna blr; frukten 2knölig af klotrunda, föga sammanhäng. småfrukter.*

- 5 *G. palustre* *L.* stj. *slak*, *glost* borsttaggig; bladen 4 [säll. 5, 6] i *kransen*, smalt *lancettl.* omv. äggrunda, olikstora, trubbiga; fruktämnet *mycket mindre* än den 4klufna *kronan*. 2 6, 7, hv. blr. — *β decipiens*: större och mera upprät; bladen 5—6 i *kransen*. Fig. H.N.f.15, n:o 16. *β* Fl.D.423.

Väta st. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* till Ost-Finm.) *Var. i hög grad till storleken, och från n. glatt till öfverallt småluden: var. pubescens.* — *β, ell. G. elongatum Presl., anses af Godt. & Gren. m. fl. för egen art.*

\*\* Bladen med udd i spetsen; frukten grynprickig.

- 6 *G. uliginosum* *L.* stj. vanl. *slak* och *borsttaggig*; bladen 6 i *kransen*, *smalt lancettlika*, i kanten\* stråfva; blrna i dubb. 3deladt knippe. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D. 1509. H.N.f.15, n:o 17.

Fukt. st. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* till Ost-Finm.) *Var. späd, enkel och upprät, föga sträf: var. tenue, samt utbredd, lång och mycket grenig och då n. snärjande sträf.*

- 7 *G. saxatile* *L.* stjelen *slak*, *glatt*; bladen nedtill 4, upptill 6 i *kransen*, omv. *äggrunda*, kort uddspetsiga, stråfbräddade; blomknippet tät. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D. 1633. H.N.f.2, n:o 19.

Fukt. stenbund. mark, r. (*Sk. Hall. Boh.* Oroust. VG. Fritsla sn. *Smål.* vest. del.; Algutsboda och Stenbrohult; Vexjö. Gmlla: Scheutz. *Blek.* Ebbenäs och Kristianopel: Gosselm.; Gredby. — *N.* Christiansand; Stavanger; Bergen etc.) 3—8 *tum lång, lufvig; svartnar torr.* — *G. hercynicum* *Weig.*

+++ Bladen omkr. 8 i krans; fr. glatt; stjelen aldrig snärjande.

- 8 *G. silvestre* Poll. stj. uppstigande, *glatt*; bladen 6—8, jemnbredt lancettlika, *smal-spetsiga*, meränd. *glatta*, äfven i kanten. 2, 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *læve*: mindre och nedligg., alldes *glatt*. Fig. FLD.1866. H.N.f.4, n:o 10.

Fukt. st. r. (Sk. Lund, vid Arendala; Stenshufvud. *Blek. bergen* kring Ronneby; Hokadal i Asarum sn. *Smål.* mell. delen; samt Skillingaryd i Tofteryd sn: Scheutz. ÖG. Omberg och i Kisa enl. Kindb. *Stockh.* Tranholmen i Lilla Värtan. VG. Kinnekulle, Sparrsäter. — N. Christiania. —  $\beta$  *Öl. Gottl.* — N. Christiania.)  $\beta$  *är endast 2—5 t. hög;  $\alpha$  större och blomrikare, närmande sig till G. uligin., men skild med sin glatta stjeln.* — *G. pusillum* Wg. *G. multicaule* Wallr.  $\beta$  *G. austriacum* Jacq.

- 9 *G. Mollugo* L. stj. upprätt ell. slak, tydligt *4kantig, glatt*; bladen 8 i kransen, lancettlikt jemnbreda ell. mot spetsen bredare, *trubbiga med kort udd*, vanl. *glatta*, med *platta* och *sträfv*a kanter. 2, 6, 7, hv. ell. gulakt. blr. —  $\beta$  *ochroleucum*: blrna gulaktiga, i stort, grenigt knippe. —  $\gamma$  *clivale*: nedliggande; bladen små [2—3 lin. långa], n. omv. äggrunda. Fig. Sv.B.357. FLD.455. H.N.f.16, n:o 14;  $\beta$  f.2, n:o 20.

Bäckar etc. (Sk. *Blek. Hoby*; Lyckeby enl. Gosselm. — *Helsl. Ångml.* Ytter-Lännäs; Säbrå sn: Arn. *Dal. Vestml. Ner. Verml.* bergslagen. *Boh.* Strömstad. *Hall. Gottl.* Visby, samt Rohnemyr enl. G. v. Ced. — N. söd. delen. —  $\gamma$  *Smål.* Grenna: Lіндеb. ÖG. Söderköping, vid Ramshäll: Kindb. VG. Venersborg; Trollhättan; Ursand. *Boh. Hall.*) *Var. i hög grad. De blombär. grenarne äro vanl. glatta, men förekomma äfven finkludna, då växten synes närma sig följ:s  $\beta$ . —  $\alpha$  G. erectum Huds.  $\gamma$  G. elatum Thuill. var. Godr. & Gr.*

- 10 *G. verum* L. stj. upprätt, *trubbkantig, småklud*; bladen 8 i kransen, *småll* jemnbreda, *småkludna* med *tillbakavikna* kanter. 2, 7, g. säll. hv. blr. —  $\beta$  *albidum*: blrna blekgula ell. n. hvita. Fig. Sv.B.165. FLD.1146.  $\beta$  H.N.f.2, n:o 21.

Tor. st. a. (Sk.—*Ångml.* och *Jeml.* — N.) *Bladen vanl. ganska smala, stund. bredare, något närmande sig till föreg., hvarmed den synes kunna hybridisera.*

++++ Bladen 6—9 i krans; stjelen snärjande.

- 11 *G. Aparine* L. stj. slak, småtaggig; bladen lancettlikt jemnbreda, med nedåt rigtade småtaggar i kanten; blomskäften 3—6blommiga; fruktskaften raka. ☉ 6—8. —  $\alpha$ : stjelkledderna ullhåriga; blrna teml. stora, *hvita*; frukt. stora, *grynprickiga* och *håriga*. —  $\beta$  *tenerum*: bladen färre, tunna, n. ovala. Fig. FLD.495. Reich.t.1197, f.1;  $\beta$  f.4.

\**infestum* Kit. blrna små, *gulaktiga*; fr. smärre, n. släta, men *håriga*. Fig. Sv. B.419.

\**spurium* L. bl. oftare 6 i krans; fr. något *grynprickiga, glatta*. Fig. FLD.2530. H.N. f.2, n:o 22.

Bland busk. och på odl. st. (Sk.—*Lpl.* — N. —  $\beta$  *Smål.* Kalmatrakten. *Öl. Gottl.* — \**infest.* allmän. — \**spur.* Sk.—*Gestr. Vestml. och Verml.* *Öl.* — N. till Nordl. Norm.) *Hufvudarten är mera sällsynt i norra Sv.*

- 5 Fam. LORANTHACEÆ Don. Foder vidväxt det enrummiga fruktämnet. Krona 4delad. Stånd. fästade midt emot kronflikarne. Fukt enfröigt bär. Parasitbuskar.

### 59. VISCUM Lin. Mistel.

- 1 *V. album* L. stjelen klynnegrenig; bladen lancettl. trubbiga nervlösa; blrna oskaftade, gytttrade 5 och 5 i grenarnes spets.  $\frac{1}{2}$  5, gulgr. blr. Fig. FLD.1657.

Parasitväxt på Ek, Apel och andra träd, r. (Sk. på en ö vid Christianstad enl. gammal uppgift af Leche. — *Uppl.* och *Vestml.* på Mälarens öar. VG. Kinnekulle och Hunneberg. *Boh.* vid Öjared i St. Lundby. — N. södra delen.) *Buskväxt. Bladen tjocka läderaktiga; bären hvita.*

6 Fam. **CAPRIFOLIACEÆ** Juss. Foder vidväxt det flerrummiga fruktämnet, som moget blir ett bär ell. bärlikt fröhus. Märke 1, odeladt.

60. **LONICÆRA** Lin. Try.

1 *L. Xylosteum* L. bladen ovala, mjukhåriga; blomskäften 2blommiga, af blrnas längd; de 2 blrnas fruktämnen fria, endast vid basen sammanhängande, inom 2 syl-likä och 4 bredt äggrunda skärmfjäll.  $\frac{1}{2}$  6, hvitg. blr. Fig. Sv.B.319. Fl.D.808. H.N.f.16, n:o 15.

Skogsäng. back. (Sk.—Ångml. Jemtl. Verml. Boh. — N.) Ett par alnar hög buske, med parvisa, röda bär.

2 *L. cærulea* L. bladen elliptiska, vanl. mer afsmalnande mot basen, äldre n. glatta, med håriga skaft; blomskäften 2blomm., betydligt kortare än blrna; dessas fruktämnen helt och hållet hopväxta, slutl. bildande ett enda bär; blomskärmen 2:ne, syl-likä.  $\frac{1}{2}$  6, hvita blr. Fig. Sv.B.355. H.N.f.3, n:o 9.

Bergstr. r. (Dal. Ösmundsberget; Ore socken mell. Ore och Viken, i Vikängen m. fl. st. omkr. Oresjön; Grangärde sn, Saxberget. Vestml. vid Dalkarls-, Skrikare- och Elfshyttan m. fl. st. i Nora sn.) Buske som föreg., med blå bär, hvilkas yttre hud bildas af de med fruktämnet hopväxta bredare skärmen. Bladen i yngre tillstånd håriga.

3 *L. Periclymenum* L. bladen ovala ell. äggrunda, glatta; blrna oskaftade, samlade i hufvud.  $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Sv.B.140. Fl.D.908.

Lund. och klipp. särd. nära hafvet. (Sk. Blek. Smål. i Femsjö och Lidhult; Färgaryd; Eke i Thorsås sn enl. Ekstr. Hall. Boh. VG. Dalsl. — N. vid Christianiafjorden; Arendal; Bergen; samt i Romsdalen.) Slingrande buske, med n. 2 tum långa, utvändigt ljusröda, inuti hvita blr; mörkröda bär. Nyskottens blad ofta bugtandade håriga.

61. **LINNÆA** Lin. Linnæa.

1 *L. borealis* L. stammen vek, n. trådsml, krypande, med motsatta rundade blad, uppåta 2- eller 4blommiga grenar.  $\frac{1}{2}$  7, hv. inv. rödl. blr. Fig. L.Fl.Su. Sv.B.1. Fl.D.3. Wg.Fl.L.9. H.N.f.16, n:o 16.

Barrskog. (Lpl.—Sk. nor. del. Hall. Halmstad; m. fl. st. enl. Theor. Öl. Gottl. Ymnigast i norra Sv. — N.) Krypande buske, med öfvervintrande blad; grenarne med 2, stund. 4, små, hängande, väl lukande blr i spetsen.

## 2 KLASSEN

### ANNULIFLORÆ.

7 Fam. **CAMPANULACEÆ** Juss. Fodrets nedre del vidväxt fruktämnet. Krona regelbunden. Stånd. 5, fria. Frukt sierrummigt, mångfröigt fröhus med centrala fröfästen.

#### 62. CAMPANULA Lin. Blåkllocka.

† Bladen tydl. håriga ell. stråfvä.

\* Fodret med nedböjda bihang mellan flikarne.

- \*1 *C. barbata* L. hårig; bladen aflångt lancettlika; blirna i *klase*, skaftade *nedböjda*; foderflikarne äggrundt lancettlika; kronans flikar i kanten långhåriga. 2 7, 8, bl. blr. Fig. Reich.t.1594.f.1, 2. H.N.f.6, n:o 11.  
Fjellväxt, r. (N. teml. allm. i de öfre delarne af Torpen och Etnedalen: Ax. Bl.) 6—12 t. hög, med inga ell. små, n. jemnbreda, stjelkl., 4—8, fingerborgslika blr i *klasen*.

\*\* Fodret utan bihang; blirna samlade i hufvud.

- 2 *C. Cervicaria* L. bladen lancettlika [hos  $\beta$  n. äggrunda], de nedre skaftade, de öfre halftomfatt.; blomhufvudena i stjelkens spets och de öfre bladvecken; fodrets flikar *utböjda med inböjd spets, kölade, trubbiga*. 2 7, 8, bl. blr. —  $\beta$  *platyphylla*: bladen utdraget äggrunda. Fig. Fl.D.787.  
Skogsäng. ängsback. r. (Sk.—Medelp. i Torp sn. Ängml. Gudmundrå sn. Gissjö: Arn. Dal. Verml. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. södra delen. —  $\beta$  N. Ringerige vid Gårdshagen.) 2, 3 fot hög, tjock stjelk; blomkronornas veck stråfhåriga.  $\beta$  har bladen 2 tum långa och vid basen tumsbreda.

- 3 *C. glomerata* L. bladen äggrundt lancettlika, de nedre långt skaftade, de öfre halft omfattande; blomh. som hos föreg.; foderflikarne *uppråta, platta, spetsiga*. 2 7, 8, viol. stund. hv. blr. Fig. Fl.D.1328.  
Ängar. (Sk. Smål. Urshult: Scheutz. ÖG. — Helsl. Medelp. vid Indalselven; Böle nära Sundsvall enl. Leml. Vestml. Dal. Husby och St. Schövi snr. Verml. i bergslagen. Boh. Östby i Näsinga enl. Leml. Hall. Gottl. Mest i östra kustprov.) Blirna *glest finhåriga; de nedre bladens bas ofta hjertlik*.

\*\*\* Fodr. utan bihang; blirna i klase ell. ensamma i blad.

- 4 *C. Trachelium* L. stj. *hvässkantig, stråfhårig*; de nedre bladen skaftade *hjertlika*, de öfre oskaft. äggrunda långspetsade, alla djupt dubbelsågade; blirna i *bladig klase* eller på skaft i bladvecken; foderflikarne äggrundt lancettlika spetsade *uppråta*, i kanten *styfhåriga*. 2 7, 8, blå, stund. hv. blr. —  $\beta$  *urticifolia*: blomfodret öfverallt stråfhårigt. Fig. Fl.D.1026 och 2167.  
Skogsäng. (Sk.—Gestr. Kubbo i Vahlbo sn. Medelp. Dal. Sättersdalen. Vestml. Boh. Öl. Gottl. — N. södra del. till Ringerige etc.) Var. med mer äggrunda blad. —  $\beta$  *C. urticifolia* Schmidt.

- 5 *C. latifolia* L. stj. föga kantig, mjukhårig; bladen äggrunda spetsade dubbelsågade, de nedre något hjertlika och skaftade; blrna *enstaka* i öfre bladvecken, *upprätta*; foderflik. lancettlika spetsade, *upprätta* och *glatta*. 2½ 7, 8. —  $\beta$  *macrantha*: blrna mycket stora [n. 3 tum långa, 2 i diam.]. Fig. Sv.B.272. FLD.782 och 85.  
Skugg. lund. r. (Sk.—Uppl. Gefle, vid Stenbäcken. Medelp. Norasfors bruk. Jeml. Vestml. Verml. Boh. Öl. — N. till Nordl. —  $\beta$  Helsl. Söderhamn i Bromsäng. Verml. vid Ränneberget i Östmarks sn.) *Stor växt med de största blrna af de bredbladiga arterna. Blrna hvita i fjelltrakter, eljest vanl. blå.*
- 6 *C. rapunculoides* L. stj. trubbkantig, gleshårig; de nedre bladen skaftade, *hjerlikt äggrunda* spetsade, de öfre oskaftade, n. lancettlika, alla sågade; blrna i *ensidig klase, lutande*; foderflik. lancettlika, *nedböjda*. 2½ 7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.369. FLD.1327.
- Odl. st. (Sk.—Medelp. vid Sättna prestgård; Torp sn. Ångml. Hernösand; Arn. Dal. Dalsl. Öl. Gottl. — N. södra del, allmän.) *Klasen mest enkel, men blomrik; rotbladen hjertlika.*

(*C. Rapunculus.*)

†† Bladen merändels glatta.

\* Stjelken oftast mångblommig; kronan längre än frukten.

- 7 *C. patula* L. rotbladen omv. äggrunda—aflånga skaftade, stjelkladen lancettlika naggade; blrna i utbredd *qvastlik* samling, med i *spetsen* delade allm. skaft; foderflik. *upprätta*; kronan *vidgadt* klocklik, klufven *nedom midten*; fröh. *upprätt*. 2½ 7, 8, viol. blr. Fig. FLD.373. H.N.f.8, n:o 6.
- Ång. r. (Östr. Dal. Gestr. och Helsl. högst allmän och ymnig, spridande sig genom Ner. Verml. VG. och ÖG. ned till Smål. östra och mell. delen och Hall. Hasslöv; samt uppåt till Medelp. Ångml. och Jeml.) *Roten spensig; de nedre stjelkladen aflånga; kronan dubbelt längre än de syl-lika foderflikarne.*
- 8 *C. Rapunculus* L. rotbladen aflånga; stjelkl. smalt lancettlika, naggade; blrna i *klase-lik* saml., med enblommiga ell. *vid basen* delade skaft; foderflik. *som hos föreg.*; kronan *djupt* flikad; fröh. *upprätt*. 2½ 8, 9, b. blr. Fig. Sv.B.629. FLD.1326.
- Ång. r. (Sk. vid Belteberga och Torup enl. F. Aresch.; samt här och der förvildad i gamla trädgårdar. Hall. Hasslöv: Theor.) *Roten tappformig; bladnerven stundom stråfhårig.*
- 9 *C. persicifolia* L. rotbladen omv. äggrunda—aflånga, skaftade; stjelkladen jemnbreda, glest smånaggade; blrna i n. enkel klase; foderflik. *utstående*; kronan klocklik, *grundt* flikad; märkets flikar *längre* än stiftet; fröh. *upprätt*. 2½ 7, 8, blå, stund. hv. blr. Fig. FLD.1087.
- Ångsback. (Sk.—Ångml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Högväxt med stora blr. Var. glatt och hårig, särdeles blomfodret.*
- 10 *C. rotundifolia* L. rotbladen njur- ell. *hjerlika*, skaftade; stjelkl. smalt jemnbreda; blrna i *klaselik* saml.; foderflik. *utböjda*; kronan klocklik, *grundt* flikad; märkets flikar *kortare än stiftet*; fröh. *nedböjdt*. 2½ 7, 8, blå, stund. hvita blr. —  $\beta$  *lancifolia*: större, med nedliggande mångblommig stjelk, 2 tum långa lancettlika glessågade blad. —  $\gamma$  *alpicola*: stjelken meränd. enblommig; stjelkladen aflångt jemnbreda, Fig. Sv.B. 297. FLD.1086; 855 och 189 [varr.].
- Ång. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Verml. på sandhedarne vid Christinefors bruk och sparsamt på Mälarens öar. —  $\gamma$  i fjellen.)  $\gamma$  är mindre, med n. runda rotblad, blomman *icke större än på den vanl. formen.*

\*\* Stjelken alltid enblommig; kronan kortare än frukten.

- 11 *C. uniflora* L. de nedre bladen aflånga, de öfre n. jemnbreda; foderflik. bredt syl-lika, *upprätta*; kronan *bågarlik*; frukten lancettlik, *upprätt*. 2½ 7, 8, b. blr. Fig. Sv. B.526. FLD.1512. H.N.f.10, n:o 11.
- Hög fjellv. r. (Torn. Lpm. Sälls. i nor. del. af Lul. Lpm.; men allm. i dess söd. del, samt i Pil. Lpm. nor. delen, vid 3 à 4000 f. öfver hafvet: H. Widm. — N. Finnmark. Tromsø-land. Dovre.) *Stjelken nyss blommande knappt fingerhög; kronan ofta icke längre än foderflikarne, stundom mer utskjutande.*

## 63. PHYTEUMA Lin. Rapunkel.

\*1 *P. spicatum* L. de nedre bladen hjertlika dubbelsågade, långt skaftade, de öfre äggr. lancettlika—n. jemnbreda; blrna i cylindriskt ax; stiftet hårigt. 24 6, 7. Fig. FLD. 362. Reich.t.1586,f.2.

Fjelltrakt. r. (N. flerst. vid Möestranden i öfre Tellemarken, t. ex. Lejrbäckstoul på Svenofjell.) *Blrna gulaktigt hvita med grönaktiga stikar.*

## 64. JASIONE Lin. Monke.

1 *J. montana* L. stj. och gren. endast nedtill bladiga; bladen jemnbreda. ☉ 7, 8. b. säll. hv. blr. —  $\beta$  *litoralis*: roten bärande flere nedtryckta stjelkar, utan grenskott. —  $\gamma$  *perennans*: roten mest enstjelig med krypande grenskott. Fig. Sv.B.401. FLD. 319.  $\beta$  H.N.f.6, n:o 12.

Torra st.  $\beta$  och  $\gamma$  i sandjord. (Sk.—Stockh. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Hafsstr. Sk. Hall. ÖG. Mem i Täby enl. Kindb. Gottl. — N. Lindesnäs. —  $\gamma$  Sk. Ifvetofta; Tullstorp på en ättehög. Hall. söd. del.: Theor. Gottl. på Fårö.) *Bladen vanl. vågiga i kanten samt mer och mindre stråfhåriga; stjelken i bladvecken skottallstrande. —  $\gamma$  J. perennis* Fr. utan dylika skott.

8 Fam. LOBELIACEÆ Juss. Krona oregelbunden. Ståndarknappar sammanväxta; i öfr. som föreg. familj.

## 65. LOBELIA Lin. Notblomma.

1 *L. Dortmanna* L. stängeln bar; alla bladen samlade vid roten, jemnbreda helbräddade, inuti 2pipiga; blrna i klase, hängande. 24 7, 8, ljusblå blr. Fig. Sv.B.452. FLD.39. H.N.f.8, n:o 7.

I vatten. (Sk.—VB. nor. del. Jemtl. Boh. Öl. — N. södra och vestrå del.) *Bladen alltid under vattnet, endast blomklasen ofvan ytan.*

9 Fam. CONVULVULACEÆ Juss. Foder fritt från fruktämnet. Krona regelbunden. Stånd. 5, säll. 4, fria. Fr. 2—3rummigt fröhus.

## 66. CONVULVULUS Lin. Vinda.

1 *C. arvensis* L. bladen spjut- ell. pil-lika, med spetsiga flikar; blomskärm. 2, på blomskaflets midt; foderflikarne rundade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.341. FLD.459.

Åkr. (Sk.—Medelp. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Blr hvita, utvändigt rödlåta, väl-luktande. Både denna och följ. art hafva enblommiga blomskaf och slingrande stjolk.*

2 *C. sepium* L. bladen hjertlika, med snedstympade flikar vid basen; blomskärm. 2, stora, hjertlika, tätt under fodret; dettas flik. aflånga. 24 7, 8. Fig. Sv.B.514. FLD.458. Lundar, nära sjöstr. r. (Sk.—Södm. vid kusten. Stockh. flerstädes. Uppl. vid Uppsala och Ekolsund m. fl. st. omkring Mälaren; Ununge sn, vid sjön Nordingen; Borg i Frötuna sn enl. Leml. Vestml. Vesterås; Skinnskatteberg etc. Ner. vid Hjelmaren. Boh. och Hall. Öl. st. Rör i Högsrum sn; vid Hornsviken; mell. Vickelby och St. Frö. Gottl. Visby; Martebo myr, Hörsne och Burs sn enl. Leml. och G. v. Ced. — N. södra delen upp till Bergens st.) *Har mycket stora, krithvita blr. — Calystegia* Br.

## 67. CUSCUTA Lin. Snarrefva.

† Pistiller med spetsigt märke.

1 *C. europæa* L. stjelken trådlig, grenig; fodret 4—5klufvet, med aflångt äggrunda trubbiga flikar, kortare än kronpipen; denna i början cylindrisk, föga längre än brämet, invändigt meränd. med hinnaktiga, tilltryckta fjäll. ☉ 7, 8, rödl. ell. hv. blr. Fig.

- Sv.B.352. Fl.D.199. H.N.f.11, n:o 17. — \**Schkuhriana Pfeif.* kronpipens fjäll otydliga, hår- ell. syl-lika.  
 Parasitväxt på Humle, Nässlor etc. (Sk.—VB. Umeå sn. Verm. Öl. Gottl. — N.)  
*De i kronpipen under ständarne fastade fjällen saknas stundom, ell. blifva otydliga, syllika o. s. v. Någon gång så blirna ett mycket kort skäft, såsom hos ex. i H.N.: var. nefrens Fr. — \*C. europ. γ Epilobii Aresch.*
- 2 *C. halophyta* Fr. stj. enkel; fodret deladt n. till basen i 5, bredt äggrunda flakar; kronpipen från början vidgadt klocklik, af brämet längd och med tilltryckta fjäll. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. H.N.f.12, n:o 30 [?].  
 Parasit på strandväxter vid kusten, r. (Boh. flerst. i skärg. och vid kusten: Leffl. Smål. Örö i Kalmar län; Hjorthed, Solstastrand: Scheutz. Gottl. Lummelund. — N. Laurvig; Dröbak; Christiania.) *Stjelken utan alla grenar, fn och röd. — C. europ. \*halophyta ed. 5. C. halophila Aresch. — Anm. Enl. Lindeb. och Leffl. lär den af F. Aresch. som art uppställda C. Ligustri i Boh. endast högst obetydligt afvika från det förekommande former af C. halophyta, hvars egen arträtt torde behöfva bekräftas genom ytterligare granskning i naturen.*
- 3 *C. Trifolii* Bab. stj. grenig; fodr. 5deladt, med n. lancettlika flakar; kronpipen cylindrisk, af brämet längd, tillsluten af samstående fransade fjäll, hälften så långa som pipen. ☉ 7, 8, hv. ell. ljusr. blr. Fig. Reich.t.1343, f.4. H.N.f.14, n:o 13.  
 Parasit på klöverarter. (Sk.—Uppl. i Funbo och Rasbo snr. Ner. VG. Hall. Hasslöt: Theor. Gottl.) *Står i alla afs. närmast den hos oss ännu icke med säkerhet funna C. Epithymum, hvilken hufvudsakl. skiljer sig med mindre växt och blomgytt, samt kronpipens fjäll, som hos den äro lika långa som sjelfva pipen.*  
 †† Pist. med klubblikt vidgadt märke.
- 4 *C. Epilinum* Weih. stj. n. enkel; fodr. deladt n. till basen i 5, bredt äggr. flakar; kronpipen från början vidgadt klocklik, längre än brämet, med tilltryckta fjäll. ☉ 7, 8, gulakt. blr. Fig. Fl.D.1987. H.N.f.12, n:o 29.  
 Parasit på Lin. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N.) *Fin och föga grenig; fodret ungefär af kronpipens längd.*

- 10 Fam. BORAGINEÆ Juss. Frukt af 4 små-nötter med ett gemensamt stift. Fod. och kron. som föreg. fam. Stånd. 5.

#### 68. SIMPHYTUM Lin. Vallört.

- 1 *S. officinale* L. något sträff hårig; bladen äggrundt lancettlika spetsade, nedlöpande på stjelken, de nedersta skaftade, utdraget äggrunda; stånd.knapp. dubb. längre än strängens. 2 6, 7. — *β calycinum*: foderflik. längre än kronpipen; stiftet af kronans längd. Fig. Sv.B.418. Fl.D.1569. H.N.f.5, n:o 3. *β* Fl.D.664.  
 Odl. st. r. (Sk.—Uppl. Stockholm; v. Ryd vid Sundby; Löfsta bruk etc. Vestml. Dal. Grycksbo Bruk. Verm. Stömme; Venerstrakten. Öl. Borgholm; Böda. — N. Söndmör; Romsdalen etc. — *β* Stockh. vid Sabbathsborg. Gottl.) *Har vanl. violett-röda blr, och är då, om foderflik. tillika äro utstående, S. patens Sibth. enl. Bab. Var med hvitgula blr.*
- 2 *S. orientale* L. mycket sträffhårig; bladen äggr. lancettlika; de öfversta oskaftade, knappt nedlöpande, de nedre skaftade, n. hjertlika; knapp. af strängens längd. 2 6, 7, r. blr. Fig. Buxb.Cent.5, t.68. H.N.f.5, n:o 4.  
 Odl. st. r. (Sk. Delperöd i Rörum enl. F. Aresch. Smål. Kalmar; Virbo i Misterhult: D:r Lund; Blekhem i Törnefalla enl. Leffl. ÖG. Norrköping enl. Kindb. Uppl. Uppsala; Enköping; Löfsta i Eds sn. Helsl. Söderhamn. Vestml. Sättrabrunn; Lisjö i Munktorp. VG. Venerborg, Storegården; Gräfsnäs enl. Leffl.) *Utmärkt af sin skarpa sträffhårighet och de icke märkligt nedlöpande bladen. — S. patens H.N. S. uplandicum Nym. Syll.*
69. ANCHUSA Lin. Rast.
- 1 *A. officinalis* L. sträffhårig; bladen lancettlika — n. jemnbreda; blomklasarne slutl. par-



visa; fodret med utstående hårlighet. 2, 6, 7. — *β angustior*: mera mjukhårig; bladen n. jemnbreda. Fig. Sv.B.280. Fl.D.572. H.N.f.7, n:o 6.  
Åkerren. torra äng. a. (Sk.—*Gefle* och *Dal. Helsl.* Hedvigsfors: Wistr. Öl. Gottl. — N.) *Var mycket. Blrna mörkblå, viol. ell. röda; foderflik. vanl. spetsiga, stundom trubbiga. Bladen hos β 2—3 lin. breda.*

## 70. LYCOPSIS Lin. Tungört.

- 1 *L. arvensis* L. mycket stråfhårig; bladen aflångt lancettlika, bugtigt småtandade; kronpipen krökt vid midten. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.433. Reich.t.1310.f.1.  
Åkr. a. (Sk.—VB. Neder-Kalix och Um. Lpm. — N.) *Blrna i början röda, sedan ljusblå. — Anchusa MB.*

71. MYOSOTIS Lin. Förgät-mig-*ej*, Ögonblomma.

† Krona tallricksformig, med teml. stort, platt bräm.

- 1 *M. palustris* L. stjelen upptill grenig; blomfodret djupt 5tandadt, med tilltryckta, raka hår; kronflikarne meränd. i spetsen intryckta. 2, 6—8, b. blr. — *α scorpioides*: örtens hår utstående. — *β laxiflora*: stjelen hår tilltryckta, grenarnes utstående. — *γ strigulosa*: stjelen och grenarnes hår tilltryckta. Fig. Sv.B.72 (γ). Reich.t.1320, f.1; β f.4; γ f.3.  
Våta st. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Stjelen utskjuter någon gång långa sidogrenar, afvensom de smärre formerna stundom hafva rundade, ej intryckta, kronflikar. — Alla svenska arter i detta släkte innefallades i Linnés M. scorpioides. Med stora blr förstås 2—3 linier breda.*

- 2 *M. caespitosa* Schults: stjelen nedtill delad i långa grenar; blomfod. deladt nedom midten i lancettlika flikar, med hår som föreg.; kronflik. rundade. 2, 6—10, b. blr. — *β repens*: nedligg., ofta vid basen rotstående; blrna mycket små. Fig. Fl.D.2283. Reich.t.1321.f.1. H.N.f.4, n:o 11.

Stränder. (Sk.—Um. Lpm. och VB. Öfver-Kalix. Boh. Öl. — N. allmän till Trondhj. Näro vid Nordts söd. gräns: Norm. Ost-Finnm. Sydvaranger: Th. Fr.) *Har smärre blomkronor, men större foder än föreg.; stjelen tilltryckt hårig, snart delad i grenar, hvilka slut. bilda långa, slaka och glesa blomklasar, vanl. med skärmblad vid de nedre blrna. — M. lingulata Schults, något äldre, men af namngifvaren sjelf förkastadt namn.*

- 3 *M. silvatica* Hoffm. stjelen mot basen bredare, något omfattande; blomfod. ludet af utsperrade krokuddiga hår, deladt nedom midten i olikformiga flikar. 2, 5—9, b. blr. Fig. Fl.D.583, till venst. Reich.t.1322.f.1 och 2. H.N.f.1, n:o 10.  
Fjelltrakter och löfskog. (Sk. Hall. Hallandsås: Theor. Smål. Grenna, Klefven; Jönköping, Bondberget: Zett.; Ribbingsnäs i Barkeryd enl. Scheutz. ÖG. Omberg. Dal. vid Gröfvelsjön. Herjed. Funnedalen etc. Jemtl. Ängml. Tåsjöberget. Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Blrna n. så stora som hos första arten; rotst. krypande. — M. arvensis β Wg. M. alpestris Schmidt.*

†† Krona trattlik, med konkavt bräm, föga vidare än det krokhåriga fodret.

\* Blomfodrets flikar vid fruktmognaden hopslutna [slutet fruktfoder].

- 4 *M. arvensis* Hoffm. bladen utdräget aflånga; fruktfod. äggformigt, kortare än skaftet; stiftet mycket kortare än kronpipen. ☉ 6—9, b. blr. Fig. Reich.t.1323.f.1. H.N. f.10, n:o 13.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.: Norm.) *Större än de följ., som jemte denna hafva mycket mindre, och mer konkavt kronbräm än de föreg.; rotst. kort, snart öfvergående i trädar. — M. intermedia Link.*

- 5 *M. stricta* Link: fruktfodr. äggformigt lancettlikt, upprätt, n. oskafadt, slutl. i utdragna uppräta klasar; kronans pip kortare än fodret; stift som föreg. ☉ 4, 5, b. blr. Fig. Fl.D.2285, a. Reich.t.1324.f.2. H.N.f.1, n:o 13.  
Torra back. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Pit. Lpm. — N.) *2—4 tum hög; grenarne ända ned blombedäckta, ofta med blad vid de nedersta blrna. — M. arvensis. Reich. i Sturm.*

- 6 *M. versicolor* Sm. fruktfodret aflångt, i öfrigt som föreg.; kronans pip längre än fo-

dret; stiftet *längre än* kronpipen. ☉ 5—7. Fig. FLD.583, högra fig.; 2285, b. Reich.t.1325.f.1. H.N.f.1, n:o 12.

Torra st. sand etc. (Sk.—ÖG. och VG. Boh. Öl. Gottl. Visby enl. Leffl. — N. Christiansand?) *Liknar föreg., men har blrna mer samlade åt den öfre mycket inrullade delen af grenarne, hvilka nertill äro bara; blr i början med gull, sedan blåaktigt bräm. — M. stricta β Wg.*

\*\* Blomfodrets flikar vid fruktmogn. åtskiljda [öppet fruktfoder].

7 *M. hispida* Schlecht. blomklasarne utstående, glesblommiga; fruktfodr. äggformigt, på uppböjda *skaft af omkr. fodrets längd*; stift. mycket kortare än kronpipen. ☉ 4, 5, b. blr. Fig. FLD.2284. Reich.t.1323.f.2 och 3. H.N.f.1, n:o 11.

Tor. back. (Sk.—Uppl. Vestml. och Verml. Herjed. i Vämdalen. Öl. — N.) 3—6 tum hög, mycket spenslig, torr bräcklig, särd. blomskafren; blrna mycket små, i början rödaktiga, aldrig gula. — *M. collina* Reich. *M. arvens. γ Wg.*

## 72. LITHOSPERMUM Lin. Sminkrot, Stenfrö.

1 *L. officinale* L. bladen lancettlika, tilltryckt håriga, *fjådernerviga*; blomfodr. af *kronpipens längd*; smånött. släta, glänsande. 2 6, 7, hvitgul. blr. Fig. Sv.B.177. FL.D.1084.

Torra st. särdeles nära hafvet, r. (Sk. Blek. Sölvitsborg. Smål. Grenna. — Gefes yttre skär. Öar i Mälaren. VG. Kinnekulle. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. Porsgrund; Christiansand etc. uppåt Gudbrandsdalen och Bergen. Nordl. Solö m. fl. st. i Bejeren: Norm.) *Smånötterna benhvita. Roten stark, mörkröd eller brun.*

2 *L. arvense* L. bladen aflånga med något utstående hår och *enkel ryggnerv*; blomfodr. *längre än* kronpipen; smånött. *ojemna på ytan*. ☉ 5, 6. — *β cæruleum*: blommorna blå. Fig. Sv.B.386. FLD.456.

Åkerrenar, a. (Sk.—södr. Lpm. — N. — *β ÖG.* Kärna sn etc. Stockh. nya Kyrkogården. Öland. Gottl. lilla Carlsön.) *Blommorna vanl. hvita; nötterna mörkgrå; roten utanpå röd. — Rhytispermum Lk.*

## 73. STENHAMMARIA Reich. Fjärva.

1 *S. maritima* Reich. bladen elliptiska — omv. äggrunda, köttiga. 2 6, 7, ljusbl. blr. Fig. FLD.25. H.N.f.5, n:o 5.

Vestra hafskust. r. (Boh. Haleskär i Askim; Kålon i Quille; Otterön, Pinnö ymn. Musön, Lindön, samt Furaby strand n. om Grebbestad i Tanum; Arholmen och Nordkoster i Kärnö sn. Strömstad m. fl. st. — N. flerstädes, ända till Ost-Finnm.) *Nedliggande, mycket grenig, blåaktig växt. — Pulmonaria L. Lithospermum Lehm. Mertensia Don. Hippoglossum Ed.4.*

## 74. PULMONARIA Lin. Lungört.

1 *P. officinalis* L. rotbladen *äggrundt hjertlika*, nedlöpande på skaftet; stjelkladen äggrundt lancettlika, de nedre med bredkantade skaft; de öfre halftomfattande, alla *stråfhåriga*. 2 5, 6. Fig. Sv.B.135. FLD.482.

Skuggiga lund. (Sk.—Helsl. Vestml. Hall. Öl. Gottl.?) *Rotbladen utväxa efteråt och blifva stora, mer och mindre hjertlika; blrna straxt de utslå röda, äldre blå.*

2 *P. angustifolia* L. rotbladen *lancettlika*, afsmalnande till skaft; stjelkladen lancettlika halftomfattande, alla *mjukhåriga*. 2 5, 6. — *β oblongata*: rotbladen bredare, aflångt lancettlika. Fig. Sv.B.544. FLD.2344. H.N.f.1, n:o 14. Reich.t.1319.f.1 och 2; *β f.3.* FLD.483.

Lund. backar, r. (Sk. ford. flerstädes; i sednare tider knappt annorstädes än vid Refen i Svedala sn: F. Aresch. Smål. Ljungbyholm; Kranklösaholm etc.; Ålseda. VG. Åsaka och Sandhem snr; på Mösse- och Älleberg; Gäddeberg nära Gredby gästg.; Hafstena ångar vid Billingen; Skara Djurgård. — *β Smål.* Braås nära Nottebäck, bland ljun i en torr björkskog.) *Blr som hos föreg. art. — P. azurea Bess.*

## 75. ECHIUUM Lin. Blåkunt.

1 *E. vulgare* L. mycket stråfhårig, håren med värtlik bas; bladen lancettlika, de öfre smalare; sidoaxen korta närsittande, bildande ett sammansatt ax; ståndarne utskjutande ur kronan. 2 7, 8. Fig. Sv.B.274. FLD.445.

Torra st. åkr. (Sk.—VB. *Jemtl.* Refsund och Sundsjö. *Dal. Öl. Gottl.* Sällsyntare norr om Mälaren. — N.) *Alnshög enkel, med ett långt ax af himmelsblå, säll. hv. blr.*

## 76. CYNOGLOSSUM Lin. Munkfnat.

- 1 C. *officinale* L. bladen bredt lancettlika, något vågiga, tilltryckt mjukt grålundna; ståndarne inneslutna i kronpipen.  $\gg$  6—8. —  $\beta$  *bicolor*: kronan hvit med röda mynningknölar. Fig. Sv.B.302. F.I.D.1147.

Vid vågar och byar, a. (Sk.—Gestr. omkring torp vid sjön Trösken. *Helsl.* Bollnäs och vid Hedvigsfors: *Wistr. Dal. Verml.* sydöst. delen. *Boh.* Qville sn. *Hall. Öl. Gottl.* — N. Christiania etc. —  $\beta$  *Smål.* Kalmar. *Öl.* Glömminge och Borgholm. — N. Christiania.) *Blrna först röda, sedan violetta.*

## 77. ECHINOSPÉRMUM Swartz. Piggfrö.

- 1 E. *Lappula* Lehm. bladen aflångt lancettlika — n. jemnbreda, hårbräddade; fruktskaften ganska korta *upprätta*; smånött. *med tvenne rader taggar* i kanterna.  $\odot$  7, b. blr. —  $\beta$  *squarrosu*: hög, med stor samling af bägligt utböjda blomklasar. Fig. F.I.D.692. Reich.t.1329,f.2. H.N.f.9, n:o 10.

Torra st. vid byar. (Sk.—Uppl. *Helsl.* Söderhamn, vid Långrör. *Vestml. Ner. VG. Boh. Hall.* Hasslöf. *Öl. Gottl.* — N.) *Stjelken vanl. endast högt upp förgrenad. — Myosotis L. Rochelia Röm.*

- 2 E. *deflexum* Lehm. bladen som hos föreg., men vanl. *spetsigare*; fruktskaften *nedböjda*, de nedre med skärm: smånött. *med en enkel rad taggar*.  $\gg$  7, 8, b. blr. Fig. Vet.Ak.H.1810,t.4. F.I.D.1568. Reich.t.1329,f.1. H.N.f.9, n:o 9.

Fjell- och bergstrakt. r. (*Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Aktsik vid Laidaure: H. Widm. *Pit. Lpm.* Istjakk etc. *Jemtl.* vid Portfjellet; Fogel- och Carlberget i Frostviken. *Herjed.* Funnesdalsberget och Ullsberget. *Medelp.* Randklöfven. *Smål.* Taberg: J. E. Zett. — N. Ost-Finnm. Nordvaranger, vid Flintenæsen: Norm.; samt från Älten ned till Christiansand.) *Liknar Myosotis arvens.*, men *är större. Stj. långt ned, ofta ända från rothalsen förgrenad. — Myosotis Wg.*

## 78. ASPERÜGO Lin. Rifva.

- 1 A. *procumbens* L. stjelken slak och snärjande; bl. aflånga, i kanten småtaggiga; blrna oskaftade i bladveckan.  $\odot$  5, 6, b. blr. Fig. F.I.D.552.

Od. st. till hus etc. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Ofta alnslång och grenig.*

- 11 Fam. LABIATÆ Juss. Krona oregelbunden [oftast läppformig]. Stånd. 4, säll. 2. Fruk. af 4 smånötter, med ett gemensamt, i spetsen 2klufvet stift.

- 1 Floken *Menthesæ*. Kronan trattlik med 4—5 olikstora, men mindre olikformiga flikar.

## 79. ELSHOLTZIA Willd. Kryddmynta.

- † 1 E. *cristata* W. bladen skaftade eggrunda och sågade; axen ensidiga.  $\odot$  7, 8. Fig. F.I.D.2652. H.N.f.5, n:o 8.

Förvild. på odl. st. r. (Sk. vest. del. t. ex. Lyby; Vest. Tveet i Hällesta sn m. fl. st.; samt närgränsande delar af *Smål.* och *Hall.* t. ex. vid Karups gästg. i gropar vid landsvägen. *Södm. Stockh.* vid Rålambshof, samt på Södermalm. *Verml.* i trädg. i Carlstad. *Gottl.* nära Bro kyrka: G. v. Ced.) *Ört med stark lukt, små rödaktigt hvita blr.*

## 80. MENTHA Lin. Mynta.

† Blomkransarne närmade i utdragna, bladlösa ax.

- 1 M. *silvestris* L. bladen n. oskaftade, lancettlika—bredt äggrunda, spetsiga hvass-sågade, *under grålundna*; axen täta, nedtill något gieskransade, smålundna; kronan *luden*.  $\gg$  8, 9, ljusr. blr. —  $\beta$  *latissima*: bladen hjertlikt ovala, föga ludna. Fig. F.I.D.1932. Reich.t.1283 och 4. H.N.f.9, n:o 11;  $\beta$  f.1, n:o 18.

Fukt. st. r. (Sk. här och der. *Smål.* i Misterhultsskären. *ÖG.* Omberg; Hageby nära Skenninge; Odenfors: Kindb. *Öl.* i bäcken vid öfra Sandby i Bredsåtra sn; Åhs sn i Ottenby. *Gottl.* Klinte sn, i Mölnareång; Stenkyrka sn enl. Lemf. Stundom förvildad i bondtäppor ända till Uppl. Roslag. Rånäs. —  $\beta$  *Sk.* Vadmöllan i Hostad.)  $\beta$  *M. nemorosa* W. enligt bladformen; *Tyska ex.* hafva dock mer ovala och under gråhuden blad.

+2 *M. viridis* L. bladen n. oskaftade, lancettlika, n. glatta; axen mindre tätta, af mer skilda kransar; kronan glatt. 2 $\frac{1}{2}$  8, ljusr. blr. Fig. Fl.D.1876. Reich.t.1284.f.1. H.N. f.7, n:o 9.A.

Fukt st. r. (Sk. Ousbyholm, Skartofta, N. Vram etc. *Smål.* Misterhult på tomter vid Hökhult; Loftahammar; samt i Madesjö och Urshult enl. Scheutz. *ÖG.* nära Gusum, och vid Malma qvarn i V. Ryd enl. Kindb. *Öl.* Glömminge surbrunn. *Gottl.* Visby enl. Lemf. Ursprungl. odlad.) Bladen på båda sidor gröna. Anses af flere förf. som var. af föreg.

†† Blomkransarne i bladveckan ell. närmade i hufvud. \*)

3 *M. gentilis* L. alltid med blomlösa toppblad; stjelkbladen något skaftade, äggrunda—lancettl., mer och mindre håriga, sågade; blrna *kransvisa* i bladveckan, yngre *gråhuden*; blomskafsten och kronan n. glatta; fodr. n. klocklikt, icke veckigt, kådprickigt och isynnerhet upptill hårigt, med *syllika* tänder. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8, gred. blr. —  $\alpha$  *Agardhiana* Fr. bl. äggrunda, med utstående sågtänder; toppbl. större; blomkrans. mer åtskilda. —  $\beta$  *glabrata*: mera glatt; bl. lancettl. med mera framåtriktade sågtänder; toppbl. små; blomkrans. mer tattsittande. Fig.  $\alpha$  Fl.D.2655. H.N.f.4,n:o17; f.6, n:o 13;  $\beta$  f.12, n:o 32.

Fukt. odl. st., bondtäppor, r. (Sk.—Södm. och Ner. *Helsk.* Skog sn. *Jemt.* Frösön. *Verm.* Boh. *Öl.* Kastlösa prestg.: Sjöstr. *Gottl.* — N. Slidre; Suledal etc. —  $\beta$  *Sk.* flerst. *Smål.* söd. del. och *Öl.* enl. Wg. Fl. Su.) Bladskafsten alltid korta, upptill, särđ. hos  $\beta$ , n. inga; de nedre säll.  $\frac{1}{2}$  tum; blomkrans. skul. något skaftade. — *M. sativa* ed. 5. *M. Agardhiana* Fr. H.N.f.4. *M. gentilis*  $\beta$  verticill. *Aresch.*;  $\beta$  *M. pratensis* ed. 9. *M. rubra* Fr. S.V.Sc. *M. gentilis*  $\alpha$  subspicata *Aresch.*

4 *M. aquatica* L. bladen skaftade, bredt äggrunda—afånga, sågade, med vanl. framåtriktade sågtänder; blrna i hufvud i stj. spets ell. *kransvisa* i bladveckan, yngre icke *gråhuden*; blomskafst. och kronan *gleshåriga*; fodr. n. rörformigt, upptill något vidgadt, veckigt, kådprickigt och mest nedtill hårigt, med n. *syllika* tänder. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8, blå blr. —  $\alpha$  *capitata* Fr. utan toppblad; blrna i hufvud, med små, af blrna skylda skärmb. —  $\beta$  *subspicata* F. *Aresch.* med små ell. inga toppbl.; blomkrans. något tattsittande, stödda af vanl. oskaftade, uppåt allt smärre skärmb. —  $\gamma$  *verticillata* Roth: alltid med toppbl.; blomkrans. glest sittande, stödda af större, tydl. skaftade blad. Fig.  $\alpha$  Fl.D.638. H.N.f.2, n:o 25; f.4, n:o 16 [glatt form].  $\gamma$  H.N.f.2, n:o 26.

Stränd., fukt. st. (Sk.—*Gestr.* *Helsk.* Enånger. *Angml.* Vestml. Baggå i Skinnskatteberg. Ner. *Verm.* i bergsl. VG. Boh. Hall. *Öl.* *Gottl.* — N.) Blomfodr. n. alltid färgadt. Varierar i hög grad från n. glatt med köttiga bl. på hafsstränder: var. *litoralis* ed. 9 ell. odorata Fr., till tät luden: var. *villosa* ed. 9; samt från 1 till 3 fots höjd;  $\gamma$ , som oftare träffas i det inre af landet vid sött vatten, är vanl. mest storväxt. — *M. hirsuta* E. B. *Origanum vulgare* Fl.D.;  $\gamma$  *M. Agardhiana* ed. 9. *M. sativa* Fr.

5 *M. arvensis* L. alltid med blomlösa toppbl.; stjelkbl. skaftade, äggr.—lancettl.; blrna *kransvisa* i bladveckan; fodr. klocklikt, icke veckigt, med korta, bredt äggrunda tänder, jemte skafstet meränd. hårigt. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8, rödbl. blr. —  $\beta$  *glabrata*: bela växten vanl. rödaktigt anlupen; blomskafsten och de äggrunda bladen n. glatta. —  $\gamma$  *lapponica*: örten grön; blskafsten och de lancettl. bladen som  $\beta$ . Fig. Sv.B.279. Fl.D. 512.  $\beta$  H.N.f.2, n:o 27.  $\gamma$  Wg.Fl.L.t.10.

\*) Vid framställningen af hithörande arter har utg. så mycket mindre tvekat att hufvud sakl. följa F. *Aresch.* och Lange, som deras forskningar till fullo bekräftat giltigheten af de tvifvelsmål rörande *M. pratensis* och *M. Agardhiana* ed. 9 arträtt, samt de antydningar om dessa formers släktskap (den enas med *M. gentilis*, och den andras med *M. aquatica*), hvilka redan i flere föreg. upplagor (från och med den 5:te) blifvit uttalade.

\**agrestis* Sole: luden: bladen bredt, n. hjertlikt äggrunda, med grofva, mer utstående sågtänder. Fig. E.B.2120.

Stränd. och fukt. st. a. (Sk.—söd. Lpm. — N. — γ Um. Lpm. Jemtl. — \*Blek. Aspö. Sk. Helsingborg etc.) Fodertländ. minst lika breda som långa, då hos begge de föreg. arterna längden är mycket större än bredden. Vanl. mjuk och hårig; β mera glatt, stel och violett anlupen. \*har n. 2 tum breda blad, med söga större längd, små blr i gråludna kransar. — β var. *riparia* Fr. γ *M. lapponica* Wg.

### 81. LYCOPUS Lin. Strandklo.

1 *L. europæus* L. bladen aflånga, inskuret sågade ell. parklufna, något håriga, med mest hela flikar. 2 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.262. Fl.D.1081.

Stränd. fukt. st. (Sk.—Hels. och Dal. Boh. Öl. Götth. — N. till Trondhj.) Blrna små kranvisa. Var. mer och mindre hårig, samt med vid basen pardelade blad: β *subpinnata* Blytt.

2 Flocken **Monardese.** Kronan 2läppig, med 2 ståndare.

### 82. SALVIA Lin.

1 *S. pratensis* L. bladen aflångt hjertlika, groft dubbelnaggade, de öfversta stjelkomfattande; blomkransarne omkring 6blommiga; kronans öfre läpp båglikt böjd, klibbig, längre än den nedre. 2 6, 7, b. blr. Fig. Sv.B.667. H.N.f.3, n:o 10.

Äng. täppor vid gårdarne, r. (Uppl. Uppsala bortåt Slafsta; Högstabro i Bälänge; Vendel sn, vid Grytby och Karby, samt Mensta by.) Ofta alnshög med tumslånga blr.

3 Flocken **Saturejineæ.** Kronan 2läppig med platta läppar. Stånd. 4, åtskilda och stående från hvarandra.

### 83. ORIGANUM Lin. Konig.

1 *O. vulgare* L. bladen äggrunda; blomskärmen ovala, något längre än fodret; blomqvasten upprepad 3grenig, med gytttrade småknippen. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.188. Fl.D.1581.

Lund. ängsback. (Sk.—Gestr. Hels. Iggesund: Wistr. Jemtl. Fogelberget i Frostviken. Vestml. Verm. Boh. Öl. Götth. — N. till Nordl.) Stjelken 1—1½ fot hög med rik blomsamling, violett af de färgade skärmen; var. i Nyköpingsskären med n. hvita blr och gröna skärm.

### 84. THYMUS Lin. Timjan.

1 *T. Serpyllum* L. stjelken nedliggande, öfverallt ånluden; bladen ovala—jemnbreda n. oskaftade, hårbräddade; blrna i hufvud. 2 6—8, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.320. Fl.D.1165. H.N.f.5, n:o 7.

Sandback. hedar, a. (Sk.—Gestr. Ockelbostigen. Hels. Voxna bruk; Hanebo sn: Wistr. Medelp. Sundsvall. Ängml. Nora sn; Nätra och Själevad m. fl. st. VB. Harskär nära Umeå enl. G. v. Ced. Dal. till Furudal. Verm. sydöst. delen. Dalsl. Öl. Götth. — N. mest närmare Sv. gränsen.) Bladen vanl. aflånga, stund. mycket smala, mer upphöjdt nerviga än hos följ. med mindre tydligt skaft. En form med breda ovala blad sammanbinder dock båda arterna.

2 *T. Chamædrys* Fr. stjelken uppstigande, längs kanterna småluden; bladen äggrunda platta, med tydligt skaft, icke ell. blott vid basen hårbräddade; blrna i hufvud. 2 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.2237. H.N.f.5, n:o 6.

Back. skog. r. (Sk. vid Tjörndala i öst. del. [nu trol. utgången: F. Aresch.]. Blek. Smål. vid Bleks gräns; Wexiötrakten: Scheutz; Algutsboda; Kalmar; Vestervik vid Grantorpet. ÖG. Skrukarp i Krigsberg enl. Kindb. Södm. Säfstaholm och Åkerö; Tullgarn: C. Ind. Stockh. Vermdön, vid södra Stäket och Bo egor. Ängml. Bondsjö i Säbrå: Arn. Boh. Oroust och Koster enl. Leffl. — N. Christiania upp till Gudbrandsdalen, Helgeland etc.) Till de flesta delar större än föreg.; bladen, särdeles de nedre, med tydligt skaft. Är utomlands, likasom i N., allmännare än föreg.

### 85. CALAMINTHA Mönch. Har-timjan.

1 *C. Acinos* Clairv. bladen äggrunda ell. ovala, glest sågade; blr i åtskilda kransar.

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

- ⊙ 2, 7, 8, viol. blr. — *β perennans*: mindre, men mera varaktig, med hv. blr. Fig. Fl.D.814.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Stadsberget i Ragunda sn. Um. Lpm. — N. till Trondhj. Levangerneset och Værdalsören. — *β Gottl.* Visby kalkugn; Thorsborgens; Gejrungs i Ruthe.) Vanl. upprät. — *Thymus L. Acinos vulgaris Pers.*

#### 86. CLINOPODIUM Lin. Dosta.

- 1 *C. vulgare L.* Stjelken meränd. enkel; bladen äggrunda, glest smånaggade, håriga; blomskärmen borstlika. 2, 8, r. blr. Fig. Sv.B.441. Fl.D.930.  
Ångsback. (Sk.—Helsl. Vestml. och Verml. Boh. Tanum. Hall. Öl. Gottl. — N.)  
2—3 quart. hög.

- 4 Flocken *Scutellariææ*. Kronan 2läppig, med 4 parallela stånd. under den öfre läppen. Fruktfodret plattadt tillslutet.

#### 87. SCUTELLARIA Lin. Frossört.

- 1 *S. galericulata L.* bladen från bredare, n. hjertlik bas lancettlika, glest naggsågade; blrna parvisa i bladvecken. 2, 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.437. Fl.D.637.  
Vid vatten bland sten. a. (Sk.—Pit. Lpm. Torn. Lpm. vid Tornioträsk. — N. till söd. Finnm.: Norm.) Blrna  $\frac{1}{2}$  t. långa, kortare än bladen. Blir stundom på hösten grenig, med blrna mer närmade i likhet med följ., de öfversta då längre än skärmladen.

- 2 *S. hastifolia L.* bladen af ett par korta utstående sidofilkar vid basen n. spjutlika, helbräddade; blrna närmade i ax i toppen, längre än skärml. 2, 7, viol. blr. Fig. Fl.D.1822. H.N.f.4, n:o 13.

Sten. stränd. i synn. hafsstr. r. (Blek.—Rosl. Hargs skärgård. Södm. Uppl. och Vestml. vid Mälarens stränd. Hall. vid Sperlingsholm: Fr. Fl. Hall. Öl. Gottl.)  
Bladen aflånga—äggrunda med tvärhuggen bas.

#### 88. PRUNELLA Lin. Brunört.

- 1 *P. vulgaris L.* bladen aflångt äggrunda, vid basen meränd. tandade; blomfodrets öfre läpp tvärhuggen med 3, vid basen åtskilda tänder. 2, 7, 8, blå, säll. hv. blr. — *β parviflora*: kronan föga längre än fodret, hvit, med glatt öfre läpp, ljusröda ståndarknappar. Fig. Fl.D.910.

Betesm. a. (Sk.—Lul. Lpm. — N. till Finnm. Tromsøe.) Blrna vanl. 3 lin. långa; öfre foderläppens tänder nå icke hvarandra med basen.

- 2 *P. grandiflora L.* bladen som hos föreg.; fodrets öfre läpp hvasst inskuren i 3, med basen sammanstötande, syllika flskar. 2, 7. Fig. Fl.D.1933. H.N.f.4, n:o 14.

Betesm. r. (VG. Allebergsända; Åsaka i Vartofta h:d; Kinnekulle, Österplana vall enl. Lefm. Öl. Gottl.) Stjelken mer upprät, blrna dubbelt större än hos föreg., viol. stundom hv. — *P. vulg. β grandiflora L.Sp.Pl.*

- 5 Flocken *Nepetææ*. Kronan 2läpp. Stånd. som hos föreg. flock, de öfre längre än de nedre. Fodret icke plattadt.

#### 89. NÉPETA Lin. Katmynta.

- 1 *N. Cataria L.* bladen skaftade, hjertlika grofsågade, under jemte stjelken fint grålundna; blomkransarne i ax, sammansatta af blomknippen på korta skaft. 2, 7. Fig. Sv.B.410. Fl.D.580.

Byar etc. (Sk.—Uppl. Vestml. Verml. Boh. Kuseröd och Lindö i Tanum. Hall. Öl. Gottl. — Södra Norge.) Stjelken alnshög, upprät och grenig. Blrna hvita, inuti rödprickiga, med stark lukt.

#### 90. GLECHOMA Lin. Jordrefva.

- 1 *G. hederacea L.* bladen rundadt hjertlika, n. glatta; foderlängderna äggrunda uddspetsiga. 2, 4, 5, b. blr. — *β grandiflora*: blrna mycket större ( $\frac{1}{2}$  t.), mer mörkblå. Fig.Sv.B.183. Fl.D.789. *β* H.N.f.11, n:o 19.

Torra, *β* fukt. st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. — N. till Finnm.) Krypande med långa grenar från rotstocken. Blrna i 6blomm. kransar; de nedre bladen njurlika.

91. DRACOCÉPHALUM *Lin.* Drakblomma.

- 1 *D. Ruyschiana* *L.* bladen *jembreda* ell. smalt lancettlika, något trubbiga, jemte de *aggrunda* spetsade blomskärmen *helbräddade*; blrna i *kort ax*; kronan 2—3 *gr längre* än fodret. 24 7, viol. blr. Fig. Fl.D.121. H.N.f.4, n:o 15.  
 Äng. r. (*Smål. Hvetlanda i Huleång [fordom]*), samt Uplanda: Scheutz; Köpstad i Vrigstad sn; Germunderyd i Alsheda sn. *VG.* Älle- och Mösseberg; Gisseberg; Åsaka i Vartofta härad; Hållstad sn. *ÖG.* i Thorstorps äng vid Drothems prestgård, samt Björsåters äng nära Skinnmyran m. fl. st. nära Söderköp. *Vestml.* i Storängen och vid Hjortsberga nära Vesterås. — *N. Christiania*; Ringerige vid Gårdshagen; Hadeland; Slidre i Valdres; omkring Mjösen upp till Toten och Dovre.) *Blrna i tum långa.*
- †2 *D. thymiflorum* *L.* bladen *aggrunda*—*aflånga*, *sågade*; blrna *kransvisa* i bladveckan, uppåt närmade i *ax*, med *aflånga* helbräddade skärm; kronan *föga* längre än fodret. 5, 6, b. blr. Fig. H.N.f.3, n:r 11.  
 Torftak, vägrenar etc. r. (*Uppl. Uppsala*, förvildad i Svartbäcken och vid Rickomberga; Löfstå bruk. *Stockh.* vid Carolinska Instit., Observatoriibacken etc. *Hall.* Karup, vid vägen upp åt Hallandsås: Theor.)
- 6 Flocken *Stachydese*. De öfre ståndarne kortare än de nedre, för öfr. som föreg. flock.

92. BALLÖTA *Lin.* Bonässla.

- 1 *B. ruderalis* *Sw.* bladen bredt ell. hjertlikt *aggrunda*, grofsågade; blomfodrets tänder utdraget *aggrunda*, långt sylspetsade. 24 7, 8, röd. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.389. Fl.D. 1702. H.N.f.7, n:o 7.  
 Byar. (*Sk.*—*ÖG.* *Stockh.* *VG.* Halle- och Hunneberg. *Boh.* Kongelf. *Hall.* Öl. och *Gottl.* allm. — *N. Christiania*.) *Fodertänderna utdragna i en, ofta öfver en linie lång, udd; bladen stundom njurlika. Varierar mer och mindre luden.* — *B. nigra* *L.f.Su.* och *Herb.*

93. BETONICA *Lin.* Humlesuga.

- 1 *B. officinalis* *L.* bladen hjertlikt *aflånga*, groft trubbsågade; blomkrans. närmade till ett ax; fodertänderna uddspetsiga. 24 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.284. Fl.D.726. H.N.f.2, n:o 23.  
 Skogsmark, r. (*Sk.* Bosarp och Torrlösa snr flerst.; Stehag; Ramstorp; Trollenäs i Fastorps sn. På öfr. ställen numera utgången enl. F. Åresch.) *Blrna alldeles utan skaft, nedersta kransen vanligen fränskild i öfversta bladveckel. Blomkronorna utvändigst hvilludna.* — *B. stricta* *Ait.*

94. LEONORUS *Lin.* Hjertstilla.

- 1 *L. Cardiaca* *L.* de nedre bladen hjertlika, de öfre vigglika, alla handflikiga, något grofsågade; blomkrans. i långa ax. 24 7, 8. Fig. Sv.B.195. Fl.D.727 och 1756.  
 Byar, väg. a. (*Sk.*—*Gestr.* och *Dal.* Husby sn, Kyrkbyn och Klosters bruk. *Verm.* *Boh.* Tanum sn, Grebbestad. *Hall.* Öl. *Gottl.* — *N.*) *Blomkron. ludna, hvita, inuti rödprickiga.*

95. STACHYS *Lin.* Syska.

† Kron. långt utskjutande ur fodret.

- 1 *S. silvatica* *L.* bladen *långt skaftade*, *bredt hjertlika spetsiga*; blomkrans. 6blommiga. 24 7, 8, mörkröda blr. Fig. Sv.B.578. Fl.D.1102.  
 Lund etc. (*Sk.*—*Ängml.* och *Jeml.* *Boh.* Öl. *Gottl.* — *N.* till söd. Finn.: Norm.) *Älnshög och derutöfver; bladen stora och tunna, grofsågade, med rundade, uddspetsiga sågtänder.*
- \*2 *S. ambigua* *Sm.* bladen *kort skaftade*, *lancettlikt aflånga*, med hjertlik bas; skärmbli. smalt lancettl.; blomkrans. 6blomm. 24 8, 9, mörkr. blr. Fig. Fl.D.1877. Reich. t.1215.  
 Od. st. r. (*N.* Gudbrandsdalen, mell. Stav och Rörvig; mell. Elstad och Lössnæs; ½ mil n. om Lillehammer. Lundervig vid Egelandsfjorden. Bergens st. Skall äfven

vara funnen i Sv.) *Synes vara en hybrid form af föreg. och följ.; närmar sig den förra uti blomningen, den sednare i bladformen.* — *S. palustri-silvatica Schiede.*

- 3 *S. palustris* L. bladen oskaftade ell. ganska kort skaftade, jemnbredt lancettlika, med hjertlik bas; skärmb. äggrundt lancettl.; blomkrans. 6blomm. 2 8, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.431. Fl.D.1103.

Fukt. st. och åkr. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Salten.) *Äls-hög och mera, med småsågade blad; i åkrar dubbelt lägre, mer gråhuden.*

†† Kron. knappt utskjutande.

- 4 *S. arvensis* L. stj. stråfhårig; bladen skaftade äggrunda med hjertlik bas, trubbiga, trubbsågade; blomkrans. 4—6blommiga. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.674. Fl.D.587. H.N.f.4, n:o 12.

Sandiga åkrar. r. (Sk. temligen allm., sänd. i n.ö. delen. Hall. söd. del. allm.: Theor.; Varberg; Hvalinge etc. Boh. Uddevalla, ofvan Kuröd. Blek. Gredby, Stiby; samt på Storkö, Senoren och Tjuskö. Smål. Kronob. län, Urshult. Berga nära Kalmar. — N. till Trondhj.) *Kronorna blekt violetta, ell. hvita med rödprickig läpp.*

#### 96. GALEOBDOLOON Huds. Gulsuga.

- 1 *G. luteum* Huds. bladen något hjertligt äggrunda, grofsågade. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1272. H.N.f.2, n:o 24.

Skog. r. (Sk. ymnig. Blek. Listershufvud. Smål. Hulta i Höreda sn enl. Scheutz; Risnäs i Älhem, samt vid Saxtorp och Risinge m. fl. st. i Kristdala sn enl. Ekstr. — N. Bergen.) *Blrna gula med rödfläckig nedre läpp.* — *Galeopsis Galeobd. L. Leonurus Willd.*

#### 97. LAMIAM Lin. Plister.

† Bladen spetsiga.

- 1 *L. album* L. stjelen stråfhårig; bladen skaftade hjertlika, grofsågade; blomkrans. mångblommiga; blomfodrets tänder borstlika. 2 5—9. Fig. Sv.B.55. Fl.D.594.

Byar. a. (Sk.—Uppl. Gefle, på Brobänken. Helsl. Alfta sn: Wistr. Ångml. Dal. Ner. sälls. Dalsl. Änimskog. Boh. Marstrand, på Koön. Hall. allm. i söd. delen: Theor. Öl. Gottl. — N.) *Blrna stora, hvita.*

†† Bladen trubbiga.

- 2 *L. purpureum* L. alla bladen skaftade hjertlika, trubbsågade eller inskurna, de öfre tättsittande; fodertänderna af foderpipens längd ell. längre. ☉ 4—9, r. blr. Fig. Fl.D.523. Reich.t.1204,f.3.

\* *incisum* W. skärmb. flikiga, de öfre med vigglik bas. Fig. Reich.t.1204,f.4. H.N. f.10, n:o 16.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Jemtl. — N. — \*Sk. — Uppl. Vestml. Ner. och Verm. Carlstad och Christinehamn. Öl. Gottl. enl. G. v. Ced.) *L. incisum* W. har ett ganska afvikande utseende och skiljes af alla nya förf., ehuru inga säkra karakterer kunna uppgifvas; dess blad och blomfod. äro vanl. rödaktiga. — *L. confer-tum* Fr. S.V.Sc.

- 3 *L. intermedium* Fr. bladen njurlika, inskuret naggade, de öfre oskaft.; fodertänderna längre än foderpipen. ☉ 4—9, r. blr. Fig. Fl.D.1701. Reich.t.1204,f.1. H.N.f.1, n:o 15.

Åkrar. (Sk.—Gefle. Helsl. Hudiksvall; Norrbo prestg. Ångml. Nylands gästgg. och Gudmundrå sn. Vestml. Ner. Verm. Hall. enl. Theor. Gottl. — N. upp till Sogn-fjorden.) *Har blomning som föreg., blad som följ., men är vanl. mycket gröfre än denna. Fodret något violett. Tänderna vid kronpipens mynning stundom omärkliga.* — *L. purpureum* γ Wg.

- 4 *L. amplexicaule* L. bladen njurlika, inskurna eller djupt tandade, de öfre oskaftade; fodertänderna kortare än foderpipen. ☉ 6—8, r. blr. Fig. Fl.D.752. Reich.t.1204,f.2.

Torra st. a. (Sk.—VB. och Pil. Lpm. Ärfvidsjaur. — N.) *Bladen meränd. ljus-gröna; fodret n. hvitaktigt grönt. Blomkronorna utveckla sig icke alltid ur fo-dren; men, då de utskjuta, blifva de ofta mycket långa, med smal pip.*



## 98. GALEOPSIS Lin. Blindnässla, Dån.

† Stjelken icke uppsvåld under lederna.

- 1 *G. Ladanum* L. stjelken *mjukluden*; bladen äggrunda—lancettlika sågade småhåriga; alla blomkransarne *åtskiljda*; blomkronans öfre läpp tandad. ☉ 7, 8, r. blr. — *β angustifolia*: bladen smala lancettlika. Fig. Fl.D.1757. Reich.t.1228.f.2,3; *β* t.1229.f.1. H.N.f.16, n:o 19.

Odl. ställ. (Sk.—Helsl. Norrbo prostgård; Sanna i Jerfsö: Wistr. *Jeml.* Östersund. *Vestml. Ner. Verm.* Öl. *Gottl.* — N. till Trondhj.) *Blomfodret glandelhårigt; kronans öfre läpp ofta 2flikad.*

- 2 *G. pubescens* Bess. stjelken täckt af mjuka, nedåt tilltryckta hår, endast vid lederna *stråfhårig*; bladen äggrunda; de öfre blomkrans. tättsittande; kronans pip *af fodrets längd* ell. kortare. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Sturm. 62 häft. Reich.t.1230.f.2.

Berg och odl. st. r. (*Smål.* Femsjö sn. Bösseherget och vid Hallaböke; Binga i Hosmo enl. Ekstr. *Stockh.* Lilla Nyckelviken, och Kungshamn. *Uppsala*, vid vägen till Eklundshof. *Vestml.* Malmberga i Carl sn. *Herjed.* Funnesdalsberget. — N. Gudbrandsdalen, vid Elstad, Kringelen och Domaas.) *Skiljd från följ. endast med den mjukludna, jemntjocka stjelken, och är trol. blott en lokalform deraf.*

†† Stjelken tydligt uppsvåld under lederna.

- 3 *G. Tetrahit* L. stjelken *öfverallt stråfhårig*; för öfr. som föreg. ☉ 7, 8. Fig. Fl. D.1271.

\* *bifida* Bönn.: nedre kronläppens mellanflik anhäng urnupen. Fig. Reich.t.1230.f.1.

Berg och odl. st. etc. allm. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.: Norm.) *Blrna vanl. röda på bergiga ställen, blekgula på odl.*

- 4 *G. versicolor* Curt. kronans pip *dubbelt längre än fodret*, med bred hvalflik öfre läpp; för öfr. som föreg. ☉ 7, 8. — *β parviflora*: blrna flere gånger smalare. Fig. Sv.B. 446. Fl.D.929.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finm.) *Blrna stora gula, med purpurfläckig nedre läpp. Denna och föreg. art hybridisera på odl. ställen och sammanflyta; i alla fall föga skiljda. — G. cannabina Roth. G. Tetrahit γ L.*

## 99. MARRUBIUM Lin. Andorn.

- 1 *M. vulgare* L. bladen rundadt äggrunda, skrynkligt ådriga; blomkrans. i bladvecken, mycket tätblommiga; fodertänderna krokuddiga. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1036.

Byar, vägar. (Sk.—Uppl. Sigtuna, Tibble, Enköping etc. *Vestml.* Kärbo. Barkarö, St. Ilan snr. *Ner.* Öar i Hjelmaren. *Boh.* Hall. Öl. *Gottl.* — N. Trondhj. på Stör-dalsuthyden.) *Stjelken och blomkransarne ulliga.*

- 7 Flocken *Bugulæ*. Kronans öfre läpp omärklig ell. liten och 2klufven.

## 100. TEUCRIUM Lin. Löksuga.

- 1 *T. Scordium* L. bladen *oskaftade, aflånga*, groft trubbsågade, mot basen helbräddade; blrna parvisa i *bladvecken*, skaftade; fodret *föga olikformigt* standadt. 2 7, 8, röd-viol. blr. Fig. Sv.B.255. Fl.D.593. H.N.f.1, n:o 17.

Fukt. st. r. (Sk. mångenst. i söd, och sydv. del. t. ex. vid Lomma, Alnarp. Malmö, Hvellinge, Trelleborg, Käseberga mosse etc. enl. F. Aresch. ÖG. mell. Vadstena och Lankarebron, samt vid V. Staby: Kindb. Öl. allmän. *Gottl.* s. om Vishy; Slite, Roma, Gothemsån etc.) *Stjelken uppböjd mjukhårig, nedtill med grenskott och bi-rötter.*

- \*2 *T. Scorodonia* L. bladen *skaftade, hjertlika* trubbiga sågade; blrna parvisa i *ensidiga klasar*, med njurlikt rundade skärmbblad; fodret *2läppigt*. 2 7. Fig. Fl.D.485. H.N.f.10, n:o 15.

Skogshack. r. (N. Christiansand; Mandal; Lindesnäs på Nyrnäs och Tronäs; Fleckesfjord och Lene i Lister.) 2—3 quart. hög, upprät, med gulakt. ell. grönhvita blr.

## 101. AJUGA Lin. Blåsuga.

- 1 *A. reptans* L. n. *glatt* ell. upptill småluden, med *långa krypande* grenskott; bl. omv. äggrunda, de nedre större, bugtandade; de öfre *föga längre än blrna*; blomkran-

- sarne närsittande, 6—10blommiga. 2½ 5, 6, b. blr. — *β radicans*: grenskotten rotslående. Fig. Fl.D.925. Reich.t.1234,f.3. H.N.f.9, n:o 13.
- Fukt. st. i skugga. r. (Sk. Fogelsång nära Lund; Tjutehed nära Hässlunda; mell. Billinge och Gunnaröd m. fl. st. enl. F. Aresch. *Blek*. Ronneby, vid Rönninge; Skärfva nära Carlskrona. *Smål*. Gränsö: Scheutz; Kalmar, i parken vid Lindsberg, samt vid Sandås; Vestervik, Grantorpet. *Hall*. Hallandsås: Theor. *Gottk*. vid Visby; Ljugarn enl. G. v. Ced. — *N. Christiania*: Norm. enl. Ax. Bl. — *β Boh*. Styrös, och Koön flerstädes. *Blek*. Rönninge enl. Gosselm.) *β A. alpina* Fr. S.V.Sc.
- 2 *A. pyramidalis* L. hårig, säll. med små grenskott; bl. som hos föreg., de nedersta störst, de öfre mindre, alla mycket längre än blrna; bl.krans. 6blommiga. 2½ 5, 6, b. blr. — *β glabrata*: nära glatt; stjelen stundom med helt korta grenskott. Fig. Sv.B.225. Fl.D.185. H.N.f.12, n:o 34; *β* f.15, n:o 20.
- Skuggiga hagar, a. (Sk.—VB. och Um. Lpm. — *N.* till Finnm. Tromsøe. — *β Blek*. Lyckeby, Wedeby; Ronneby m. fl. st. enl. Gosselm. *Smål*. Säfsjö jernv.station och Vrigstad: Scheutz. VG. Göteborg, nära Landala enl. Leml. — *N. Christiansand*.) *Quartershög*, genom de 4-sidigt fästade, nedtill större och uppåt allt mindre bladen, pyramidlik. Nära ublommade ex. få bladen mer skiljda, och, då rotbladen stull. bortvissna, blir växten något lik föreg., men saknar de långa grenskotten.
- 3 *A. genevensis* L. hårig, alltid utan grenskott; bladen aflånga—ägrunda, bugtigt groftandade, de öfre kortare än blrna; blomkrans. 8—10blomm., närmade till axform. 2½ 6, 7. Fig. Fl.D.1703. Reich.t.1234,f.1. H.N.f.1, n:o 16.
- Torra st. kribback. r. (Sk. Malmö vid Limhamn och på spridda st. derifrån ned mot Trelleborg enl. F. Aresch.) *Blrna mer i axform än hos de föreg., lifligt blå, med mycket större bräm.* — *A. alpina* Lin. Herb. samt Fr. Nov.

- 12 Fam. MENYANTHÆ Mart. Krona regelhunden, 5flikig, med 5 ståndare. Fröhus enrummigt, af 2 skal, med fröfästen längs efter dessas midt.

102. MENYANTHES Lin. Vattenklöfver, Bläcken.

- 1 *M. trifoliata* L. bladen 3fingrade, med bredt aflånga—omv. äggr. småbl. 2½ 6. — *β paradoxa*: kronan delad till basen, föga hårig. Fig. Sv.B.22. Fl.D.541.
- Kärr, a. Sk.—Lpl. — *N.* — *β* Sk. Lund. *Smål*. Kalmar, Tegelbrukskärren; Almä i Femsjö sn. ÖG. Vadstena i Ladugårdsängen.) *Blrna i klase, med inuti hvit, utv. röd krona.*

- 13 Fam. POLEMONIACEÆ Juss. Krona och stånd. som föreg. fam. Fröhus 3skalligt, 3rummigt, med centrala fröfästen.

103. POLEMONIUM Lin. Blågull.

- 1 *P. cæruleum* L. stjelen vanl. mångbladig, nedtill n. glatt, upptill småluden; bladen parbladiga, med lancettlika—ägrundt lancettl., spetsiga småbl.; blomsaml. mer och mindre tät. 2½ 6, 7, b. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.309. Fl.D.255.
- \* *campanulatum* Th. Fr. småbl. färre och glesare; blomsaml. enklare, mer fåblomm.; kronan klocklik, med något spetsade flikar. Fig. H.N.f.16, n:o 17.
- Äng. särd. i fjelltr. r. (Lpl.—Herjed. Ängml. och Medelp. Helsl. Mällungsstuga i Älfta sn: Wistr. Nedåt mell. och söd. Sv. ofta odlad och förvildad. — *N.* Vest-Finm. — Dovre. Christiania. — \* Torn. Lpm. nedanför Kaissepakte; Karesuando. VB. nor. del. vid Huukis gästgg.; Muoniovaara i Pajala: C. P. Læst. — *N.* Ost-Finm. Varanger, vid Vesterelfven och Carlebotten; Tanen, ofvan Seida och vid Birkelund. Vest-Finm. vid Alten-elv; Karasjok etc.: Norman.) *Älshög, upprät. Underarten har ullhåriga blomskäft och foder, samt klotrunda ståndknappar.*

\*2 *P. pulchellum* Bunge: stielken n. *blidlös*, upptill glandelhårig; bladen parbladiga, med aflångt elliptiska—rundade, *trubbade* småbl.; blomsaml. gles. 24 6, 7, b. blr. Fig.

Strandäng. r. (N. Ost-Finnm. Bugönäs i Syd-Varanger, upptäckt af Norm.) *Knappt* *quartershög*, vanl. med flere stielkar från rotstocken; *fodret* *klibbludet*; *kronflik*. *rundadt trubbiga*.

104. DIAPENSIA Ltn. Polört.

1 *D. lapponica* L. tuffig, bladen läderartade, tunglika *trubbiga*; blrna ensamma på uppräta skäft. 24 6, 7, hv. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1,f.1. Wg.Fl.L.t.9. Sv.B.517. Fl.D.47. H.N.f.5, n:o 3.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Låg*, alltid grönskande växt, med 1—2 tum höga *blomskäft*.

### 3 KLASSEN

## TUBIFLORÆ.

- 14 Fam. **OLEINEÆ** *Link.*: Krona regelbunden, 4flikig, stundom felande. Stånd. 2. Frukt. 2rummig, med 1—2 hängande frön i hvarje rum.

#### 105. SYRINGA *Lin.* Syren.

- †1 *S. vulgaris* *L.* bladen hjertlika spetsade.  $\frac{1}{2}$  5, 6, gred. ell. hv. blr. Fig. Sturm. 1 h. Reich.t.1073,f.1.  
Odl. st. (Allmän i trädgårdar samt här och der förvildad.) *Ett par famnar hög buske med väluktande blr i rika spiror.*

#### 106. LIGUSTRUM *Lin.* Liguster.

- 1 *L. vulgare* *L.* bladen bredt lancettlika glatta; blrna i tät, äggformig spira.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. Fig. Sv.B.415. Fl.D.1141.  
Stenback. r. (*Boh.* på Oroust; Qville sn, på Hvalö och Hjertö; Tanum sn, vid Sör Edsvik, Svinäslandet och Öarne Otterö, Lindö, Musö, Väderöarne; Koster; på fastlandet vid Tanumsnäs: Leffl. Förvildad i *Hall.* vid Sperlingsholm och vid Hasslöf: Theor. *VG.* på Kinnekulle m. fl. st. — *N.* på Öar i Christianiafjorden, t. ex. Krageröen vid Fredriksstad, Hvalöarne på Spjærland m. fl. Langöen vid Holmestrand.)  
*3—4 alnar hög buske med svarta bär.*

#### 107. FRAXINUS *Lin.* Ask.

- 1 *F. excelsior* *L.* bladen parbladiga, med lancettlika sågade småblad; blomhyll 0; vingfrukten i spetsen snedt urnupen.  $\frac{1}{2}$  5, viol. blr. Fig. Sv.B.175. Fl.D.969.  
Skog. och hagar. (*Sk.—Helsl. och Dal. Verml. Boh. Öl. Gottl.* — *N.* till Trondhj.)  
*Högt träd med motsatta qvistar, svarta knoppar och blr på bar qvist.*

- 15 Fam. **VERBENACEÆ** *Juss.* Krona oregelbunden. Stånd. 4, af hvilka 2 längre. Frukt i börj. 4rummig, 4fröig; slutl. delande sig i 4 smånötter.

#### 108. VERBENA *Lin.* Jernört.

- 1 *V. officinalis* *L.* stjelen upprät; bladen flikigt sågade med större flikar vid basen; axen mycket smala.  $\frac{1}{2}$  8, 9, r. blr. Fig. Sv.B.182. Fl.D.628. H.N.f.1, n:o 19.  
Vid gård. r. (*Sk. Öst. del. t. ex. Åsum; Raflunda; Köpinge; tillfällig i vest. delen enl. Aresch. Smål. Kalmar, vid Jordbron 1848, enl. Vesterl. Hall. Skottorp, i åkr.: Theor.*)

- 16 Fam. **ASCLEPIADEZÆ** Juss. Krona regelbund., med i knoppen vridna flikar. Stånd. 5, med frömjölet hophängande i vaxlika massor. Märken 2. Frukt af 2 fröhylsor.

109. *CYNANCHUM* R. Br. Tülkört.

- 1 *C. Vincetoxicum* Br. stjelken upprätt; bladen äggrunda ell. något hjertlika, helbräddade spetsade, med kanterna nedtill och skaften finludna; blomkronan glatt, med äggrunda flikar. 2½ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.249. Fl.D.849.  
 Klipp. stenback. (Sk.—Uppl. och Vestml. Målartrakten. Blott i östra prov. Öl. Göttl. — N. södra del.) Blrna bilda flocklika knippen i de öfre bladvecken. — *Asclepias L. Vincetoxicum officinale* Mönch.

- 17 Fam. **GENTIANEÆ** Juss. Krona som föreg. fam. Fröhus af 2 skal, med fröfasten längs efter kanterna, hvilka stundom kunna så invikas, att fröh. blir 2-rummigt.

110. *GENTIANA* Lin. Stålkört.

† Kronorna med bart, hårlöst svalg.

\* Ståndarknapparne hopklubbade.

- \*1 *G. purpurea* L. bladen ovalt lancettlika; blrna i toppen gytttrade, i bladvecken motsatta; blomfodr. hölsterlikt; kronan 5—6klufven, med omv. äggrunda—rundade, trubbiga flikar och små tvärhuggna mellanligg. tänder. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.50. Reich. t.1054, f.2. H.N.f.13, n:o 35.

Fjellv. (Norges vestliga fjell, mest mellan Hecke fjell, Tind och Romsdalen.) Fotshög, med stora bägarlika, utvändigt gulaktiga, inuti purpurroda blommor. — *G. lutea L. Fl. Su.*

- 2 *G. Pneumonanthe* L. bladen jemnbreda, trubbiga; en blomma i toppen, de öfr. i bladvecken; kron. vidgadt bägarlik, 5klufven, med äggrunda, n. helbräddade, kortspetsiga flikar och korta triangulära mellanligg. tänder. 2½ 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.651. Fl.D. 269. H.N.f.14, n:o 15.

Ang. och betesm. (Blek. Mörrum; Valje och Siretorp enl. Goss. Sk.—Boh. Smål. mot öst. till Vexjö och Vrigstad: Scheutz. VG. Verml. — Söd. N.) 6—12 tum hög; blrna 1—1½ tum långa, de flesta skaftade.

\*\* Ståndarknapparne fria.

- \*3 *G. serrata* Gunn. bladen jemnbreda—smalt lancettlika; blomskäften enblommiga, flere gånger längre än blomman; kron. smalt bägarlik, 4—stund. 5klufven, med aflånga småågade flikar, utan mellanligg. tänder. ☉ 7, 8, b. blr. — β *detonsa*: kronan med 4, naggade flikar. Fig. Fl.D.317. Act. Haffn. 10, t.1, f.8. Gunn. Fl.N.2, t.2, f.3—5. H.N. f.8, n:o 9.

Hafsstr. vid fjellen, r. (N. Finnm. och Nordl. ned till Salten, såsom vid Jarfjorden och Berlevaag enl. Th. Fr.; Porsanger, vid Börselvs mynning: Norm.; Hammerfest; Bossekop; Talvig; Tromsøe; Skjærstad etc.) Blrna ofta öfver en tum långa, 2:ne fodersflikar längre och smalare än de öfriga. — *G. ciliata* Fl. N. β *G. detonsa* Rottb.

- \*4 *G. involucrata* Rottb. bladen äggrunda; toppblrna meränd. hufvudlikt gytttrade inom bladlika skärm; kron. bägarlik, med n. lancettlika uddspetsiga flikar, utan mellanligg. tänder. ☉ 7, 8, hv. ell. blåakt. blr. — β *umbellata*: blrna skaftade, jemte skärmbladen blåaktiga. Fig. Fl.D.344. H.N.f.5, n:o 10.

Hafsstr. r. (N. Finnm. och Nordl. Trondhj. st. Otteroe.) Stjelken 4kantig, 3—6 tum hög, med oftast 5klufna kronor. — *G. aurea* L. *G. quinquefolia* Fl.D. β *G. umbellata* MB.

- 5 *G. nivalis* L. bladen äggrunda; blrna slutl. skaftade; fodret hvasskantigt; kron. trattlik, 5klufven, med äggrunda trubbad flikar och vanl. 2klufna mellanligg. småtänder. ☉ 6, 7, b. blr. Fig. Sv.B.725. Fl.D.17. H.N.f.9, n:o 19.

Fjellv. (*Lpl.*—*Herjed.* *Dal.* vid Tenninge masugn. *Ångml.* *Medelp.* *Helsl.* mångenst. i nor. delen. — *N.*) 2—4 tum hög.

†† Kronorna med hårfransade fjäll i svalget: *Eurythalia* *Ren.*

- 6 *G. tenella* *Rotlb.* bladen äggrunda; blomskäften *ganska långa*, n. bladlösa; fodret deladt i 4, n. *äggrunda föga olikformiga* flikar; kron. 4klufven.  $\curvearrowright$  7, 8, b. blr. *Fig. Sv.B.726. Fl.D.318. H.N.f.14, n:o 16.*

Högre fjellv. r. (*Torn. Lpm.* vid nordvestra stranden af Torn. Träsk. *Lul. Lpm.* Kaissats och Jälle vid Wirihauare; Sårjasjaure och Kallovarats nära Rovejaure: *H. Widm. Pil. Lpm.* Akarisfjell; Sulitälma, Mettjispakte: *Widm. Herjed.* Stora Midtåklappen; Ljusnedals bruk. — *N. Dovre; Röråstrakten.* Nordl. ofvan Herkvisgsvand vid Ofotenfjord. Finnm. mellan Lyngen och Varangerfjord.) 1—3 tum hög, grenad ned vid roten, stund. enkel och enblommig. — *G. Kænigti Gunn. G. glacialis Vill.*

- 7 *G. campestris* *L.* bladen äggrundt aflånga; fodret olikformigt 4deladt, med 2, mycket större, ovala flikar; kron. 4klufven.  $\curvearrowright$  7, 8, b. sällan hv. blr. *Fig. Sv.B.278. Fl.D.367. H.N.f.8, n:o 10; f.9 [var.].*

Ång. betesm. (*Sk.*—*Jemtl.* och *Ångml.* — *N. till Finnm.: Norm.*) Ofta mycket grenig och blomrik, stundom liten och enkel, äfven till bladen omväxlande i likhet med *G. Amarella*. De större foderflikarne innesluta de mindre.

- 8 *G. Amarella* *L.* rotbl. spadlika; stjelkl. äggrunda—aflånga ell. tunglika; fodret n. likformigt klufvet i 5 ell. 4, smalt lancettlika trubbad flikar af kronpipens längd; kron. 5-ell. 4klufven.  $\curvearrowright$  6—10, b. blr. *Fig. Fl.D.328. H.N.f.6, n:r 15.*

\**lingulata* *Ag.* stjelkl. aflånga—jemnbred tunglika trubbiga. *Fig. H.N.f.6, n:o 14.*

Sidlånda äng. (*Sk.*—*Helsl. Dal.* och *Verm.* *Öl. Gottl.* — *N. till Nordl.: Norm.* —

\**Sk.*—söd. *Lpm.* — *N.*) Har mindre blr än föreg. men ofta högre stjelk; foderflikarne något olikstora; bladen hos hufvudformen från bred bas spetsade, hos \* från smalare bas bredare mot midten eller spetsen.

#### 111. ERYTHRÆA Pers. Arun.

- 1 *E. litoralis* *Fr.* stjelken trubbadt 4kantig; bladen lancettlikt jemnbreda; blrna kort skaftade i klynnedeladt knippe; blomfodr. n. af kronpipens längd, med 2 skärmb. vid basen.  $\odot$  2 [Fr.] 7, 8, r. blr. *Fig. Sv.B.579, f.1. Fl.D.1814. H.N.f.5, n:o 9.*

Hafsstr. (*Sk.*—*Gestr.* Tynderö enl. *Leml. Boh. Öl. Gottl.* — *N. Christiania, Holmestrand etc.*) Blrna n. utan enskilda skaft; bladen stund. tunglika. Roten hos denna och följ. 1—flerstjelkig, med enkla 3—8 tum höga stjelkar. — *E. angustifolia* *Wg.* *E. linariifolia* *Pers.* — Denna art skiljes icke af *Linné* från följ.

- 2 *E. Centaurium* *Pers.* stjelken hvasst 4kantig; bladen ovala; blrna kort skaftade i jemnhöga skaftade knippen; blomfodret n. dubbelt kortare än kronpipen, med 2 skärmb. vid basen.  $\odot$  7, 8, r. blr. *Fig. Sv.B.219. Fl.D.617. H.N.f.2, n:o 31.*

Ång. nära kusten, r. (*Sk.*—*ÖG.* Södm. Utäcker i Råby enl. *C. Ind. Hall. Öl. Gottl.*) 4—12 tum hög, med smalare och spetsigare kronflikar än föreg. *Fig. i Sv.B. liknar denna art till örten, men föreg. till blomman.* — *Gentiana Centaurium* *L.*

- 3 *E. pulchella* *Fr.* stjelken hvasskantig, enkel enblommig, eller till hela längden klynnegrenad, med långt skaftade blr; bladen äggrunda; fodret kortare än kronpipen, utan skärmb. vid basen.  $\odot$  7, 8, r. blr. *Fig. Sv.B.579, f.2 och 3. Vet.Akad.H.1783, t.3, f.8,9. Fl.D.1637. H.N.f.3, n:o 16.*

Hafsstr., äfven i åkrar. (*Sk.*—*Gestr.* på Orarne. *Boh. Öl. Gottl.* — *N. södra delen.*) Ofta knappt en tum hög; åkerformen 5—8 tum hög, grenig. — *E. angustifolia*  $\beta$  *tenuiflora* *Wg.* *Gentiana pulchella* *Sw.*

- 18 Fam. **SOLANACEÆ** *Juss.* Krona regelbunden, i knoppen veckad. Stånd 5. Frukt: fröhus ell. bär med 2 rum, många frön, fästade på skiljevägen.

#### 112. LYCIUM *Lin.* Bocktörne.

- †1 *L. barbarum* *L.* stammen buskartad med slaka hängande grenar; bladen lancettlika,

dels skiftevisa dels knippevisa; blrna enstaka ell. knippevisa.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. Reich.t.1635,f.1.

Od. st. (Sk. allmänt odlad och förvildad i sydv. delen; Kåseberga, i sandbranterna; Christianstad: F. Aresch. Likaledes förvild. vid *Norrköping, Nyköping, Stockh. Visby m. fl. st.*) *Bären aflånga, röda ell. gula, mycket längre än det hos denna art alltid 2läppiga fodret.*

### 113. *SOLANUM* Lin. Trollbär.

† Stammen buskartad, slak ell. n. slingrande.

- 1 *S. Dulcamara* L. bladen hjertlikt äggrunda, de öfre meränd. spjutlika af ett par likar vid basen; blomknippena klynnedelade, fästade på stjelkens sida, midtemot bladen.  $\frac{1}{2}$  7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.20. Fl.D.607.

Stränd. och fukt. st. vid stenrös. (Sk.—Medelp. Dal. Boh. Öl. Göt. — N. till Trondhj.; Værdalsören.) *Bladen sakna stundom spjuflikarne. Bären något aflånga röda. Vanl. glatt, någon gång, i synnerhet på sandiga hafsstr., småtuden.*

†† Stammen örtartad.

- 2 *S. nigrum* L. stjelken kantig, med n. släta kanter; bladen äggrunda, mer ell. mindre tandade ell. bugtbräddade, n. glatta; blrna *stockvisa*, med det gemensamma skaftet fästadt nedom bladen; blomkronan dubb. längre än fodret; bären *svarta ell. grön-gula*.  $\odot$  7, 8, hv. ell. något viol. blr. —  $\beta$  *melanocerasum*: stjelken tjock med skarpa upphöjda ränder; bären svarta, stora som små kersbär. Fig. Sv.B.61. Fl.D.460.  
\* *humile* Bernh. bären grön-gula. Fig. Fl.D.2345. Reich.t.1632,f.2. H.N.f.9, n:o 14.  
Od. st. vid byar etc. (Sk.—Uppl. Dal. och Verml. Boh. Grebbestad. Öl. Göt. — N. — \* Sk. Smål. Kalmar. Stockh. Uppl. Sänga sn vid Säby.)

- 3 *S. miniatum* W. stj. jemte blomskaften *mycket kantig*, med kanterna *skarpa* af tårika vårtlika knölar; bladen äggrunda—n. rutformiga, groftandade, n. glatta; bären *högröda*; för öfr. som föreg.  $\odot$  7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1927. Reich.t.1632,f.3,4. H.N.f.15, n:o 21.

Od. st. stränd. r. (Sk. Helsingborg; Lund; Trolleberg; Bunkeflo sn; Hofdala; Tydinge i Broby; Strömbult i Örkened m. fl. st. Smål. Kalmar och Värnanäs enl. Vesterl. och Ekstr. Fordom äfven i Hall. vid torpet Laxviken i Eldsberga sn, på hafsstranden.) *Skiljd från föreg. hufvudsakl. genom stjelkens beskaffenhet, bärens färg och sin starka moschuslukt.*

- 4 *S. villosum* Lam. stj. *knappt kantig*, jemte blomskaften och de rutformigt äggrunda groftandade bladen *ulligt luden*; blrna som föreg., med kronan *flere gr* längre än fodret; bären *gula*.  $\odot$  7, 8, hv. blr. Fig. Dill. Hort. Eltham.t.274,f.353. Reich.t.1632,f.1. H.N.f.15, n:o 22.

Od. st. gator, r. (Sk. Lund; Helsingborg; Edenryd: F. Aresch. Trol. flerstädes.) *Utmärkt från de bägge föreg. genom sin hårlighet, bladens blekare färg, de större blommorna och bärens färg.*

### 114. *HYOSCYAMUS* Lin. Bolmört.

- 1 *H. niger* L. bladen äggrundt aflånga, stjelkomfattande, vinkligt bugtiga ell. rikiga; blrna n. oskaftade.  $\odot$  7, 8. —  $\beta$  *agrestis*: mindre och enårig, med äggrunda tandade, föga omfatt. blad, de öfversta n. hela. Fig. Sv.B.211. Fl.D.1452.  $\beta$  H.N.f.8, n:o 8.

Byar, a. (Sk.—VB. Jeml. Näs och Hammerdal. — N. till Trondhj.) *Stor, klibbluden, illaluktande; blrna smuts-gula med svartblå botten och ådernät, säll. enfärgadt gula ell. hvitaktiga.*

### 115. *DATURA* Lin. Spikklubba.

- 1 *D. Stramonium* L. bladen äggrunda, groft bugtandade, glatta; fröhuset upprätt, groftaggigt.  $\odot$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.43. Fl.D.436.

Gator, hafsstr. r. (Sk. vid vest. kusten t. ex. Trelleborg; Malmö; Höganäs; Lomma; samt i inre del. vid Söfde; Andrarum; Broby m. fl. st. Blek. Carlshamn; Vemmö: Gossehm. — Stockh. Uppl. Tierp: Arn. Vestml. Köping. Ner. Örebro. Hall.

Falkenberg; flerest. i söd. delen: Theor. *Gottl.* — *N. Christiania.*) *Har mycket stora blr och fröhus.*

- 19 Fam. **PERSONATÆ** *Lin.* Krona med olikformigt flikadt bräm, 2 ell. 4, sällan 5 stånd. Frukt 2-, säll. 1-rummigt fröhus, med fröfästen i förra fallet på skiljeväggen, i det sedn. på sidoväggarne.

- 1 Flocken **Verbascæ** *Bartl.* Ståndarknappar enrummiga. Fruktämne 2rummigt.

116. **VERBASCUM** *Lin.* Kungsljus.

† Bladen [åtm. de öfre] nedlöpande, ulliga.

\* Tre ståndarsträng. hvitludna, 2 n. glatta.

- 1 *V. phlomoides* *L.* bladen ägrunda smalspetsade naggade, de nedersta skaftade, med något hjertlik bas, de öfre omfattande, *något nedlöpande* på den *trinda* stjelken; blomgytt. i *glost* ax; de 2 glatta ståndarsträngarne med *mycket större knappar* än de öfriga.  $\gg 7, 8, g. blr.$  Fig. Reich.t.1639—41.

Torra st. r. (*Sk.* vid Malmö och Lund: Aresch. *Blek.* Carlshamn; Sölvitsborg; L. Boråkra: Gosselm. *Södm.* Hanö i Bälunge sn enl. C. Ind. *Uppl.* vid vägen mell. Hjelmså och Lindberga gästg.) *Har stora sköna blr, omkring 4 samgyttrade. Som bladen äro föga nedlöpande, blir stjelken hos denna art trind.*

- 2 *V. thapsiforme* *Schrad.* bladen aflånga—lancettlika, naggade, *långt* nedlöpande; blrna i *tätt* ax; kronflik. *omvändt ägrunda*; ståndarknapp. *som hos föreg.*  $\gg 7, 8, g. blr.$  —  $\beta$  *cuspidatum*: mycket ullig; öfversta bladen och blomskärmen tvärt afsmalnande i en lång udd. Fig. Reich.t.1638. H.N.f.4, n:o 19;  $\beta$  20. Fl.D.1810.

Torra st. r. (*Sk.* Karsholm; Vegeholm enl. F. Aresch.; Österlöfs kyrka: Scheutz. *Smål.* Kalmar, vid slottet. *Stockh.* Vermdön. *Öl.* Ottenby, Resmo etc. — *N. Christiania.* —  $\beta$  *Sk.* Karsholm: Aresch. *Öl.* *Lägre än följ., som den mest liknar, men med mycket större och plattare blr.* — *V. cuspid.* Fl.D.

- 3 *V. Thapsus* *L.* bladen *som hos föreg.*; blrna i *tätt* ax; kronflikarne *aflånga*; ståndarknapparne *n. lika stora*.  $\gg 7, 8, g. blr.$  —  $\beta$  *bracteatum*: mindre tjockt luden; skärmbladen mycket längre än blomgyttringarne. Fig. Sv.B.79. Fl.D.631. H.N.f.16, n:o 20.

Torra st. a. (*Sk.*—*Ångml.* och *Jeml.* — *N.* —  $\beta$  *Stockholm* vid Ålkistan.) 2—3 *alnar hög*; *stjelken, likasom hos föreg., kantig af de nedlöpande, gulaktigt ulliga bladen.* — *V. Schraderi* Koch.  $\beta$  *V. bracteatum* Ag.

\*\* Alla ståndarsträng. violettudna (Hybrida former).

- × *V. nigro-thapsiforme* *Fr.* bladen *långt nedlöpande*; blomgytt. *täta*; stånd. med *likstora knappar*.  $\gg 8, 9, g. blr.$  Fig. Fl.D.1811, enl. Fr. H.N.f.9, n:o 13.A.

Torra st. r. (*Öl.* vid Thorslunda k.a.) *Örtan af V. thapsiforme; blr af V. nigrum, men större.* — *V. seminigrum* *Fr.*

- × *V. thapso-nigrum* *Schied.* bladen *föga nedlöpande* på den något *kantiga* stjelken; blomgytt. *glesa*; stånd *som hos föreg.*  $\gg 8, 9, g. blr.$  Fig. H.N.f.9, n:o 13.B.

Torra st. r. (*Sk.* *Smål.* Kalmar, vid slottet: Scheutz. — *Uppl.* Nockebybro nära *Stockholm.* *Vestml.* Malma kyrkogård. *V.G.* Kinnekulle, vid Martorp. — *N. Christiania.*) *Till blomningen lik V. nigrum, till örten V. Thapsus.* — *V. collinum* *Schrad.* Hn.Ed.4.

†† Bladen hvarken nedlöpande ell. ulliga.

- 4 *V. nigrum* *L.* bladen ägrundt aflånga, *under gråudna*, de nedre skaftade med *hjärtlik* bas, de öfre oskaftade; blomgytt. *glesa*; *alla* strängarne *violettludna med likstora knappar*.  $\gg 7, 8, g. blr.$  —  $\beta$  *amplectens*: axet med långa, n. omfattande skärm; *alla* bladen, utom de nedersta, *föga* skaftade. —  $\gamma$  *glabrescens*: stjelkbladen tunna, *föga* ludna, smalspetsade, skaftade. —  $\delta$  *cuspidatum* *Nordst.* öfv. bl. och blomskärmen tvärt afsmaln. i en lång udd. Fig. Sv.B.590. Fl.D.1088.



Torra st. (Sk.—Medelp. Dal. Husby sn. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. i Tanum sn. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Öl. —  $\gamma$  Smål. Vexjö: Scheutz. Dalsl. Vedbyholm i Holm. — N. Hjelmeland. —  $\delta$  VG. Kinnekulle.) *Stjelken trind, med mindre tätt och ludet az än de föreg. arterna. Funnen af Dr Ax. Lund med hviludna ståndarsträngar vid Eds gamla kyrka i Smål.*

- 5 V. *Lychnitis* L. blad. äggrundt aflånga spetsiga rundnaggade, under gråhvita af ett pulverlikt ludd; rotbladen med, stjelkl. utan skaft; blomsaml. gles, af tätblommiga grenar; sträng. hviludna.  $\gamma$  6—8, g. ell. hv. blr. —  $\beta$  album: med hv. blr. Fig. Reich. t.1648.  $\beta$  Fl.D.586.

Vid hyar etc. r. (Den gulblommiga finnes förvildad endast i bot. trädgårdar. —  $\beta$  Sk. Kullaberg, Dufek; i Christianstadstrakten och i Söfde sn [i sedn. tider ej återfunnen: F. Aresch.]. Smål. Vestervik nära Norrlandsäng. Södm. Tullgarn i parken. Stockholm vid Skarpneck. Gottl. vid Visby hamn.)

#### 117. SCROPHULARIA Lin. Flenört.

- 1 S. *nodosa* L. stjelken 4kantig glatt; bladen aflångt hjertlika spetsiga, olikformigt grofsågade, glatta; foderflik. äggrunda; blomkronan öppen.  $\gamma$  7, 8, br. blr. Fig. Sv.B. 315. Fl.D.1167. H.N.f.2, n:o 4.

Skugg. st. och vid vatt. a. (Sk.—Ångml. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) *Alnshög, med stor, stundom glandelhårig blomsaml.; bladens bas bred, n. tvärhuggen.*

- +2 S. *vernalis* L. stjelken trubbigt 4kantig, jemte bladskafen mjukluden; bladen hjertlika, groft dubbelsågade, klubbhåriga; foderflik. aflånga; blomkron. tillsluten.  $\gamma$  5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.411.

Stenmur. och odl. st. r. (Sk. Lund i Paradislyckan; Maltesholm; Malmö. Smål. Råsnäs i Ålhem sn, och Rogberga. Stockh. flerstädes; Ulriksdal i gamla murar.) *Våxten klubbhårig; yngre med blomknippen i bladvecken, slutt. often i toppen.*

- 2 Flocken *Antirrhineæ*. Ståndarknapp. 2rummiga, utan bihang vid basen. Fröh. 2rummigt.

#### 118. DIGITALIS Lin. Fingerhatt.

- 1 D. *purpurea* L. bladen aflånga trubbigt naggade, under mjukt gråludna; foderbladen äggrunda spetsiga; kronan utvändigt glatt, med mycket trubbig eller intryckt öfre läpp.  $\gamma$  6, 7, r. blr. Fig. Fl.D.74. H.N.f.10, n:o 18.

Stenbundna st. r. (Boh. Qville sn, ymn. i Utgårds, Kindlyckes, Snibes och Rönnängens skogar, spars. i Bodelands; vid berget Fontin nära Kongelf. Hall. på klippor vid Stensjö i Efra sn; Hallandsås. förvildad: Theor. Sk. förvildad enl. F. Aresch. — N. icke sällsynt i Christiansands och Bergens stift upp till Romsdalen, vid stenar, vågar etc.: Trondhj. på Strand vid Storig.) *Alnshög ell. mera, med 1½ tum långa, inuti purpurstänkta, hängande blr.*

#### 119. ANTIRRHINUM Lin. Skalleblomma.

- 1 A. *Orontium* L. stj. nedtill långhårig, upptill glandelhårig; bladen lancettlika; blrna kortskäftade, i öfre bladvecken; fodret djupt deladt, med ryggflikarne längre än kronan, mjukhåriga.  $\gamma$  7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.941.

Odl. st. åkr. r. (Sk. mell. Trelleborg och Ystad, t. ex. vid Snårestad; Börringe mell. Vidarp och Fortuna; Vest. Alstad; Ifö; Oppmanna etc. Blek. Carlskrona, Kungshall. Öl. Gottl. Här och der förvildad upp till Stockholm.) *Quartershög, med omkr. trefjedredels tum långa blr. — Orontium arvense Pers.*

#### 120. LINARIA Mill. Sporreblomma.

+ Glatta örter, med korta blomskaft [icke längre än fodret].

- 1 L. *vulgaris* Mill. stjelken upprät; alla bladen strödda, n. jemnbreda; blrna i tät klase; sporen mycket längre än fodret.  $\gamma$  7, g. blr. —  $\beta$  Peloria: blrna mer eller mindre regelbundna med 2—5 sporrar. Fig. Sv.B.196. Fl.D.982.  $\beta$  Linn. Diss. de Peloria.

Torra st. (Sk.—Jemil. och Ångml. VB. Björkfors och Sangis. — N. till Nordl.) *Stjelken vanl. enkel; blrna tumslånga. — Antirrhinum Linaria L. —  $\beta$  är en tillfällig afvikelse, icke egentlig afart, emedan oftast vanliga blr finnas i samma az som de flersporriga.*

†2 *L. striata* DC. stj. *uppstigande*; bladen lancettlikt jemnbreda, de nedre *kranssittande*; blrna i gles klase; kronans öfre läpp djupt urnupen blåstrimmig; sporren *af fodrets längd ell. kortare*. 24 7. Fig. H.N.f.11, n:o 20.

Torra st. ballastpl. r. (Södm. Bondeby i Stigtomta sn: C. Ind. *Uppsala*, Slottsbacken. *Gefle* på Nya Brobänken. *Medelp.* Sundsvall: Ind. *Ner.* Kihls kyrkog. etc. *VG.* Göteborg: Lemf. Säkertigen öfverallt förvildad. — *N.* Mandal etc. på ballast.) *Blåaktig, oflast grenig vdxl, med de öfre bladen strödda; blrna hvita ell. blåaktiga. — Antirrh. repens L.*

†3 *L. supina* Desf. stj. *nedligg.* ell. *uppstigande*; bl. *small jemnbreda*, de nedre *kranssittande*; blrna i kort och tät, glandelhårig klase; sporren *mycket längre* än fodret. 24 7. Fig. Reich.f.1681, f.5. H.N.f.16, n:o 21.

Tor. sand. st., ballastpl. r. (Göteborg, på Lindholmen, sedan 10 år ymnig: Lemf. På ballast vid *Gefle* och *Sundsvall.*) *Knappt kvartershög, delad vid rothalsen i enkla grenar; de öfre bladen strödda; blrna stora, gula, med violettstrimmig sporre. — Antirrh. L.*

†† Håriga örter, med långa blomskaft [dubb.—flere gr längre än fodret].

4 *L. minor* Mill. *hela örten klubbhårig*; stj. n. upprät; bladen *small lancettlika*, de nedre motsatta, de öfre skiftevisa; blrna i *bladvecken* ell. i glesa, bladiga klasar; sporren *kortare* än foderlikarne. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.502. H.N.f.11, n:o 21.

Åkr. mur. etc. (Sk.—Helsl. Iggesund. *Medelp.* Sundsvall. *Ångml.* Hernösand: Arn. *Jemtl.* Liths sn. *Vestml.* *Ner.* Kägelholm. *Dalsl.* Baldersnäs. *Öl.* *Gottl.* — *N.* Christiania, Kongsvinger etc.) *Vanl. grenig, med små, blekt rödviol. stund. hvitakt. blr. — Antirrh. minus L.*

5 *L. Elatine* Desf. stj. *nedliggande, långhårig*; bladen skiftevisa, dels *äggrunda*, dels *spjullika*; blrna i *bladvecken* med glatt skaft; sporren *längre* än foderlik. ☉ 7; 8. Fig. Sv.B.711. Fl.D.426. H.N.f.1, n:o 20.

Åkrar, r. (Sk. vestra delen, från Landskrona till Trelleborg enl. F. Aresch. *Gottl.* vid Göstafs i Fröjel och Stenhuse i Sanda sn.) *Blrna långskaftade, små, gula med viol. öfre läpp; bladen hårbräddade. — Antirrh. L.*

## 121. VERONICA Lin. Ärenpris.

† Tätblommiga ax i toppen.

1 *V. longifolia* L. bladen 3, 4 i *krans*, säll. motsatta, från bredare bas *lancettlika*, spetsade, *ojemnt ell.; dubb. sågade till spetsen*; blomfodretsflikar tydligt *oliklånga spetsiga*. 24 7, 8, b. blr. *Bland denna arts talrika former, hvaraf en del varit ansedda som egna arter, äro följ. de utmärklaste:*

\* *Linnæi*: bladen med tvärhuggen ell. hjertlik bred bas, grofsågade spetsade. Fig. Fl. D.374. Schrad. Ver.t.2, f.1.

\* *vulgaris*: bladen med äggrund bas jemnt spetsade grofsågade. Fig. H.N.f.3, n:o 12.

\* *serrulata*: blad. från äggr. ell. tvär bas långspetsade, tätt sågade med korta och hvassa tänder.

\* *maritima* L. blad som föreg. med långa spetsade mycket olikstora tänder. Fig. H. N.f.4, n:o 21.

\* *media* Schrad. blad som föreg. kortspetsade, med något grofva och spetsiga, men korta sågtänder. Fig. Sv.B.560. — *V. arguta* Bl.N.Fl.

Fukt. st. vid berg, stränd. (Sk.—Uppl. *Ångml.* Gräninge bruk. *VB.* upp efter Torn-, Sangis- och Kalix-elfvar. *Vestml.* *Ner.* *Verm.* *Dalsl.* *VG.* Boh. Uddevalla; vid Strömsån, och Qvistrumsån: Lemf. — *N.* Aggershus stift. Finn. — *V. serrul.* *Hall.* — *V. marit.* på hafsstr. *Blek.* Tromtö enl. Gosselm. *ÖG.*—*VB.* — *V. media:* *Hall.* — *N.* Christiania vid Næsoddungen.) *Mellan de här anförda formerna finnas många mellanliggande, likasom andra, hvilka öfvergå i följ. art.*

2 *V. spicata* L. bladen *motsatta*, mycket säll. i *krans*, lancettlika—n. äggrunda, med vanl. korta och föga olikformiga sågtänder, *mot spetsen helbräddade*; foderlik. n. *liklånga trubbiga*. 24 6, 7, b. blr. — *β orchidea*: kronansflikar smala och vridna. Fig. Schlecht. D.Fl.4 B.2 häft. Följ. former hafva af en del förf. blifvit framställda som egna arter:

\* *hybrida* L. mycket gröfre; blad. äggrundt aflånga med rundad bas och trubbig helbrädd. spets, groft och trubbigt naggsågade. Fig. Fl.D.52. E.B.673.

\* *neglecta* Bl. bladen från bredare bas lancettlika spetsiga, sågade n. till spetsen, med täta hvassa sågtänder.

\* *australis* Schrad. bl. från bred n. tvärhuggen bas utdraget äggrunda spetsiga med grofva spetsiga sågtänder. Fig. Schrad. Ver.t.2.f.3.

Torra st. etc. (Sk.—Uppl. Ner. vid Hardemo kyrka. *Dalsl.* Dalbobergen enl. Larsson. *Hall. Öl. Goull.* — N. — Underarterna i södra Sv. särdeles *Hall.* — N. i södra delen af Aggershus st.) Var. i hög grad, från mer och mindre hårig till n. glänsande glatt: var. *nitens*, samt med m. o. m. trubbiga ändra till smalspetsiga blad: var. *acutifolia*. \* *hybr.* Öfvergår utan gräns i hufvudarten.

†† Blomklase i toppen.

- 3 *V. serpyllifolia* L. bladen äggrunda—afånga trubbiga, fint naggade glatta; blomskäften kortare än skärmb.; fodret n. glatt; fröhuset bredt 2knöligt, urnupet, af fodrets och stiftets längd. 2½ 5—7, blåstrimm. blr. — *β borealis* [Læst.]: bladen mer rundade; blrna n. rent blå. Fig. Fl.D.492.

Äng. a. (Sk.—VB. och Lpl. — N. till Ost-Finm. — *β* i högre fjelltrakter.) Fröhusen i kanten håriga, bredare än längden, stult. i utdragen klase.

- 4 *V. alpina* L. bladen elliptiska ell. ovala, glest naggade ell. helbrädd.; blomskäften kortare än skärmb.; foderflikarne hårbräddade; kronan klocklik; fröh. omv. äggrundt, tvärhuggat, af fodrets längd, längre än stiftet. 2½ 7, 8, blå blr. — *β lasiocarpa*: fröhuset hårigt. Fig. L.Fi.L.9.f.4. Sv.B.721. Fl.D.16. H.N.f.12, n:o 42.

Fjellv. a. (Lpl.—Herjed. — N. Ost-Finm. till Goustafjell i söd. delen.) Fröhus längd större än bredden. Örtan svartnar vid torkning. — *β V. alp.* var. *australis* Wg.

- 5 *V. saxatilis* L. d. yng. bladen tunglika—omv. äggrunda; klasen fåblommig; blomskäft. längre än skärmb.; foderfl. glatta; kronan plattad; fröh. äggrundt afångt, i spetsen afrundadt, betyd. längre än fodret, föga längre än stiftet. 2½ 7, b. blr. Fig. Sv.B.347. Fl.D.342. H.N.f.12, n:o 41.

Fjellklipp. r. (Lpl.—Herjed. — N. Finm. — Christiansands st.) Knappt fingerhög, risaktig växt, med n. läderartade blad, stora och vackra blr. — *V. fruticulosa* Fl.D.

(*V. arvensis*, *verna*.)

††† Blomklasar från bladvecken.

\* Bladen starkt sågade, jemte stjelen håriga.

- 6 *V. officinalis* L. stjelen nedliggande, småluden; bladen kort skäftade, omv. äggrunda ell. ovala, tätt finsågade; blomklasarne täta axlika uppräta, af n. oskäftade blr; fröh. omv. triangelformigt, föga urnupet. 2½ 5, 6, b. blr. — *β glabrata* Fris. stj. hårig på två sidor; bl. glatta, hårbräddade. Fig. Sv.B.159. Fl.D.248.

Back. a. (Sk.—Lul. Lpm. och VB. Pitca. — N. till Ost-Finm. — *β Ängml.* i Fjellsjö och Nora m. fl. snr.)

- 7 *V. Chamædryl* L. stjelen uppstigande, på 2:ne sidor ullhårig; bladen n. oskäftade, äggrunda ell. något hjertlika, grofsågade, ojemna; blrna på utdragna skäft i glesa klasar; foderflikarne lancettlika; fröh. som hos föreg. 2½ 5, 6. Fig. Sv.B.239. Fl. D.448.

Äng. skog. a. (Sk.—VB. Jeml. — N. till Finm.) Stora täcka himmelsblå blr med hvita ståndare; de nedre bladen stund. kort skäftade. Var., ehuru sällsynt, med öfverallt hårig stjeln, och 3 till 4 ståndare.

- 8 *V. montana* L. stjelen nedliggande, öfverallt likformigt hårig; bladen tunna, utdraget skäftade, äggrunda grofsågade; blr som föreg. med äggrunda foderflikar; fröh. rundadt njurlikt, platt, i kanten tandadt. 2½ 5, 6, b. blr. Fig. Fl.D.1201. H.N.f.2, n:o 29.

Bokskog. r. (Sk. Krageholm; Billinge och Röstånga; Lund i Reften; vid Ringsjön; Kullaberg etc.) Blrna något mindre och blekare än hos föreg.

\*\* Bladen vanl. grundt sågade, jemte stj. glatta; fröh. rundt.

- 9 *V. Beccabunga* L. stjelen uppstig.; bladen tjocka skäftade äggr.—afånga trubbiga, grundt naggsågade; blrna på utdragna glatta skäft, i glesa klasar. 2½ 5—9, b. blr. Fig. Sv.B.127. Fl.D.511.

Källback. diken, a. (Sk.—Jemtl. och Ångml. — N. till Helgeland.) Var. med n. runda och med något spetsiga, stund. helbräddade blad.

- 10 V. *Anagallis* L. stjelen upprät; bladen något stjelkomsfattande, bredt lancettlika, spetsiga, glest småsågade; blrna på utstående, glest glandelhåriga skaft, i mångblommiga något tätta klasar; fröh. cirkelrundt, omärkligt urnupet. ☉ 6, 7, b. ell. rödl. blr. Fig. Fl.D.903. Reich.t.1702,f.1.

Stränd. diken. (Sk. Smål. Jönköping enl. Scheutz. ÖG.—Helsl. Vestml. Ner. Hall. Öl. Gottl. — N. till Rommerige.) Bladen  $\frac{1}{2}$  till 1 tum breda, 2—4 t. långa; blomklasarne mest 2 motsatta, näml. en i hvardera bladveckel. Var. med spådd stjelk, små blad och ensamma klasar.

\*\*\* Bladen helbrädd. ell. med små glesa, tandlika glandler i kanten.

- 11 V. *scutellata* L. stjelen slankig; bladen oskaftade, jemnbredt lancettlika, spetsiga; blrna på utsperrade skaft, i fåblommiga och glesa klasar; fröh. mera bredt än långt, djupt urnupet. 24 5—7, hv. blåstrimm. blr. Fig. Fl.D.209 och 1561.

Våta st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) Bladen 1—2 lin. breda, 1—2 tum långa, stundom mer lancettlika; klasarne mest ensamma, skiftevisa i bladvecklen. Var. från glatt till mycket hårig: var. villosa, ell. glandelhårig: var. glandulosa Nordst.

++++ Blrna ensamma i bladvecklen.

\* Blomskäften omärkliga, alltid kortare än fodret.

- 12 V. *arvensis* L. stjelen upprät ell. uppstig.; bladen äggrunda med tvär bas, glest sågade, endast de nedersta med korta skaft; blomskärmen lancettlika. ☉ 4, 5, ljusblå blr. Fig. Fl.D.515.

Torra st. åkr. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N. till Helgel.) Fröh. hvasst urnupna, hårbräddade, slutt i axlik samling.

- 13 V. *verna* L. stjelen och grenar uppräta; bladen 5-ell. 8flikiga, de nedersta äggrunda odelade; blomskärmen smalt lancettlika. ☉ 4, 5, b. blr. Fig. Fl.D.252.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N. i Aggershus och Bergens st.) I början tumshög och enkel, sedermera 3—6 tum och grenig; blrna mycket små; fröh. mindre hvasst urnupna, än hos föreg., håriga, slutt i axlik samling.

\*\* Blomskäften af de trubbiga foderflikarnes längd, ell. längre.

- 14 V. *triphyllos* L. stjelen med utstående grenar, glandelhårig; de nedersta bl. skaftade, hela, äggr. ell. n. hjertlika, sågade, de öfre oskaftade, handdelade; foderflik. aflånga. ☉ 5, 6, b. blr. Fig. Fl.D.627. H.N.f.4, n:o 22.

Åkr. r. (Sk. Hall. Blek. Lyckeby och Ronneby m. fl. st. Smål. Jönköping, Österbrunn; Kalmar allm.; Ryssby och Ålthems s:r; Vestervik. ÖG. Norrköping; Åtved enl. Kindb. Öl. Gottl.) Mörk, torr svartnande; skärmb. dels handdelade, dels hela, n. tunglika.

- 15 V. *agrestis* L. grön och hårig; bladen hjertlika—äggrunda, sågade; blomsk. af bladens längd ell. kortare; foderflik. aflånga, otydligt nerviga, utvändigt håriga; fröh. rundadt, med djup urskärning mell. rummen. ☉ 5—9. —  $\beta$  calycida: fodrets flikar inskurna. —  $\gamma$  carnosula: bladen små, mer aflånga och köttiga, n. glatta; blrna hvita. Fig. Fl.D.2221. H.N.f.4, n:o 24.

Odl. st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. — N. till Trondhj. —  $\gamma$  Uppl. Rasbo sn, Näsudden på åkrar.) Blrna variära blå, ljusröda och hvita. Stånd. fästade i kronpipens nedre kant; fröh. oflast glest glandelhårigt;  $\gamma$  ej olik V. polita.

- 16 V. *opaca* Fr. örten och blomsk. som föreg.; bladen bredt äggrunda, trubbiga, ell. rundade, med något hjertlik bas, sågade; foderflik. n. spadtlika, nerviga, på båda sidor håriga; fröh. mera bredt än långt, med djup urskärning mell. de rundade rummen. ☉ 5—9. Fig. Fl.D.2701. H.N.f.2, n:o 28.

Odl. st. (Sk. Blek. Smål. Norrviding; Husvarna, samt Urshult enl. Scheutz. ÖG. flerst.: Kindb. Stockh. VG. Kinnekulle flerst. Hall. Brandshult; Karup; Theor. Öl. Gottl. — N. södra del.) Mörkare och med mer rundade blad än föreg.; fröh. bredare, krusigt—smålutet; blrna mörkblå med vit botten. Stånd. fästade i kronpipens mynning.

\*\*\* Blomskäft flere gånger längre än de spetsiga foderflik.

- 17 *V. polita* Fr. ljusgrön, något daggblå ört; bladen något hjertlika ell. ovala, jemna, glatta ell. omärkt. finbåriga; blomskäft. slutl. *längre än* bladen; foderflik. *ågrunda, upphöjdt nerviga*, n. glänsande *glatta*; fröb. något mera bredt än långt, med omkr. urskärningen rundade rum. ☉ 5—9, b. blr. Fig. Fl.D.449. H.N.f.4, n:o 25.
- Odl. st. (Sk. allm. på slätten i vest. och söd. del. Smål. Kalmar. Uppl. Rosersberg och Runsa enl. G. v. Ced. Boh. Hall. flerst.: Theor. Öl. Gottl.) *Närmast lik följ., men mycket mindre; bladen något köttiga. Stånd. fästade i pipens nedre kant; fröb. tätt småludet af utstående enkla hår.* — *V. agrestis* Fl.D.
- 18 *V. persica* Poir. bladen fjädnerviga, rundade ell. något hjertlika, djupt sågade; blomsk. *längre än* bladen, efter blomn. båglik ut- ell. nedhöjda; foderflik. *ågrunda lancetlika*; fröhuset *dubbelt så bredt som långt. tvärhugget, upphöjdt nätdrigt.* ☉ 4—9, blå blr. Fig. Buxb.Cent.1,t.40,f.2. Fl.D.1982. H.N.f.8, n:o 27.
- Odl. st. r. (Sk. Malmö: F. Aresch.; Lund; Norr-Viddinge; vest. Tvet etc. Smål. Femsjö; Jönköp. Flerestådes, t. ex. vid Stockholm. med andra trädgårdströfrö förvildad.) *Foderflik. vid blomn. n. lancetlika; kronan stor, utbredd n.  $\frac{1}{2}$  t. i diam.; fröb. s 2 rum så fränstående, att de bilda med öfre kanten en n. rät linea; frön omkr. 8.* — *V. Buxbaumii* Ten.
- 19 *V. hederifolia* L. bladen handnerviga, hjertlikt rundade, *grundt 3—5flikiga*, ändfliken stor, helbräddad; blomskäften ungefär *af bladens längd*; foderflikarne *hjertlika.* ☉ 5, 6, hvitblå blr. Fig. Fl.D.428.
- Åkr. r. (Sk.—Gefte och Vestml. Boh. Öl. Gottl. — N. Eger vid Fiskumvand; Trondhj. vid Biskopsgården Berg; förgäves sökt af prof. Blytt.) *Blomkronan liten; frön mycket stora, skålformiga, omkr. 4 i fröhuset.*

## 122. LIMOSELLA Lin. Dy-ört, Äfsebrodd.

- 1 *L. aquatica* L. bladen aflånga—trädsmalt jemnbreda, på utdragna skaft; blrna ensamma, på skaft från rotstocken. 2 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Fl.D.69. H.N.f.15, n:o 23.
- Stränd. vattengrop. (Sk.—VB. Torn. Lpm. Wittangi. Herjed. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl. Solö i Bejeren: Norm.) *Ett par. tum hög ört, ofta försedd med blom-bärande grenskott.* — *Formen med smalt jemnbreda bl. är L. borealis* Less.
- 3 Flocken **Rhinanthaceæ**. Stånd.knappar 2rummiga, med borstlika bihang vid basen. Fröb. 2rummigt.

## 123. BARTSIA Lin. Svarthö.

- 1 *B. alpina* L. bladen ågrunda, trubbigt sågade; blrna i öfversta bladveckan. 2 6, 7, viol. blr. Fig. Sv.B.579. Fl.D.43.
- Kärr, mest i fjellen. (Lpl.—Dal. Ångml. Tåsjö sn. Helsl. Ångersfors i Ljusdal: Wistr.; Färila. vid Laforsen enl. Lemm. ÖG. Omberg, Dagsmossen, samt på en mängd andra st. mell. Stångån och Vettern. VG. Hunneberg. Gottl. Klinte; Eista; Löstja; Etelhem enl. G. v. Ced. — N.) *Var. enl. Th. Fr. i Finnm. med smulsgula blr och gröna skärmbll.; de sedn. äro hos den vanl. formen mörkt violetta.*

## 124. ODONTITES Pers. Rödkulla.

- 1 *O. rubra* Pers. stjelen *grenig*; bladen smalt lancetl. ell. jemnbreda, *spetsade*; de öfre skiftevisa, bildande blomskärm; blrna i ensidiga klarar, *af skärmens längd ell. längre*; fröb. af fodrets längd ell. kortare. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.625. Reich.t.1727,f.1. H.N.f.11, n:o 22.
- Åkrar. (Sk.—Gefte. Vestml. och Verml. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Oftast grenig ända från roten, säll. n. enkel.* — *Euphrasia Odontites* L. *Bartsia Odont.* Huds. *Od. serotina* Drej.
- 2 *O. litoralis* Fr. stj. *enkel*; bladen *köttiga*, ågrundt ell. bredt lancetl., *trubbiga*; de nedre blrna *kortare än* skärmbladen; fröb.  $\frac{1}{2}$  längre än fodret; för öfr. som föreg. ☉ 6, 7, mörkr. blr. Fig. Reich.t.1727,f.2. H.N.f.12, n:o 37.
- Hälsstr. (Sk.—Uppl. Ångskär i Holtnäs sn. VB. Neder-Kalix skärg., på Hvitgrundet. Boh. Öl. Fröbygårda. — N. Christiania?) *Blrna smärre och mörkare än hos föreg. Anses af flere förf. för en lokalform af föreg.* — *O. verna* Drej.
- Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

## 125. EUPHRASIA Lin. Ögontröst.

- 1 *E. officinalis* L., stjelken enkel, ell. med *utstående* grenar; bladen äggmunda sågade; fröhuset i spetsen *intryckt*. ☉ 6—8. — *a pratensis*: bladen bredt äggmunda, trubbadt sågade, platta och mjuka; fodret glandelprickigt. — *β nemorosa*: bladen udd-sågade, veckigt nerviga. — *γ curta*: 1—2 tum hög, vanl. mycket grenig, med små blr; blad som *β*. Fig. Fl.D.1037. H.N.f.9, n:o 17. *β* Sv.B.267. H.N.f.9, n:o 18. *γ* H.N.f.4, n:o 26.

Äng. back. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Blrna mer och mindre blåaktiga med gult svalg. Blir på feta ställen stor, med breda, n. hjertlika blad. — En medelform till följ. och innefallande när: β och γ är E. parviflora Fr.*

- 2 *E. gracilis* Fr. stjelken spenslig, enkel ell. med *upprätta* grenar; bladen ovala ell. af-långa, med 2—3 sågtänder i hvardera kanten; fröh. aflångt, *tvärhuggel*. ☉ 7, 8. Fig. Fl.D.2724. Reich.t.1733,f.4. [*E. micrantha* Reich.], icke 5. H.N.f.2, n:o 30.

Ljungback. (Sk.—Gestr. *Helsl. Hudiksvall*: Wistr. Ner. *Vestml. Vesteråstrakten. Verm. Dalsl.* vid Näs i Holm. *Boh. kring Strömstad*; Oroust och Koön. *Hall.* flerst. i söd. del.: Theor. *Öl. Götll. — N. Christiania*; nära Fredrikshall.) *Mycket spädare, ehuru ofta lika hög, ell. högre än föreg. Bladen säll. mer än en god linie breda och dubbelt så långa, de få tänderna åtskiljda af den raka bladkanten. Skiljd från följ. deri, att blrna äro mindre och n. reni hvita, samt bladen kortare.*

- 3 *E. salisburgensis* Funk. stj. som föreg., oftast alldeles enkel; bladen lancettlika—n. jemnbreda, med vigglik bas och 2—3, långt skiljda, *utböjda syllika*, hos de öfre bl. n. *borstlika tänder* i hvardera kanten; kronans öfre läpp 2klufven; fröh. som föreg. ☉ 7, 8. Fig. Reich.t.1730,f.2. H.N.f.14, n:o 20.

Back., tor. st. r. (Götll. nära Westringe i Etelhem sn; vid nordöstra sidan af Tingstade träsk; Stenkyrke sn enl. Leml.) *Späd som föreg., och knappt quartershög, sällan och då obetydligt grenad. Bladen, som hos föreg. äro föga mera än 1—2 lin. långa, äro hos närv. art omkr. dubbelt längre med samma bredd, och hafva de sliklika tänderna ännu mer åtskiljda. — E. alpina DC.*

## 126. RHINANTHUS Lin. Höskallra.

- 1 *R. major* Ehrh. blomskärmen *bleka gulaktiga*, de öfre djupt sågade, med syl-lika tänder; öfre kronläppens främre tänder *färgade, äggmunda*; kronpipen något *båglik* krökt uppåt. ☉ 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.348,f.1. Fl.D.981. H.N.f.7, n:o 11.

\* *alectrolophus* Poll. frön med smal, ell. omärklig hinnkant. Fig. H.N.f.10, n:o 19.

Äng. \* i åkr. a. (Sk.—Ängml. och Jemtl. *Öl. Götll. — N. till Ost-Finnm.*) *Af ljusare färg och större än följ. i synnerhet \*, som vanl. är korsvis grenad, med foder och blomskäft något sträfvat af korta hår. Fröets hinnkant hos a. n. lika bred som kärnan. Bladen var. hos bägge arterna från aflångt lancettlika till smalt jemnbreda. — R. Crista Galli β L.Fl.Su. \* R. hirsutus Lam.*

- 2 *R. minor* Ehrh. skärmen *gröna*, hvass-sågade; kronläppens tänder *äggmunda*; pipen rak. ☉ 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.348,f.2. Fl.D.2656. H.N.f.7, n:o 12.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Mindre och oftare enkel; var. i afseende på läpp-ländernas färg och bladens bredd. Till färgen mörkare än föreg.; fröen bredt hinnkantade. — R. Cr. Galli α L.Fl.Su. — Anm. R. alpinus Baumg., af Fries i S.V.Sc. uppgifven för mell. Sv. och N., torde vara osäker, såsom sedermera icke af någon angifven för något bestämdt växtställe.*

## 127. SCEPTRUM Rudb. Kungsspira.

- 1 *S. Carolinum* Rudb. stjelken enkel, n. bladlös; bladen parklufna med trubbiga inskurna och naggade slakar; blrna 3—4 i hvarje krans, tillsamm. bildande ett afbrutet ax. 2, 8. Fig. L.Fl.L.t.4,f.4,5. Sv.B.505. Fl.D.26.

Kärr, våta äng. r., i fjelltr. a. (Lpl.—*Helsl. och Dal. Verm. Vestml.* Sala vid Stampertorp; Kila sn etc. Ner. Sköllersta, Hardemo och Kräklinge snr. VG. Österplana-Vall; Härlingstorp vid Åxevalla-Hed; Sandhem sn, flerst.; Möseberg och Gökhem. *Dalsl.* nära Onsön i Ed sn enl. Leml. *Uppl.* i Jumkilsjärren etc. *Stockh.* vid Ensta i Täby sn. *Södm.* Dunker sn, i kärret Galghult. *ÖG.* Sjöbacka äng i Ljung, samt vid Öfre Götala enl. Kindb.; Väfversunda storäng. *Smål.* Vernamo; Åhs sn; Forssarum; Borge i Vexjö län: Scheutz. — N. Ost-Finnm. — Österdalen,

närmare Sv. gränsen; Gudbrandsdalen; öfre Tellemarken.) 2—3 *qv. hög*, med mer än *tumslånga* blr, till färgen *ljusgula* med *rödt* på läpparne. — *Pedicularis Sceptum Carolinum* L.

128. *PEDICULARIS* Lin. Frier.

† Kronans hjälm [öfre läpp] i spetsen 2flikig.

- 1 *P. palustris* L. stjelen enkel ell. *grenad ända upp*, utan bladämnen vid basen; bladen *paradelade*; hjelmen af *nedre läppens längd*, tvärhuggen med spetsiga flikar. 2 6, 7, r. säll. hv. blr. — *β borealis*: fodr. n. cylindriskt; blr och frön n. dubbelt mindre än hos *α*. Fig. Fl.D.2055.

Våta äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. — *β* Lpl. ÖG. Öst. Tjutton n. om Rejmyra: H. v. Post enl. Kindb.) *Stjelm och grenar upprätta*; 1—2 *qv. hög*.

- 2 *P. silvatica* L. stjelen *grenad endast vid rothalsen* i uppstigande grenar, och der omgifven af odelade tandade bladämnen; bladen *paradelade*; hjelmen *betydligt längre* än nedre läppen, framtill tvärhuggen, med en syl-lik udd i flikarnes spets. 2 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.358. Fl.D.225. H.N.f.12, n:o 38.

Fukt. skogsäng. r. (Sk.—Verm. Ner. och Vestml. ÖG. Rosl. Ortala bruk. Jemtl. vid Hofverberget. Gottl. — N. till Nordmör.) *Hufvudstjelen kort, enkel och upprätt, grenarne vid basen nedligg. med den blommande toppen uppböjda*.

- 3 *P. lapponica* L. stjelen *enkel*; bladen *parklufna*, med bred skifva, korta flikar; blrna i kort ax, utsperrade; hjelmen af *nedre läppens längd*, framtill *utdragen i en lång* 2flikig spets. 2 7, 8, g. blr. Fig. L.Fl.L.t.4.f.1. Sv.B.750. Fl.D.2. H.N.f.9, n:o 16. Subalpin fjellv. (Lpl.—Dal. — N.) *Enkel, churu stund. med 2—3 stjekar från samma rot*.

†† Hjelen hel.

- 4 *P. hirsuta* L. bladen *parklufna*, med bred skifva, korta, något *framdt* rigtade flikar; blrna upprätta, i ett tätt ax; fodret *5standadt*, tunnt *hvitulligt*; hjelmen *utdragen*, något *framkrökt*, trubbig. 2 6, 7, r. blr. Fig. L.Fl.L.t.4.f.3. Fl.D.1105. H.N.f.10, n:o 20. Högre fjellv. r. (Torn. Lul. och Pit. Lpm. På de högre fjellplatåerna i Lul. och nor. del. af Pit. Lpm. allmän enl. H. Widm. Dalsjellen enl. Linné. — N. Finn. Alten på Goskevarer; Eibydal och Talvig; Tsatsa; Sör-Reisen, på Middagsfjeld, samt Maalselv på Istinderne, Mauken etc.: Norm.: Nordl. Sulitälma, Kaddåive: H. Widm.; Snaasen; vid Beite mell. Valdres och Gudbrandsdalen.) 3—6 *tum hög, vanl. flerstjeltig; bladflik. icke tillbakaböjda som hos de följ.*

- 5 *P. flammea* L. bladen *paradelade* med något *neddt* rigtade flikar; blrna som föreg.; fodr. *5flikigt, glatt*; hjelmen *rak*, vid mynningen *trubbig*, inneslutande hela pistillen. 2 7. Fig. L.Fl.L.t.4.f.2. Fl.D.1878. H.N.f.11, n:o 23.

Högre fjellv. r. (Torn. Lpm. vid Tornioträsk. Lul. Lpm. Wiribaure, Wassja, Ala, Kerkeware, Toki m. fl. st. enl. ex. af And. Pit. Lpm. Sulitälma, Unna Metjispakti: Widm. — N. Finn. Tsatsa; Langfjeldene vid Beinelv: Norm. Nordl. Kaddeaware: Widm.) *Fingerhög; blrna brandgula, n. hela hjelmen mörkröd*.

- 6 *P. Oederi* Vahl: bladen och fodret *som hos föreg.*; kronhjelmen *vidgad*, något *klolikt nedböjd* mot mynningen och *mindre trubbig* än hos föreg.; pist. *oftast något utskjulande*. 2 6, 7. — *β foliosa*: axet nedtill försedt med långa skärmblad. Fig. Fl.D.30. H.N.f.3, n:o 15.

Fjelltr. (Jemtl. Snaashögen; Skurdalsporten, Smällhögarna och Sylsfjellen. Herjed. ned till Storsjöns fjell, samt Skarf- och Hamrafjellen. — N. Dovre, allmän; Vangs. i Opdal; Örkedalen; Tronfjellet; Ridalen; Hecke. etc.) 4—7 *tum hög, stundom med hvithåriga foder, hos oss oftare glatta; blrna guldgula, hjelmen blott i toppen rödbrun*. — *P. versicolor* Wg. *P. flammea* Fl.D. — *β*, en *luxurerande form*, är *P. virescens* Wg. och trol. *P. foliosa* Gunn., tagen på Vangsfjellet och vid Skurdalsporten.

129. *MELAMPYRUM* Lin. Kovall.

† Blrna närmade i mer och mindre täta ax.

- 1 *M. cristatum* L. bladen *lancettlika*, helbräddade; axen *4kantiga täta* pyramidlika, med *hjerflik* hopvikna *sliktandade* skärm. ☉ 7. Fig. Fl.D.1101.

- Ängsback. (Sk.—Gestr. och Dal. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N.) Blomskärmen vanl. brunröda, blrna röda med gul mynning, men var. med blekgula skärm och blr.
- 2 *M. arvense* L. bl. som hos föreg.; axen allsidiga, aflånga, mindre låta; skärmen lancettlika, parklufvetflikiga; blomfodren något sträfvä. ☉ 7. Fig. Fl.D.911.
- Åkr. (Sk.—Uppl. Rosl. Hargs skärgård på Medholmen. Boh. Oroust och Nordkoster enl. Leml. Hall. Öl. Gottl.) Skärm och blr, utom en vit ring på midlen och gul fläck vid den nedre läppens bas, röda.
- 3 *M. nemorosum* L. bladen äggrundt lancettlika, helbr.; axen n. ensidiga, bladiga och glesa; skärmen hjertlika spetsade hvasstandade; bl.fodren hvitulliga. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.423. Fl.D.303.
- Lundar, särd. i östra prov. (Sk.—Gestr. på Limöarne. Vestml. Hall. Öl.) Blomskärmen violetta, sällan hvita; blrna brandgula.
- †† Blrna ensamma i bladvecken, ensidiga.
- 4 *M. pratense* L. bladen lancettlika, helbr.; fodret glatt, flere gånger kortare än den tillslutna kronan. ☉ 7, 8, blekgula blr. — *β purpureum*: kronan mörkröd med invändigt gul läpp. Fig. Sv.B.286. Fl.D.2238.
- Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Norm. — *β* Sk. Vånga sn; Hjersås sn: F. Aresch. Blek. Berntorp. Smål. Dref och Bergunda; Vexjö flerst.; Solberga i Vestra härad: Scheutz. VG. Skölvveden och Vårgårda: J. Hult. Gottl. allmän.) Blrna blekare och dubb. längre än hos följ.
- 5 *M. silvaticum* L. bladen som hos föreg., stund. äggrunda långspetsade; fodret glatt, föga kortare än den vidöppna kronan. ☉ 7, 8, brandg. blr. Fig. Fl.D.145.
- Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Blrna omkr. 3 lin. långa; bladen vanl. 2—3 lin., men var., särd. i söd. Sv., nära 1 tum breda.

- 4 Flocken **OROBANCHE**. Ståndarknappar 2rummiga, utan tydliga bihang. Fröhus enrummigt.

### 130. OROBANCHE Lin. Snyltrot.

- 1 *O. major* L. fodret af 2, framtill hopväxta blad, hvardera klufvet i 2, något olikstora flikar; kronans öfre läpp djupt urnupen, den nedres flikar likformiga trubbiga; strängarne fastade nedom kronpipens midt, håriga; pistillen n. glatt. 2 7, 8, ljusbruna blr. Fig. Sv.B.596. Fl.D.1338, H.N.f.12, n:o 35.
- På rötterna af *Centaurea Scabiosa* och *Jacea*, r. (Sk. Lund; Malmö; Rå; Esperöd etc. Hall. Hasslöv: Theor. — N. Afendal på Tromsøe?) Stjelken 2—4 qv. hög, bladlös och fjällig, likasom hos alla arter i detta släkte; blrna n. tumslånga, i ax och något bågligt böjda framåt som hos följ. — *O. elatior* Sutt.
- 2 *O. Cirsii* Fr. fod. af 2, alldeles åtskiljda blad, nedom midten klufna i 2:ne olikstora, en-nerviga flikar; kronan som föreg.; sträng. fastade nära kronpipens bas, jemte pist. glatta. 2 7—9. Fig. Fl.D.2725. Reich.t.1832 [för ljus färg]. H.N.f.11, n:o 24.
- På rötter af *Cirsium heterophyllum*. r. (VG. på öst. sidan af Mösseberg, mell. Tingshögen och Jättened.) 2—3 qv. hög, men mycket spädare än föreg.; blrna smärre, blekgula med bråmet dragande i violett [enl. torra ex.]; ned. läppens flikar n. tvärhuggna.

### 131. LATHRÆA Lin. Fjällrot, Vetteros.

- 1 *L. Squamaria* L. stjelen bladlös, fjällig; blrna i ensidig klase, hängande; nedre läppen 3flikig. 2 4, 5, purp. blr. Fig. Sv.B.316. Fl.D.136.
- Skugg. bergsrötter, r. (Sk.—Uppl. Gåsskär i Elfkarleby sn. Gefle, vid Stenbäcken. Vestml. och Verm. i bergslagen. Ner. Dalsl. Baldersnäs m. fl. st. Boh. Uddevalla, vid Kasen. Hall. Öl. Gottl. — N. Dröbak, Gjellebäk; Asker; mellan Eger och Drammen etc.) Hela värtan ofvan jord ljusröd, under jorden vit, delad i grenar, täckta med tjocka skiffliga fjäll.



20 Fam. **LENTIBULARIÆ** Rich. Krona oregelbunden, 2läppig, med sporre. Ståndare 2. Fröhl. Irummigt, med fritt centralfäste.

### 132. *UTRICULARIA* Lín. Blåsort.

† Bladen parbladigt delade i hårfinar likar.

1 *U. vulgaris* L. bladlikarne blåsbärande; den öfre kronläppen *knappt högre än den nedres huflikt uppsvållda bas*; sporren kägel-lik, *frånstående*; ståndarknapp. *förenade*. 2 7, 8, brandg. blr. Fig. Sv.B.572. Fl.D.138.

Vatten, i diken etc. (Sk.—VB. Torn. Lpm. Karesuando. Jemtl. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. till Hitteren i Trondhjs stift. Ost-Finnm. C'olmijaure vid Svanvik.) *Blrna n. en tum i längd; stängeln brun, klasen med talrikare blr än hos de följ.*

2 *U. neglecta* Lehm. bladflik. blåsbärande; öfre kronläppen 2—3 gånger högre än den nedres huflika bas; sporren kägel-lik *tilltryckt*; ståndarkn. *fria*. 2 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1981. Reich.t.1824,f.1—3. H.N.f.8, n:o 11.

Stillast. vatten r. (Smål. Lidhult, i vattengropar vid Fylle-å nära Thorsberg; Jönköping, Ryhof. Verml. Carlstad flerst.; Christinehamn, i Broängarne.) *Något mindre än föreg.*

†† Bladen tredelade med klynnedelade likar,

\* Bladflik. platta, ennerviga och borstbräddade.

3 *U. intermedia* Hay. bladlikarne smalt jemnbreda—syllika; luftblåsorna *på egna bladlösa grenar*; öfre kronläppen n. *dubbelt högre än den nedres bas*; sporren *syf-lik*, *tilltryckt*. 2 7, 8, g. blr. Fig Sv.B.561. Fl.D.1262.

Vatt. kärr. (Sk.—Lpl. Boh. Strömstad. Hall. Gottl. — N. till Snaasen i Trondhjs st.) Ört och blr dubb. mindre än hos *U. vulg.*; *kronans nedre läpp n. platt*. — Anm. *U. Grafiana* Koch är endast en af torrare lokal beroende form, med ända till den trubbad, borstuddiga spetsen jemnbreda bladlikar.

4 *U. ochroleuca* R. Hn. bladflik. som hos föreg.; luftblåsorna *dels på egna bladlösa grenar, dels på bladlikarne*; sporren *kägellik, trubbig, frånstående*; för öfr. som föreg. 2 7, 8. — *β microceras*: sporren n. dubb. kortare; blr brandgula. Fig. H.N.f.16, n:o 23.

Vatt. kärr, r. (Angml. Multrä sn: Stud. F. Kempe enl. Lem. Helsl. nära Tönshammar sjön i Skog sn. Uppl. Film sn. Ner. Knista sn, i Farbrorstorps mosse; Hammar sn, vid Aspa. ÖG. Herresäter i Värna enl. Kindb. Smål. Sund i Jersnäs sn; Gårdsrum och Wilstad snr. Verml. Carlstad flerst. t. ex. på Örsholmen, vid Jacobsberg etc. — *β Smål. Wrigstad sn.*) *Mycket spåtare än föreg., från hvilken den är skild genom de på bladen och egna grenar sittande blåsorna, den rödbruna stängeln och sporren, samt den sednarens form. Blrna hos hufvudformen blekt smulsgula.*

\* Bladflik. hårlika, nervlösa och glatta.

5 *U. minor* L. öfre kronläppen *af samma längd som den nedres bas*; ned. läppen *eliptisk ell. oval*, med *tillbakaböjd kant*; sporren mycket kort, trubbig. 2 7, blekg. blr. Fig. Sv.B.585. Fl.D.128. Reich.t.1825,f.1. H.N.f.16, n:o 24.

Vatt. diken (Sk.—Torn. Lpm. Boh. Strömstad m. fl. st. Hall. Gottl. — N. till Nordl. Ost-Finnm. ofvan Nyborg.) *Hela växten mindre än föreg.; foderbl. n. runda, af smalnande till en spets.*

6 *U. Bremii* Heer: kronans nedre läpp n. *cirkelrund och platt*; för öfr. som föreg. 2 7. Fig. Reich.t.1825,f.2.

Vatt. r. (Smål. Hagsbult sn vid sjön Målen; Wrigstad sn, vid Kyrkarp; Skatelöfs sn, i Taglamyren; Jönk., Ryhof. Verml. Väsehärad; vid Skallebysåtern i Fryksände sn. Angml. Salteå i Nora sn.) *Mycket lik föreg., dock med ännu mindre blr och, som del af torra ex. synes, af renare gul färg, samt n. njurformiga foderblad, med udd.* — *U. pulchella* Lehm. och Fr.S.V.Sc.

## 133. PINGUICULA Lin. Tåttört.

- 1 *P. vulgaris* L. bladen elliptiska; kronansflikar olikstora, hela, rundade; sporren n. jemntjock, *syl-lik rak*, n. af kronans längd. 2 5—7, blå blr. —  $\beta$  *grandiflora*: kronan dubbelt större med 3—5flikig nedre läpp. —  $\gamma$  *bicolor* Nordst. kronan violett med hvit läpp. Fig. Sv.B.36. Fl.D.93.
- Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  *Medelp.* Hässjö sn enl. Leffl. — N. fjellen; äfven på Norrfjellet i Buskeruds fögderi samt vid Christiania. —  $\gamma$  *Lul. Lpm.* Stenbäcken mell. Jokkmokk och Pajarim: L.Fl.Lapp. VG. Sandhem sn flerst.: O. Nordst. — N. Dovre.) Var. *mycket i ans. till sporrens dimensioner och blomskaflets hårlighet; blrna någon gång ljust gredelina.*
- 2 *P. alpina* L. bladen som hos föreg.; blomskaflet *glatt*; sporren *kägellik, framböjd, kortare än kronan*. 2 6, 7. Fig. L.Fl.L.t.12,f.3. Sv.B.685. Gunn. Fl.N.2,t.4. Fl.D.453. H.N.f.14, n:o 22.
- Fukt. st. egentl. i fjelltr. (Lpl. Götll. vid Gothenåsan; Storugns i Lärbro; Visby; Eista etc. — N. Ost-Finm. — Nordl.; Rörstrakten.) *Blrna hvita, med en ell. två gula fläckar [ $\beta$  bimaculata] inpå nedre läppen.* — *P. flavescens* Flörke.
- 3 *P. villosa* L. bladen rundade; blomskaflet *hårligt*; sporren *rak syl-lik*, genom blomskaflets böjning vid blomman, *vänd bakut*. 2 7, blå blr. Fig. L.Fl.L.t.12,f.2. Sv.B.686. Fl.D.1021. H.N.f.3, n:o 17.
- Fjellv. (Lpl.—Dal. i Idre på Långfjellet samt mell. Idre och Gördalen. Ängml. Tåsjö sn, nära Stortjärn. *Medelp.* Hafverö sn, nära prestg. — N. Finm. — Dovre och Tronfjellet i Österdalen.) *Mycket spädnare än de föreg.; kronan nedplattad strimmig; fröth. n. kubiskt.*

- 21 Fam. PRIMULACEÆ Lin. Krona regelbunden. Ståndarne motsatta kronflikarne. Fröth. som i föreg. familj.

- 1 Flocken **Rotaceæ** L. Örten med bladig stjeln.

## 134. TRIENTALIS Lin. Dufkulla.

- 1 *T. europæa* L. bladen ovalt lancettlika, finsågade. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.591. Fl.D.84. H.N.f.16, n:o 25.
- Skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Stjeln 1—2blommig; bladen på stjelnens nedre del *inga ell. skiftevisa; de öfversta n. kransvisa.*

## 135. LYSIMACHIA Lin. Videört.

- 1 *L. vulgaris* L. stjeln *upprät, småluden*, med blomknippe ell. klase i toppen; bladen 2—4 i krans, *lancettlika*. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.345. Fl.D.689.
- Stränd. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Älnshög; vanl. med flerblomm., stund. enblomm. blomskafst i toppen och de öfre bladvecken.*
- 2 *L. numularia* L. stjeln *krypande, glatt*, med ensamma blr i *bladvecken*; bladen motsatta, *rundade*; foderflikarne n. *hjerlika*. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D.493.
- Gräsväxta ställ. nära vatt. (Sk. *Blek.* Nätraby sn; Carlshamn enl. Scheutz. *Smål.* Vestervik, Marnäs i Nöbbelved; Vestrum sn, Helgerum. — *Gefle*, vid Kastet. VG. Göteborg flerst. enl. Leffl. *Boh. Hall.* Hasslöf. *Öl. Götll.* — N. söd. del. mellan Skien och Follestad.) *Har stora, något plattade blr. Var. med rundadt trubbiga och omärkligt spetsiga blad.*
- 3 *L. nemorum* L. stj. *nedligg., glatt*, med blr i *bladv.*; bladen motsatta, *äggrunda spetsiga*; foderflik. *lancettlikt syl-lika*. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.174. H.N.f.1, n:o 21.
- Skugg. och fukt. st. r. (Sk. Öfvedskloster; Bjärsjö Ladugård; Romeleklint, ej långt från Husarhusen vid bäckrännilar; Andrarum m. fl. st. *Smål.* Vestervik, vid Marnäs, enl.

Ekstr. — N. Bergen på Ulriken; på Storöen i Bergs st. vid Kårevigen; Molde.)  
Blrna 2—3 lin. i diam.

## 136. NAUMBURGIA Mönch. Topplösa.

- 1 *N. thyrsiflora* Reich. stielk. upprät; bladen motsatta, lancettlika; blomklasarne tätta, långskaftade i de mellersta bladvecken. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D.517.  
Vatten. (Sk.—Lpl. Boh. Uddevalla; Strömstad. Öl. Eriksöre. — N. till söd. Finnsm.: Norm.) De öfversta bladen mest tättsittande. — *Lysimachia* L.

## 137. ANAGALLIS Lin. Rödarv.

- 1 *A. arvensis* L. bladen äggrunda—afånga oskaftade, 2 [säll. 3] motsatta; kronflikarne i kanten fint glandelhåriga. ☉ 6, 7. —  $\beta$  *cærulea*: blrna blå. Fig. Sv.B.123. Fl.D. 88.  $\beta$  Fl.D.1570.  
Torra st. åkr. och hafsstr. (Sk.—Södm. Stockh. Verml. Molkom i Nyeds sn. VG. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Mandal; Arendal; Kirköe, en af Hvalöarne etc. —  $\beta$  Sk. vid Lund, Fjällige, Lyngsjö m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. Jönköping: J. E. Zett. Södm. Floda prestg. enl. C. Ind.) Blrna hos  $\alpha$  vanl. mönjeröda, stundom mer och mindre hvita; hos  $\beta$  rent blå, men lika glandelbräddade som hos  $\alpha$ ; skiljes dock af Koch och Fries som egen art.

## 138. CENTUNCULUS Lin. Knutarv.

- 1 *C. minimus* L. stj. vanl. grenig, stund. enkel; bladen skiftevisa, äggrunda—n. lancettl.; blrna n. oskaftade i bladvecken. ☉ 5—7, rödl. blr. Fig. Sv.B.610. Fl.D.177 och 1567. H.N.f.1, n:o 22.  
Fukt. sandjord, r. (Sk.—Boh. VG. Dalsl. nära Venersborg. Verml. i Fryksdalen. Blek. Smål. Hjortheds prestg.; Påskallavik och Tuna vid Piptorpssjön; i Kronob. län. Ljunga och Algutsboda. Öl. Böda. Gottl. södra del. — N. till Trondhj.) Omkr. 1 tum hög, äldre ett par tum. Den enkla, mer smalbladiga formen är *C. simplex* Fl.D.1567.

## 139. GLAUX Lin. Strandling.

- 1 *G. maritima* L. bladen motsatta, äggrunda—afånga; blrna oskaft. i bladvecken. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.443. Fl.D.548.  
Hafsstr. a. (Sk.—VB. Neder-Kalix. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finnsm.) Fingerhög med något köttiga blad, klocklika blr.

## 140. SAMOLUS Lin. Punge.

- 1 *S. Valerandi* L. stielken upprät; alla bladen bredt spadlika; blrna i klase; blomskafsten med skärm nära midten. ☉ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.198. H.N.f.15, n:o 24.  
Hafsstr. på östra kusten, r. (Sk.—Norra Uppl. Öl. Gottl.) 1—2 quart. hög, slutl. grenad i glesa blomklasr.  
2 Flocken *Preciæ* L. Örten utan egentl. stielk. med blad (i rosett) och allmänt blomskafst ell. stängel från rotstocken.

## 141. PRIMULA Lin. Vifva.

† Kronan [gul] med vidgadtt svalg.

- 1 *P. veris* L. bladen äggrunda, med tvär bas, smalt nedlöpande på skaftet, olikformigt naggade, skrynkligt ojemna, omärkl. flinudna, under blekare; blomfloken på utdragen stängel; foderflik. äggrunda, spetsiga [utan särskild udd]; kronans bräm djupt konkavt. 2 4, 5. Fig. Sv.B.5. Fl.D.434.  
Äng. a. (Sk.—Ängml. Jemt. på Frösön m. fl. st. Boh. Öl. Gottl. Norr om Gefle sällsynt. — N. upp till Lysöen, i Trondhjs stift; Levangernæset.) Blrna höggula. — *P. officinalis* Jacq.  
2 *P. elatior* Jacq. blad och blomflock som hos föreg.; foderflik. uddspetsiga; kronbrämet vidgadtt, föga konkavt. 2 4, 5. Fig. Fl.D.433. Reich.t.1090, f.1. H.N.f.2, n:o 32.  
Äng. och parker, r. (Sk. Kullaberg; Ölvedskloster; Tulesbo; Skärtofta sn; Bjärsjö ladugård enl. F. Aresch. — N. södra delen, t. ex. Mandal.) Blrna svafvelgula, med

större och plattare bräm än hos föreg., men mindre än hos följ. — *P. veris*  $\beta$  elatior L.

- 3 *P. acaulis* Jacq. bladen ovala trubbiga, jemnt afsmalnande till skaft; blomskäften från rotstocken, enkla och enblommiga, eller i mycket kort skafstad flock; fodertänd. lancettlika spetsade; kronbrämet platt. 2 4, 5. Fig. F.I.D.194. Reich.t.1091,f.23. H.N.f.2, n:o 33.

Ang. och park. r. (Sk. Kullaberg: vid Bökebol, Råbagen och Gylleröd enl. Lilja. — N. Christiansand; Hitterøe; Hatvigen; Bergen upp till Statlandet.) *Blirna* svafvelgula med brämet ända till 1 tum i diam. Blomskäftens hår långa. — *P. veris*  $\gamma$  L. *P. grandiflora* Fr. S.V.Sc. *P. vulgaris* Bab. *P. sylvestris* Scop.

†† Kronan [blå ell. rödakt.] med trångt svalg.

\* Bladen på undre sidan tätt hvitmjölīga.

- 4 *P. farinosa* L. bladen omv. äggrunda—tunglika; flocken mångblommig; blomfödr. aflångt, med jemnbreda, trubbiga flikar n. af kronpipens längd; kronflik. bredt omv. hjertlika, af pipens längd; fruktämne omv. äggformigt. 2 5, 6, rödgredel. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.442. H.N.f.13, n:o 38.

Sidländta äng. (Sk.—Helsl. Jemtl. allm. i Storsjötrakten. Um. Lpm. Dal. Verml. Öl. Gottl.) Stängeln öfversta del jemte blomskäften och fodret hos denna och följ. art vanl. lika hvitmjölīga som bladens undersida.

- 5 *P. scotica* Hook. bl. omv. äggrunda; flock mångblommig; fod. aflångt, något bukigt, med äggrunda, trubbiga flikar, betyd. kortare än kronpipen; kronfl. som föreg., af halfva pipens längd; fruktämne klotrundt. 2 6, mörkviol. blr. Fig. F.I.D.125 [enl. Blyt]. E.B.2608. H.N.f.8, n:o 12.

Ang. och bergsslutt. i fjelltr. (Lul. Lpm. enl. Ands. Pit. Lpm. Arjeplog; Gullön vid Storafvan. Jemtl. Östersund, i Björnmyran. Herjed. Stora Midtåkläppen. — N. Finnm. och Nordl. Dovre, allm. Gudbrandsdalen.) Lågre och af stadigare växt än de öfr. i afd., med de mörkt ell. blåaktigt violetta blirna på korta skaft i n. hufvudlikt sammandraingen flock.

\*\* Bladen på undre sidan gröna ell. mycket glest mjölprickiga.

- 6 *P. stricta* Horn. bladen aflånga ell. tunglika—spadlika, afsmalnande till ett kort skaft, n. bara [utan mjöl]; flock. meränd. fåblommig; fod. n. äggformigt, bukigt med äggrunda flikar, betyd. kortare än kronpipen; kronflik. viggformigt omv. hjertlika åtskilda, omkr. 3 gr kortare än pipen. 2 6, 7, ljusst gred. blr. Fig. F.I.D.1385. H.N. f.5, n:o 11.

Fukt. äng. i fjelltr. (Ipl.—Herjed. — N.) Stängeln vanl. högre, och glänsande mörkgrön, men mer fåblommig än hos de föreg.; blirna smärre, mycket ljusa med smälare kronflikar, kortare foder. Var. enl. Norm. i Finnm. med 5—10blommig, tjock och stadig stängel, närmande sig något till föreg. — *P. farinosa*  $\beta$  Wg.

- \*7 *P. sibirica* Jacq. bladen äggrunda—oval, helbräddade med utdraget, smalt skaft, fullkomligt bara; flocken 1—3blommig; fod. n. af kronpipens längd; kronflik. som hos föreg., vanl. längre än pipen. 2 7, 8, gred. blr. Fig. Sv.B.530. F.I.D.1809. H. N.f.8, n:o 13.

Strandäng. r. (N. Finnm. vid Altenfjord: Tålvig, Kaafjord, Elybacken; Hammerfest; Hasvig i Loppens sn; Maasøe; Vardøe; Renøe i Pasvigfjord; Jarfjorden enl. Th. Fr.) Har säll. mer än 3 blr i flocken, men större än hos de 3 föreg. — *P. integrifol.* Gunn. *P. norvegica* Retz. *P. finnmarchica* Ed.4.

#### 142. ANDRÓSACE Lin. Hillsko.

- 1 *A. septentrionalis* L. stäng. finluden; bladen i rosett, lancettlika tandade, n. glatta; blomflockens svepebl. kortare än skäften; fodret glatt, kantigt, något kortare än kronan. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.483. F.I.D.7. H.N.f.8, n:o 14.

Sandåsar, r. (Sk.—Gefle. Ner. Öl. Gottl. — N.) Var. med n. oskafstad blomflock.

#### 143. HOTTONIA Lin. Vattenblink.

- 1 *H. palustris* L. stängeln upprät, med krausvisa, skafstade blr. 2 6, 7. Fig. Sv.B.603. F.I.D.487 och 1867.

Stillestående vatt. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Öl. Gotll.) Stjelden ned-sänkt, bladen kammtikt pardelade; blrna hv. ell. rödlåta.

- 22 Fam. GLOBULARIÆ DC. Blomkorg. Krona oregelbund. Stånd. 4. Fruktämne inom blomman, slutl. enrumm. enfröigt, nöt med ett hängande frö.

144. GLOBULARIA Lin. Bergskrabba.

- 1 *G. vulgaris* L. rotbladen ovala ell. spadlika, hela ell. i spetsen 3tandade; stjeklbladen lancettlika. 2 6. Fig. Sv.B.364. Fl.D.suppl.84. H.N.f.4, n:o 18.

Kalkberg, r. (Öl. vestra landtborgen, mångenståd. från Borgholm ned till Ottenby; på alvaren från Resmo till Hulterstad sn enl. Sjöstr. Gotll. mångenstädes.) Ört med 3—6 tum hög, enblomstrig stjekl, hvilken vid blomningens början ofta är söga utvecklad; blrna blå, stund. hvita. — *G. spinosa* Lam. *G. suecica* Nym. Ull.förf.: *G. vulgaris* är en helt annan art, näml. *G. Willkommii* Nym.

- 23 Fam. PLANTAGINÆ Juss. Krona regelbunden, 4-klufven. Stånd. 4, skiftevisa med kronflikarne. Fröh. med centralt fröfäste, 2- ell. 4rummigt. säll. nötkikt, enrummigt, enfröigt.

145. PLANTAGO Lin. Groblad.

† Bladen äggrunda—lancettlika, hela.

- 1 *P. major* L. stäng. trind, otydl. strimmig; bladen äggrunda tandade glatta, ell. omärkl. småbåriga; axet cylindriskt; fröh. mångfröigt. 2 7, 8. —  $\beta$  *scopulorum*: bladen mer och mindre grofttandade tjocka. —  $\gamma$  *agrestis*: roten enårig; bladen tunna ludna; axet aflångt. Fig. Sv.B.93. Fl.D.461.

Väg. åkr. stränd. a. (Sk.—Lul. Lpm. — N. till Finn.: Norm. —  $\beta$  Sk. — Rosl. Hall. Öl. Gotll. — N. —  $\gamma$  Sk. vid Gessige. Blek. Ronneby. Smål. Algutsboda; Kalmar. VG. vid Väringe k:a; Säby. Boh. på Klöfverön; Grebbestad; samt Hall. flerest. enl. Lem.) Var. från 1 tum hög med n. äggformigt ax till 1½ fot med kvarterslångt, jemntjockt ax; ståndarknapparne rödbruna. — Anm. Alla Skand. arter hafva bladlös stängel.

- 2 *P. media* L. stäng. som hos föreg.; bladen ovala—äggrunda, ludna; axet aflångt, slutl. cylindriskt; fröhuset 2—4fröigt. 2 6, 7. Fig. Sv.B.631. Fl.D.581.

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Lofoden.) Axet utblommadt cylindriskt; ståndarknapp. n. hvita på ljusröda strängar.

- 3 *P. lanceolata* L. stäng. kantig, fårad; bladen lancettlika, glest naggtandade, spetsade; axet klot- ell. äggformigt; fröh. 2fröigt. 2 5—7. —  $\beta$  *dubia*: rothalsen och bladen vid basen täckta af snöhvitt ull. Fig. Sv.B.632. Fl.D.437.

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Sk. Ystad, vid Köpingeåns utlopp etc. Blek. Smål. Kalmar; Vestervik. ÖG. Gryt sn: Kindb. Öl. Gotll.) Stånd. n. hvita. Var. mycket till stort och axets form; på fet, odlad jord stund. alnshög och bredbladig: var. *mazima*, på hafsstr. med n. jemnbreda långhåriga blad: var. *graminifolia*. —  $\beta$  *P. dubia* L.

†† Bladen jemnbreda, hela, ell. parklufna med jemnbreda flikar.

- 4 *P. minor* Fr. stäng. trind; bladen smalt jemnbreda, nervlösa; axet aflångt ell. cylindriskt; fröh. mångfröigt. 2 6. —  $\beta$  *depressa*: större, nedliggande; bladen bredare, glest tandade; axet längre. Fig. Ups.Vet.Soc.H.1851,t.4,f.a;  $\beta$  f.b. Fl.D.suppl.t.9. H.N.f.4, n:o 27;  $\beta$  f.16, n:o 28.

Tor. st. r. (Öl. på alvarens ofruktbaraste ställen. —  $\beta$  Öl. Åhs sn, vid Kärra; Gråsgård sn, vid Qvingsröta; Segerstad sn, vid Seby.) 1—2 tum hög, med knappt 1 lin. breda blad, ofta längre än stängeln; axet når hos  $\beta$  en tums längd; frön 6—8.

- 5 *P. maritima* L. stäng. trind; bladen köttiga, jemnbreda, rånnformiga; axet långt cylindriskt, med glatta blomskärm af fodrets längd; fröh. merändels 2fröigt. 2 7.

— *β dentata*: bladen något lancettlika, glest tandade. Fig. Fl.D.691, 243. H.N.f.16, n:o 27. *β* Fl.D.1634.

Hafsstr. (Sk.—VB. Boh., Öl. Gottl. — N.) Bladen variera från trådlika ennerviga till 3—6 linier breda, och ända till 5nerviga [*P. serraria* Retz.?]; stånd. gula. En var. med korta, trådlika blad är *δ gentilis* Fr. Fl. Hall.

- 6 *P. Coronopus* L. stäng. trind; bladen jemnbreda, parklusna, med långt åtskilda smalaflikar [stundom hela]; axet cylindriskt, med egggrundt syl-lika blomskärm; fröh. omkr. 6fröigt. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.723. Fl.D.272. H.N.f.1, n:o 23.

Hafsstr. (Sk. Blek. Smål. Hall. Domsö; Koön vid Marstrand m. fl. st. Öl. Gottl.) Härig ört, med fåfröiga fröhus, emedan flere frön icke mogna. Bladen på magra ställen n. hela, glest tandade; stånd. gula.

#### 146. LITORELLA Lin. Strandpyrl.

- 1 *L. lacustris* L. bladen upprätta syl-lika, jemte de enblomm. blomskäften från rotstocken; blrna skildkonade. 2 6—8. Fig. Sv.B.532. Fl.D.170. H.N.f.11, n:o 25. Sjöstr. i vattenbrynet, r. (Sk.—Uppl. Dalelven vid Söderfors bruk. Helsl. Norrbo vid Dellarne; Ströms bruk. Wistr. Angml. Skog och Styrnäs sn; Högsjö sn, vid Mört-sjön; Arn. Pål. Lpm. i Svärdeffen. Vestml. Ridön; Skinnsk.berg; Nora. Ner. Verml. Dalsl. VG. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) Hanblommans skaf 1—2 tum högt, bladen likna dem hos *Isotles*, men äro icke 4pipiga inuti.

- 24 Fam. PLUMBAGINÆE Juss. Krona regelbunden, med 5 stånd. motsatta flikarne. Frukt enrumm., med ett, vid centralfästet hängande frö.

#### 147. STATICE Lin. Marrisp.

- 1 *S. Behen* Drej. stängeln trind; bladen aflånga—omv. äggrunda, med udd i spetsen, under tydl. svartpunkterade; blomsamlingens grenar utböjda, tätblommiga, med sina nedersta fjäll tomma. 2 7, 8, ljusb. blr. Fig. Fl.D.2409. Reich.t.1140.f.1. H.N.f.10, n:o 21.

Hafsstr. r. (Sk. väst. kusten: Hyellinge; Eskilstorp; Gessie; mell. Landskrona och Helsingborg; Kullen etc.) Vanl. mindre och mer tätblommig än följ.; bladens sidonerv variera hos bägge arterna mer och mindre tydliga. — *S. Limonium* *β* Ed.3.

- 2 *S. rariflora* Drej. stäng. kantig; bladen som föreg., otydl. punkterade; blomsamlingens grenar n. upprätta, glesblommiga, med blr inom alla fjällen. 2 7, 8, ljusb. blr. Fig. Fl.D.315 och 2410. Reich.t.1140.f.2. H.N.f.3, n:o 18; f.11, n:o 26.

Hafsstr. r. (Sk. Torrekov på Skäppaskär. Boh. på Lögholmen i Tanum; Lindön; Marstrand, på Koön; Domsö; Gåseskär nära Henån etc. — N. Christianiafjorden, Krageröe m. fl. st.) 2—3 qv. hög. — *S. Limonium* L. St. Bahusiensis Fr. (den högre formen).

#### 148. ARMERIA Willd. Trift.

- 1 *A. elongata* Koch: stängeln vanl. glatt; bladen smalt jemnbreda, något spetsiga, vanl. härbräddade; yttre holkfjällen uddspetsiga; fodret hårigt långnerverna. 2 6, 7, ljusr. blr. Fig. Fl.D.1092 och 2585. H.N.f.8, n:o 15.

Torra äng. (Sk.—Uppl. Vestml. Dal. Grangärde sn, Sunnansjö bruk. VG. Venersborg. Boh. Öl. Gottl. — N.) Stängeln fotshög, mer central [från bladknippets mid] än hos följ.; bladen n. trådsmla, ennerviga, säll. en linie breda och då med 2 svagare sidonerv. — *A. vulgaris* W. *Statice Armeria* L.

- 2 *A. maritima* W. stäng. vanl. finhårig; bladen som föreg. trubbiga; yttre holkfjällen triangulära med ingen, ell. omärklig udd; fodret öfverallt hårigt. 2 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.2584. H.N.f.5, n:o 12; f.16, n:o 26 [glatt var.].

Hafskust. (Sk. längs hela kusten, mest på den vest. Hall. Snöstorp; Theor.; mell. Varberg och Kongsbacka, högst ymnig och gåendé långt in åt landet. Boh. — N. Fredriksvärn på vallarne. Christiania; och trol. hela södra och vest. kusten. Molde.

Trondhj. Nordl. Helgeland; Bodø; Hadselö i Vesteraalen: Norm. Finnm. på Maasøe: Th. Fr.) *Växer i stora, rikt blommande tufvor, med quartershöga, sällan 7—8 tum höga blomstänglar.* — *A. pubescens* Lk. | *Statice Armeria* E.B. *S. marit.* Mill.

\*3 *A. sibirica* Turcz. stäng. glatt ell. nedtill glesl hårig; bl. som föreg., glatta, endast vid basen hårbräddade; holkfj. rundade och trubbiga; fodr. som hos föreg. 24 7, ljusr. blr. Fig.

Fjellv. r. (N. Ost-Finnm. Svartnæs midtför Vardø; mell. Vardø och Persfjorden: E. Henschen enl. Th. Fr. Vest-Finnm. Porsanger, på spetsen af Silfavarre: Norm.; Tsatsa, på öfversta slutt. mot Kiittdalen.) *Norska ex. enl. Th. Fr. bestämda af Boiss. Synes vara en från föreg. föga skild art.*

## 2 Serien: THALAMIFLORÆ.

### 4 KLASSEN

### DISCIFLORÆ.

- 25 Fam. CORNÆ DC. Kronblad 4, i knoppen kantlagda. Fruktämne 2rummigt, vidväxt fodret och täckt af disken, slutl. en 2rummig, 2fröig, bärlik stenfrukt.

#### 149. CORNUS Lin. Kornell.

- 1 *C. sanguinea* L. buske med glatta grenar; bladen *skaftrade*, äggrunda, på båda sidor gröna; blrna *utan svepe*, i platta qvastlika knippen.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.235. Fl.D.481. H.N.f.2, n:o 35.

Lund. r. (Sk. Blek. Vemmö; Berntorp och Ramdala enl. Gosselm. ÖG. VG. Boh. Lindö; Koster. Öl. Gottl. — N. Porsgrund, Langesund etc. upp till Söndmör och Tellemarken.) *Manshög buske, med röd bark på grenarne, svartblå stenfrukter.*

- 2 *C. suecica* L. ört; bladen *oskaftrade*, äggrunda, bågnerviga; blomflocken mycket kortare än de 4, äggrunda spetsiga *färgade svepebladen*.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B.201. Fl. D.5. H.N.f.2, n:o 34.

Fukt. st. (Lpl.—Gestr. och Verml. Mer spridd i rikets sydl. prov. ända till Sk. Blek. Hall. och Boh. Gottl. — N.) *Quartershög med små svartröda blr inom ett stort hvitt kronbladlikt svepe. Röda [någon gång hvita] stenfr.*

- 
- 26 Fam. CELASTRINEÆ R. Br. Kronblad 4, 5, i knoppen tegellagda. Fruktämne flerrumm., nedsänkt inom disken, fritt ell. vidväxt fodrets botten, slutl. fröhus ell. bärlik stenfrukt, med lika många frön som rum.

#### 150. ILEX Lin. Kristtorn.

- 1 *I. Aquifolium* L. bladen äggrunda spetsiga vågiga och med styfva tornar i kanten; blrna flockvisa i bladveckan.  $\frac{1}{2}$  7, hv. blr. Fig. Fl.D.508. H.N.f.10, n:o 17.

Lund. r. (Boh. vid Vägga i Tossene sn; nu mer trol. utrotad. — N. Christiansands och Bergens st. till Söndmör; t. ex. Arendal på Mærdöe och vid Lindesnäs, ymnig.) *Träd med läderartade, glänsande blad, de öfre stundom utan tornar; röda stenfr.*

#### 151. EVONYMUS Lin. Benved.

- 1 *E. europæus* L. bladen bredt lancettlika ell. aflånga, glatta; blomskäften 2—3blommiga plattade; blomdelarne 4taliga; kronbl. äggrundt aflånga; fröhusen trubbvinkliga.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B.247. Fl.D.1089. H.N.f.2, n:o 36.



Skogsäng. r. (Sk. Hall. Blek. Smål. Tykatorp i V. Torsås. *Öl. Gottl.* — *N. Smålehnene; Tellemarken.*) *Omkring manshög buske, med korsvisa grenar, gulgröna blr, röda fröhus.*

27 Fam. **ARALIAOEÆ Juss.** Kronbl. 5, i knoppen kantlagda. Frukt fierrummigt bär, med ett hängande frö i hvarje rum.

152. **HÉDERA Lin.** Murgrün.

- 1 *H. Helix L.* bladen handlikt 3—5flikade, blomgrenarnes hela äggrunda spetsade; blrna i flock. 5, 9, 10, gr. blr. Fig. Sv.B.397. Fl.D.1027. H.N.f.13, n:o 39.  
Skog. berg etc. (Sk.—Mälaren. VG. Halleberg. Dalsl. på Kroppefjell; Lindheden; Hedeberget etc. Boh. Uddevalla; Marstrand; Henån, på Hedberget. *Öl. Gottl.* Sällsynt norr om Smål. — *N.* vid kusten från Arendal och Christiansand upp till Hardangerfjorden.) *Buske med klångande grenar, som fästa sig medelst luftrotter; beständigt gröna blad och svarta bär, som mogna året efter blomningen.*

28 Fam. **UMBELLIFERÆ Juss.** Kronbl. 5, i knoppen inrullade. Stånd 5. Fruktämne beklädt af det vidväxta fodret; slutl. 2:ne hopväxta, vid mogningen skiljbara, enfröiga delfrukter [dubb. skallfr.]. Stift 2.

- 1 Flocken **Cælospermæ.** Delfrukternas mot fogen vända sidor skålformigt konkava.

153. **CORIANDRUM Lin.** Koriander.

- †1 *C. sativum L.* hela växten glatt; stjelen strimmig; de nedre bladen mindre delade med n. vigglika flikiga småblad, de öfre findelade; blomflocken 3—5strålig. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1989. Reich.Umbellif. 202.  
Förvildad omkr. plant. r. (Boh. på backar omkr. Marstrands fästning; mell. Kongsbacka och Walda. Smål. Kalmar; Hjorthed och Westerum snr. *Gottl.* Stenkyrke sn enl. Leml.) *Örtien illaluktande, men frukterna mycket aromatiska.*

- 2 Flocken **Campylospermæ.** Delfrukternas mot fogen vända sidor på längden färade.

154. **PLEUROSpermum Hoffm.** Slökesticka.

- 1 *P. austriacum Hoffm.* hela växten n. glatt; bladen dubbelt och 3dubb. parbladigt delade, med aflångt äggrunda, inskuret sågade slutflikar; svepebl. lancettlika, nedböjda. 2, 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.suppl.70. Reich.t.192. H.N.f.16, n:o 29.  
Steniga st. r. (ÖG. Kolmorden, nära Marmorbruket; Rödmosse, Eriksberg, Häradsveden och Hult i Qvillinge sn enl. Kindb.) 3—5 fot hög, upptill förgrenad i en mängd blomflockar, med de allm. svepebladen dels hela, dels parklufna. Utmärkt af de nedåt föga vidgade, knappt halfomfallande bladskäften, hvarigenom stjelen ihållighet fortsättes ända upp utan leder. — *Ligusticum L.*

155. **CONIUM Lin.** Odört.

- 1 *C. maculatum L.* hela växten glatt; bladen 3dubbelt parbladigt delade; det enskilda svepet blad äggrundt lancettlika, kortare än blomflocken. ☹ 7, hv. blr. Fig. Sv.B. 226. Fl.D.2168.  
Torra st. åkr. (Sk.—Gestr. Vestml. och Verml. vid Bäck i By sn. Boh. *Öl. Gottl.* — *N.* söd. del. sällsynt, t. ex. Brevig.) *Stjelen 3—4 fot hög, brunfläckig.*

156. **MYRRHIS Scop.** Spansk Körvel.

- †1 *M. odorata Scop.* hela örten mjukhårig; bladen 3dubbelt parbladigt delade; slutflikarne sågade. 2, 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.374. Fl.D.1928.

Odl. st. r. (Sk.—Södm. Ner. och Verml. Öl. Öfverallt förvildad. — N. Seiböe i Bergens st., såsom det påstås verkligt vild; äfven funnen vid Bergen och Molde.) 1—2 alnar hög, med starkt lukande blad; tumslånga, stull. svarta frukter. — *Scandix L.*

### 157. CHÆROPHYLLUM Lin. Hundloka.

- 1 *C. temulum L.* hela växten smått stråfluden; stjelken strimmad; bladen dubb. parbladigt delade, med åggrunda ell. aflånga trubbiga, inskurna flikar; svepebl. härbräddade; stiften af diskens längd. 7, hv. blr. Fig. Fl.D.918.  
Torra st. (Sk. Blek. Vemmö; Risanäs m. fl. st. enl. Goss. Smål. Kalmar; Oscarshamn; Seglerum nära Vestervik; Fieholm; m. fl. st. nära kusten. ÖG. Norrköping, Odenfors och Vadstena enl. Kindb. VG. Kinnekulle. Hall. Öl. Gottl.) Stjelken vanl. fläckig. — *Scandix Wg.*

- \*2 *C. aureum L.* stj. nedtill ell. vid de något uppsvällda lederna mer och mindre stråflutig, upptill glatt, strimmad; bladen dubb. parbladigt delade med smalt åggrundt lancettlika, nedtill parklufna, upptill hvast sågade och långt spetsade slutblad; svepebl. som föreg.; stift. mycket längre än disken. 2 7, hv. blr. Fig. Reich. Umb.t.177. H.N.f.16, n:o 30.

Tor. st. r. (N. Christiania, ej långt från Natmandhougen: Krok.) Stjelken fläckig; bladen vanl. glatta. — *C. maculatum W.*

### 158. CEREFOLIUM Hall. Körvelfloka.

- 1 *C. sativum Bess.* stjelken finstrimig, vid lederna mjukhårig; bladen 3dubb. parbladigt delade; småbladen med n. vinkelrätt utspärrade skaft, inskurna trubbiga flikar; en del blomflock. n. oskaftade, på stj:s sidor. 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.283. Fl.D.1640.

Odl. st., skugg. r. (Sk.—Boh. Smål. Femsjö; Kalmar. ÖG. mångenstād. enl. Kindb. Södm. Hörningsholm på klipporna omkr. slottet. Stockh. Öl. n. om Borgholms slott. Gottl. För öfr. här och der förvildad. — N. Christiansand; Arendal; Christiania.) Har vanl. 3bladiga enskilda svepen. Lukt och smak af Spansk körvel, hvarföre växten stund. odlas. — *Scandix Cerefol. L. Anthriscus Ceref. Hoffm. Chæroph. sativum Wg.*

- 2 *C. silvestre Bess.* stjelken fårad, nedtill fluden, upptill glatt; bladen 2—3dubb. parbladigt delade; småbl. med utstående skaft, och parklufvet inskurna flikar; alla blomflock. skaftade, i stj:s och grenarnes topp. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.124. Fl. D.2050.

Odl. st. lund. a. (Sk.—Lpl. — N.) 2—3 fot hög. — *Chæroph. L. Anthriscus Hoffm.*

### 159. ANTHRISCUS Pers. Kax.

- 1 *A. vulgaris Pers.* stjelken glatt; bladen 3dubb. parbladigt delade; fåstråliga blomflock. på stj:s sidor; frukt. åggrunda, öfverallt smått kroktaggiga. 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.863.

Vid väg., jordvall. (Sk. Hall. Blek. Smål. Kalmar; Jönsö i Mönsterås sn. ÖG. Lönnabo under Väsbj i Horns sn: Dr Ax. Lund. Öl. Gottl.) Alnshög; enskilda svepen 2—3bladiga. — *Scandix Anthr. L. Chærophyll. Wg.*

### 160. SCANDIX Lin. Nälkörvel.

- 1 *S. Pecten L.* stjelken grenig; bladen 3dubb. parbladigt delade med små jemnbreda flikar; fruktens spröt på 2 sidor uppåt styfharigt. 5—7, hv. blr. Fig. Fl.D.844. H.N.f.4, n:o 28.

Åkr. r. (Öl. flerest. i Köpings och Högsrums sn; mera sälls. i Gärdslösa, Repplinge och Thorslunda m. fl. sn i mell. delen enl. Sjöstr. Gottl. Visby; Ejsta, Klinte, Roma och Vänge m. fl. st. Fordom äfven funnen i Smål. vid Kalmar.) Allm. flocken delad i 2, ställ. 3 strålar; de mogna frukterna långa, bildande en kammlig flock.

### 161. TORILIS Adans. Rödfloka.

- 1 *T. Anthriscus Gmel.* hela växten sträf; bladen dubb. parbladigt delade, med aflånga, inskurna och sågade slutblad; blomflock. långt skaftade, med mångbladigt enskildt svepe. 7. Fig. Sv.B.759. Fl.D.919.

Torra st. (Sk.—Upl. och Dal. Dalsl. Boh. Uddevalla; Strömstad etc. Öl. Gottl. —

N.) 2—3 fot hög; blrna rödl., säll. rent hvita. — *Tordylium* L. *Caucalis* Liljebl.

3 Flocken **Orthospermæ**. Delfrukternas mot fogen vända sidor platta.

162. **DAUCUS** Lin. Morot.

1 *D. Carota* L. stjelen stråfhårig, färad; bladen 2—3dubb. parbladigt delade, med djupt inskurna spetsiga slutblad; fruktflokarne i midten insänkta.  $\gamma$  7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.104, odlad. Fl.D.723.

Torra st. åkerren. (Sk.—Uppl. Vestml. och Verml. Råda sn enl. Leff. VG. Dalsl. Boh. Christinedal nära Gustafsberg. Hall. Varberg: Scheutz; Hasslöf: Theor. Öl. Götth. — N.) *Bladflikarne variera smalare och bredare; flockarne mycket tätta, roten hos den vilda smal och hvit. Blir odlad mera glatt och får tjock, ofta röd rot.*

163. **LASERPITIUM** Lin. Spenört.

1 *L. latifolium* L. hela växten n. glatt; bladen 2—3dubb. parbl. delade, med snedt hjertlika, trubbiga, hvass-sågade, säll. inskurna slutblad; flocken stor, med n. trådsmla svepebl.; fruktens vingade åsar krusiga.  $\gamma$  7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1513.

Skogsäng. (Sk.—Gefle, vid Nyberg. Dal. Vestml. Hall. flerst. i söd. delen: Theor. Öl. Götth. — N. mell. Laurvig och Skien.) 3—5 fot hög, blåaktig växt; rotbladen, sårdæles yngre, stundom under småludna.

164. **HERACLÉUM** Lin. Björnfloka.

1 *H. sibiricum* L. stråfhårig; bladen enkelt ell. dubb. parbladigt delade; småbladen par-delade ell. djupt inskurna, med ovala—jembreda, grofsågade, tandade ell. n. hela flikar; flockens kantbl. [hos hufvudform.] föga större än de öfriga.  $\gamma$  7, 8. —  $\beta$  *angustifolium*: bladflikarne långa och jembreda, n. hela. Fig. Sv.B.363. Reich.Umb. t.131.  $\beta$  H.N.f.4, n:o 29.

\* *australe* Hn. blrna hvita ell. rödaktiga, de i kanten större och mer olikformiga än de öfriga; delfr. smälare, ovala. Fig. Fl.D.2406. Reich.t.128.

Äng. a. (Sk.—Ängml. VB. Umeå sn. Backen. Jemtl. Verml. och Dalsl. Hall. Öl. — N. till Trondenäs i Finn. — Norm. — \* i södra och vestra prov. till Verml. och Stöckh. på Färingön. Götth. Visby: Vestöb. — N. enl. Ax. Bl.) *Stor och sträf växt; den nordligare formen med gröngula ell. gulakt. blr och mycket varierande blad. Kronbl. äfven hos denna oflast omv. hjertlika med inviken spets, stundom t. o. m. i samma flock, inböjda utan den hjertlika intryckningen. — H. Sphondylium L.Fl.Su. och Herb.  $\beta$  H. angustif. L. \* H. Sphondylium Fries, hvars H. succicum är en medelform med hvita blr.*

165. **PASTINACA** Lin. Palsternacka.

1 *P. sativa* L. bladen enkelt parbladigt delade, omkr. 4pariga; småbladen äggrunda inskuret sågade, stund. flikiga.  $\gamma$  7, 8, g. blr. —  $\beta$  *silvestris*: småluden, med smal träaktig, något bitter rot. Fig. Fl.D.1206. H.N.f.11, n:o 29.

Odl. st., vid vägar etc. (Sk. allm. på slätthgd. Hall. Öl. på hafsstr. För öfr. troligen endast förvildad, ända upp till Uppl. och Verml. — N. Opdal; Rörås.) *Var. helt och hållet glatt, med under och [ $\beta$ ] på båda sidor håriga blad.  $\beta$ , som af Fr. anses vara P. opaca Bernh. och endast förekommer i Skåne, torde vara den ursprungligt vilda.*

166. **ANÉTHUM** Lin. Dill.

+1 *A. graveolens* L. blågrön, glatt; bladen dubb. parbladigt delade i trådsmla flikar.  $\odot$  6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1572.

Odl. st. (Sk.—Gestr. sjelfsådd i kryddgårdar.) *Älnshög, med små blr i stor gles flock.*

167. **LEVISTICUM** Koch. Libsticka.

+1 *L. officinale* K. bladen parbladigt delade; småbladen n. vigglika, flikiga, de nedre 3-delade.  $\gamma$  7, 8, g. blr. Reich.Umb.t.100.

Gårdstomt. (Trol. öfver hela Sv., ursprungligen odlad.) 1—2 alnar hög, illaluktande. — *Ligusticum* Levist. L. *Levisticum paludapifolium* Reich.

## 168. ANGÉLICA Lin. Stråtta.

† Delfrukternas skal sammanhängande med fröet.

- 1 *A. silvestris* L. blad- och småbladskäften *kölade*; de nedre bladen 2—3dubb. parbladigt delade, 3—4pariga; småbladen äggrunda, sågade [vanl. icke nedlöpande], uddbladigt meränd. helt, stund. 3deladt; flockskäften *finludna*; delfr. plattade *vingkantade*. 2½, 7, 8, hv. blr. — *β montana*: de öfre småbladen nedlöpande på de gemensamma skäften. Fig. Sv.B.303. Fl.D.1639. Reich.Umb.t.95,f.1,2; *β* t.96.
- Fukt. äng. och stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.: Norm. — *β* i öfre delarne af Sv., samt i N. enl. Fr. S.V.Sc.) Småbladen hos den allm. formen vanligen hela, något tjocka, fint och tätt sågade, men varierade äfven djupt och ojemnt sågade, då de tillika äro stora, tunna och glänsande: var. *nilens*. Växten vanl. 1½ aln hög, men blifver i fjelltr. och på hafsstr. ofta dubb. högre, till alla delar mycket grof: var. *major* ed. 9.

†† Delfr: skal slutl. lossnande från fröet: *Archangelica* Hoffm.

- 2 *A. litoralis* Fr. bladskäften *fårade*; bladen dubb. parblad. delade; småbladen *olikformigt* sågade, uddbladet 3klufvet; flockskäften *n. glatta*; delfr. konvexa, med höga och något uppsvållade åsar. 2½, 6, 7, gulgr. blr. Fig. Fl.D.2407. H.N.f.10, n:o 23.
- Hafsstr. (Sk. Malmö; Färöfsholm och Vidtsköffe. — Rosl. Öregrunds skärgård. VB. Neder-Kalix skärg. Hall. Boh. Gottl. Fårö enl. G. v. Ced. — N. till Finnm.) Föga skiljd från följ. Bladskäften *n. trinda* med en grund fåra ofvanpå. — *A. Archangelica* *β* Wg.
- 3 *A. Archangelica* L. allm. bladskäften ofvanpå *platta*; bladen som föreg. med *dubbel*-sågade småblad, uddbladet 3klufvet; flockskäft. meränd. *glatta*; sidoflock. högre än den mellersta; delfr. som föreg. 2½, 7, 8, gulgr. blr. Fig. Sv.B.633. Fl.D.206. H.N.f.11, n:o 27.
- Fjelltr. (Lpl.—Dal. — N.) Stjelen 5—6 qv. hög, aldeles trind; rotbl. 2—3 fot breda med 2—3 tum långa, under grågula flskar; flockarne 8—12 tum vida. — *Archang. officinalis* Fr.

## 169. IMPERATORIA Lin. Mästerrot.

- 1 *I. Ostruthium* L. bladen dubb. 3fingradt delade: sido-småbladen djupt 2klufna, uddbladet 3klufvet, flskarne ovala, olikformigt grofsågade. 2½, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.368. H.N.f.5, n:o 13.
- Skogsäng. r. (Hall. Boh. Sörbygd. Smål. Femsjö i Elfdalen; Jönköpingstrakten, vid Sanna; Bredaryds sn, Anneberg; Åbs och Odensjö m. fl. st. i vest. delen. VG. Frödered sn, torpet Källebacka. Dalsl. vid Fölens gästgg. Verm. Vestgård i Emterviks och vid Ränneberget i Östmarks sn. Vestml. nära Stjernfors bruk. Dal. Lima och Transtrand. ÖG. flerst. i Åtvedstrakten; Sommarbygd; samt mell. Vettern och Stångån enl. Kindb.) De öfre bladen enkelt 3fing. delade.

## 170. PEUCÉDANUM Lin. Mossrot.

- 1 *P. palustre* Mönch: stjelen *kantig* och strimmig; bladen 3dubb. parbladigt delade mångpariga, med *jernbredt lancellika*, kortspetsiga flskar; svepebl. *small lancellika*; flockstrål. *finludna*. 2½, 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.380. Fl.D.257 och 412.
- Kärräng. stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) De *findelade* bladens omkrets *triangelär*; småbladens skäft *icke tillbakaböjda*. — *Selinum* L. *Thyselinum* Hoffm.
- 2 *P. Oreoselinum* Mönch: stj. *trind* och strimmig; bladen 3dubbelt parbladigt delade med småbladens skäft *tillbakaböjda*, bladlikarne *vigglika*, *inskrurna*; svepebl. *trådsma*; flockstrål. *n. glatta*. 2½, 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1750. H.N.f.2, n:o 38.
- Torra betesm. och sandfält, r. (Sk. teml. allm. i öst. delen från Stenshufvud till Ystad, samt h. o. d. i de inre delarne enl. F. Aresch. Öl. Sandby och Gårdby på öst. sidan; samt Wicklebys, Resmo och Borghyborg på den vestra enl. Sjöstr.) — *Athamanta* L. *Selinum* Lin. Sk. resa.

## 171. SELINUM Lin. Krufrö.

- 1 *S. Carvisfolia* L. stjelen *fårad* med *hinnaktiga* kanter; bladen 2—3dubb. parbladigt delade mångpariga, med skäft *n. utan* slidor; flskarne *small aflånga uddspetsiga*; svepebl. *jernbreda*. 2½, 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.667.

Skogsäng. (Sk.—Rosl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gotl. — N. södra del.)  
*Bladens omkrets äggrund ell. något aflång.*

- 2 *S. lineare* Schum. stj. strimmig, upptill något hvasskantig; bladen dubb. parbladigt delade, med långa slidor;flik. långa, n. jemnbreda, spetsiga; svepebl. n. hårfina.  $\textcircled{D}$  7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1330. H.N.f.4, n:o 30.

Bland buskar, r. (Smål. från Blekingegränsen till Döderhult, t. ex. Söderåkra, Ljungby, Arby, Kalmar etc. Öl. från Ottenby upp till Böda.) *Ålmslåg, med de öfre bladen föga längre än de n. 2 tum långa, stjelen insvepande slidorna; bladflik. smala,  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa; delfr. med djupa åsdålder.* — *Cnidium venosum* Koch.

#### 172. CONIOSELINUM Fisch. Finnkarv.

- \*1 *C. Gmelini* (Bray): stj. strimmig, glatt; bladen n. 3dubb. parbladigt delade, med långa och breda slidor; de i korta aflånga flikar delade småbladens omkrets äggrund; svepebl. n. hårfina, lätt affallande.  $\textcircled{2}$  7, 8, hv. blr. Fig. Gmel.Fl.Sib.1, L.44. Reich.t.78. H.N.f.8, n:o 17.

Fukt. gräsbevärta st. i fjelltr. r. (N. Vest-Finm. Alten vid Bossekop, Hjemmeluft, Qveenvigen, Elvbakken; Mageröe: Th. Fr. etc.; Ost-Finm. vid Varangerfjorden flerst., t. ex. Vester-elven, Gornitak, Vadsö.) *2—3 quart. hög, med vida, tumslånga, från stjelen snart utvika bladslidor, talrika flockstrålar.* — *C. tataricum* Fisch. och Fr.S.V.Sc. *C. Fischeri* Wilm. & Gr. *Selinum* ed. 9.

#### 173. SILAUS Bess. Ängsticka.

- 1 *S. pratensis* Bess. stj. nedtill trind, upptill kantig; bladen 2—3dubb. parbladigt delade, med jemnbredt lancettlika uddspetsiga ådriga flikar; enskildta svepet af småflockens längd.  $\textcircled{2}$  6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.suppl.69. H.N.f.1, n:o 24.

Skogsäng. r. (Sk. i Hörteskog nära Trelleborg; Almaröd; Malmö, vid Rosenlund.) *Liknar Peuced. palustre, men har smärre, 5—8stråliga, meränd. svepelösa flockar.* — *Peuced. Silaus* L. *Cnidium* Sm.

#### 174. HALOSCIA Fr. Strandsticka.

- 1 *H. scoticum* Fr. stjelen trind; bladen dubb. 3fingradt delade; småbladen snedt ägrunda, ofvan midten grofsågade, med vigglik helbräddad bas.  $\textcircled{2}$  7, hv. blr. Fig. Sv.B. 622. Fl.D.207. H.N.f.11, n:o 28.

Hafsstr. bland klipp. r. (Sk. Kullaberg; Torrekov m. fl. st. i n.v. delen. Hall. Boh. — N. hela kusten till Finm.) *Omkring fotslåg, till alla delar glatt, med tumsbreda småblad, lukt och smak af Libsticka.* — *Ligusticum* L.

#### 175. LIBANOTIS Crantz. Säfferot.

- 1 *L. montana* All. stjelen fåradt kantig; bladen parbladigt delade; småbladen par-delade ell. ånyo parbladigt delade med inskurna flikar; frukten luden.  $\textcircled{2}$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.760. Fl.D.754. H.N.f.12, n:o 45.

Ängsback. (Smål. öst. delen. — *Gestr. Vestml. Ner. VG. Öl. Gotl. — N. södra del.*) *Blomflockarne vanl. mycket tätta, konvexa; fruktflock. platta ell. n. konkava.* — *Athamanta Libanotis* L.

#### 176. ÆTHUSA Lin. Vildpersilja, Glis.

- 1 *Æ. Cynapium* L. stjelen fårad; bladen dubb. parbladigt delade; småbladen par-delade och inskurna, med lancettlika flikar.  $\textcircled{C}$  6—8, hv. blr. Fig. Sv.B.64. Fl.D. 1991.

Od. st. kryddgård. a. (Sk.—Helsl. Ängml. Hernösand: Arn. Dal. Verml. och Dalsl. Boh. Öl. Gotl. — N.) *Till alla delar glatt; bladen tunna och glänsande; svepet längre än småflocken, nedböjdt.*

#### 177. OENANTHE Lin. Stäkra.

- 1 *O. fistulosa* L. rothbladen 2—3dubbelt, de öfre bladen enkelt parbladigt delade, med korta, n. jemnbreda flikar, ihålliga skaft, längre än sjelfva bladet; allm. blomflock. *2—4stråliga.*  $\textcircled{2}$  7, hv. blr. Fig. Sv.B.619. Fl.D.846. H.N.f.2, n:o 39.

Fukt. st. vattengrop. (Sk. Hall. Smål. Kalmar, Hosmo-å och Berga. Gotl.) *Rot-trädarna till en del uppsvållda till ovala knölar; flockens kantbl. stora och oregelbundna, könlösa.*

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

- 2 *O. Phellandrium* Lam. stielkbladen 3dubb. parbladigt delade, med småbladsskaften tillbakaböjda, samt aflånga trubbadeflikar; flock. mångstråliga.  $\gamma$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.155. F.I.D.1154.  
 Vatten. (Sk.—VB. Dal. Verm. — N.?) Bladflikarne små, under vattnet stundom hårfina. — *Phell. aquaticum* L.

178. *CICUTA* Lin. Sprengört, Bunarot.

- 1 *C. virosa* L. bladen dubb. parbladigt delade med dels enkla, dels sammanflytande, lancettlika hvass-sågade flikar.  $\gamma$  7, 8, hv. blr. —  $\beta$  *tenuifolia*: bladflik. liniebreda, grundt och glest sågade, Fig. Sv.B.134. F.I.D.208. F.I.N.1,t.2.  
 Vatten. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl. —  $\beta$  Verm. Ekshärads prestgård. VB. Salmi-nanti. Torn. Lpm.) Glatt växt af alnshöjd ell. mera, med omkr. 2 tum långa,  $\frac{1}{2}$  t. breda bladflikar;  $\beta$  knappt med tumslånga. Roten stor, rundadt aflång och ihålig, mycket giftig.

179. *APIUM* Lin. Selleri.

- 1 *A. graveolens* L. de nedre bladen parbladigt, de öfre 3fingradt delade, med vigglika inskurna småblad; sido-blomflockarne i bladvecken, med inga ell. korta skaft.  $\gamma$  7, 8, hv. blr. Fig. F.I.D.790.  
 Hafsstr. och vallar, r. (Sk. vestra kusten, t. ex. Hvellinge; Malmö; Landskrona etc. Gottl. — N. sydl. kust.) Glatt och glänsande med stark lukt.

180. *ÆGOPODIUM* Lin. Kirskål, Qvaller.

- 1 *Æ. Podagraria* L. bladen dubb. 3fingradt delade; småbladen äggrunda med snedt hjertlik bas.  $\gamma$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.147. F.I.D.670.  
 Odl. st., lundar, a. (Sk.—Hels. Angml. allm. i Viksjö enl. Leffl. Vestml. Verm. Dalsl. Öl. Gottl. — N.) Hela växten glatt, 3—4 fot hög.

181. *CARUM* Lin. Kummil.

- 1 *C. Carvi* L. bladen dubb. parbladigt delade med findelade småblad.  $\gamma$  6—8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.115. F.I.D.1091.  
 Äng. och renar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.: Norm.) Fotshög, glatt. — *Bunium* Godr. & Gren.

182. *BUNium* Lin. Jordnöt.

- \*1 *B. flexuosum* With. stielken nedtill bladlös; stielkbladen n. oskaftade, dubb. parbladigt delade i n. jemnbreda inskurna flikar; stiften hos frukten upprätta.  $\gamma$  6, 7, hv. blr. Fig. E.B.988. H.N.f.13, n:o 41.  
 Torra st. sandback. r. (N. mellan Stavanger och Nordmør, t. ex. Mundheim; Storöen; Aalesund; Dr P. Olsson; Molde etc.) Stielken fotshög, mycket smal ned mot den rundadt knölformiga roten; rotbladen skaftade, 3dubb. parbladigt delade. — *Carum* Fr. S.V.Sc. *Conopodium denudat.* Koch och Fr. H.N.

183. *PIMPINELLA* Lin. Bockrot, Anis.

- 1 *P. magna* L. stielken fåradt kantig; bladen parbladigt delade, med utdraget äggrunda spetsiga, inskuret sågade, glänsande småblad, 3flikigt uddblad; äfven de öfversta bladens småblad äggrunda ell. lancettlika, sågade.  $\gamma$  7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.741. F.I.D.1155. H.N.f.2, n:o 41.  
 Äng. r. (Sk. mångenstād. i vest. delen. Smål. Ökna mell. Emhult och Åsgårde; Rödsle nära Vestervik. ÖG. flerst. enl. Kindb. Södm. Tullgarn nära slottet, ymng. Öl. mell. Mörbylånga och Borgby; Sandby och vid Vickleby. Gottl. mell. Årshamn och Vialsudde.) Småbladen större mer utdraget ell. lancettlikt äggrunda än hos följ.; de öfversta, vid blomflockarne, af samma form, icke så smal-flikiga som hos denna. Var. i Sk. och på Gottl. med parbladigt delade småblad: var. dissecta.

- 2 *P. Saxifraga* L. stj. trind och strimmig; bladen parbl. delade, de nedre med rundade ell. bredt äggrunda trubbiga sågade småblad, de öfre med smalt jemnbreda helbräddade flikar.  $\gamma$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.160. F.I.D.669.

\* *nigra* W. roten innehållande en blå saft.

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Nordl. — \* Sk. Limhamn m. fl. st. enl. Aresch. ÖG. flerst.: Kindb. Öl. Götll.) Var. som föreg., samt glatt och småluden. — *P. nigra*, hvars rotsaft blir i luften blåaktig, skiljes af Koch med ludna flockstrålar, en hårtighet, som är lika obeständig som stjelkens.

## 184. FALCARIA Host. Skärfloka.

1 *F. Rivini* Host: bladen 3fingradt delade i dels hela, dels 2—3delade, långa och n. jemnbreda flikar med brosklikt kantade sågtänder. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.621. Fl.D. 1749. H.N.f.2. n:o 40.

Torra åkrar, r. (Sk. vid byn Glemminge i Ingelstads härad. Götll. söder om Visby.) Blåaktig glatt, alnshög växt, med låderartade, 2—6 tum långa bladflikar, trådmala svepen. — *Sium Falcaria* L. *Critamus* Reich.

## 185. SIUM Lin. Märke.

1 *S. latifolium* L. stjelken fåradt kantig; stjelkl. enkelt parbladigt delade; småbladen utdraget lancettlika ell. jemnbreda, n. likformigt sågade, med uddspetsade sågtänder; blomflock. långt skaftade; svepebl. helbrädd. ell. tandade. 2 7, 8, hv. blr. — *β longifolium*: småbl. jemnbreda och något krökta. Fig. Sv.B.178. Fl.D.246.

Vatten. (Sk.—VB. och Um. Lpm. Boh. Öl. Götll. i Wall. — *β* ÖG. Norrköp. på Bykholmen; Egebylund i Mjölby: Kindb. Göteborg, Quillebäcken etc. Hall.) 3—4 fot hög, med flere tum långa flockskaf. Rotbl. dubb. parbladigt delade. — *β* har 2—4 tum långa, 2—3 linier breda småblad.

2 *S. angustifolium* L. stjelken trind och strimmig; bladen enkelt parbladigt delade; småbladen ågrunda—lancettlika, oliformigt hvass-sågade, vid basen något inskurna; sidoblomflock. kort skaftade, motsatta bladen; svepebl. vanl. flikiga. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.620. Fl.D.247. H.N.f.1. n:o 25.

Vatten, r. (Sk. sijn. Blek. Sölvisborg: Sissebäck och Ynde: Gosselm. ÖG. Vallerstad sn. Skensån. Hall. Boh. Mollö. Öl. Götll.) 1—2 fot hög, med 1—2 tum långa flockskaf. — *S. nodiflorum*, samt enl. Fries *Oenanthe crocata* L.Fl.Su. *Berula* Koch.

## 186. HELOSCIADIUM Koch. Kärrfloka.

1 *H. inundatum* K. de nedre bladen dubb. parbladigt delade i hårfina flikar, de öfre enkelt parbl. delade i vigglika 3klufna flikar; blomflocken 2-, säll. 3strålig, fåblommig. ☉ 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.740. Fl.D.89. H.N.f.1. n:o 26 och f.8, n:o 18.

Vattengrop., öfersv. st. r. (Sk. Christianstad; Ystad; Skanör; Lund; Landskrona; Kullaberg etc. Hall. Varberg; Onsala sn. nära Stenkilsås etc. Dalsl. i Orselfven vid Vestergården och Krokfors i Ör sn. Blek. Ronneby; Säby i Ramdala m. fl. st. Smål. Söderåkra i Kalm. län; Applerum i Thorsås enl. Ekstr.; i Vexjö län flerst. enl. Scheutz. Öl. Näsby i Åhs sn enl. Leml.) I djupare vatten stund. fotslång, simmande, på uttorkade ställen 3—4 tum lång och krypande; småflock. 3—6 blommiga. — *Sison* L.

## 187. BUPLEURUM Lin. Harfloka.

1 *B. tenuissimum* L. stj. grenig; bladen hela jemnbreda, spetsiga; blomflockarne nästan hufvudlika skiftevisa, af det 5bladiga svepets längd. ☉ 7, 8, gulakt. blr. Fig. Sv.B. 618. Fl.D.1090. H.N.f.1. n:o 27.

Hafsstr. och torra st. r. (Sk. här och der från Landskrona till Skanör; samt vid Ystad: F. Aresch.; Lund vid Fogelsång etc. Blek. Carlskrona; Ronneby. Smål. Kalmar. Öl. Götll. Sanda; Sproge; Öja sn, vid Stockviken; Visby: G. v. Ced.) Har 6—10 tum långa trådmala uppstigande stjelkar. — *Odontites* Spreng.

## 188. SANICULA Lin. Läkeört.

1 *S. europæa* L. stj. enkel, bar ell. enbladig; bladen handdelade i 3—5, vigglika 3klufna ell. inskurna och sågade flikar; småflock. hufvudlika. 2 7, hv. rödl. blr. Fig. Sv.B.245. Fl.D.283.

Lundar. (Sk.—Gestr. och Vestml. VG. Dalsl. Boh. Smörkullen; Uddevalla; Christinedal. Hall. Särö; Hallandsås: Fr. Öl. Götll. — N. till Molde.) Fotshög.

189. HYDROCOYLE *Lin.* Spikblad.

- 1 *H. vulgaris* *L.* stj. kryppande och rotsläande; bladen sköldlika cirkelrunda, glest naggade; blomflocken hufvudlik, omkr. 6blommig, slutligen förlängd i form af ett kort, afbrutet ax. 2, 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.617. Fl.D.90. H.N.f.16, n:o 31.  
Stränd. dik. etc. (Sk.—ÖG. Värna i Slutorp enl. Kindb. och VG. Lidköping i skogen Kartåsen; Thorsön i Ven.; Fritsla sn. nära torpet Hagen. *Dalsl.* Krokfors i Ör sn, samt nära Venersborg. *Boh.* Öl. *Gottl.* — *N.* söd. del, Lister etc.) *Blott bladen och blrna visa sig öfver jordytan.*

190. ERYNGIUM *Lin.* Manskraft, Martorn.

- 1 *E. maritimum* *L.* rotbladen hjertlikt rundade, jemte stjelklbladen veckiga, taggsågade och inskurna; blomflock. hufvudlika, skaftade, med 3gafflade fjäll mell. blrna. 2, 7—9. Fig. Fl.D.875. H.N.f.14, n:o 23.  
Hafsstr. r. (Sk.—Norra *Boh.* *Blek.* Sillnäs vid Torsövik: Gosselm. Öl. Byerum. *Gottl.* vid Ihrevik; Lummelund. — *N.* Listers fogderi. Hvalöarne i Smålehnene.) *Hela växten styf, blåaktig; bladen läderartade, taggiga; blrna ljusblå.*

- 29 Fam. ADOXÆ *E. Mey.* Kronbl. vid basen hopväxta, i knoppen kantlagda. Stånd. dubb. så många som kronbladen, med enrummiga knappar. Fruktämne 4—5-rummigt, till hälften täckt af disken, slutl. bärlikt fröhus med ett frö i hvarje rum.

191. ADÓXA *Lin.* Desmeknopp.

- 1 *A. Moschatellina* *L.* rotbl. långt skaftade, dubbelt 3fingrade; stjelklbl. 2, motsatta, 3-fingr.; alla medflikade småbl. 2, 4, 5, gr. blr. Fig. Sv.B.435. Fl.D.94.  
Skugg. back. (Sk.—Medelp. och *Jemt.* Öl. *Gottl.* — *N.* till Ost-Finnm.) *Blomhufvet af en drts storlek. Örten luktar Moschus.*

- 30 Fam. ACERINEÆ *DC.* Kronbl. i knoppen tegellagda. Fruktämne fritt, 2—3rummigt, med 2 fröämnin i hvarje rum; slutl. vingfrukt ell. läderartadt fröhus.

192. ACER *Lin.* Lönn.

- 1 *A. platanoides* *L.* bladen handflikt 5flikiga, glatta, med *spetsade* flikar och tänder; blomskäften *glatta*, i *upprät qvast*. ½ 5, g. blr. Fig. Sv.B.86.  
Skogsäng. byar. (Sk.—*Angm.* Nora sn, Bölesta och Skuluberget. *Jemt.* Stugu sn. *Dal.* upp till Hykjeberget. *Verm.* *Boh.* Koster. Öl. *Gottl.* — *N.* Aggerbus och Christiansands st. Bergens st. sällsynt. Romsdalen: Gunn.) *Högt träd med stora tunna blad.*
- 2 *A. campestre* *L.* bladen handlikt 3—5klufna, med *trubbiga*, inskurna ell. groftandade flikar; blomskäften *småhudna*, i något *lutande qvast*. ½ 5, gr. blr. Fig. Sv.B.409. Fl.D.1288. H.N.f.2, n:o 37.  
Back. r. (Sk. Svedala sn nära Brännemölla och Aggarp på Nafverbacken; i skogen vid L. Lindholmen enl. F. Aresch. Skall äfven finnas i skogar vester om Sönnerskog.) *Litet träd eller buske.*
- +3 *A. Pseudoplatanus* *L.* bladen som föreg. med *spetsiga* olikform. grofsågade flikar, *under blekare*; blrna i *hängande klasar*. ½ 5, gr. blr. Fig. Fl.D.1575.  
Byar, r. (Sk. planterad vid vägar etc., mer sällan ända upp till *Helsl.* — *N.* i södra delen planterad.) *Högt träd; frukten med mindre utsperrade vingar än hos de föreg.*
193. ÆSCULUS *Lin.* Hästkastanie.
- +1 *Æ. Hippocastanum* *L.* bladen 7—9fingrade; småbladen vigglika spetsade sågade. ½ 5, 6, hv. blr. Fig.



Planterad. (Sk.—Helsl. — N.) Högt träd med blr i stora upprätta klasar, samt skull. med stora, meränd. groftaggiga fröhus.

---

- 31 Fam. **RESEDACEÆ DC.** Blr oregelbundna. Kronblad i knoppen åtskiljda. Fröh. i toppen öppet, enrummigt, med fröfästen i fogarne mellan skalen.

194. **RESEDA Lin.** Wau.

- 1 *R. Luteola L.* bladen lancettlika, helbräddade, med en omärkl. tand vid basen; blrna oskaftade i tätt och smalt ax; fodr. 4deladt.  $\curvearrowright$  7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.82. Fl.D.864. H.N.f.1, n:o 32.

Sandback r. (Sk. Helsingborg, Landskrona, Lund, Ystad, Gladsax, Åhus etc. *Blek.* Sölvitsborg; Carlshamn och Silltorp: Gosselm. *Smål.* Kalmar; Ljungby sn, Harby gästgg.; Visingsö. *Hall. Boh.* på Koön. *Öl. Gottl.* Othem sn, på Enholmen ymn.; Slite och Visby. I de öfre prov. någon gång förvildad ell. införd med ballast. — N. Christiania, förvildad: Ax. Bl.) *Axlet från 3 tum till mer än fotslängt.*

---

## 5 KLASSEN

### SERTIFLORÆ.

32 Fam. **NYMPHÆACEÆ DC.** Kronbl. i flere kransar, öfvergående i äfvenledes talrika ståndare. Frukt läderaktigt, mångrummigt fröhus med fröfästen på väggarne.

#### 195. NYMPHÆA Lin. Näckros.

1 *N. alba L.* bladskafven *trinda*; bladen rundade, med hjertlik bas, platta helbräddade; pistis märke 10—20stråligt. 2½ 7, hv. blr. —  $\beta$  *biradiata* Som. märket tecknad med en stor stjernformig mörkröd fläck. —  $\gamma$  *rosea*: blr stora, rosenröda. Fig. Sv.B.92. Fl.D.602.  $\beta$  Reich.D.Fl.f.119.  $\gamma$  H.N.f.16, n:o 32.

Sjöar och vattenpöl. (Sk.—Lul. Lpm. och nor. del. af VB. Boh. Öl. Goutl. — N. till Nordl. —  $\gamma$  Ner. i sjön Fagertårn på Tiveden.) *Blrna utbredda ofta 4 tum vida, stund. blott hälften så stora, då öfven bladen blifva små. Inskärningen mell. flikarne vid bladens bas än smal, än bred; märket gult, brandgult ell. rödt.*

#### 196. NUPHAR Sm. Näckblad.

1 *N. luteum Sm.* bladskafven *upptill 3kantiga*, en kant rundad; bladen rundadt elliptiska med hjertlik bas; ståndarknapp. *jembredt aflånga*; märket 10—20stråligt, odeladt. 2½ 7, g. blr. —  $\beta$  *minus*: blr små, omkr. en tum i diam.; märket 10—12stråligt. Fig. Sv.B.266. Fl.D.603.

Sjöar, a. (Sk.—Lpl. Boh. Goutl. — N. —  $\beta$  Lpl. Karesuando.) *Kronbl. mycket små i jemförelse med de stora gula foderbl.; stånd.-knapparne 2—3 gånger så långa som breda. — Nymphæa L. — Möjl. tillhör  $\beta$  följ., då bladskafvens form på de pressade ex. ej kunnat utrönas. En medelform till  $\beta$  har O. Nordst. sändt från VG. — Enl. Läst. skulle närv. och följ. arter endast vara lokalformer af en och samma art.*

2 *N. intermedium Ledeb.* bladsk. *plattade*; bladen och ståndarkn. *som hos föreg.*; märket 9—15stråligt, helt ell. något *flikadt*. 2½ 7, 8, g. blr. —  $\beta$ ? *Spennerianum*: bladen små med fränstående basflikar; kronbl. teml. stora, vigglika; märket omkr. 10tandadt ell. flikadt. Fig. H.N.f.14, n:o 24.  $\beta$  Reich.D.Fl.f.116.

Sjöar. (Torn.—Ptt. Lpm. VB. nor. del., t. ex. i Gäddträsk ymnig. Jeml. Ovikens sn, vid Kjanneråshodarne. — N. Finnm. Karasjok: Norm.)  *$\beta$  synes tillhöra denna art, ehuru bladskafvens form ej kan bestämmas. Var i VB. med på undre sidan mer och mindre tät småtudna blad; vanligast äro de glatta.*

3 *N. pumilum DC.* bladskafven *trubbigt 3kantiga*; ståndarkn. *n. quadratisk*, blott en half gång längre än breda; märket omkr. 10stråligt, flikadt. 2½ 7, g. blr. Fig. Reich.D.Fl.f.115.

Bäck. dammar, r. (Smål. Gårdserum sn, i flere sjöar. ÖG. teml. allm. i Åtvedstrakten enl. Kindb. Dal. i Nässjön nära Hykjeberget. Helsl. Aktjärn och Lillbotjärn i Arbrå: Stud. E. Collinder. Angml. Arnäs sn, i Prostjärn och Ellsjön; Själeved sn, i Lomsjön. VB. Småträsk i Neder-Kallix: Reuterm. Um. Lpm. Fatsjön i Wilhelmmina sn. Torn. Lpm. i bäckar vid Muonio elf upp till Karesuando. — N. Christia-

nia: Tellemarken; Valders; Gudbrandsdalen, söder om Laurgaard. Bergen etc. Ost-Finnm. Colmijaure vid Svanvik.) *Blrna ej större än på Caliha pal.*; *bladen omkr. 2 tum breda. Kronbladen små, omv. aggrunda. Var. liksom föreg. med under småludna blad.* — *N. minimum* Sm.

33 Fam. **RANUNCULACEÆ** Juss. Blomhylla enkelt, ell. dubbett af skiftevisa foder- och kronblad. Stånd. vanl. talrika. Frukt af flere fria karpeller [sällan hopväxta till ett bär].

1 Flocken **Ranunculeæ**. Kronbl. med honingsgrop på klön. Karpeller nöttika, slutl. enföriga.

### 197. *RANUNCULUS* Lin. Solögon.

† Kronbl. 5, hvita.

1 *R. glacialis* L. stjelken upprät, 1—2blommig; rotbladen skaftade, jemte de nedre stjelkl. 3fingradt delade, med djupt 3flik. och inskurna småblad; blomfodr. quar-sittande, brunulligt; karpellerna halfmånlika hinnryggade. 24 7, 8. Fig. Lin.F.I.L. t.3.f.1. Sv.B.747. Fl.D.19. H.N.f.9, n:o 30.

Hög fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) 1 Jemtland är denna art vanl. 1-, i Lpl. 2-, sällan 3blommig, quartershög. *Blrna stora, med utvändigt rödvioletta kronbl.*

2 *R. aconitifolius* L. stjelken upprät grenig, mångblommig; bladen djupt 3—7klufna, med ovala inskurna och grofsågadeflikar; bl.fodret snart affallande, glesst hvithårigt; karp. utan hinnkant. 24 7, 8. Fig. H.N.f.8, n:o 28.

Fjellv. r. (Jemtl. Stor-Li etc.; flerst. i Frostviken; Fölinge sn. Herjed. från Sylfjellen ned till Funnes- och vest. Tennsdalen. Dal. Särna på Fulu fjellen. — *N. Kälåhögen*; Ridalen; Holtaalen; Dovre; Romsdalen; Filefjell; Valders etc. ned till Håckefjell.) 1—3 alnar hög, med blad, som likna Stormhattens. — *R. platanifolius* Godr. & Gren.

†† Kronbl. gula; örtbl. odelade.

3 *R. Lingua* L. stjelken upprät; bladen utdraget lancettlika, långspetsade, glesst naggtandade; karpellerna med utdraget kroklikt spröt. 24 7, 8. Fig. Sv.B.636. Fl.D.755.

Å- och sjöstrand, i vatt. (Sk.—Helst. Jemtl. Håsjö sn; Ragunda i elfven. Dal. Verm. Dalsl. Boh. Ramtjärn i Näsinga enl. Leffl. Hall. Öl. Gottl. — *N. i Vigsån* nära Korsegården vid Mjösen.) Ofta alnshög och deröfver, bladen quarterslånga, med korta ell. inga skaft; blrna tumsvida. Var. glatt och stråfhårig.

4 *R. ophioglossifolius* Vill. stjelken upprät; bladen aflånga ell. elliptiska, de nedre n. hjertlika, alla trubbiga; karp. sträva af upphöjda knölar, med kort spröt. ☉ 6. Fig. H.N.f.16, n:o 33.

Kärr. r. (Gottl. ½ mil n. om Visby vid vägen till Skålsö i Väskinde sn.) Från några få tum till omkr. fotshög med pipig stjelk; öfre bl. n. oskaftade, de nedre långt skaft., dels helbräddade, dels naggsågade.

5 *R. Flammula* L. stjelken uppstigande eller krypande [säll. upprät]; bladen äggrundt lancettlika—jemnbreda, kortspetsade ell. trubbiga, glatta; karp. släta ell. groptigt punkterade, med mycket kort spröt. 24 7. — *β reptans*: stjelken trädlik, båglikt krypande; bladen n. trådsmla. Fig. Sv.B.117. Fl.D.575. *β* Lin.F.I.L.t.3.f.5. Fl.D. 108. H.N.f.10, n:o 27.

Kärr, strand, a. (Sk.—Lpl. — N.) *α* har ofta fingerbreda blad, men öfvergår utan gräns i *β*, som är Linnés *R. reptans*. Första rotbladen på våren aggrunda och, då de växa i vatten, långt skaftade och flytande; likna då bladen af *Alisma* natans.

††† Kronbl. gula; örtbl. flikiga ell. delade.

\* Stjelken krypande, med enkla blomskäft i bladvecken.

6 *R. lapponicus* L. bladen glatta 3delade, med bredt spadlika, naggade eller inskurna

flikar; blomskäften upprätta, enblommiga, bladlösa ell. enbladiga; karp. med utdraget, krökt spröt. 2 6. Fig. Lin.Fl.Lt.3.f.4. Sv.B.749. Wg.Fl.Lt.8. Fl.D.2292. H.N.f.3, n:o 28.

Fukt. st. i fjelltrakter, r. (Torn.—Um. *Lpm. Jeml.* Oviksfjellen; Sunne, Offerdahl och Ström snr. *Herjed.* vid Kolsätt. *VB.* Skellefteå, Falkberget. *Ängl.* Vallsjö i Sollefteå; Hellgum, Edsele och Ramsele snr: Arn. *Medelp.* Sättna, vid Flata säbodar. — *N. Finnm.* Anarjok och i Sydvaranger vid Pasvig-elv: Norm.) *Egentl. stjelen kryper lik en rot under jorden eller i mossan, uppskjutande i lederna blad och quartershöga blomskäft. Blomfodr. mest af 3, och kronan af 7, små blad, hvilket dock varierar; karpell. föga längre än deras spröt. — Coptidium ranunculoides Beurl.*

7 *R. hyperboreus* Rotbl. bladen 3klufna, med aflånga, helbräddade, trubbiga flikar; blomskäften korta, enblommiga, bladlösa; karp. n. utan spröt. 2 7. Fig. Sv.B.710. Fl.D.331. H.N.f.5, n:o 25.

Fukt. st. i fjelltrakter, r. (Torn. *Lpm.* flerst. t. ex. Kedkesuando, Naimakka, Kilpisjärvi, Jukkasjärvi etc. *Lul. Lpm.* Sirkasluokte vid Wirihauare. *Pit. Lpm.* Akarisfjell: H. Widm. *Jeml.* Ovikens sn, vid Eltnäset och Borgen; Bergs sn, vid Vigge. *Dal.* Idre, vester om Djupgrafsstöven vid Löfåsen. *VB.* vid Öfver-Torneå. — *N. Varanger; Vadsöe; Bossekop* etc. Salten; Dovre; Tronfjellet etc.) *Blomskäften tumslånga; ganska små blr med oftare 3 ell. 4 kronbl. Karpell. hafva omogna ett kort, klotlik stift, som stult. n. alldeles försvinner.*

\*\* Stjelen uppstigande ell. upprät, enblommig.

8 *R. pygmaeus* Wg. stjelen uppstigande; rotbladen n. njurlika, djupt 3—6klufna, med helbräddade flikar; blomfodret föga hårigt, n. längre än kronbladen; karpell. med kort spröt. 2 7, 8. Fig. L.Fl.Lt.3.f.3. Sv.B.748. Wg.Fl.Lt.8. Fl.D.144. H.N.f.7, n:o 28.

Fjellv. (*Lpl.—Herjed.* — *N.*) *Blommande 1—3 tum hög; vid fruktmogn. ofta quartershög, men mycket spenslig. — R. nivalis* β *L.*

9 *R. nivalis* L. stjelen upprät; rotbladen njur- eller hjertlika, nedom midten 5—7-klufna; stjelen djupt 3—5klufna med helbräddade flikar; blomfodret brunlutet, dubb. kortare än kronbladen; karp. med utdraget, krökt spröt. 2 7, 8. Fig. Lin. Fl.Lt.3.f.2. Sv.B.394. Wg.Fl.Lt.8.f.3. Fl.D.1699. H.N.f.7, n:o 27.

Högre fjellv. (Torn. *Lpm.—Jeml.* Ekorrdörren. — *N. Finnm.* allmän. Dovre, på Finnshöe m. fl. st. ofvanför Drivstuen och Vaarstien, samt på Knudshöe.) *Omkr. quartershög; bladen glänsande, med 3 hufvudflikar, den mellersta hel, sidoflikarne inskurna; blommorna guldula.*

\*10 *R. altaicus* Lax. stjelen upprät; rotbladen rundade eller viggformiga [icke intryckta] vid basen, grundt mångflikiga; stjelen 5—7flikade eller klufna till och nedom midten i lancettlika flikar; blomfodr. som hos föreg.; karpell. med något utdraget krökt spröt. 2 8. Fig. Fl.D.suppl.82. H.N.f.15, n:o 29.

Fjellv. r. (*N. Vest-Finnm.* Magerö, samt andra öar vid Nordkap. Ost-Finnm. Lebesbyfjellen, Langfjordfjellen etc.; Berlevaag.) *Vanl. större än föreg., bladen n. utan glans, blrna ljusgula. — R. niv. β sulphureus* Wg.Fl.L. *R. sulph. Fr. S.V.Sc.*

\*\*\* Stjelen meränd. upprät och flerbliommig; roten trådig.

a — Blomskäft släta [orefflade]; karpell. ludna.

11 *R. auricomus* L. stjelen glatt, mångbliommig; rotbl. njur—hjertlika, meränd. djupt 3klufna ell. delade, stund. hela, groft naggtandade, under glatta; stjelen oskaftade, handdelade, med jernbreda, vanl. helbräddade flikar; karp. dubb. längre än deras spröt. 2 5, 6. Fig. Fl.D.665.

Äng. a. (*Sk.—Lpl.* — *N. till Ost-Finnm.: Norm.*) *Var. med alldeles odelade och ända till basen handdelade rotbl.; de nedre stjelenbladens flikar äro stund. handklufna: var. palmatus. Den bladlösa slida, som hos R. cassub. omsluter basen af rotbladens skäft, saknas hos närr. art, hvars rotbl. i stället hafva skäftet vid basen vidgad till en slida.*

12 *R. cassubicus* L. stjelen som hos föreg.; rotbl. rundadt njurlika, odelade, groft naggtandade, under gleshåriga; stjelen bl. som hos föreg., meränd. med lancettlika,

*sågade* slikar; karp. *knappt* längre än sprötet. 2½, 6. Fig. Fl.D.suppl.83. H.N. f.5, n:o 23, 24.

Skugg. st., äng. r. (*Gestr.* vid Flerång, Grinduga. Kuhho m. fl. st. *Rosl.* i Vaddö; Grisslehamn etc. *Uppl.* Ytterboda i Elfskarleby; Uppsala, vid Godtsunda och Vreta-udde; Hågeby; Öfver-Gran; Husbysjutöf. *Vestml.* Björnön och öst. Håstholmen i Vesterås-fjärden; Sättra brunn enl. Leffl. *Verm.* Aspsäter i Gilberga. ÖG. Runstorp i Kimstad enl. Kindb. *Smål.* Almesåkra: Zett.) *Gröfre* än föreg.; *rotbl.* äldre ofta 4 tum breda, med skaftens bas innesluten i en vid, hinnaktig slida.

b — Blomskäft släta; karp. glatta och släta.

13 *R. acris* L. stjelken meränd. *tilltryckt småhårig*; bladen 3—5delade, med inskurna slikar. håriga; öfre stjelkbladens slikar n. *jernbreda*. 2½, 8. — *β nothus*: *rotbl.* 3fingradt delade, med skaftade småbl. Fig. Sv.B.375. Fl.D.2415.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Var. från alshög till några få tum hög, samt med gleshåriga ända till silkesludna blad.*

14 *R. Friestii* Godr. & Gren. stjelken *nedtill kort stråfhårig*, upptill jemte bladen silkes-hårig; alla bladen *likformiga*, 3fingradt delade, med kort skaftade, n. *ruiformiga*, djupt inskurna slikar. 2½, 8. Fig. H.N.f.11, n:o 31.

Äng. r. (*Uppl.* Uppsala, på en äng bredvid Akademiens materialbod. — N. vid vägen mell. Aalesund och Steenvaagen: Doc. P. Olsson; i Torpen, vid Finden och Nörsteli: Bl.?) *Större och gröfre än föreg., från hvilken den är väl skild genom de ända upp likformiga bladen, samt den utsperrade hårligheten på stjelkens nedre del och bladskäften, hvori den mera liknar R. lanuginosus. Bladnerverna starkt upphöjda, hvitaktiga. — R. silvaticus Thuill. enl. Fr. R. Steveni Andr. enl. Beurl. R. acris γ pubescens Ax. Bl. Bot. Reise i Valders?*

c — Blomskäften refflade; karp. glatta och släta.

15 *R. repens* L. stjelken *uppstigande, med grenskott*; bladen 3fingradt delade, med långt skaftade, 3delade och inskurna slikar; blomfodr. *tilltryckt* [till kronan]; frukt-fästet styfhårigt. 2½—8. Fig. Sv.B.400. Fl.D.795.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.) *Har vanl. stora, höggula blr. Var. från glatt till silkesluden; funnen vid Strengnäs med upprätt stjelk, utan grenskott.*

16 *R. polyanthemos* L. stjelken *upprätt, utan grenskott och knöl* vid roten, *utsperradt stråfluden*, mångblommig; bladen djupt 3—5delade och slika, med n. oskaftad ändflik; blomfodr. och fruktfästet *som hos föreg.* 2½, 6, 7. Fig. Fl.D.1700.

\* *nemorosus* DC. *rotbl.* klufna till ½ nära basen i 3—5, omv. äggrunda inskurna slikar. Fig. H.N.f.14, n:o 25.

Äng. (Sk.—*Gestr.* *Helsl.* i Tuna och Bergsjö: Wistr. Ängml. Nordingrå prestg. enl. Leffl. *Dal.* *Dalsl.* *Boh.* Öl. *Gottl.* — N. till Lofoten. — \* *Gottl.* mångenstädes.) 2—5 qv. hög, med stora blr; hos hufvudformen äro rotbladen delade ända till basen. — \* *R. silvaticus* Thuill. enl. Godr. & Gr.

17 *R. bulbosus* L. stjelken *upprätt, utan grenskott*, uppsvällad till en knöl vid roten, ut-stående mjukhårig, fåblommig; bladen djupt 3delade, med bredt vigglika, klufna och tandade slikar, skaftad ändflik; blomfodret *nedböjdt*; fruktfästet styfhårigt. 2½, 5, 6. Fig. Sv.B.387. Fl.D.351.

Ängsback. a. (Sk.—*Helsl.* Söderhamn. *Vestml.* VG. *Dalsl.* Venersborg. *Boh.* Öl. *Gottl.* — N. Christjansand.) *Stjelken quartershög, ofta enkel; i skugga stundom hög och grenig, hvarvid knölen vid roten n. försvinner och bladflikarne blifva n. lancettlika.*

d — Karpell. upphöjdt grynprickiga ell. taggiga.

18 *R. Philonotis* Ehrh. stjelken *hårig*, mångblommig; bladen 3fingradt delade, med breda, 3delade och inskurna slikar; blomskäften *refflade*; foderbl. *nedböjda*, af halfta kronbls längd; karp. *omkring kanten grynprickiga*. 2½—8. Fig. Fl.D. 1459. H.N.f.7, n:o 26.

Äng. och åkerrenar, r. (Sk. Trelleborg; Håjebro. *Blek.* teml. allm.: Goss. *Boh.* Koön enl. G. v. Ced. Öl. vid Näsby i Åhs; Gamlegårde i Ventlinge: Sjöstr. *Gottl.* allm. i sydv. del.; samt Hallgårds i Östergarn, Hörsnö sn etc. — N. Söndmör?) *Stj. grenig, stundom föga hårig. — R. hirsutus* Curt.

- 19 *R. arvensis* L. stj. glatt ell. omärkligt hårig, mångblommig; bladen 3fingradt delade i smala, ånyo delade småbl. med n. jemnbredaflikar; blomskäften släta; foderbl. tilltryckta, n. af kronans längd; karp. taggiga, kantlaggarne störst. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.537. Fl.D.219. H.N.f.8, n:o 27.
- Åkr. (Sk. Blek. Smål. Kalmar; Gamleby; Nygård i Lofta. ÖG. öst. Ryd. Södm. Bergshammar sn. vid Vreta enl. C. Ind. Stockh. på Lidingön och Lofön. Uppl. Frötuna m. fl. st. Hall. Öl. Götll. — N. söd. del. på ballast: Ax. Bl.) Stj. 1—3 qv. hög, nedtill glatt, högre upp med mycket glesa, tilltryckta hår.

\*\*\*\* Stj. upprät, flerblommig; roten knölig.

- 20 *R. illyricus* L. stjelen hvitullig, fåblommig; bladen delade i 2—3, hela ell. 2klufna, jemnbredt lancettlika, helbräddadeflikar, hvitulliga; blomskäften släta; foderbl. nedböjda. 24 6. Fig. Fl.D.suppl.1,t.19. H.N.f.4, n:o 40.
- Sand. st. r. (Öl. mångenst. på både öst. och vest. Landtborgen, t. ex. Hulterstad, Sandby, Thorslunda, Glömminge m. fl. snr. Förvildad vid Stockh. i Beylons park.) Blrna mycket stora; roten af ett rundadt knippe grofva grynlila knölar; bladen stundom odelade.

#### 198. BATRACHIUM Wimm. Grodnate.

† Kronblad gula.

- 1 *B. sceleratum* Th. Fr. bladen djupt 3klufna, med trubbigt inskurnaflikar; de öfre delade n. till basen i lancettlika—jemnbredaflikar; foderbladen nedböjda, längre än kronbl., slutl. kortare än det utdragna fruktfästet. ☉ 6—8. Fig. Sv.B.412. Fl. D.571.
- Vid och i grundare vatt. a. (Sk.—Um. Lpm. — N.) Var. till storleken, från n. alshög till ett par tum, samt dels, på det torra, upprät, dels, i vatten, flytande; blrna mycket små. — *Ranunculus* L.

†† Kronblad hvita; fruktfäste hårigt. [*Ranunc. aquatilis* L.]

\* Alla blad nedsänkta likformiga, delade i hårfinaflikar.

a — Bladen oskaftade, flere gr kortare än blomskäften.

- 2 *B. marinum* Fr. stj. trind; bl. med oregelbunden omkrets, af framåt riktade, föga utståendeflikar; stånd. talrika, kortare än pist.; fruktfästet kägellikt; karpeller med kort, men tydligt stift. 24 7. Fig. H.N.f.9, n:o 28.
- Haftvatt. (Sk. Saxaviken. — Helsl. Ängml. Hernösand; Eden och Grönsvik i Nora sn. Öl. Götll.) Stjelen lång, benhvit, omärkl. hoptryckt; karp. 40—60.
- 3 *B. circinatum* Fr. stjelen trubbkantig; bladen med half- eller helrund omkrets, af i samma plan utståendeflikar; stånd. talrika, längre än pist.; fruktf. klotrundt; karp. som hos föreg. 24 6—8, hv. blr. Fig. Fl.D.2236. H.N.f.9, n:o 29.
- Sjöar. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verm. Hall.) Utmärkt af bladen, hvilkasflikar ligga i ett teml. rundadt plan, samt ej äro så mjuka och hopfallande som hos de öfriga. Karp. uppgifvas vara håriga och ökölade, men hos ex. i H.N. äro de lika glatta och kölade som hos föreg. — *R. divaricatus* Schrank.

b — Bladen skaftade.

- 4 *B. trichophyllum* Chaix. stj. trubbkantig; bl. med oregelbunden omkrets, af åt alla håll utståendeflikar; blomskäft ungefär af bladens längd; stånd. 12—talrika, längre än pist.; fruktf. klotrundt; karp. med kort stift spetsade, oftast håriga. 24 6—8. Fig. Fl.D.2357.
- \* *pantothrix* DC. ståndarne talrika. —  $\beta$  *succulentum*: mindre, med köttiga bladflikar. Fig. H.N.f.9, n:o 27;  $\beta$  f.11, n:o 33.
- Vatten. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.?) Denna jemte arterna 6—9 innefattas i *B. aquatile* Wimm. — *Ran. paucistamineus* Tausch.  $\beta$  *R. caespitosus* Thuill.

- \*5 *B. Drouetii* Nym. stj. trubbkantig; bl. som hos föreg., med slakaflikar; blomskäft dubb. längre än bladen; stånd. 12 [vanl. färre än 12], längre än pist.; fruktf. klotrundt; karp. mot spetsen vidgade och afrundade. 24 6. Fig.
- Vatten, r. (N. Vaagedalen, i en bäck vid vest. ändan af Selvandet; Gudbrandsdalen,

nära Laurgaard: Elgenstj.) *Blomskäften finare och längre än hos föreg., bladflikarne stakare, så att de ofrån vattnet falla tillhopa.* — *Ranunculus* Schultz.

- 6 *B. conservoides* Fr. stj. och bl. som föreg.; stånd. 6—10, längre än pist.; fruktf. n. cylindr.; karp. rundadt trubbiga, utan stift. 2 7. Fig. H.N.f.13, n:o 45.

Vatten. (Torn. Lpm.—Medelp. och Jemt. Hels. Iggesundsåns utlopp: C. Berg. Gestr. Gelle, i Stenborgsviken. ÖG. Tåkern enl. Kindb. — N. Ost-Finnm. Tanaelv; Berlevaag. och flerst. vid Varangerfj.: Th. Fr. Vest-Finnm. Flöjfeld vid Tromsø etc.: Norm. Dovre.) Vanl. liten, från 2—3 tum till föllång och mera; blrna alltid små, med ett par linier långa, smala kronblad. — *R. paucistam. v. borealis* Beurl. i Bot. Not. — Anm. *B. admixtum* W. Nyl. är af Dr Ångstr. sänd från Stensele i Um. Lpm., men ex. äro icke så fullständiga, att utg. förmår skilja dem från föreg.

\*\* De nedre bl. alltid nedsänkta och delade i härfinna likar, de öfre ofta flytande, med breda likar.

- 7 *B. confusum* Schultz: de nedre [indelade] n. oskafade bladens likar med en. ell. flere borster i spetsen; de flyt. bladen små, ofta felande, 3klufna ell. delade i vigglika—omv. ågrunda tandade likar; kronbl. knappt dubb. längre än fodret [2—3 lin. långa]; stånd. omkr. 10; fruktf. kägellikt; karp. med kort stift. 2 6—8. Fig. Fl.D.1993. H.N.f.10, n:o 28 [ut. flyt. bl.]; f.15, n:o 28 [med fl. bl.].

Vatten, r. (Sk. Lund; Kälinge; Ystad m. fl. st. Blek. Tornby; Sissebäck: Goss. Smål. Vestervik, på Norrlandet. Rost. Blidö sn, Köpmanholm. Vestml. Ramnäs Bruk; Åshulta i Munktorp sn; Vesterås, vid Carlsund. Ner. Humlemysviken i Göthlunda: Past. Blomb. Dalsl. Ekholmen i Gunnarsnäs; samt Boh. Tjörn enl. Lem.) Förblandas lätt med den utländska *B. tripartitum* (DC.) Fr., som dock skiljes med karp. utan märkl. stift och kronbl. knappt längre än fodret. — *B. Petiveri* Ed.5. *Ran. tripartitus* Nolle. *R. Kochii* Beurl. i B.N.

- 8 *B. heterophyllum* Fr. de nedre bl. som hos föreg.; de flyt. bladen [stund. felande] njurlika, till midten ell. djupare 3—5klufna och tandade; blrna vanl. stora med talrika ståndare; fruktf. klotrundt; karp. som föreg. 2 6—8. —  $\beta$  *crassicaule* Fr. stj. tjock uppblåst; karp. glatta, 60—80 i hvarje gytring. Fig. H.N.f.11, n:o 32.

Vatten, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.: Norm.) *Blomskäften hos denna och följ. ungefär af bladens längd, hos föreg. mycket längre; de flyt. bladens bas stund. tvärhuggen.* — *Ranunc. Friesii* Beurl.

- 9 *B. pellatum* Fr. de nedre bladen långskafade, utan borst i likarnes spets; de flyt. bladen aldrig felande; fruktf. äggformigt; i öfr. som föreg. 2 7, 8. —  $\beta$  *isophyllum*: krypande; alla bl. njurlika, inga indelade. Fig. H.N.f.12, n:o 48.

Djupare vatt. (Sk. vid Ringsjön m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. — Ångml. och Jemt. VB. nor. delen. Pit. Lpm. Arjeplog, Storafvan. Hall. Wessige, i Åtran. Boh. Strömstad. — N. Christiania i sjön Gjellumsvand. Ost-Finnm. i flere sjöar i Syd-Varanger.) — *B. setigerum* Fr. i Bot. Utfl. *Ranunculus* Schrank.

††† Kronblad hvita; fruktfäste glatt.

- 10 *B. hederaceum* Dum. stjelen krypande; alla bladen flytande njurlika, med 3—5, hreda trubbiga likar; kronbladen knappt längre än fodret; karp. trubbiga, utan märkligt stift. 2 6—8. Fig. Sv.B.673. Fl.D.321. H.N.f.2, n:o 43.

Vattengrop. nära hafvet, r. (Sk. Össjö nära Engelholm. Hall. Halmstad; Eldsberga. Boh. på Klöfverön. Gottl. Visby vid gamla hamnen. — N. Trondhjem.) *Krypande och rotslände; kronbl. små, hvita, med gul klo.* — *Ranunculus* L. — Anm. Den utländska *B. Lenormandii* liknar mycket denna art, men karp. hafva ett tydligt qvarstättande stift.

(*B. pellatum*  $\beta$ .)

#### 199. FICARIA Hall. Svalört.

- 1 *F. ranunculoides* Mönch: stjelen meränd. enblommig; bladen hjertlika, de nedre grundt, de öfre djupare bugtbräddade. 2 5, g. blr. Fig. Sv.B.17. Fl.D.499.

Lundar. (Sk.—Hels. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) *Rot med ett knippe klubblika knölar.* — *Ranunc. Ficaria* L.

200. MYOSOTIS *Lin.* Mustippa.

- 1 *M. minimus* *L.* bladen n. trådsmla, jemte det enblommiga blomskaftet från rotstocken. ☉ 4—6, g. blr. Fig. Sv.B.690. Fl.B.406.  
Torra st. (Sk.—*Ängml. Dal. Boh. Uddevalla; Strömstad. Öl. Gottl.* — *N.* upp till Trondhem.) *Blomman liten på ett ½—2 tum högt skaft; fruktfästet slutl. 1—2 tum långt.*

- 2 Flokken *Anemoneæ.* Kronbl. utan honingsgrop. Karp. nötlika, slutl. enfröiga.

201. THALICTRUM *Lin.* Ängsruta.

† Karpellerna med 3—4, breda, hinnaktiga kanter.

- 1 *T. aquilegifolium* *L.* bladen 3dubb. parbladigt delade, med stipler vid småbladens skaft; småbladen rundade ell. omv. äggrunda, framtill trubbigt flikiga; blrna i n. qvastlikt knippe. 2 6, rödl. blr. Fig. H.N.f.2, n:o 42.  
Lundar, r. (Sk. här och der, ymnig. *Blek. Ynde i Sölvitsborgs sn; Carlshamn; Mörum och Elleholm sn m. fl. st. Smål. Viestad sn. Almås; Stenbrohult vid Elmhults gåstgg.; Tingsås vid Tingsryd; Götheryd; Scheutz.*) *Bladen icke olika Aklejors, ehuru smärre.*

†† Karp. mångfårade; blr i en enda, enkel klase.

- 2 *T. alpinum* *L.* stjelen n. bladlös; bladen dubbelt parbladigt delade i rundade småblad; klasen vid blomn. nedbröjd. 2 6, 7, Fig. Sv.B.655. Fl.D.11. H.N.f.3, n:o 27. Fjelltr. a. (*Lpl.—Dal. vid Storbo i Idre. Ängml. Tåsjö sn. — N.*) *Quartershög, enkel, med små, glänsande småblad, viol. ell. gula blr.*

††† Karp. mångfårade; blr i knippe ell. sammansatta klasar.

\* Blrna uppräta; stjelen fåradt kantig.

- 3 *T. kemense* *Fr.* bladen 2—3dubbelt parbladigt delade, med de nedersta sidogrenarne mycket långa; småbl. rundade ell. något omv. äggrunda, trubbigflikiga, under bleka; blomsamlingen yngre tät, äldre gles. 2 7, 8, gulakt. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 26.

Fukt. skogslund, r. (*Torn. Lpm. — N. Finnm. Alten etc.; vid Tana-elv: Norm.*) *Ofta stor som T. flavum, men har mer sammansatt delade blad, tunnare och mer rundade småblad, ej olika dem hos T. minus, ehuru större. De enskilda bladskäften skola, enl. Fries, hos denna art vara trinda, hos följ. kantiga. — T. majus Wg.*

- 4 *T. rariflorum* *Fr.* bladen mest dubb. parbladigt delade, med kortare sidogrenar, omv. äggrunda, trubbigt flikiga småblad; blomsamlingens grenar uppräta, med n. klasevisa blr. 2 7, 8. Fig. H.N.f.16, n:o 34.

Ängar och elfstränder, r. (*VB. utmed Torn. och Muonio elfvar från Huukis ned till Haparanda. Ängml. Nämforsen i Liden sn. Medelp. vid Indals prestg.; Hässjö sn: F. Kempe enl. Leffl.*) *Liknar föreg., men bladen hafva, såsom hos följ. art, mindre ångulär omkrets; småbl. än tunna och rundade såsom hos föreg., än fasta och mer utdragna såsom hos följ. — T. Friesii Rupr. och Beurl. — Anm. Denna och föreg. art anses af Læst. vara blott varieteter af T. simplex.*

- 5 *T. flavum* *L.* bladen dubb. parbladigt delade, med korta sidogrenar, omv. äggrunda [säll. smalt vigglika], vanl. 3flikiga småblad; blomsamlingens grenar med mot toppen flockvis samlade blr. 2 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.328. Fl.D.939. H.N.f.9, n:o 25; f.15, n:o 26 [var.].

Fukt. äng. a. (Sk.—*VB. nor. delen och Um. Lpm. — N.*) *1—1½ aln hög, med minst tumslånga småblad, än med bred, än viggformig bas, rik blomsaml. med ljusgula ståndarsträngar. Har stundom fjäll-lik, snart försvinnande stipler vid småbladskäften. Var. i ÖG., på Gottl. och vid Christiania med smalt vigglika småbl.: var. angustatum Fr.*

- 6 *T. angustifolium* *Jacq.* bladen 3dubb. parbladigt delade; småbl. jemnbreda ell. lancettlika, uddbladet ofta smalt vigglikt, 2—3flikigt; blrna som hos föreg. 2 7. Fig. Jacq.Hort.3,t.43. H.N.f.13, n:o 43.

Fukt. skogsäng. r. (*Öl. i Föra sn.*) *Lik en smalbladig form af följ.; de nedre bla-*



dens småbl. bredare [1—2 lin., med omkr. 1 tums längd], de öfres trådsmla; roten trådig.

\*\* Blrna lutande; stj. kantig utan färor.

- 7 *T. simplex* L. bladen dubb. parbladigt delade, med vanl. smala, vigglika, 3flikiga ell. jernnbreda och hela småblad; blomsamlingens grenar med klaserisa, skiljda blomkransar. 2 7, grågul. blr. —  $\beta$  *dubium*: småbl. n. omv. ågrunda med spetsiga flikar. —  $\gamma$  *boreale*: de nedre bladens småbl. n. omv. ågrunda, med trubh. flikar. Fig. Fl.D.244. H.N.f.3, n:o 26;  $\gamma$  f.10, n:o 24.

Äng. (Sk.—VB. och Jeml. — N. —  $\gamma$  VB. vid Torn. elf. flerst. Ängml. Liden och Junsele snr.) Till alla delar spåddare än *T. flav.*; enskilda blomskafen 2—5, i åtskiljda halfkransar; strängarne mörka. —  $\gamma$ , som synes bilda en öfvergång till *T. rarifl.*, är *T. strictum* \* bor. Nyl. Var. på Öl. och Gottl. med mycket smala, n. jernnbreda småbl.: H.N.f.13, n:o 44; men denna form öfvergår vid odling till den vanliga.

\*\*\* Blrna nästan hängande; småbladen n. runda.

- 8 *T. minus* L. stjelen refblad och något kantig, vid basen bladlös; bladen 3—4dubb. parbladigt delade; småbl. rundade, 3—5klufna, med spetsiga flikar; blomsaml. ganska grenig, med vidt utböjda grenar; karp. n. lancettlika, något åggrade. 2 6, 7, grå-röd. blr. Fig. Fl.D.732? Reich.D.Fl.4627. H.N.f.7, n:o 23.

Sandiga strandäng. r. (Sk.—Boh. — N. Jædderen upp till Hardangerfjord.) Vanl. mindre än följ. med mera utsperrade blomgrenar, men i synnerhet skiljd med de smalare, åt båda ändarne mer spetsade karpellerna. — *T. vulgatum* Schultz och Beurl.

- 9 *T. Kochii* Fr. stj. n. slät, under lederna något refblad, från basen bladig; bladen som hos föreg.; blomsaml. ganska grenig med utstående grenar; karp. åggformiga. 2 7, grå-röd. blr. Fig. Reich.4628. H.N.f.7, n:o 25.

\* *flexuosum* Reich. stj. vanl. något zigzag-böjd mell. lederna: bladflikarne längre och spetsigare; karp. med något längre spets. Fig. H.N.f.7, n:o 24 [varr.].

Äng. (ÖG. Gräsmarö i Gryt sn: Kindb. Gottl. allm. — \*Sk. Ön Hven, St. Ibbs kyrkog. Gottl. Vänge och Løjsta snr.) Ett par fot hög, med rik blomsamling; karp. smärre än hos föreg. \* har ofta blomgrenarne mer utstående och något plattade karpeller. Odlat har *T. Kochii* i lefande tillstånd mörkröda märken, *T. flex. gula*. Båda formerna skola dock på Gottl. öfvergå i hvarandra. — *T. minus* L. Gottl. resa och herb. *T. collinum* H.N.

## 202. ANEMONE Lin. Sippa.

† Svepet aflägsnadt från blomman, af 3fingradt delade blad.

- 1 *A. silvestris* L. stängeln enblommig med flere rotblad vid basen; svepebladen skaf-tade med flikiga småbl. och hviludna skaft; hyllebladen meränd. 5, ovala ell. omv. ågrunda; karpeller hvitulliga. 2 5, hv. blr. Fig. H.N.f.8, n:o 29.

Torra st. r. (Öl. Föra sn, omkr.  $\frac{1}{2}$  mil öster om kyrkan, på 2 ställen vid Husvalla by. Gottl. Färön nära kyrkan samt vid Lauters; Capellshamn; Lokrum sn. i en hage vid Martebo-myr; Hesse i Fläringe; vid Hangvahr kyrka.) Gröfre än följ., med större blr, trådigt hopknippad rot. Hyllebladen säll. flere än 5 och då smalare. Rotbl. hos denna och de 2 följ. långt skaftade, 3—5fingradt delade, med flikiga småbl.

- 2 *A. nemorosa* L. stäng. enblomm., med ett enda rotblad; svepebl. skaftade med in-skurna småbl. och gleshåriga skaft; hyllebl. 6 ell. flere, aflånga; karp. gleshåriga. 2 4, 5, hv. ell. röd. blr. Fig. Sv.B.3. Fl.D.549.

Skog. fukt. st. a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. — N.) Rotstocken hos denna och följ. jemntjock, horisontal. Finnes stund. med särskilda honbl, hvilka äro smärre än de 2 köndade.

- 3 *A. ranunculoides* L. stängeln 1—2blomm.; svepebl. föga skaftade, med såglik in-skurna småbl.; hyllebl. meränd. 5, elliptiska; för öfr. som föreg. 2 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.405. Fl.D.140.

Lund. äng. r. (Sk.—Södm. och Vestml. vid Mälaren, derofvan mycket sällsynt, t. ex. Rosl. Vaddö i Hammarby äng. Öl. Gottl. — N. Asker. Christiansand—Salten.) Min-dre än de föreg., alltid med höggula blr.

†† Svepet tätt under blomman, foderlikt, af odelade blad: *Hepatica DC.*

- 4 A. *Hepatica L.* rotbladen klufna till midten i vanl. 3 helbräddade flikar. 2 4, 5. —  $\beta$  *glabrata*: fullkomligt glatt, äfven frukttämnena; bladflik. med kort udd. —  $\gamma$  *multiloba*: bladen klufna i 5—9 flikar. Fig. Sv.B.141. Fl.D.610.  
Skogsback. a. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. —  $\beta$  ÖG. Åtvedsnäs. Södm. Strengnäs i Olivekälls park. Uppl. Uppsala, i Kungsparken; Funbo sn, vid Helmbyboda. Ner. i Hammar. —  $\gamma$  Uppl. Rasbo sn. Södm. Fridön vid Tullgarn: C. Ind. VG. Billingen.) Blrna vanl. blå, stund. röda ell. hvita, någon gång dubbla. — *Hepatica triloba DC.*

### 203. PULSATILLA Mill. Vippra.

† Bladen 3fingradt delade.

- 1 P. *patens* Mill. bladen långt skaftade; småbl. n. rutformiga, 2—3delade med vigglika, i spetsen djupt 2—3tandade, ell. mångdelade flikar; blomman n. upprät. 2 4, 5, ljust viol. blr. Fl.D.suppl.80. H.N.f.15, n:o 27.  
\* *Wolfgangiana* Bess. småbladens flikar mångdelade; uddbladet långskaftadt. Fig. Back. r. (Gottl. vid Løjsta kyrka. Ängml. Ramsele sn.  $\frac{1}{2}$  mil ofvan Nylands by; Re-sele sn; Liden sn, vid Nämforssen enl. Leml. — \* Gottl. bland hufvudformen.) Lik-nar under blomningstiden ganska mycket P. *vulgaris*, men skiljes från denna och öfr. Sv. arter genom de efter blomningen främväxande långskaftade och 3fingradt delade rotbladen, hvilka hos \* i ans. till den långt skaftade 3delade ändfliken tyckas vara 2pariga. — *Anemone L.* \* P. *Hackelii* Bot. Not. 1856.

†† Bladen parbladigt delade.

- 2 P. *vernalis* Mill. bladen en gång parbladigt delade; småbl. n. omv. äggrunda, djupt inskurna med äggrunda flikar och tänder; hyllebl. dubb. längre än ständerne. 2 5. —  $\beta$  *rosella*: blrna små, rosenröda. Fig. Sv.B.637. Fl.D.29. H.N.f.5, n:o 22.  
Skogshed. r. (Jemtl. Bergs. Sunne och Mysjö snr. Herjed. och nor. Helsl.—Smål. Blek. Skillinge och Listerby. Sk. Örkelljunga; mell. Kädarps gästg. och Röke kyrka m. fl. st. i nor. del. enl. F. Aresch. Hall. Öl. Mörbylånga. — N. mell. Kongsvinger och Elverum. Gudbrandsdalen. Dovre etc. —  $\beta$  Smål. Femsjö sn, vid Torpet Bjellö.) Blomman i början på en kort stängel, n. upprät; äldre blir stängeln quartershög, med lutande, endast i solen vidt öppnad blomma; färgen hvit, dragande i rödt, utvändigt rödbrun. Svepet hos alla arterna findeladt, mycket ludet. — *Anemone L.*  
3 P. *vulgaris* Mill. bladen 2—3dubb. parbl. delade, med small jemnbreda—trådsmla flikar; blomman något lutande, med n. raka blad, dubbelt längre än stånd. 2 4, 5. —  $\beta$  *glabra* Nordst. hela växten fullkomligt glatt: blrna hvita. Fig. Sv.B.292. Fl.D.153.  
Sandback. (Sk.—Uppl. och Vestml. Verml. vid Gullspångselfven i Råda sn. Dalsl. Lockerud nära Venersborg. Boh. Öl. Gottl. — N.? —  $\beta$  VG. nära Sandhems kyrka enl. ex. af O. Nordst.) Blomman stor, hos hufvudf. rödviolett. Hyllebl. stundom mer och mindre flikiga: var. *schizantha* ed. 8. Hos  $\beta$  är äfven karp.: eljest tätt ludna spröt alldeles glatt. — *Anemone L.*  
4 P. *pratensis* Mill. bladen som föreg.; blomm. n. hängande, med i spetsen tillbaka-böjda blad, knappt  $\frac{1}{2}$  längre än ständerne. 2 5. —  $\beta$  *glabrata* M. Flod. hela växten glänsande glatt. Fig. Sv.B.299. Fl.D.611. H.N.f.1, n:o 34.  
Torra äng. r. (Sk.—Södm. VG. Öl. Gottl. — N. Christianiæ på Hovedöen, samt i Skiebergers sn. —  $\beta$  Öl. sparsamt vid Mörbylånga.) Blomm. mindre än hos föreg., invändigt purpurrod, utv. blyfärgad. — P. *nigricans* Störk. Anem. L.

### 204. ADONIS Lin. Kastlöser.

- 1 A. *vernalis L.* bladen oskaftade, 2—3dubb. parbladigt delade, med trådsmla flikar; kronbladen öfver 10, lancettlika, i spetsen något trubbnaggade; karpellerna mjuk-håriga, i äggformig samling. 2 5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.555 [dålig]. Fl.D.suppl.81. H. N.f.4, n:o 38, 39.  
Backar. r. (Öl. Borgholm: Thorslunda vid Aronstorp; mell. Kastlösa och Ottenby; Näsby i Ås sn. Gottl. Hoborgen; st. Carlson m. fl. st.) Blommande fotshög; blrna vanl. öfver 2 tum vida.

3 Flocken **Helleboreæ**. Karp. kapsellika, flerfröiga.205. **CALTHA** Lin. Kabbelök.

- 1 *C. palustris* L. stjelken uppstigande ell. nedligg.; bladen hjert- ell. njurlika, grofnagade, med rundade flikar vid basen. 2l 4, 5, g. blr. — *β radicans*: stjelken nedliggande, rotsläende i lederna. Fig. Sv.B.200. Fl.D.668.

Våta st. a. ((Sk.—Lpl. — N. — *β* N. Finnm. Tanen och Varanger flerst.))

206. **TROLLIUS** Lin. Bullerblomster.

- 1 *T. europæus* L. stjelken upprät; bladen handlikt 5delade, med flikiga och inskurna småbl.; foderbladen öfver 10, slutande sig tillsammans i klotform; kronbladen af de oöppnade ståndarnes längd. 2l 6, 7. Fig. Sv.B.383. Fl.D.133.

Äng. etc. (Sk.—Lpl. och VB. Öl. Mest i vestra prov., på mer spridda ställen i de östra. — N. till Finnm.) 3—4 qv. hög, glatt växt, med stora klotrunda ljusgula blr. Då ståndarne utlömt frömjölet, dro de längre än kronbladen. Var. med små blad och blr.

207. **AQUILEGIA** Lin. Akleja.

- 1 *A. vulgaris* L. stj. upprät; de nedre bladen dubbelt 3fingradt delade; småbladen grundt inskurna i rundadt trubbiga flikar; kronsporrarne med inkrökt spets, kortare än foderbl. 2l 7, 8. Fig. Sv.B.118. Fl.D.695.

Lund. i bergstr. r. (Sk.—Södm. Ner. Vestml. Dal. Grangärde; Boda Capell vid vägen till Styggforsen. Verml. Öl. Göt. Förvildad vid Gefle m. fl. st. upp till Sundsvall. — N. upp till Gudbrandsdalen och efter kusten till Trondhj.) Alnshög, vanl. glatt växt, med stora, blå, stund. ljusröda ell. hvita blr. Var. med hårig stjelk.

208. **ACONITUM** Lin. Stormhatt.

- 1 *A. septentrionale* Köll. bladen handlikt 3—7klufna och flikade; blomklasen klubbig af tätta glandelhår; hjelmen utan tydlig klo; honingsgömmena med tillbakarullad sporre, lancettlik läpp. 2l 7, 8. Fig. Sv.B.654. Fl.D.123. H.N.f.5, n:o 26.

Fjelltr. a. (Lpl.—Herjed. Dal. Särna och Elfdalen. Verml. nor. Finnskoga sn. Ängml. Medelp. Uppl. Hillebola. — N. till Finnm. nordligast på Laxetind: Norm.) 2—3 alnar hög, med blå, stund. n. hvita, högst sällan hos oss gula blr. \*) — *A. Lycocotum* L.Fl.Su.

- 2 *A. Napellus* L. bladen 5fingradt delade, med vigglika 3klufna och flikiga småbl.; klasen tät rak, finluden; hjelmen finluden, halfrund, med till klo afsmalnande bas; honingsgömm. med kort, tillbakahöjd sporre och urnupen läpp; karp. med utstående spets. 2l 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.46. H.N.f.6, n:o 23.

Fukt. skogsäng. r. (Dal. Vika sn, Stämshöjden, vid Trostbäcken i Stortäkten. Södm. Åker sn, vid Berga-ån. Sk. Hasselmöllan vid Romeleklint.) Hyllebladen ut- och invändigt småhåriga; de nedre örtbladen glatta och glänsande. — *A. napelloides* Sw. *A. neubergense* Reich.

- 3 *A. Cammarum* L. bladen som hos föreg.; klasen slutl. glesblommig, ferböjd glatt; hjelmen glatt, koniskt hvalf-lik, med afsmalnande bas; honingsgömm. som hos föreg.; karp. yngre med hopstblände spets. 2l 7, 8, b. blr. Fig. Fl.D.1698. H.N. f.6, n:o 24.

Byar etc. r. (Hall. vid Fylleåns stränder. Smål. vest. del. t. ex. Femsjö; Klefshult etc. Fastor i Nye sn.) Lik föreg., men är glatt, med längre skaftade blr, stundom, sård. odlad, med utsperradt grenig klase, smärre och mer bredflikiga blad. — *A. Störchianum* Reich. *A. neomontanum* Fl.D.

209. **DELPHINIUM** Lin. Riddarsporre.

- 1 *D. Consolida* L. bladen dubh. 3fingradt delade, med smalt jemnbreda—trådsmla flikar; blomsaml. utsperradt grenig; honingsporren enkel; karpell ensam, glatt. ☉ 6, 7, viol. blr. Fig. Sv.B.58. Fl.D.683.

Åkrar. (Sk.—Hels. Vestml. Ner. VG. Öl. Göt. — N.) Omkring fotshög med stora blr i klasar.

\*) Enl. Wbgs Fl. Lapp. n:o 275 är en gulblommig form (*β*) tagen vid Kirkewara i Lul. Lpm.

4 Flokken **Pæoniæ**. Frukt: [flerfröiga karpeller ell.] bär.

210. **ACTÆA** Lin. Trolldrufva.

1 *A. spicata* L. bladen 2—3dubbelt parbladigt ell. 3fingradt delade, med äggrunda—omv. äggr., hvass-sågadeflikar; blrna i tät, äggformig klase. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.291. Fl.D.498.

Lund. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.: Norm.) *Med ensam blomklase, svarta bär.*

34 Fam. **BERBERIDEÆ** Juss. Blr regelbundna af 6 foder- och kronblad motsatta hvarandra. Stånd. motsatta kronbladen. Frukt enrummig, med fröfäste på ena sidan.

211. **BÉRBERIS** Lin. Surtorn, Berberis.

1 *B. vulgaris* L. stammen med sammansatta taggar och knippevisa, omv. äggrunda, taggsågade blad; blomklasarne hängande; kronbl. trubbiga. 2 6, g. blr. Fig. Sv.B.24. Fl.D.904.

Betesh. (Sk.—Gestr. Helsl. flerst. vid Hudiksvall: Wistr. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Borgholm. Gottl. Visby. — N. Arendal; Holmestrand; Christiania; Fredrikshall.) *Buske med aflånga, röda, ganska sura bär.*

35 Fam. **PAPAVERACEÆ** Juss. Blr regelbundna, af 2bladigt snart affall. foder och 4 kronbl. Stånd. fria talrika. Fröh. enrummigt med ofullkoml. skiljeväggar, ell. 2rummigt.

212. **PAPÁVER** Lin. Vallmo.

† Fröh. styfhårigt, klubblikt.

\*1 *P. nudicaule* L. stängeln bar, enblommig; bladen enkelt pardelade, med bredt lancettlika, stundom djupt inskurnaflikar; blomskafstens hår *utstående*; stånd.sträng. ända upp *trådsmla*. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.41. H.N.f.5, n:o 20.

Fjellv. r. (N. Ost-Finm. Syltviåfjorden vid Osterelv. Vest-Finm. Talvig etc.; på Langfjeldene vid Maalselv; Norm. Dovre på Blaa- och Knudshøe samt Finnshøe; vid Drivelsen nedom Vaarstien, samt i Svisdal, Druedal etc. Valders vid Helestrand.) *Tufvad växt. — P. radicatum* Rottb. *P. alpinum* Fr. S.V.Sc.

2 *P. Argemone* L. stjelen bladig, mångblommig; bladen dubbelt pardelade med smalaflikar; blomskafstens hår *tilltryckta*; stånd.sträng. *uppåt bredare*. ☉ 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.538. Fl.D.867.

Åkrar, r. (Sk.—Södm. Nyköping. Stockh. Uppl. Håtuna sn; Vahlö sn; Norrtelge etc. Vestml. Skinnskatteberg. Ner. VG. Kinnekulle. Öl. Gottl.) *Blrna mycket mindre än hos de öfr. med röda blr. Var. med sargadt flikiga kronblad.*

†† Fröh. glatt, aflångt ell. klotrundt.

3 *P. dubium* L. stjelen bladig, flerblommig, med dubbelt parklufna och flikade blad; blomskafstens hår *åtminstone upptill tilltryckta*; stånd.sträng. ända upp *trådsmla*; fröh. *aflånga*. ☉ 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.457. Fl.D.902.

Åkrar, etc. (Sk.—Gefle. Medelp. Skön enl. Lem. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Hall. Särö: Lem. Öl. Gottl. — N.) *Blommorna omkring 2 tum vida.*

†4 *P. Rhoeas* L. stjelen bladig, flerblommig, med pardelade blad, inskurnaflikar; blomskafstens hår *utsperrade*; stånd. *som hos föreg.*; fröh. *klotrunda*. ☉ 7, r. blr. Fig. Sv.B.519. Fl.D.1580.

Åkr. och odl. ställ. r. (Sk.—Uppl. och Vestml.; förvildad med andra frön; äfvenså i Norge.) *Större än de föreg.*

†5 *P. somniferum* L. hela växten vanl. glatt; bladen *stjelkomfallande*, äggrunda—bredt aflånga, *grundt flikade*; stånd.sträng. *uppåt bredare*; fröh. *klotrunda*. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.525.

Odli. st. r. (Sk.—Held. och Vestml. här och der sjelfsädd i och utom trädgårdar. — N. enl. Ax. Bl. Förvildad.) *Blåaktig växt, med hvita ell. röda, vid basen violetta kronblad.*

## 213. CHELIDONIUM Lin. Skelört.

1 *C. majus* L. stj. gleshårig; bladen parbladigt delade, medflikiga småbl.; blrna i flock; fröb. långa, släta. 2½—8, g. blr. —  $\beta$  *crenatum*: kronbladen flikiga; fröb. längre, vridna. Fig. Sv.B.67. Fl.D.542.

Vid murar och hus. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Sk. vid Lund: F. Aresch.; Klinta nära Ringsjön.) *Bladen under blåaktigt gröna, gleshåriga, med vid basen bladlikt vidgade småbladskäft.*

## 214. GLAUCIUM Scop. Möblomma.

1 *G. luteum* Scop. stjelen glatt; rotbladen skäftade, pardelade; stjelen omfattande, djupt bugtiga ell. flikiga; fröb. mycket långa, stråknöliga. 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.171. Fl.D.585. H.N.f.10, n:o 29.

Hälsstr. r. (Boh. Quille sn. Vassholmen och Tistelholmarna; Strömstad, på S. Koster och Bredviksmarken; Grötd.; Otterö och Hvalö; Hjertö; Svinölandet och Furaby strand i Tanum, ymn. — N. Christianiafjord på Illöen; Spjälrand; Aggeröen, Langesund, Mandal etc.) *Blrna stora som på Vallmo; växten blåaktig. — Chelidonium Glaucium L.*

36 Fam. FUMARIOIDEÆ DC. Fod. 2bladigt, affallande. Kronan oregelbund., 4-bladig. Stånd, 6, sammanväxta i 2 stammar, med enrummiga knappar. Frukt enrummig.

## 215. CORYDALIS Pers. Nunneört.

† Stjelen med ett stort fjäll nedom lägsta bladet; knölstammen tät.

\* Blomskärmen omv. äggrunda, n. alltid flerklufta.

1 *C. solida* Sm. de 2 yttre kronbl. i spetsen urnupna, småtandade, det nedre med knöl vid basen; de 2 inres rygg *smalt vingad*; stiftet vid basen *knåliskt nedböjdt*; fruktskäft. af *den smalt lancettlika baljans längd*. 2½, 4, 5, r. blr. Fig. Sv.B.531,f.1. H.N.f.11, n:o 34.

Lundar, r. (Blek. vid Ronneby; Carlshamn: Gosselm. *Södm.* Tjufholmen vid Nyköping: C. Ind. *Uppl.* Funbo i Kersbärsunden vid prestgården. *Rosl. Stockh.* Bergslund, förvildad.) *Blomklassen vanligen glesare och mer rikblommig, samt med längre blomskäft än hos de följ. Bladen hos alla arterna dubb. 3fingradt delade, med flerklufta småblad.*

2 *C. laxa* Fr. de yttre kronbl. *knappt* urnupna, småtandade, det nedre med knöl; de inre som hos föreg.; stiftet utan knä; fruktskäft. kortare än den *smalt lancettl. baljan*. 2½, 4, 5, r. blr. Fig. Sv.B.531,f.2 [blrna för mörka]. H.N.f.8, n:o 25.

Lund. r. (Sk. Esperöd; Helsingborg och trol. flerst. enl. F. Aresch. *Smål.* Kalmar. — *Uppl.* holmen Fläskjan i Mälaren; Steninge; Säbyklint i Dalby enl. Lem. *Gottl.* Lilla Carlson enl. G. v. Ced.) *Var. större och mindre, stundom med tät och rikblommig klase, samt med klufta och hela skärm. — C. Lobelii Tausch. Fum. bulbosa a Lin. Fl.Su.*

3 *C. pumila* Host: de yttre kronbl. i spetsen *tvärhuggna*, småtandade, det nedre utan knöl vid basen; de inres rygg *smalt och kort vingad*; stiftet utan knä; fruktsk. 2—3 g. kortare än den *ägggrundt lancettlika baljan*. 2½, 4, 5, r. blr. Fig. Fl.D.1224. H.N.f.8, n:r 26.

Lund. (Sk.—Uppsala. *Rosl. Öl. Gottl.* — N. Christiania.) *Varierar som föreg., men är i allmänhet till alla delar mindre, med blekare blr. — C. laxa \* pum. Ed. 6.*

\*\* Blomskärmen äggrunda, n. alltid bela.

4 *C. fabacea* Pers. de yttre kronbl. urnupna, otandade, det nedre utan knöl; de inres *Hartman, Skandinavians Flora* (10:de uppl. .

rygg med en *upptill* bred, *högt öfver kronbl: spets* framskjutande vingkant; för öfr. som föreg. 2 4, 5, r. blr. Fig. Sv.B.15. Fl.D.1394. H.N.f.10, n:o 30.  
Lund. (Sk.—Medelp. Jemtl. Åreskutan; Hackås. Um. Lpm. Laxfjellet. Vestml. Ner. VG. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. — N. till Finnmark.) 3—5 tum hög, fäblommig; skärmen mycket sällan grundt inakurna. — *Fumaria bulbosa* β Lin.

†† Stjälken utan fjäll; knölstammen ihållig.

5 C. *cava* Schw. & K. blomskärmen ågrunda—*af långt lancettlika*, meränd. *hela*; kronsporrer med trubbig krökt spets; fruktskaftet mycket kortare än baljan. 2 4, 5, r. ell. hv. blr. Fig. Fl.D.605. H.N.f.1, n:o 33.

Lund. r. (Sk. skogväxta delen allm. Smål. Eds sn. ÖG. Omberg vid Alvastra?; Väststena; Stafsäter i Wist m. fl. st. trol. förvildad enl. Kindb. Öl. från Ottenby upp till Föra.) *Större än de föreg., vanl. fotshög; knölstammen öfven större, med rötter på hela sin yta, hos de föreg. endast nedtill.* — *C. bulbosa* Pers. *Fumaria bulb.* γ Lin.

## 216. FUMARIA Lin. Jordrök.

† Fodret af halfva kronans längd.

\*1 F. *media* Lois. bladskafen klängelikt vridna; småbl. med omv. ågrund omkrets och aflångaflikar; frukt, något ågrundt klotformiga, trubbiga, något smågropiga, på utböjda skaft. ☉ 6, 7, ljusr. blr. Fig. Hamm.Fum.t.3. H.N.f.15, n:o 30.

Åkr. och odl. st. r. (N. Stavangers amt, i åkrar och vid vägen mellan Nærstrand och Ölen, ymnig. — So. på ballastplatser, t. ex. Malmö och Gefle.) *Bladen [såsom hos alla arterna] dubb. parbladigt delade.* — *F. muralis* Sond.

†† Fodret mycket kortare.

2 F. *officinalis* L. bladen med lancettlikaflikar; skärmen *något* kortare än fruktskaften; foderbl. ågrunda, fjdel af kronans längd; frukterna klotrunda, i toppen *intryckta*. ☉ 6, 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.42. Fl.D.940. Hamm.Fum.t.1.

Odl. st. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Finnmark. Tromsøe.) *Stundom upprät, stundom klängande; utmärkt af de något njurlika frukterna.*

3 F. *tenuiflora* Fr. bl. som föreg.; skärmen *dubb.* kortare än fruktskaften; foderbl. *n. lancettlika*, fjdel af kronans längd; frukterna klotrunda. ☉ 6, 7, hvitr. blr. Fig. Hamm.Fum.t.1.

Odl. st. r. (Sk. Lund, Krageholm m. fl. st.; synes enl. F. Aresch. Sk.Fl. ej i sednare tider vara återfunnen. Uppl. Hågeby, enl. ex. fordom samlade af förf.) *Blrna mycket mindre och isynnerhet smalare än hos föreg., n. hvita, endast i spetsen mörka; bladen blåaktiga.* — *F. Wirtgeni* Koch [till en del] enl. Fr. och Garcke.

4 F. *Vaillantii* Lois. bladflik. smalt lancettlika, n. jemnbreda; skärmen *som hos föreg.*; foderbl. ågrunda, *många gånger kortare än kronan*; frukt. klotrunda, i toppen *hela*, ell. med en omärklig *vårtlik spets*. ☉ 6, 7, blekr. blr. Fig. Sv.B.574. Hamm.Fum.t.1. H.N.f.3, n:o 25.

Åkr. r. (ÖG. Linköping, Slaka, Ljung och Kisa enl. Kindb. Smål. Lunda vid prestgården; Vester-Hanninge, vid Håringe. Stockh. nära Lofö kyrka; Drottningholm; Bromma etc. Uppl. i synnerhet omkr. Mälaren; Tierp vid Fors; Funbo sn; Hökbufvud vid prestg. Vestml. Sala; Surhammarsbruk.) *Bladen blåaktiga.*

37 Fam. CRUCIFERÆ Juss. Fed. och krona regelbundet, 4bladiga [korsformiga]. Stånd. 6, af hvilka 4 längre. Frukt: skida. Fröhvite 0.

Anm. Genom felslagning kunna stund. kronbl. och 2 ell. 4 stånd. saknas, samt skidan blifva enrummig.

1 Flocken **Brassiceae**. Skida lång, öppnande sig på längden i 2 skal. Fröen med hjertbladen vikna omkring det ryggliggande rotämnet.

### 217. BRASSICA Lin. Kål.

1 *B. campestris* L. roten smal, hos  $\gamma$  tjock; rotbl. skaftade, lyrförmiga, gles stråfhåriga; stjelkl. hjertlikt äggrunda eller aflånga, med djup stjelkomfattande bas, glatta blåaktiga.  $\odot$  6, 7, g. blr. —  $\beta$  *biennis*: rot. smal, 2årig; nedre stjelkl. lyrförmigt inskurna. —  $\gamma$  *Rapa*: roten tjock och köttig [rofva], 2årig. Fig. Fl.D.550, H.N.f.9, n:o 21;  $\beta$  f.10, n:o 31;  $\gamma$  f.9, n:o 22.

Åkr. etc. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. —  $\beta$  och  $\gamma$  odlade och förvildade.)  $\gamma$  *B. Rapa* L.

2 *B. Napus* L. roten tapplik; rotbl. som hos föreg., men glatta; stjelkl. lancettlika, med smalar, n. pil-lik, stjelkomfattande bas, glatta.  $\odot$  6, 7, g. blr. —  $\beta$  *rapifera*: roten tjock, tapplik. Fig. Reich.Tetrad.f.4435. H.N.f.10, n:o 32; f.14, n:o 29.

Åkrar, hafstr. r. (Sk. nordöstra kust.; Älven Kullaberg. Smål. i skären. Södm. Nämudö; Ornö. Stockh. Rosl. Ljusterö, Börstel etc. Öl. Gottl. Burs och När snr etc. — N. Toten. —  $\beta$  odlad och förvildad.) Var. *præcox* H.N. kan knappt skiljas från a.

### 218. SINAPIS Lin. Senap.

1 *S. alba* L. stjelken stråfhårig; bladen vid basen parklufna; skidorna styfåriga, vidt utsperrade, nästan kortare än det sabelformiga stiftet.  $\odot$  7—9, g. blr. Fig. Fl.D. 1393. H.N.f.7, n:o 13.

Åkrar, r. (Sk. Hall. samt här och der upp till Verm. Vestml. och Uppl. Jeml. Östersund. Öl. förvildad. Gottl. Bläse i Fleringe sn. — N. Christiania. Vig och Leganger etc. i Bergens st. Vang i Valdars.)

2 *S. arvensis* L. stj. stråfhårig; bladen äggrunda, groftandade ell. [de nedre] lyrförmigtflikade; skidorna trinda, knöliga, utstående, längre än det fyrkantiga stiftet.  $\odot$  6—8, g. blr. —  $\beta$  *ambigua*: skidorna stråfhåriga. Fig. Fl.D.753.  $\beta$  Reich.f.4425, b.

Åkrar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finn. —  $\beta$  Sk.—Gestr.)  $\beta$  har mer utstående grenar, alla bladen kortskaftade, flikiga, med något pil-lik bas: *S. arv.* Schkuhriana Reich. Var. *incisa* Fr.

### 219. MELANOSINAPIS DC. Svartsenap.

†1 *M. communis* Spenn. bladen lyrförmiga, de öfversta hela, jemte stjelken glatta; skidorna tryckta till stjelken.  $\odot$  6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.83. Fl.D.1582.

Odk. st. etc. förvildad. (Sk. Hall. VG. Göteborg, på Öarne. Boh. Marstrand. Blek. Lyckeby m. fl. st. Smål. Oscarshamn. Öl. Gottl. Följande med skänsk säd ända upp till Norrl. — N. Christiania.) *Sinapis nigra* L. *Brassica nigra* Koch.

### 220. ERUCASTRUM Schimp. & Spenn. Kålsenap.

1 *E. Pollichii* Sch. & Sp. stj. kort och nedböjdt stråfhårig; bladen aflånga, pardelade med ojemnt och trubbigt tandade flikar, gles stråfhåriga; skidorna i nedtill bladiga klasar, utstående.  $\odot$  6—9, g. blr. Fig. Reich.Tetrad.4428. H.N.f.15, n:o 31.

Odk. st. r. (ÖG. på sjön Tåkerns genom urtappning uttorkade stränder, t. ex. mell. Säby och Hyngesta, samt mell. Hofgården och byn Furåsa i Hof sn. — Införd med ballast till Gefle Brohänk.) Omkring fotsög växt, med smutsigt gula, svagt ådriga blr. — *Sisymb.* *Erucastrum* Poll. *Diplotaxis bracteata* Godr. & Gren. samt Fr. H.N.

### 221. DIPLOTAXIS DC. Sandsenap.

†1 *D. tenuifolia* DC. stjelken bladig; bladen groftandade eller pardelade, med jemnbreda flikar, glatta, de öfversta hela.  $\odot$  7—9. Fig. Sv.B.501. H.N.f.9, n:o 23.

Sand, stränd. r. (Sk. Sandhammar. ÖG. med föreg. vid Hofgården i Hof sn. För öfr. införd med ballast till Ystad; Malmö; Landskrona; Varberg; Scheutz; Carlskrona; Kälmar; Nyköping; Gefle; Sundsvall; Nyland i Ängml.; Ratan i VB.; Visby och Ljugarns hamn på Gotland etc. — N. flerst. på ballastpl. i söd. delen. Ax. Bl.) Ofta 3—4 quart. hög, med ljusgula blr, stora n. som hos *Brassica camp.* — *Sisymb. L. Sinapis Sv.B.*

2 Flocken *Sisymbriese.* Skida som föreg. flock. Hjärtblad platta med ryggliggande rotämne.

## 222. SISYMBRIUM Lín. Vägsenap.

† Birna gula.

†1 *S. Loeselii L.* bladen *pardelade*, med båglik utböjda, i nedre kanten vanl. helbräddade, i den öfre bugtandade flikar; ändfliken stor, n. spjutlik; kronbl. *längre* än fodret; skidorna *vidt utstående*, dubbelt längre än deras skaft. 7, 8. Fig. Reich.f.4409. H.N.f.13, n:o 49.

Mur. odl. st. r. (Stockholm på murar och i potatesland kring väderqvarnar mell. Sabbatsberg och Kungsbacken; Djurgårdsbrunn; Observatoribacken. Uppsala.) *Blrna stora som hos Nasturt. silv. Bladflikarnes hufvudnerv följer tätt efter deras nedre kant. Stjelen meränd. stråfhårig.*

2 *S. Sophia L.* bladen *dubbelt parbladigt delade* i n. jemnbreda flikar; kronbl. *kortare* än fodret; skid. trådmala, n. *uppräta*, dubb. *längre* än de utstående skaften. 7. Fig. Sv.B.203. Fl.D.528.

Torra st. a. (Sk.—söd. Lpm. och VB. nor. del. Lul. Lpm. Storbacken: Ind. — N. till Alten.) *Kronbladen hälften så långa som de utskjutande ståndarne.*

3 *S. officinale Scop.* utsperradt grenig; bladen *neddt parflikiga*, med ojemnt groftandade flikar, stor, ofta spjutlik ändflik; kronbl. *längre* än fodret; skid. n. *oskaftade*, kort syl-lik, tilltryckta. 7—9. Fig. Sv.B.158. Fl.D.560.

Byar, vägar, a. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Bergen.) Vanl. gles hårig: var. i Verml. och N. n. glatt. — *Erysimum L. Chamæplium Wallr.*

†† Birna hvita.

4 *S. supinum L.* bladen n. *pardelade*, med trubbtandade flikar; skidorna *ensamma i bladvecken*, *ganska kort skaftade*, jemnbreda, något båglik krökta. 7. Fig. Fl. D.Suppl.86. H.N.f.4, n:o 31.

Kalkberg, på fukt. st. (Öl. allmän. Gottl. vid Ar i Fleringe sn m. fl. st.) *Kulliggande, någon gång uppräta, med tumslånga, kort skaftade skidor.* — *Braya Koch. Chamæplium Wallr.*

## 223. HESPERIS Lín. Natviol.

†1 *H. matronalis L.* bladen äggrundt lancettlika, spetsade bugtandade; skidorna kantigt trinda, glatta. 24 6, 7, hv. ell. rödvio. blr. — *β inodora:* blr hvita med ringa lukt. Fig. Fl.D.921 och 924.

Skogsback. ruin. r. (Sk. Kulla-Gunnarstorp, Trolleholm, Toppe- och Bjersjö-ladugård m. fl. st. Hall. Göteborg etc.; förvildad upp till Verml. och Helsl.) *Alnshög med vålluktande blr, hvarföre den odlas. Den vilda är vanligen hvitblommig och n. utan lukt: H. inodora L.Sp.Pl.*

## 224. ERYSIMUM Lín. Gyllen.

1 *E. cheiranthoides L.* bladen lancettlika helbräddade, eller gles tandade, stjernhåriga; blrna *kortare* än skaften; skidorna *dubbelt* längre än de meränd. *utsperrade* skaften. 6—8, g. blr. — *β nodosum:* stjelen högväxt, med en knöl vid basen; skidorna tilltryckta. Fig. Fl.D.731 och 923.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Lul. Lpm. — N. — *β Sk.* vid Gyllerup i Hörup. ÖG. Kullen i Kärna: sn.)

2 *E. hieracifolium L.* bladen lancettlika, gles naggsågade stjernhåriga; blrna *dubbelt*, skidorna *många gånger* längre än skaften, n. *uppräta*. 5, 6, g. blr. Fig. Wg.Fl. L.t.12.f.1. H.N.f.8, n:o 20.



\* *strictum* Koch: blrna större; skid. kortare och tjockare, alltid tilltryckta med 2klufvet märke. Fig. Fl.D.229. H.N.f.8, n:o 19.

Torra st. helst i skären och fjellen. (Smål. i skären. — VB. Kalix skärgård. Lul. och Torn. Lpm. Jeml. Sibberön nära Christinehamn. Ner. vid Hjelmaren. ÖG. Omberg m. fl. st. vid Vettern. Öl. ön Norman. Gottl. — N. Christiania; Dovre; Snaasen i Trondhj. st.; Nordl. och Finnm. mångenst. enl. Norm. — \* Sk. Sularp nära Fogelsång enl. F. Aresch. Blek. Smål. Grenna och Jönköping: Scheutz. VG. Boh. Gottl. Lokrume myr enl. G. v. Ced. — N. söd. del.) *Ofta mer än alns-hög, enkel ell. endast upptill grenig, med större blr än föreg. — Cheiranthus alpinus* Wg.Fl.L. \* *E. hieracifol.* Fr. S.V.Sc.

## 225. ALLIARIA Adans. Hvitlöksört.

1 *A. officinalis* Andr. bladen skaftade hjertlika bugtandade. 5, hv. blr. Fig. Sv.B. 208. Fl.D.935.

Lundar. (Sk.—Uppl. och Vestml. Boh. Öl. Gottl. — N. Bergen.) *Luktat hvitlök. — Erysimum* L. *Sisymbrium* Koch.

## 226. BRAYA Sternb. & Hop. Stenkrasse.

1 *B. alpina* S. & H. bladen skaftade, smalt lancettlika, hela ell. glest tandade; skidorna i en kort, sammandragen klase, uppräta, längre än skaften. 2, 7, 8. Fig. Reich. f.4370.

Fjelltr. r. (Lul. Lpm. Sähkok: Ångstr. 1837; sedan icke återfunnen. — N. Finnm. ön Hukö, vid Skjervö, Rostafield vid Maalselv; samt Nordl. ofvanför Muldjord och Solö i Bejeren: Norm. Salten på Baadfjellet.) *Svenska ex., 3—4 tum höga, likna en förkrumpt form af Arabis petræa; blrna hvita ell., enl. de torra exemplaren, violetta.*

3 Flocken *Arabidese*. Skida som föreg. flock. Hjärtblad platta med kantliggande rotämne.

## 227. DENTARIA Lin. Tandört.

1 *D. bulbifera* L. bladen parbladigt delade [2—3pariga], med lancettlika, sågade småbl.; de öfversta bladen hela, med knopplökar i bladveckan. 2, 5, ljus. blr. Fig. Sv.B. 356. Fl.D.361.

Lundar, r. (Sk.—Uppl. upp till Dalelven, t. ex. på En-noten nedom Söderfors. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Uddevalla; Christinedal. Öl. Gottl. — N. efter kusten från Christianiafjorden till Bergen.) *Rotstocken grenig, bekladd med tjocka hvita fjäll.*

## 228. CARDAMINE Lin. Ängskrasse, Brämsa.

† Bladen parbladigt delade.

\* Kronbl. omv. äggrunda, minst 3 gånger längre än fodret.

1 *C. pratensis* L. stjelen trind; bl. 5—mångpariga; rotbladens småblad rundade, vinkligt landade, stjelkbladens lancettlika, meränd. helbräddade; ståndarknapp. gula; skidorna med ganska kort stift. 2, 5, 6, gredel. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.350. Fl.D.1039. Väta äng. dik. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.: Norm.) *Har större blr än de öfriga. Växande i renare vatten får denna art stundom större, rent hvita blr och stora småblad: var. speciosa. Var. med något tandade småblad samt med dubbla blr.*

2 *C. amara* L. stj. färadt kantig; bl. 2—5pariga; alla småbladen rundade—aflånga, vanl. vinkligt landade; ståndarkn. violettbluna; skid. med syl-likst stift, dubbel längre än skidans bredd. 2, 5, 6, hv. blr. — β hirta: till alla delar spåhare; stjelen småluden eller hårig. Fig. Reich.f.4305. β Fl.D.148.

\* *æquiloba* C. Hn. bl. 4—5pariga; småbl. likform. aflånga, de nedre bladens ellipt., alla helbräddade, fasta och glatta, hårbräddade.

Källback. etc. β fukt. skogsäng. (Sk.—Lpl. α allmännast norr om Mälaren. — N. — \* VG. mell. Finnerödja kyrka och Skagersholm 1863: C. Elgenstjerna.) — β *C. silvatica* Hoffm. *C. hirsuta* Fl.D. Var. äfven med bladen delade i 3 småbl., hvaraf det yttersta skaftadt: var. *trisecta*; samt med alla bladen odelade, ovala, tandade:

var. *anomala* Ed.9. — \* är en högst egendomlig form, måhända egen art, men behöfver närmare observeras i naturen.

\*\* Kronbl. aflångt tung- ell. spadlika, högst dubb. längre än fodret.

a — Bladskäften med 2 stipelform. bihang vid basen.

- 3 *C. impatiens* L. stj. upprät; bladen mångpariga, med äggr.—lancettl. *stiktigt inskurna* småblad; skid. utstående, 4 gång. längre än deras skaft. ☉ 6, hv. blr. Fig. Fl.D. 1339. Reich.f.4302.

Bergshöjder, skog. (Sk. Smål. nor. del, och Urshult i Kronob. län. — *Uppl. och Vestml. Ner. Dalsl.* Färglanda sn. Ö. Borgholm; Thorslunda. — N. Skien; Christiania etc.) *Ofta alshög, med mycket små blr; kronbl. saknas stundom och då får fodret ofta hvit färg.*

b — Bladskäften utan stipelform. bihang.

- 4 *C. silvatica* Link: stjelen vanl. *flerböjd, mångbladig*; rotbl. få och små; stjelnbl. 5—7pariga med tandade småblad; kronbl. aflångt tunglika; stånd. 6; skidorna 3 gånger längre än de utstående skaften. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.735. Reich.f. 4303. H.N.f.16, n:o 38.

Fukt. skog. r. (Sk. Stehag; n. Vram; Pugerup etc. *Blek. Smål.* Kalmar; Kronoberg; Femsjö. ÖG. Bersbo grufva i Värna sn: Scheutz; i Björsäter, Kärna och V. Ny snr enl. Kindb. *Stockh.* Gladöqvarn i Huddinge: Ahrl. VG. Kinnekulle; Hunneberg i Fristorps hage. — N. Laurvig; Christiania, Egeberget vid Græssæter.) 2—3 quart. hög och gröfre än följ., men med lika små blr. *Svenska ex. smärre, mer närmande sig C. hirsuta än de norska.*

- 5 *C. hirsuta* L. stj. mest rak, *fåbladig*; rotbl. talrika och stora; stjelnbl. 2—4pariga; småblad och kronblad som föreg.; ståndarne 4; skid. som föreg. med uppräta skaft. ☉ 5, 6, hv. blr. Fig. Reich.f.4304. Fl.D.1762. H.N.f.3, nr 20; f. 7, n:o 18 [var.].

Skogsback. etc. r. (Sk.—*Uppl.* i Vahlö sn. *Herjed.* vid byn Malmagen, och Ormaruet. *Jemt.* flerstäd. i Frostviken. *Dal. Vestml.* Nora, vid Eifhyttan. *Ner.* Apelvik i Hammar, och vid Skarbysjön. VG. Kinnekulle. *Dalsl. Boh. Öl. Gottl.* — N. till Trondhj.) *Nyss blommande fingerhög, äldre 6—8 tum; kronbl. 1—1½ linie långa, saknas stundom: var. clandestina. — C. intermedia Hörn.*

- 6 *C. parviflora* L. stj. nedligg. ell. upprät; bladen mångpariga, med aflånga eller jemnbreda, vanl. *helbräddade* småbl.; kronbladen aflångt *spadlika*; skid. omkring dubbelt så långa som de utstående skaften. ☉ 6—10, hv. blr. Fig. Sv.B.568. Vet.Ak. H.1822. H.N.f.3, n:o 21.

Öfversvåmm. st. i vattnet, r. (ÖG. i trakten af sjöarne Roxen och Glan; flerst. i skärg., samt vid Vettern, nedom Omberg enl. Kindb. *Södml.* Eskilst. Rosenbergs bruk: Nyköping; Åkerö m. fl. st. *Ner.* Myrö; Göthlunda och Lillkyrka snr vid Hjelmaren; Sörön vid sjön Qvismaren. *Vestml.* Fullerön. *Dal.* By sn, vid bäckens utlopp i Bysjön. *Verm.* Carlstad m. fl. st. *Dalsl.* Sjötorp i Änimskog sn. VG. Sjötorp; Degeberg; Källandsö vid hamnen Pirum; Kinnekulle, vid Venern.) *Stjelen 3—10 tum hög, grenig med små blr., men kronbladen dubbelt längre än fodret. Rotbladens småblad bredare, stundom jemte stjelnbl:s tandade.*

†† Bladen odelade.

- 7 *C. bellidifolia* L. alla bladen äggrunda helbräddade, långt skaftade; kronbl. dubb. längre än fodret; skid. flere gånger längre än skaften. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Lin.Fl.L.9.f.2. Sv.B.772. Fl.D.20. H.N.f.7, n:o 17.

Högre fjellv. (Lpl.—*Herjed.* — N. Finnmp. — Dovre.) 1—2 tum hög *stjeln, än högre, än kortare än rotbladen.*

## 229. ARABIS Lin. Backbränna.

† Stjelnbl. talrika, omfattande, sågtandade.

- 1 *A. hirsuta* Scop. rotbl. smalt omv. äggrunda; stjelnbl. aflånga; blrna längre än skaften, med uppräta, aflånga kronbl.; skidorna uppräta tillryckta. 2 5, 6, hv. blr.

— *β glabrata*: bladen glatta, vid basen hårbräddade. Fig. Fl.D.1040. H.N.f.12, n:o 50.

\* *sagittata* DC. gröfre, bladen fingerbreda, med större tänder och pil-liket stjelkomfati. bas; frön hinnkantade, otydl. punkterade. Fig. Reich.f.4343, b. H.N.f.10, n:o 33.

\* *Gerardi* Bess. slutl. alnsbög, med bl. som *sag.*, frön hinnkantade och nättlikt punkterade. Fig. H.N.f.14, n:o 30.

Ängsback. (Sk.—Lul. Lpm. Bok. Öl. Gottl. — N. till Finn. — *β* Sk. Öst. Torp. Öl. Gottl. Carlssvärd, Thorsborg etc. — N. Egeberget. — \* *sagitt.*: VG. Södm. Mariefred. Stockh. Vermdön. Öl. Gottl. — N. Christiania, Ourdal. — \* *Ger.*: Gottl. i Åkebäcksmyr.) *Turritis* L. *β* *T. alpina* Retz. \* *sag. Ar. sagittata* DC. *A. hirs. γ crassior* Wg. \* *Ger. A. glastifolia* H.N.

2 *A. alpina* L. rotbl. omv. äggrunda; stjelkl. *äggrundt aflånga*, alla finludna; blrna kortare än skaften, med *utböjda*, omv. *äggrunda* kronbl.; skidorna *utstående*. 2, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.773. Fl.D.62. H.N.f.7, n:o 16.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Stjelken* vid basen *nedliggande* och *gifvande grenar*, som *utvecklas* och *blomma efterhand*. *Blrna* större än hos de öfriga arterna.

†† Stjelkl. fåtaliga, icke omfati, åtm. de öfre helbräddade.

3 *A. petraea* Lam. rotbladen tunglika, *tandade* eller *grundt* *flikiga*; stjelklbladen n. *jennbreda*, *helbräddade*; blrna *långre* än skaften; kronbl. omv. *äggrunda*; skidorna *utstående*, på upptill *knöl-liket* vidgade skaft. 2, 6, 7. Fig. Sv.B.676. Fl.D.386, 1392 och 1462. H.N.f.3, n:o 22.

Grusiga stränd. r. (Ängml. Hernön, Hemsön, Bondskär, Lofmen; Nora sn, Grönsvik m. fl. st. — N. Inre Sogn här och der: Ax. Bl. Hardanger-fjellen; Oldendalen; Romadalen i Eikisdal; Lom; Dovre etc.) *Har* större blr än de *följ.*, vanl. *hvita*, *stund. violetteröda*; *stj.* och *bl.* *variera* från n. *glatta* till *stråfhåriga*. — *Cardamine* L.

4 *A. arenosa* Scop. *β borealis* Fr. rotbladen omv. äggrunda, meränd, *lyrformigt* *parflikiga*, med n. vinkelrätt utsperrade flikar; stjelklbladen *lancettlika*, de *nedre* *kvass-tandade*; blrna *af skaftens längd*; kronbl. *spadlika*; skid. som *föreg.* med något vidgad faste. 2, 6, 7, gred. blr. Fig. Fl.D.1760. Reich.f.4322, c. H.N.f.7, n:o 15.

\* *suecica* Fr. stj. mera bladig; rotbl. mindre djupt flikade; kronbl. hvita, vid basen gula. Fig. H.N.f.7, n:o 14 och f.10, n:o 34.

Vid städer, byar etc. r. (Smål. Kråksmåla; Fagreskog i Elghult enl. Scheutz. ÖG. Norrköping; Skenninge enl. Kindb. Uppl. Onsike i Tibble: G. v. Ced.; Uppsala; samt Medelp. Löjdö bruk enl. Lem. Vestml. Vesteråstrakten. — \* Södm. Ner. och Verm. — Helsl. Dal. Jemil. Östersund. Ängml. Hernön och Säbrå sn: Arn. VB. Umeå.) *Väl* *utvecklade* *ex. äro*, *blommande*,  $\frac{1}{2}$  *aln höga*, med  $\frac{1}{2}$  *tums breda*, *djupt* *flikade* *blad*; men *öfvergår* på olika lokaler i *underarten*. *Fröen*, *dubb. större* än hos *följ.*, *hafva* *rotämnet* *alltid* *kanlliggande*. — *Sisymb.* *arenosa*. L.Fl.Su.

5 *A. thaliana* L. rotbladen *aflånga* ell. *ovala*, *helbräddade* ell. *glost* *tandade*; stjelkl. *lancettlikt* *jennbreda*, *helbräddade*; blrna vanl. *kortare* än skaften; kronbl. *tunglika*; skid. som *föreg.* 2, 4, 5, hv. blr. Fig. Fl.D.1106. Reich.f.4380.

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N.) — N. till Finn.: Norm.) *Quartershög*, *spenslig*, med *små* *rotblad*. — *Conringia* Reich. *Sisymbrium* Koch.

### 230. TURRITIS Lin. Räckenträff.

1 *T. glabra* L. rotbladen *aflånga*, *bugttandade*, fint mjukludna; stjelklbladen *äggrundt* *lancettlika*, pil-liket omfattande, *helbräddade*, *glatta*; skidorna många gånger *långre* än skaften. 2, 6, 7, hvitg. blr. Fig. Sv.B.399. Fl.D.809.

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N.) 1—2 *aln* *hög* *blågrön*, *oftast* *enkel* *växt*, med *lättsittande*, *upptå* *i storlek* *aftagande* *blad*. — *Arabis* *perfoliata* Lam.

### 231. BARBARÉA R. Br. Sommargyllen.

1 *B. vulgaris* Br. rotbladens ändflik *hjärtlikt* *rundad*; stjelklbladen *groft* *bugttandade* eller *pardelade*; kronbladen *bredt* *vigglika*, i spetsen *intryckta*; skidorna *meränd. fränstående*, med *smalare* *stift*. 2, 6, 7, g. blr. — *β arcuata*: stjelkl. *pardelade* med

- af långa sidoflikar, 3—5klufven ändflik; skidornas skaft utstående, jemte skidorna båg-  
likt krökta uppåt. Fig. Sv.B.194. Fl.D.985.  $\beta$  Reich.f.4357. H.N.f.6, n:o 17.
- \* *præcox* Br. stjelkl. som hos  $\beta$ ; skid. smala, n. uppräta; smaken bitter (krasselik).  
Fig. Fl.D.1759. H.N.f.1, n:o 28.
- Åkerren. dik. etc. (Sk.—Helsl. Ångml. Säbrå; m. fl. snr: Arn. Vestml. Verm. Carl-  
stad och i bergslagen. Dalsl. Öl. Götll. — N. — \* Sk. Vidtsköffe; Åhus; Lund.  
Smål. Rostad nära Kalmar; Ön i Sjösås sn; Vexjö. ÖG. flerst: Kindb. Hall. Var-  
berg. Verm. Carlstad.) 1—2 fot hög, med rika höggula blomklasar, 6—10 linier  
långa skidor. \* är mycket utmärkt af sin bittra smak, hvarför den odlas;  
ehuru äfven  $\beta$  någon gång finnes lika bitter. — *Erysimum Barbarea* a L.Fl.Su.  
 $\beta$  Barb. arcuata Reich. \* är  $\gamma$  acidula ed. 9.
- 2 B. *stricta* Fr. rotbladens ändflik aflångt äggrund; stjelkbladen ovala—af långa, tan-  
dade, ofta med små sidoflikar vid basen; kronbladen smalt vigglika, tvärhuggna;  
skid. tilltryckta, med kort, n. lika tjockt stift.  $\gamma$  6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.2727. Reich.  
f.4355. H.N.f.6, n:o 16.
- Fukt. äng. stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 1—3 fot hög, äldre med långa  
uppräta klasar af tumslånga skidor; blrna dubbelt mindre än hos föregående,  
ofta öfvervuxna af de äldre skidorna. Rotbladens ändflik stundom med något  
hjerflik bas. — B. parviflora Fr. Nov. ed. 2. B. vulgaris a Wg. *Erysimum*  
*Barbarea*  $\beta$  L.Fl.Su.

## 232. NASTURTIIUM R. Br. Vattenkrasse.

† Blrna hvita; kronbl. alltid längre än fodret.

- †1 N. *Armoracia* Fr. rotbladen äggrundt aflånga odelade rundsågade; stjelkbladen lan-  
cettlika, hela och sågade, eller parklufna; skidorna ovala, mycket kortare än skaf-  
ten.  $\gamma$  6, 7. Fig. Sv.B.242. H.N.f.8, n:o 21.
- Vid vatten. r. (Sk.—Helsl. Vestml. och Verm. Boh. Öl. Thorslunda sn; G. v. Ced.  
Öfverallt förvildad.) Hög växt, med mycket stora rotblad. — *Cochlearia* L. *Armo-*  
*racia rusticana* Koch.
- 2 N. *officinale* Br. alla bladen parbladigt delade, med n. hjerflik runtade eller af-  
långa småblad; sidoklassarne motsatta bladen; skid. jemnbreda, krökta, af skafstens  
längd.  $\gamma$  7, 8. Fig. Sv.B.624. Fl.D.690. H.N.f.15, n:o 33.
- Vatten. (Sk. Hall. Smål. Misterhult sn, vid Horfve källa nära Köksmåla. Götll.)  
Småbladen variera i hög grad till storlek och form, från 2—3 lin. till 2 tum i  
längd, samt från rundade till aflångt hjerflik ell. n. lancettlika: N. stisfolium  
Reich. — N. aquaticum Wg. Sisymb. Nasturtium L.

†† Blrna gula.

\* Kronbl. längre än fodret.

- 3 N. *amphibium* Br. de nedre bladen pardelade, de öfre odelade, lancettlika; skidorna  
n. klötrunda af stiftets längd, flere gånger kortare än skaften.  $\gamma$  7, 8. Fig. Sv.B.  
697. Fl.D.984 enl. Lge.
- Vatten. (Sk. Blek. Smål. Kalm. län; Pjetteryd i Vexjö län enl. Scheutz. — Uppl. och  
Vestml. VG. Vänersborg. Boh. Christinedal. Hall. Öl. Götll. — N. söd. och vest.  
del.) Bladen under vattnet ofta fint pardelade. — *Sisymb. L. N. aquaticum*  
Wallr. Roripa Bess.
- 4 N. *silvestre* Br. alla bladen pardelade; skidorna jemnbreda plattade tväggade, många  
gånger längre än stiftet, ungefär af skafstens längd.  $\gamma$  7, 8. Fig. Sv.B.695. Fl.D.  
1881. H.N.f.11, n:o 35.
- Stränd. (Sk. Blek. Carlsbamn: Goss. Smål. Kalm. län. — Gefle. Ner. Göthlunda sn,  
Locknäs; norr om Örebro. Boh. Öl. Götll.; särd. ymnig omkr. Mälaren. — N.  
Christiania.) Skidorna i början trådlika, slutt. n. sabelformiga. — *Sisymbrium* L.
- 5 N. *anceps* Wg. bladen som hos föreg.; skidorna aflånga plattade tväggade, tre gån-  
ger längre än det utdragna stiftet, nära dubb. kortare än skaften.  $\gamma$  7, 8. —  $\beta$  mi-  
cropetalum: blrna mycket små, föga öfver en linie långa. Fig. Sv.B.696. H.N.f.6,  
n:o 18;  $\beta$  f.11, n:o 36.
- Stränd. (Sk. ÖG. Tåby, nära Mem; samt vid Roxen, Svartån och Vettern: Kindb.

*Södm.* Uppl. och *Vestml.* särd. kring Mälaren. *Öl.* Köping sn. *Gottl.* Föga skiljd från föreg. — *Sisymbrium* Wg. *Fl.Ups.*

\*\* Kronbl. af fodrets längd.

- 6 *N. palustre* DC. bladen pardelade; skidorna aflånga, uppsvållda, i båda ändar och kanter trubbiga, af skaftens längd, med ganska korta stift. ☉ 6—9. Fig. Sv.B.694. Fl.D.409 och 931. H.N.f.6, n:o 19.

Våta st. a. (Sk.—Lpl. — *N.* till Ost-Finnm.) *Sisymbrium amphibium* β *L. S. islandicum* Fl.D. *Roripa* Bess.

- 4 Flocken **Lomentaceæ**. Ledskida med 2, eller flere rum öfver hvarandra, affallande hel eller styckevis i lederna.

### 233. *RAPHANUS* Lin. Rocka.

- 1 *R. Raphanistrum* L. bladen lyrformiga med likformiga flikor; skidorna slutl. ledade strimmiga eller färade. ☉ 7, 8. Fig. Linn. Diss. de Raphania. Sv.B.623. Fl.D.678. Åkrar och odlade st. (Sk.—Ängml. och *Jeml.* Östersund och Oviken. *Boh.* Oroust. *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Finnm.) Skidorna äro stundom djupt färade, blirna vanl. hvitgula med något viol. ådror, stund. rent gula, lika dem hos *Sinapis arvensis*, men lätt skiljbara af det tillslutna fodret. — *Raphanistrum innocuum* Mönch. *R. segetum* Reich. *Sinapis* arv. Fl.D.

### 234. *CRAMBE* Lin. Strandkål.

- 1 *C. maritima* L. bladen bredt äggförmiga, inskuret bugtiga, tandade och vågiga, köttiga blåaktiga, jemte stjelen glatta; skid. n. klotrunda. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.495. Fl.D.316.

Hafsstr. r. (Sk. Sandhammar; Helsingborg; Kulla-Gunnarstorp; Torekow etc. *Hall.* *Boh.* på Vinga och Domsö; Køster, Lyngholmen etc.; Storön, Hvalö etc. — *N.*) Liknar kål.

### 235. *BUNIAS* Lin. Buns-ris.

- 1 *B. orientalis* L. de nedre bladen n. lyrformiga, med stor spetsad ändflik, de öfre hela lancettlika; skid. snedt äggförmiga. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1651. Reich.f.4162. H.N.f.16, n:o 36.

Odl. st. (Sk.—Helsl. *Jeml.* Dal. Smedjebacken; Hedemora. *Vestml.* Ner. Dalsl. Ekholmen i Gunnarsnäs enl. Lemm. *Öl.* *Gottl.* enl. G. v. Ced. — *N.* Christiania; Skien; Kongsberg etc.) Stor blomrik växt; bladen mer och mindre tandade. — *Lælia* Reich.

### 236. *CAKILE* Scop. Mar-viol.

- 1 *C. maritima* Scop. bladen parflikiga, pårdelade ell. bugtigt tandade, köttiga; skidans öfre rum pil-lik, något plattadt. ☉ 7, 8, blåroda blr. — β *latifolia*: bladen aflånga, bugtigt ell. trubbigt tandade. Fig. Sv.B.407. Fl.D.1168; β 1583. H.N.f.3, n:o 19.

Hafsstrand. (Sk.—*Boh.* *Blek.* Smål. Kalmar, vid Stensö; Oscarshamn och Vestervik. *Södm.* Ålön under Utön; Sandhem enl. G. v. Ced. *Öl.* söd. udde, Runsten sn etc. *Gottl.* — *N.* till Nordl. och sydl. Finnm. Ost-Finnm. vid Kjöllefjord; Norm.) Meränd. nedliggande. — *Bunias Cakile* L. β *C. marit.* β *integrifolia* Koch.

- 5 Flocken **Nucamentaceæ**. Skida kort, mogen enrummig och enförg, nötlilik.

### 237. *NESLIA* Desv. Korndådra.

- 1 *N. paniculata* Desv. bladen lancettlika, pil-lik, stjelkomfattande, stråfva; skidorna nättlik rynkiga, med långt stift. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.204. H.N.f.15, n:o 36.

Odl. st. (Sk.—Uppl. *Vestml.* Vg. nära Venersborg. *Dalsl.* Stakesund i Gunnarsnäs enl. Lemm. *Boh.* Christinedal. *Hall.* *Öl.* *Gottl.* — *N.*) *Myagrum* L. *Rapistrum* Gært.

### 238. *SATIS* Lin. Vejde.

- 1 *I. tinctoria* L. rotbl. småtandade; stjelkl. helbrädd., pil-lik stjelkomf.; skidorna af-

långa, afsmalnande mot basen, i spetsen rundade glatta.  $\gamma$  7, g. blr. Fig. Sv.B.35. H.N.f.4, n:o 33.

Torra st. särdeles hafsstrand. r. (Sk. Åhus samt på öar i Saxaviken.—Gefle skärgård. Stockh. på många st. *Öl. Goutl.* — N. Salten på Grönholmen.) *Blågrön*; blrna små, föga öfver en linie långa; bladen lancettlika.

6 Flocken **Lepidineae**. Skida kort, 2rummig, med smal skiljevagg.

239. **LEPIDIUM** Lin. Krasse.

† Stiftet flere g:r kortare än skidan, ofta omärkligt.

1 *L. latifolium* L. bladen pil-likst stjelkomfattande, odelade, aggrundi lancettlika sågade, mot spetsen helbräddade; skid. bredt aggr., med omärkligt stift.  $\gamma$  7—10, hv. blr. Fig. Sv.B.638. F.I.D.557. H.N.f.9, n:o 24.

Grusiga st. vid kusten, r. (Sk. Lilla Hammar; Löddeström; Landskrona; Torekow etc. *Blek.* Sölvisborg på skären; Ronneby, yttre Stekö m. fl. st. *Smål.* Kalmar; Misterhult vid Figeholm, samt på Svinskär under Örö Lotsplats. *Boh. Goutl.* Visby; Östergarn bortåt Katthammarsvik.) *Stor rikblommig växt.*

2 *L. campestre* Br. bladen pil-likst omfatt., odelade, aflånga, naggtandade, gråbludna; skidorna rundade, urnupna, upptill vingade, med kort stift.  $\gamma$  6, 7, hv. blr. Fig. F.I.D.1221.

Åkerrenar. (Sk.—Gestr. *Ångml.* Vestanå bruk: Arn. *Vestml.* Ner. VG. Hall. *Öl. Goutl.* — N.) Stjelken vanl. grenad i uppröta, n. jemnhöga blomklasar. — *Thlaspi* L.

3 *L. rudemale* L. bladen icke omfattande, de nedre dubbelst. ell. enkelt parbladigt delade, de öfre hela jemnbreda; kronbl. 0; stånd. 2; skid. rundade, med omärkligt stift.  $\gamma$  5—9. Fig. Sv.B.321. F.I.D.184.

Vid hus, vägar etc. (Sk.—Gestr. *Helsl.* Iggesund m. fl. st. *Medelp.* Sundsvall. *Vestml.* Ner. *Verm.* Boh. Hall. *Öl. Goutl.* — N.) Ganska små blr; luktar illa.

†† Stiftet af omkr. skidans längd.

†4 *L. Draba* L. bladen odelade, aflånga, bugtandade; skid. bredt aggrunda med något hjertlik bas.  $\gamma$  6, 7, hv. blr. Fig. Reich.f.4211. H.N.f.6, n:o 22.

Ballastplatser etc. r. (*Carlskrona*, på Kronovarvet, der den fordom blifvit införd, och nu bibehållit sig ymnig i åtm. 50 år.) *Blomklasarne talrika med små blr.* — *Cardaria* Reich.

240. **CAPSELLA** Mönch. Lomme.

1 *C. Bursa Pastoris* Mönch: rotbladen hela eller parklufna; stjelkbladen pil-likst omfatt.  $\gamma$  4—9, hv. blr. Fig. Sv.B.273. F.I.D.729.

Åkrar etc. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Bladen variera hela, bugtandade och parklufna.* — *Thlaspi* L.

241. **THLASPI** Lin. Skärf-frö.

1 *T. arvense* L. glatt; bladen aflånga, med pil-lik, omfatt. bas, tandade; skidorna rundade, i spetsen med smal och djup urskärning, omärkligt stift.  $\gamma$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.214. F.I.D.793.

Åkrar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) *Skid. n. af en half tum diam. med n. jemnbred urskärning i spetsen, mångfröiga; rotbladen snart bortvisnande.*

2 *T. perfoliatum* L. glatt; stjelkbl. hjertlikt aggrunda, n. helbrädd., med basens flakar långt öfverskjutande stjelken; skid. bredt omv. hjertlika, med vid urskärning och omärkligt stift.  $\gamma$  5, 6, hv. blr. Fig. Reich.f.4183. H.N.f.4, n:o 37.

Grus. st. sandåkr. r. (*Uppl.* Rasbo, mell. Frötuna och Näset. *Öl.* Borgholm; Vannborga i Köping och Husvalla i Föra sn; Holmudden i Böda. Förr äfven vid Stockh., på Experimentalfältet.) *Skid. omkr. 8fröiga; rotbladen fortvarande, skaftade, mer och mindre rundade.*

3 *T. alpestre* L. glatt; stjelkbl. lancettlika, med hjertlik omfatt. bas, icke öfverskjutande stjelken, tandade; skid. smalt omv. hjertlika, med upptill bredare vingkant,

nedåt vigglikt afsmalnande; urskärningen *vidgad* med *utdraget* stift. 24 6, hv. blr. Fig. Fl.D. suppl. 85. H.N.f. 6, n:o 22.

Back. r. (ÖG. Norrköping i den mindre Ekbacken vid Marieberg; Smedstad i S. Lars och vid Tinnerbäcken: Kindb. Södm. Åkers styckebruk. Stockh. Nacka Damtorp; Manilla och Marieberg: G. v. Ced. Uppl. Knifsta sn, vid Barrafjön samt på Röd-mossen.) Skid. mer vigglika än hos de föregående, 8—10fröiga. — *T. brachypetalum* Jord. *T. suecicum* Fl.D.

#### 242. SENEBIÉRA Poir. Kråk-krasse.

1 *S. didyma* Pers. bladen pardelade; kronbl. 0; skidorna *avastt urnupna*, nätrynkiga, utan stift. ☉ 6, 7. Fig. H.N.f. 6, n:o 21.

Vid kusten, trol. införd med ballast, r. (Hall. Halmstad enl. Theor. Gottl. Hellvigs sn vid kyrkan och Killejs hamn; Visby, vid Gamla hamn: G. v. Ced. Gefle på Bro-bänken. Hudiksvall på strandgatan. Ängml. Hernösand: Arn.; Nylands lastageplats. — N. Christiania: Moë.) Blrna ytterst små; skidans rum lossnande från hvar-andra. — *Lepidium* L. *Coronopus* Sm.

2 *S. Coronopus* Poir. bladen som hos föreg.; skid, halfrunda *hela*, med *udd af stiftet*, rynkiga, i kanten *knöliga*. ☉ 6—8, hv. blr. Fig. Sv.B.733. Fl.D.202. H.N.f. 15, n:o 34.

Vid väg, byar etc. r. (Sk.—Boh. Blek. Smål. Kalmar och Vestervik. ÖG. flerst. i Stångådal, samt nära Glyttinge i Kärna enl. Kindb. Uppl. Uppsala. Hels. Söderhamn, Hudiksv. och Ströms bruk: Wistr. Medelp. Sundsvall. Ängml. Hernösand: Arn.; vid Nyland. Öl. Gottl. — N. Arendal; Christiania; Bergen.) Blrna i korta låta klasar. Skidan *affaller hel*, utan att rummen *åtskiljas*. — *Cochlearia Coronopus* L. *Coronopus depressus* Möench.

#### 243. TEESDALIA R. Br. Vallkrasse.

1 *T. nudicaulis* Br. rotbl. lyrformigt pardelade, stund. *hela*; ståndarsträngarne med ett fjält-lik bihang. ☉ 4—6, hv. blr. Fig. Sv.B.732. Fl.D.323. H.N.f. 1, n:o 31.

Torra st. sand, etc. (Sk.—VG. Göteborg; Alingsås etc. Boh. Blek. Smål. Kalm. län, vid kusten. Öl. — N. efter kusten från Arendal till Bergen.) Har 2—4 tum hög, vanl. *bladlös stjelk*. — *Iberis* L.

#### 244. HUTCHINSIA R. Br.

1 *H. petraea* Br. stjelken grenig bladig; bladen parbladigt delade, med *hela* flikar; skidorna elliptiskt ovala. ☉ 4, 5, hv. blr. Fig. Reich.f.4190. H.N.f. 4, n:o 36.

Torra st. klipp. r. (Sk. Käseberga; Brösarp. Blek. Carlskrona, flerst. ymnig; Kungsholms fästn. Södm. Utöns norra udde, och vid grufvan; Landsort; Fridön vid Tullgarn. VG. Kinnekulle. Öl. Gottl.) 2—3 tum hög, *späd och slutt. mycket grenig*. — *Lepid. L. Iberis* Fr. *Capsella* Fr.

#### 245. SUBULARIA Län. Sylört.

1 *S. aquatica* L. stängel, med syl-lik blad vid roten. ☉ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.35. Reich.f.4232. H.N.f. 6, n:o 20.

Stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Blomstängeln*, som *utgår från ett af blad-veckan*, 1—1½ tum hög. Blrna små klasvisa, utan kronblad, då de äro under vatten.

7 Flocken **Alyssinere**. Skida kort, 2rummig, med bred skiljevägg.

#### 246. LUNARIA Län. Månviol.

1 *L. rediviva* L. bladen skaftade, hjertlika, ojemnt *hvasstandade*; skidorna ovala, åt båda ändar spetsiga, med kort stift. 24 6, 7. Fig. Fl.D.2241. H.N.f. 16, n:o 39.

Lundar, r. (Sk. Gladsax vid Jerrestads-hallar; Krageholm, på ön Lybeck; Gudmunds-torp; Öfvedskloster; Kullaberg m. fl. st. VG. Kinnekulle vid Hellekis och Råbäck etc. Boh. Uddevalla i skärgården.) *Älnshög*, med stora blad och skidor, *ljusröda ell. något viol. blr.*

#### 247. CAMELINA Crantz. Lindådra.

1 *C. silvestris* Wallr. bladen *tättsittande fasta*, lancettlika, n. *helbrädd.*, med pil-lik

- bas; skid. något plattade, päronformiga, af fasta skal, åtskilda af en smal utskjutande kant, fint sträsprickiga, i spetsen rundade; stift. af halfta skidans längd ell. längre.  $\text{D}$  6, ljug. blr. Fig. Sv.B.339. Fl.D.2726. H.N.f.7, n:o 19.
- \* *microcarpa* Reich. skid. små, föga längre än stiftet, och med bredare kant. Fig. Reich.f.4293.
- Åkr. etc. (Sk.—VB. och Jeml. — N.) Något blåaktig till färgen. Var. glatt och hårig, samt med glesl småtandade blad, aldrig groftand. ell. stikiga. — *Myagrum sativum* L. *Alyssum* Sv.B.
- 2 *C. sativa* Fr. bl. som föreg.; skid. aflängt omv. äggformiga, af fasta skal, med mycket smal kant, fint nåldruga, i spets. rundade; stift. knappt af halfta skidans längd.  $\text{C}$  6, 7, g. blr. Fig. H.N.f.15, n:o 35.
- Linåkr. r. (Sk. här och der i linåkr. enl. F. Aresch. Hall. Gottl.) Var. som föreg., samt har lika som den fastare blad och skidor än följ. Blrna och skid. äro ordnade n. i vippa, hos föreg. och följ. i enkel klase. — *Myagr. sativum*  $\beta$  L.
- 3 *C. foetida* Fr. bl. åtskilda, tunna, än hela, än bugtlandade eller parklufna, med pil-lik bas; skid. omv. äggformiga—n. klotrunda, med mycket uppblåsta och tunna skal samt föga märklig kant, fint nåldruga, i spets. tvärhuggna eller n. intryckta; stift. merändels kort.  $\text{C}$  6—8, ljug. blr. Fig. Fl.D.1038 och 1824. H.N.f.7, n:o 20, 21.
- Linåkr. (Sk.—Ångml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl.) Hela örten vekare och af renare grön färg än de föreg.; skid. stora med lutt hoptryckta och bristande skal, större frön. — *C. sativa* och *dentata* Fr. i H.N.f.7.

## 248. ALYSSUM Lin. Gråddära.

- 1 *A. calycinum* L. stjelken vid basen delad i uppböjda grenar; bladen jemnbredt tungell. lancettlika, stjernludna; foderbladen kölade, qvarsittande vid de cirkelrunda, i spetsen intryckta, findhåriga, vingkantade skidorna.  $\text{C}$  5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.1704. Reich. f.4269. H.N.f.1, n:o 29.
- Sandback. r. (Sk.—Uppl. Rasbo och Edebo snr, och Verm. Sundsta vid Carlstad. Boh. Uddevalla: Leml. Öl. Gottl. — N. Christiania: Ax. Bl.) Var. mer och mindre hvitluden. Vid första blomningen fingerhög, sedermera flere gånger större; kronbl. små, torra n. hvita.

## 249. FARSETIA R. Br. Sandhvida.

- 1 *F. incana* Br. bladen lancettlika; kronbl. 2klufna; skidorna smått gråludna.  $\text{D}$  7, hv. blr. Fig. Sv.B.675. Fl.D.1461. H.N.f.1, n:o 30.
- Torra st. r. (Sk. vest. delen. Blek. Carlskrona och Carlshamn. Smål. Vexjö. Scheutz. ÖG. Qvillinge vid Ettarp; Norrköp. m. fl. st. Stockh. på Observatoribacken etc. Helsl. Söderhamn vid Långgrör; Ströms och Iggesunds bruk: Wistr. Dal. Smedjebacken. Verm. vid Bäckängen i Ö. Ullerud; vid Carlstad i Sundsta. Boh. Marstrand; Kongelf enl. Leml. Hall. mell. Karup och Båstad: Theor. Gottl. Visby enl. Leml. — N. Christiania: Ax. Bl.) Fotshög ell. mera, grå af stjernludd. — *Alyssum* L. *Berteroa* DC.

## 250. COCHLEARIA Lin. Skörhuggsört.

- 1 *C. danica* L. rotbladen spjullikt hjertlika; stjelkl. triangel- ell. rutförmiga, vinkligt tandade, de öfre kort skaftade; skidorna rundadt äggformiga.  $\text{D}$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.100. Reich.f.4257. H.N.f.4, n:o 35.
- Sten. hafsstr. r. (Sk.—Rosl. t. ex. Ornö; Utö; Singö; Grisslehamn. Hall. Sandö. Boh. Öl. Gottl. — N.) Bladen hos alla arterna köttiga; rotbl. skaftade.
- 2 *C. officinalis* L. rotbladen hjertlikt rundade; stjelkl. åggrunda eller aflånga, merändels vinkligt tandade, de öfre pil-lik stjelkomfåttande; skid. n. klotrunda.  $\text{D}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.87. Fl.D.135. H.N.f.13, n:o 50.
- \* *arctica* (Schlecht.) rothls bas ofta tvär ell. afrundad; skid. äggformiga, med längre stift. Fig. H.N.f.16, n:o 40.
- Hafsstr.; \* vid fjellback. (Sk. Hall. Boh. Blek. Smål. Kalmar, vid Jutnabben; Refsudden i Ryssby; Vestervik. Öl. vid Färjestaden och Karlevi hamn enl. Ekstr. — N. till Finnm. — \* N. Vest-Finnm. i Tromsö dalen; Lyngen; Maasö: Th. Fr. Ost-Finnm. flerst. nära Varangerfjorden; Berlevaag.) Stul. folslång och mycket grenig; skid. trubbiga med tydligt stift. \*, som är *C. arctica* Fr. Mant. III och



*Hn.ed.9*, utgör en medelform till följ. art, hvilken måhända själf ej är annat än en form af *C. offic.*

- \*3 *C. anglica* L. rotbl. äggrunda, stund. med grundt hjertlik bas; stjelkl. lancettlika ell. aflånga, helbrädd. ell. något tandade, stjelkomf.; skid. ovala—lancettlika, med tydligt stift.  $\gg$  6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.329. Reich.f.4258.

Hafsstr. r. (N. Finnm. t. ex. Hammerfest; Kaafjorden, nedom Sakkabani enl. Th. Fr.; Lyngen etc. Nordl.)  $\frac{1}{2}$  aln hög; knappt skild från föreg. med annat än de aflånga skidorna.

## 251. DRABA Lin. Nagelört.

† Kronbl. ungef. till midten 2klufna: *Erophila* DC.

- 1 *D. verna* L. stängeln bar; skid. aflånga—ovala, kortare än skaften.  $\odot$  4, 5, hv. blr. —  $\beta$  *præcox*: mindre; skid. ovala. Fig. Sv.B.298. Fl.D.983.  $\beta$  Reich.f.4233. H.N.f.4, n:o 34.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och Dal. — N. till Trondhj. —  $\beta$  *Gefle*. Stockh. VG. Venersborg enl. Leml. Blek. enl. Gosselm. Öl. Götll.) Blommande tumshög, med ovala ell. aflånga rotblad, sedan 3—4 tum hög;  $\beta$  alltid mindre, ofta med bredt ovala skidor. Var. med köttiga, än n. glatta, än stråfhåriga bl., aflånga skidor: var. *pinguis* Th. Fr.

†† Kronbl. hela ell. grundt urnupna.

\* Roten svag, en-årig, utan grenskott.

- 2 *D. nemorosa* L. bladen äggrunda sågade; kronbladen urnupna; ståndarne 6; skid. elliptiskt aflånga, dubbelt kortare än skaften.  $\odot$  4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.767. H.N.f.3, n:o 24.

Sandåsar, murar, r. (Södm. vest. Vingåker, Vannala. Stockh. på Observatoriibacken. Uppsala. Gefle. Medelp. Hässjö sn enl. Leml. Ångml. Dal. Säter, Klothyttan; Grangårde sn, Björnhytte bruk och Grängesberget. Vestml. Skinnskatteberg; Nya Kopparberget. Ner. Örebro. Verm. Ölmeåhrad, vid Kungskogens hytta. — N. Kongsberg.) Är först på våren n. stjelklös, sedan ofta stor och grenad i långa klasar; skidan vanl. finluden, på ex. fr. Dal. glatt: *D. lutea* Gilib. — *D. muralis*  $\beta$  L.Fl.Su.

- 3 *D. muralis* L. bladen hjertligt äggrunda sågade stjelkomfattande; kronbl. hela; stånd. 4; skid. som hos föreg., föga kortare, än skaften.  $\odot$  5, 6, hv. blr. Fig. Reich.f.4235. H.N.f.5, n:o 16.

Skogsback., lund. r. (Sk. öst. delen.—Uppl. Vestml. Öl. Götll. — N. Tönsberg, i parken vid Berg.) Skidor och skaft utsperrade.

(*D. incana*)

\*\* Roten 2—flerårig, merändels bärande flere stjelkar eller grenskott.

a — Stjelken vanl. flerbladig; bl. tyd. sågade ell. tandade.

- 4 *D. incana* L. stjelken 3—mångbladig, jemte de äggrunda—lancettlika, sågtandade bladen tätt och fint stjernluden; skid. utdraget aflånga ell. lancettlika, vridna, mycket längre än skaften.  $\gg$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *stricta*: högre, styfvare, med talrika, vanl. tättsittande, lancettlika blad. Fig. Fl.D.130. Reich.f.4249  $\beta$ . H.N.f.5, n:o 14,  $\beta$  n:o 15.

Torra st. r. (Södm. Tynnelsö djurg. i Öfver-Selö; Hammar i Vester-Hanninge. Uppl. Uppsala; Lidd; Forssmark; Ångskär i Hollnäs; Elfskarleby. Gestr. Limön. Ångml. Hernösand. Herjed. Ljusnedal; Vallarne; Hamrafjell; Malmagen etc. Vestml. Sala grufva; Hålla ång i Badelunda. VG. Kinnekulle och Mösseberg. Öl. Götll. — N. till Finnm.) a har så och mer åtskiljda blad än  $\beta$ . Skidorna vanl. finludna, stundom glatta. Saknar stundom grenskott vid roten. —  $\beta$  *D. contorta* Ehrh.

- 5 *D. hirta* L. stjelken meränd. 1—åbladig, stjernluden eller småhårig; bladen som hos föreg., med 1—3 sågtänd. i kanten; skid. äggrundt aflånga—lancettlika, än längre, än kortare än skaften.  $\gg$  6, 7, hv. sällan något gulakt. blr. Fig. Sv.B.768. Var. i hög grad och har gifvit anledning till flere arter, som dock näppeligen kunna begränsas; sådana äro:

\* *D. incano-hirta* Hn. 1—2 qv. hög med stjelk och blad fint och tätt stjernludna; skid. lancettlika, med något utdraget stift; blr. torra gulaktiga. H.N.f.8, n:o 24. *D. dovreensis* Fr.

- \* *D. rupestris* Br. 1—2 quart. hög och slak, glesare stjernluden och hårig; skid lancettlika med omärkligt stift; blrna alltid hvita. H.N.f.3, n:o 23 och f.8, n:o 22. *D. hirta* och *laxa* Lindbl. *D. hirta a inferalpina* Wg. Fl.L.  $\gamma$  rupest. Fl.Su. —  $\beta$  *scandinavica* Lindbl. lågväxt och upprät, hårig, men söga stjernluden; stjelen bar, eller 1—2bladig; skid. åggrundt aflånga, med omärkligt stift; blrna alltid hvita. H.N.f.8, n:o 23. *D. hirta* L. enl. Solanders ex. *D. hirta*  $\beta$  *alpicola* Wg. *D. hirta* Sm. *D. rupestris* Bab. och trol. Br.
- \* *D. lutescens*: stjelen låg, bar ell. enbladig, jemte blomskafven hårig; blrna små gulaktiga.
- \* *D. trichella* Fr. stj. låg, bar ell. enbladig, jemte blomskafven hårig och stjernluden; skid. åggr. ell. ovala utan stift; bl. oftare helbrädd; blrna små hvita.
- Fjelltr. (Lpl.—Herjed. — N.) Saknar aldrig grenskott.

b — Stängel ell. enbladig stielk; bl. helbräddade.

- 6 *D. Wahlenbergii* Hn. stj. bar ell. enbladig glatt; bladen lancettlika, merändels håriga; blomskafven och de n. ovala skid. glatta. 2 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *heterotricha*: bladens hår dels enkla, dels gaffelklufva. Fig. Wg.Fl.L.t.11. Sv.B.770. H.N.f.5, n:o 17.
- \* *glacialis* Ad. bladen glatta hårbräddade; blrna smärre och gulaktiga.
- \* *brachycarpa* Zell. bl. ofvan glatta, under stjernludna; stiftet tydligt.
- Fjellv. r. (Lul. Lpm. Pit. Lpm. Kåhdespakte etc. — N. Finnm. Lyngtind m. fl. st. Dovre vid Kongsvold allmän; Blaahe; Jerkind; Vaarstien; Drivstuen etc. Valders och Tellemarken. — \* *glac.* N. Finnm. Lyngen på fj. Tsatsa. — \* *brachyc.* N. Dovre, på Gederyggen vid Jerkind.) Är ofta svår att skilja från smärre former af *D. hirta*, särsk. i blom. tillstånd, då den är söga utmärkt af annat än glattheten, som stund. sträcker sig äfven till bladen. — *D. androsacea* Wg.Fl.L. *D. lapponica* DC. och Wg.Fl.Su. *D. stellata* Fl.D. enl. Blytt. *D. lactea* Adams enl. Ledeb. — \* *glac.* synes vara *D. ochroleuca* Bunge och Ledeb.
- 7 *D. nivalis* Liljeb. stängeln och blomskafven stjernludna; bladen tunglika, grå af ett tjockt stjernludd; skid. lancettlika, glatta. 2 6, 7, gulakt. hv. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.11. Sv.B.769. H.N.f.5, n:o 18.
- Fjellv. r. (Torn.—Pit. Lpm. — N. Finnm. Mehavn. Nordl. Salten. Dovre, på Fogstuevåla, högst på Harbacken, samt på Gederyggen vid Jerkind.) Blommande vanligen 1—1½ tum hög, slutligen n. 3 tum; utmärkt af de genom luddet hvitgrå bladen, som sakna längre hår, samt de smala skidorna. — *D. muricella* Wg. *D. Liljebadii* Wallm. i Lilj.Fled.3.
- 8 *D. alpina* L. stäng. och blomsk. småhåriga; bladen lancettlika håriga; skid. åggrundt ovala, n. glatta, med kort stift. 2 6, 7, g. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.11. Sv.B.771. Fl.D.56. H.N.f.5, n:o 19.
- Fjellv. (Torn.—Pit. Lpm. Herjed. stora Midtåklappen, på nordvestra sidan. — N. Finnm.—Dovre allm. Vangsfjellet.) Utmärkt af sina teml. stora, rent gula blr och de vid basen bredare, ofta bredt åggrunda skidorna, hvilken sednare form är *D. oxycarpa* Somf.; stäng. n. alltid bladlös, vid fruktmogningen ofta quartershög.

38 Fam. POLYGALÆÆ Juss. Fod. och krona oregelbundna. Ståndarsträng. 8, samväxta, med enrummiga knappar. Fröhus 2rummigt, med ett hängande frö i hvarje rum.

252. POLYGALA Lin. Jungfrulin, Fogel-ört.

- 1 *P. vulgaris* L. de nedersta stielkbl. ovala, smärre än de öfre jemnbreda—smalt lancettl. bladen; skärmb. ovala, alltid kortare än de outslagna blrna; de större foderbl. betydligt längre än fröh. 2 6, 7. —  $\beta$  *oxyptera*: foderbladen mycket spetsiga, smärre än fröh. Fig. Sv.B.712. Fl.D.516. H.N.f.14, n:o 27.  $\beta$  Reich.t.1346.f.2.
- \* *depressa* Wend. nedliggande, spåhare och grenig, med fåblomm. klasar, en del blad motsatta. Fig. Reich.t.1347.f.1.
- Ångsback. a.; \* bland ljung etc. (Sk.—Medelp. och Jemt. Boh. Grebbestad. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) Blrna störst i släktet, vanl. rent blå, sällan hvita, eller på kalkgrund röda. Skärmb. hos alla arterna affalla tidigt.

2 *P. comosa* Schk. stjelkl. som hos föreg.; skärmb. lancetlika, de öfre längre än de outhugna blrna; de större foderbl. knappt längre än fröh. 24 6, 7, viol. röda blr. Fig. Sv.B.713. Reich.t.1346, f. 4. H.N.f.3, n:o 13.

Äng. (Sk. och Blek. sällsynt. Smål. Kalm. län; samt flerest. i Kronob. län. — Gefle. Helsl. Friggesund i Bjuråker. Vestml. Ner. Dalsl. i Ed sn. Öl. Gottl.) 6—10 tum hög, med något mindre blr än föreg. Utmärkt af att fröh. och foderblad äro n. lika långa. — *P. vulg.* β *violacea* L.

3 *P. amara* L. de nedersta stjelkl. störst och spadlika, de öfre som hos föreg.; skärmb. bvala, alltid kortare än de outhugna blrna; de större foderbl. som hos föreg. 24 6, 7, b. eller hvitakt. blr. — β *alpestris*: de nedersta bladen små, kortare, men bredare än de öfre. Fig. Fl.D.1169. Reich.t.1348, f. 2. H.N.f.3, n:o 14.

Fukt. äng. (Sk.—Gestr. och Dal. Helsl. byn Naggen i Ramsjö: Wistr. Medelp. Torpsn; Hässjö sn: Arn. Jemt. Öl. Gottl. — N. Aggerhus stift; Vaage; Gudbrandsdalen; Dovre. — β Dal. Boda kapell. Trol. flerest.) Vanl. grenad vid roten i flere, 2—5 tum långa stjelkar, med smärre blr än de föreg.; de nedersta bladen samlade i rosett. — *P. uliginosa* Reich.

39 Fam. BALSAMINÆÆ DC. Fod. och krona oregelb.; det förra med sporre. Ståndarknappar sammanhängande. Fröhus af 5, elastiskt uppspringande skal, med centralt fröfäste. Fröhvite 0.

#### 253. IMPATIENS Lin. Springkorn.

1 *I. Noli tangere* L. stjelkens leder uppsvällad; bladen tunna, äggrundt aflånga; blomskäften ensamma i bladvecken, flerblommiga. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.371. Fl.D.582.

Skugg. och fukt. st. r. (Sk.—Ängml. V.B. Umeå sn, Baggböhlen. Dal. Verm. och Dalsl. Boh. — N. till Salten.) Har stora, på fina skaft hängande blr. Stundom förblifva blomknopparna små och outvecklade, men sätta dock mogen frukt.

## 6 KLASSEN

### COLUMNIFLORÆ.

- 40 Fam. **TILIACEÆ Juss.** Fod. i knoppen kantlagdt, affallande; kronbl. tegellagda, likformiga. Stånd. talrika, fria. Frukt sierrummig, med centralt fröfäste, eller [hos de Svenska arterna genom felslagning] enrummig.

#### 254. *TILIA* Lin. Lind.

- 1 *T. parvifolia* Ehrh. bladen snedt, rundadt hjertlika hvass-sågade *glatta*, på undre sidan blågröna och i nerv-vinklarne ulliga; blomskärmet *längre* än den *mång-* [vanl. 5—7-] *blommiga* blomqvasten; frukt. n. *päronformig*, utan kanter, fittluden med *tunnt* skal.  $\frac{1}{2}$  7. hvitg. blr. Fig. Fl.D.553. H.N.f.9, n:o 32.

Ängsback. lund. (Sk.—Ängml. Skuluberg. Dal. Verml. Boh. Öl. Gottl. Thorsborg. — N. till Ringeboe i Gudbrandsdal. samt efter kusten till Nordfjord.) *Träd med väl-lukt. blr i qvast, vid hvars skäft ett stort gulaktigt skärm är fästadt. Frögömmet är mycket tunnt, n. mjölligt ludet och har vid basen en omärklig hals, som saknas hos följ. Var. med något flåkiga blad. — T. europæa L. T. silvestris Desf. T. ulmifolia Scop.*

- 2 *T. vulgaris* Hayn. bl. som hos föreg., under bleka; blomskärmet af den *mång-* [vanl. 5—10-] *blommiga qvastens* höjd; frukt. n. *klotrund*, utan kanter, tjockullig, med *hårt*, n. *trädartadt* skal.  $\frac{1}{2}$  7. hvitg. blr. Fig. Sv.B.40. H.N.f.9, n:o 31.

Lund. r. (Boh. Greby, Klefve och Rörvik i Tanum sn: Rect. For. Allmänt planterad vid städer och byar i söd. och mell. Sv.) *Träd som föreg., med större blad, blr och frukter. Blomqvasten mera mångblommig än hos de båda andra arterna. — T. intermedia DC.*

- 3 *T. grandifolia* Ehrh. bladen som hos föreg., deras undre sida *gleshårig*, med nerverna och nerv-vinklarne ulliga; blomskärmet *som hos föreg.*; blomqvasten *få-* [vanl. 3—4-] *blommig*; frukt. omv. *äggformig*, *upphöjdt kantig*, luden, med *hårt*, n. *trädartadt* skal.  $\frac{1}{2}$  7. hvitg. blr. Fig. Fl.D.2722. H.N.f.14, n:o 33.

Lundar. r. (Boh. på Öar i Strömstadstrakten, t. ex. Ödön, vid Blötebogen; och Helsö.) *Träd som föreg. Frukten har omkr. 5, tydliga utstående kanter, och de mellanliggande sidorna något plattade. — T. platyphylla Scop.*

- 41 Fam. **MALVACEÆ Juss.** Fod. i knoppen kantlagdt, qvarsittande; kronbl. hopvridna, likformiga. Stånd. talrika, med alla strängarne hopväxta. Frukt af flere karpeller, kranslikt sammanväxta omkring stiftets bas. Fröhvite 0.

#### 255. *LAVATÆRA* Lin. Stockros.

- 1 *L. thuringiaca* L. stjelen gråluden; bladen på undre sidan ludna, de nedre vinkliga och flåkiga, de öfre 3flikade, mellersta fliken längre, trubbig; blomskäften ensamma i bladveckan. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. ljusr. eller hv. blr. Fig. Jacq.A.211. H.N.f.3, n:o 30.

Äng. vid byar etc. r. (*Södm. Vestml. och Uppl.* ymnigast vid Mälaren, såsom Ekebyhof på Ekerön; Svartsjö; Strengnäs vid Kungsberg; Selaarne; Sundby gåstgg.; Hesselbyholm; Berghammar; Aggarön i Granfjärden. Uppsala vid Vårdsätra etc. Ner. vid Sickelsjö; O. G. Blomb. ÖG. vid Stegeborg och Degerhof enl. Lem. Hall. Hasslöf: Theor. Öfverallt säkerligen förvildad.) *Ofta alnshög och deröfver.*

256. *MALVA* Lin. Kattost.

† Bladen mer ell. mindre grundt flikade [aldrig djupare än till midten].

\* Stj. nedliggande; karp. småludna: *M. rotundifolia* L.

- 1 *M. borealis* Wallm. bladen rundadt njurlika, grundt 5—7flikiga, med rundade, naggade flikar; kronbladen *söga* längre än blöfodret; fruktskaften *nedböjda*; karpeller omkr. 10, med upphöjda *skarpa* kanter, något *rynliga*. ☉ 6—9, hv. blr. Fig. Sv.B.142. Fl.D.1825. H.N.f.8, n:o 33.

Gator, väg. a. (Sk.—Medelp. Dal. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N.) Kronbladen *sällan öfver ½ gång längre än fodret*.

- 2 *M. vulgaris* Fr. blad som hos föreg.; kronbladen *mer än dubbelt* längre än fodret; fruktskaften *nedböjda*; karp. 12—15, utan kanter, släta. ☉ 7, 8, blekröda blr. — *β pelargonifolia*: bladen småludna, med helbräddade flikar. Fig. Fl.D.721. H.N.f.8, n:o 34.

Odl. st. (Sk.—Gefte och Vestml. Hall. allm.: Theor. Öl. Gottl. Sällsynt norr om Mälaren. — N. till Hedemarken. — *β Blek.* Carlskrona på Stumholmen. Vestml. Strömsholm. Gottl. Lummelunds bruk.) Kronblad *ofta en half tum långa och något breda*. — *M. rotundifolia* ed.9 *Skiljes icke af Linné från föreg.*

\*\* Stjelken upprät; karp. glatta.

- 3 *M. silvestris* L. bladen rundade, 5—7flikiga; blomskäften gytttrade i bladvecken, jemte bladskaften häriga; kronbladen *flere gånger* längre än fodret; fruktskaften *upprätta*; karp. med *skarpa* kanter, *rynliga*. ☉ 6—8, r. blr. Fig. Sv.B.602. Fl.D.1223.

Grus. och odl. st. r. (Sk. allmän—Boh. Blek. Smål. i Kalmar län vid kusten. ÖG. flerst. i skärg. enl. Kindb. Öl. Gottl. Förvildad omkring Mälaren, t. ex. Stockholm, på Aggarön och Stora Hessingen. — N. Arendal i mängd. Fredrikstad.) Bladen *variera mer och mindre djupit inskurna, stundom till midten, med sågade flikar*; kronbladen *tumslånga, någon gång hvita*.

†† Stjelkbladen delade n. till basen.

- 4 *M. Alcea* L. stjelen upprät, *kort stråfhårig*, ell. stjerneluden; bladen handdelade med vanl. tandade eller inskurna flikar; foderholkladen *aflånga* ell. *lancettlika*; karp. *glatta, rynliga*. 2, 8, 9, blekröda blr. Fig. Sv.B.601. Fl.D.1882. H.N.f.14, n:o 34.

\* *fastigiata* Cav. stj. gråluden af stjerneludd, utan längre enkla hår; de öfre bladens flikar n. hela. Fig. H.N.f.13, n:o 51.

Odl. st. r. (Sk. allmän i nord- och sydöstra del. enl. F. Aresch. Blek. Smål. Kalmar, i Dörby; Vestervik: Dr Lund. ÖG. flerst. på slättbygd. enl. Kindb. Öl. mellersta delen. Gottl. Klinte, Haldhem och Hejde snr. — \* Sk. särd. i sydöst. delen: Aresch. Blek. Smål. i Kalm. län. Öl. Förvildad flerst. i mell. Sv.) *Alnshög, med stora blr.* \* *lär allestädes, der den träffas tills. med hufvudarten, n. utan gräns sammanflyta med denna.*

- 5 *M. moschata* L. stjelen upprät, *långt stråfhårig*; de nedre bladen *njurlika* flikiga, de öfre fingerlikt delade i mest 5, parklufna flikar; foderholkladen n. *jembreda* spetsiga; karp. *håriga, släta*. 2, 7, 8, hv. eller ljusröda blr. Fig. Fl.D.905. H.N.f.10, n:o 37.

Grus. st. r. (Sk.—Södm. Nyköping. Uppl. Penningby i Länna sn, och Lunda enl. Lem. Ner. Riseberga och Falkenå. Hall. Hasslöf, Karup etc.: Theor. Gottl. På de flesta ställen förvildad. — N. Christiania: Ax. Bl.) *Liknar något föreg., men är vanl. mindre.*

257. *ALTHÆA* Lin. Alté-rot.

- †1 *A. officinalis* L. stjelen upprät; bladen hjertlikt äggrunda, 3—5flikiga med tandade flikar, gråludna; blomskäften i bladvecken, de öfre meränd. 3blommiga. 2, 7—9, ljusr. blr. Fig. Fl.D.530.

Hartman, *Skandinaviens Flora* (10:de uppl.).

Strandäng. r. (Sk. Malmö och Trelleborg enl. F. Aresch.; fordom äfven på öst. kusten mell. Yngsjö och Furaboda. Troligen förvildad.) *Hela växten fint mjukluden; foderholken stundom 10—12klufven.*

42 Fam. **GRUINALES** Lin. Fod. i knoppen tegellagdt; kronbl. hopvridna, [hos de Sv. arterna] likformiga, Stånd. 5 ell. 10 [af hvilka sednare stund. 3 ell. 5 sakna knäppar], med vid basen förenade strängar. Frukt: 5, kransvisa karpeller, stund. flerrummigt fröhus.

1 Flocken **Geraniaceæ**. Frukt af 5, kransvisa, slutl. skiljbara karpeller, fästade med sina stift vid spetsen af ett långt sprötlit fäste. Fröhvite 0.

258. **GERANIUM** Lin. Näfva.

† Blomskafen enblommiga.

1 *G. sanguineum* L. bladen rundade, handdelade i 5—7, vigglika, 3—5klufna flikar; foderbl. borstuddiga; kronbl. grundt urnupna. 2 6, 7, purp. blr. Fig. Fl.D.1107.

Ängsback. och klipp. (Sk.—Medelp. Dal. Vestml. Ner. Ullaviklint; Skålleklint. Verml. Dalsl. VG. Boh. Öl. Goull. — N.) Stj. och blomskaf långhåriga; blrna mycket stora

†† Blomskafen 2blommiga; rotstock grof, flerårig.

\* Karpeller på tvären rynkiga.

\*2 *G. macrorrhizum* L. stj. upprät, *småluden*; bladen 5—7delade, med inskurna och tandade flikar; de gemensamma blomskafen *parvisa*; foderbl. *upphöjdt* nerviga, *långt* borstuddiga; kronbladen bredt spadlika, med *klo af fodrets längd*; karp. *glatta*. 2 5—7, r. blr. Fig. Jacq.Rar.134.

Bergstrakt. r. (N. Holmestrand vid Ekellund, trol. förvildad.) *Fothög; fingertjock rotstock och uppblåsta, n. klotrunda blomfoder.*

3 *G. phæum* L. stj. upprät, *långhårig*; bladen djupt 5—7klufna, med flikar som hos föreg.; de gemens. blomskafen *ensamma*, motsatta bladen; foderbl. *otydligt* nerviga, *kort* borstuddiga; kronbladen omv. åggrunda, med *kort klo*; karp. *styhåriga*. 2 5, 6, violettbruna blr. Fig. Fl.D.987. H.N.f.9, n:o 33.

Skugg. st. r. (Sk. Krageholm; Tosterup; F. Aresch. — N. vid Bergen enl. Ax. Bl.) *Enskildta blomskafen i början tillbakaböjda, slutl. uppräta.*

\*\* Karpeller icke rynkiga.

a — Kronblad rundade, hela.

4 *G. palustre* L. stj. *uppstigande*; bladen delade *nedom midten* i 3—5, inskurna och tandade flikar; fruktskafen *nedböjda*; fodret *n. glatt*; stånd.strängarne *syl-lika*; karp. *omärkligt finludna*. 2 7, r. blr. Fig. Sv.B.677. Fl.D.596. H.N.f.16, n:o 41.

Fukt. äng. r. (Sk. Kullen; Ramlösa; N. Vram; Fogelsång; Christianstad m. fl. st. VG. Göteborg i Brudängen vid Lundagården i Fässbergs sn. Boh. Ugård i Qville sn. — N. Eidsfoss.) *Blrna något mindre än hos de 2 följ.; foderbladen likasom hos dessa borstuddiga, vanl. mycket kortare än kronbl.*

5 *G. pratense* L. stj. *upprät*; bladen *delade nästan till basen* i omkring 7, inskurna och tandade flikar; fruktskafen *nedböjda*; fodret *hårigt*; stånd.strängs bas *vidgad åggrund*; karp. *glandelhåriga*. 2 7, ljusbl. blr. Fig.

Äng. etc. r. (Sk. i vest. delen: F. Aresch. Blek. Afvelsgårde. Smål. Lommaryd i Jönköp. län. — Uppl. nor. del. Gestr. Vahlbo sn, Löflunds gistvall. Helsl. Enånger: Wistr. Vestml. Boh. — N. Christiania; Tönsberg; Skien; Värdal; Gudbrandsdalen. Trondhj. Tutterön och Stördalsutbygden.) *Älnshög grenig, med renare blå blr än de öfr. arterna.*

6 *G. silvaticum* L. stj. upprät; bladen delade *nedom midten* i 5—7, inskurna och sågade flikar; fruktskafen *uppräta*; fodret *hårigt*; stånd.sträng. *syl-lika*; karp. glandelhåriga. 2 7, rödviol. ell. hvitakt. blr. Fig. Fl.D.124.

Äng. och skogsback a. (Sk.—Lpl. — N.) *Varierar mer och mindre hårig, ända till stråfhårig; blrna vanl. stora, stundom små med kronbl. knappt längre än fodret: var. parviflorum.*

b — Kronblad 2flikiga.

7 *G. pyrenaicum* L. stjelken upprät; bladen rundade, nedom midten 5—7flikiga; fruktskafen nedböjda; foderbl. småludna. n. uddlösa; karp. finludna. 2, 6, 7, viol. blr. Fig. Fl.D.2240. H.N.f.9, n:o 34.

Odl. st. r. (Sk. Lund; Årup etc. Smål. Hvena sn, mell. Käreby och Skinnarp enl. Ekstr.; Vestervik: Dr Lund. ÖG. vid Torpa prestgård; Kisa, Tåby m. fl. snr enl. Kindb. Stockh. vid Carlberg och Marieberg etc. Uppl. Rosenberg. Vestml. Skinn-skatteberg. Hall. Hasslöf. Öl. Runsberga. Gottl. Kräklingbo etc. enl. Lemm. och G. v. Ced. Sannolikt öfverallt förvildad.) *G. umbrosum* Kütz. *G. rotundifolium* β Wyg.

+++ Blomsk. 2blommiga; utan rotstock; roten späd, enårig.

\* Karpell. rynkiga; kronbl. nära dubb. längre än fodret.

a — Foderblad borstuddiga.

8 *G. Robertianum* L. bladen 3—5fingradt delade, med parklufna småblad; fodret 10-kantigt, slätt, glandelhårigt; kronbl. hela, omv. äggrunda, med lång klo; karp. gles-håriga. 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.694.

Klipp. stenbundna st. a. (Sk.—VB. och Jemt. — N. till Nordl.) *Blrna mindre än hos föreg. arter, mer klokliska; stjelk och blad ofta röda, illaluktande. Var. med korta kronbl., föga längre än fodret: G. purpureum* W.

9 *G. lucidum* L. bladen rundade ell. njurlika, till nedom midten klufna i 3—5, trubbiga, inskurna, flikar; fodret med 5 hinnaktiga kanter, på tvären rynkigt, glatt; kronbl. som hos föreg.; karp. fint glandelhåriga. 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.556. Fl. D.218.

Skugg. klipp. r. (Sk.—Rosl. Uppl. Krusenberga. Vestml. Ängsön, på Kalfholmen. VG. Dalsl. Boh. Hall. Särö. Öl. Gottl. — N. Christiania; Laurvig; Arendal; Hitteren; Trondhj. etc.) *Stjelk och rotblad blodröda, hela växten glänsande, n. glatt.*

b — Foderblad utan borstudd.

10 *G. molle* L. stj. och bladskafen mjukt långhåriga; bladen rundadt njurlika, klufna något nedom midten i 5—7, vigglika, hela ell. 2—3tandade flikar; fodret långhårigt; kronbl. urnupet 2flikiga; karp. glatta. 6, 7. Fig. Sv.B.639. Fl.D.679. H.N. f.1, n:o 36.

Tor. st. (Sk.—Rosl. Verml. Gårdsjö i Gilberga sn. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. delen.) *Späd och slankig; stjelkens och bladskafens hår längre än samma delars diameter; blrna små, lifligt röda.*

\*\* Karpell. släta; kronbl. alltid urnupna, ungefär af fodrets längd.

a — Foderblad utan borstudd.

11 *G. pusillum* L. stj. och bladskafen kort småludna; bladen runda, 5—7klufna, med flikar som föreg.; karp. tilltryckt håriga. 6—9. Fig. Fl.D.1994. H.N.f.14, n:o 35.

Tor. st. vid byar etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. Verml. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. — N.) *Vanligen liten, ubredd, stundom större och upprät; blrna ljusst violetteröda; fröen släta. — G. rotundifolium* L.Fl.Su.

b — Foderbl. långt borstuddiga.

12 *G. bohemicum* L. stjelken upprät, klubbhårig; bladen till nedom midten 3—5klufna, med inskuret tandade flikar; fruktskafen upprätta; karp. klubbigt långhåriga. 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.71. H.N.f.10, n:o 38.

Svedjel. r. (Smål. öst. del., samt n. Wedbo härad: Scheutz. — Ängml. Dal. Larsbo bruk. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. i Ed och Steneby snr. — N. Christiania; Eidsfoss.) *Hela växten af en mycket vidrig lukt; kronbl. violetterblå, hårkantade, näende föga öfver foderbladens långa borstudd; karp. svarta.*

13 *G. dissectum* L. stjelken från basen grenig, nedböjdt hårig; bladen n. till basen 5—7-

delade, med 3- ell. flerklufna flikar; blomskaften *kortare* än bladen, slutl. *nedböjda*; karp. *glandelhåriga*. ☉ 6, 7, violettröda blr. Fig. FLD.936. H.N.f.14, n:o 36.

Odl. st. r. (Sk. allm. *Blek.* Carlskrona; Carlshamn; Ronneby etc.: Goss. *Smål.* Grenna; Långliden; Slingsö i Vesterum sn: Ekstr. *ÖG.* öst. Ryd; Olstorp i Kaga och Engelholm i St. Annæ enl. Kindb. *Hall. Boh. Öl. Gottl.* — N. Christiansands st.; samt på Kirköe, en' af Hvalöarne.) *Fröen nällikt gropiga.*

14 *G. columbinum* L. stj. som hos föreg., *nedböjdt småhårig*; bladen *som hos föreg.*; blomskaften *mycket längre* än bladen, slutl. *nedböjda*; karp. *n. glatta*. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. FLD.1222. H.N.f.15, n:o 37.

Svedjel. berg. (Sk.—*Stockh. Ner.* Askersund och i Asker sn. *VG. Dalsl. Boh.* kring Uddevalla; Marstrand, på Koön. *Öl. Gottl.* — N. Arendal. Storöen i Bergens st. vid Leervig, Söndmøer.) *Har dubbelt större blr än föreg. Fröen grundt nällikt gropiga.*

#### 259. ERÓDIUM L'Herit. Skat-näfva.

1 *E. cicutarium* L'Her. bladen parbladigt delade *med n. pardelade* och tandade flikar; blrna i flock; stånd.sträng. [de knappbårande] vid basen vidgade, otandade. ☉ 4—7, r. blr. Fig. FLD.986.

Byar, gat. (Sk.—*Ångml.* och *Jemtl.* Röds sn. *Boh. Öl. Gottl.* — N. till Trondhj.) *Meränd. nedliggande och klubbhårig. — Geranium L.*

2 Flocken *Oxalidese*. Stånd. 10. Fröhus 5rummigt, med centrala fröfästen och flere frön i hvarje rum.

#### 260. ÓXALIS Lin. Har-syra.

1 *O. Acetosella* L. bladen 3fingrade, med omv. hjertlika, helbräddade, håriga småblad; blomskaften från *rotstocken, enblommiga*. 2½ 5, hv. blr. — *β rosea*: blrna rosenröda. — *γ lilacina* Lge: blr ljust gredel. med mörkt violetta nerver. Fig. Sv.B.10. FLD.980.

Skugg. st. a. (Sk.—*Lpl.* — N. till Finn. — *β VG.* Kinnekulle; Göteborg: *Leffl. Södm.* Tvetaberg enl. *Leffl.* — *γ Smål.* Vexjö flerst. *Dalsl.* Gunnarsnäs sn flerst. enl. *Leffl.*) *Växten med rent sur smak; rotstocken ledad, fjällig.*

+2 *O. stricta* L. bladen som föreg., utan stipler; blomskaften från *en upprät stielk, flerblommiga*; fruktskaften icke nedböjda. ☉ 6—9, g. blr. Fig. FLD.873.

Odl. st. r. (Sk. Lund; Malmö; Vegeholm; Åkesholm etc. Växande som ogräs i trädg.; på ballast vid Vestervik.) *O. corniculata* FLD.

3 Flocken *Linese*. Stånd. 4—5. Fröh. 8- ell. 10rummigt, med lika många skiljeväggar, af hvilka hvarannan är ofullkomlig; ett frö i hvarje rum. Fröhvite 0.

#### 261. LINUM Lin. Hör.

1 *L. catharticum* L. stielken upptill klynnegrenad; bladen motsatta, oskaftade och helbräddade, de nedre omv. äggrunda, de öfre aflånga. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.250. FLD.851.

Äng. betesm. a. (Sk.—*VB.* och *Jemtl.* — N. till söd. Finn.: Norm.) *Qvartershög, n. glatt ört med blr i knippen. Var. stundom tumshög, enkel och enblommig.*

#### 262. RADIOLA Roth. Jordknöple.

1 *R. linoides* Roth: stielken ända från basen klynnegrenad; bladen motsatta, oskaft. och helbrädd., äggrunda. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.652. FLD.178. H.N.f.14, n:o 37.

Fukt. sand. r. (Sk. *Blek.* allmän. *Smål. ÖG.* Kaga vid Roxen enl. Kindb. *VG. Verm.* Carlstad m. fl. st. *Boh. Hall. Öl.* — N. Mandal; Romsdalen etc.) *1—2 tum hög, vanl. mycket grenig, med talrika, men ytterst små blr i knippen. — Linum Radiola L. R. millegrana Sm.*



- 43 Fam. **HYPERICINEÆ DC.** Krona regelbunden. Stånd. talrika, med strängarne vid basen förenade i 3 ell. 5 flockar. Pist. med flere stift. Fröth. en- ell. fler-rummigt af skalens invikna kanter, hvilka bära talrika frön. Fröhvite 0.

263. **HYPERICUM Lín.** Johannisört, Mansblodknopp.

† Foderblad med glandler i kanterna; stjelk trind.

- 1 *H. pulchrum* L. stjelken *glatt*; bladen *hjärtlikt omfattande*, trubbiga, *glatta*, *genomskinligt punkterade*; grenbladen *aflånga*, icke omfätt.; foderbl. omv. *äggrunda*, *runadadt trubbiga*, med *oskaftade glandler*. 2½ 7, g. blr. Fig. Sv.B.536. Fl.D.75. H.N.f.7, n:o 30.

Berg vid v. kusten, r. (Hall. vid Björkeris, ofvan Kungsbacka i Töle sn [på många år ej återfunnen: Leffl.]. VG. Sotenäs nära Partilled: Stud. Ax. Belfrage enl. Leffl. — N. Arendal; Christiansand; Lindesnäs; samt derifrån allmän ända upp till Molde. Trondhj. nära Strands kyrka.) *Har solshög, upprät stjelk, med mindre blr än solj. Rodnar lätt vid torkning. Bladen hos denna och alla de solj. helbräddade.*

- 2 *H. montanum* L. stjelken *glatt*; bladen *stjelkomfattande*, *aflånga*—smalt *äggrunda*, trubbiga *glatta*, längs undre kanten *svartprickade*; foderbl. *lancettlika*, *spetsade*, med *långskaftade glandler*. 2½ 7, g. blr. Fig. Sv.B.641. Fl.D.173.

Berg, r. (Sk.—Stockh. och Verml. på spridda lokaler i alla de mellanligg. prov. Götth. — N. Arendal; Christiansand upp till Vårdalen i Trondhj. st.) *Endast de öfre bladen något genomskinligt punkterade; blomknippena hopdragna.*

- 3 *H. hirsutum* L. stjelken *småsluden*; bladen *kort skaftade*, *ovala*—*äggrunda*, trubbiga, *under småsludna*, *genomskinligt punkterade*; foderbladen *aflånga*, med *kortskaftade glandler*. 2½ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.802. H.N.f.11, n:o 37.

Betesmark, berg, r. (Sk. ÖG—Uppl. Uppsalatrakten. Rosl. Norrtelge. Vestml. Fagerön i Granfjärden. VG. Öl. — N. till Trondhj. Gævingåsen. Nordl. Indyr i Gildeskaal och Arstad-åsen i Bejeren: Norm.) *Stj. bladig ända upp till blomsaml.; hos föreg. upptill n. bladlös. De öfre bladen oskaftade.*

†† Foderblad utan glandler; stjelk 4kantig.

- 4 *H. tetrapterum* Fr. stjelken *upprät*, med 4 *hinnaaktiga kanter*; bladen *oval*, *glatta*; foderbladen *spetsadt lancettlika*. 2½ 7, 8, blekg. blr. Fig. Fl.D.640. H.N.f.7, n:o 29.

Fukt. äng. r. (Sk. Ystad; Krageholm; Benestad; Vidtsköffe; Gladsax; Roslät; Resten vid Fogelsång; Landskrona; Helsingborg etc.) *Har mindre och blekare blr än solj. Bladen, isynnerhet de öfre, hos båda mycket gles, genomskinligt punkterade.* — *H. quadrilatum* Wg. Fl.Su. *H. quadrangulum* Sm.

- 5 *H. quadrangulum* L. stjelken *upprät*, med 4, *föga upphöjda kanter*; bladen *äggrunda*, *glatta*; foderbladen *elliptiskt ovala trubbiga*. 2½ 7, 8, brandg. blr. Fig. Sv.B.359. H.N.f.11, n:o 37.

Skogsäng. (Sk.—Ängml. och Jemt. Boh. Öl. Götth. — N. till Lofoden.) *H. dubium* Willd. Sm.

††† Fod. utan glandler; stjelk trind, med 2 upphöjda ränder.

- 6 *H. perforatum* L. stjelken *upprät*; bladen *oval*—*aflånga glatta*, *tätt genomskinligt punkterade*; foderbl. *lancettlika*, *spetsiga*. 2½ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.75. Fl.D.1043.

Back. a. (Sk.—Ängml. Från Gestr. och längre mot norden sälls. och endast vid kusten. Dal. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Götth. — N. till Nordlanden.) *Älnshög, blomrik. Var. med mycket smala blad.*

- 7 *H. humifusum* L. stjelken *nedliggande*, *trådlik*; bladen *aflånga*—*lancettlika*, de öfre *genomskinligt punkterade* och *svartprickiga*; foderbl. *aflånga*, *trubbiga*. 2½ 7—9, g. blr. Fig. Fl.D.141. H.N.f.1, n:o 35.

Fukt. sandåkr. och stränd. r. (Sk. särdeles östra delen, från Ystad till nära Blekingska gränsen, såsom Köpinge; Esperöd; Maglehem; Degeberga; Träne; Västra Vram; Gualöf etc. Kullaberg nära Bärikull. Blek. Sturkö; Agdatorp enl. Goss. Smål. från Kalmar till Paskellaviks g.g.) *Rotstocken bär flere, 3—8 tum långa stjekar; blrna små, ofta ensamma i bladvecken.*

- 44 Fam. **OISTINEÆ DC.** Krona regelbund. Stånd. talrika, fria. Stift 1. Fröh. enrummigt, med fröfästen längs skalens midt, ell. flerrummigt med centralt fröfäste.

264. **HELIANTHEMUM Mill.** Solvända.

- 1 *H. Fumana* Mill. stammen träktigt nedtryckt; bladen utan stipler, upptill skiftevisa, jernbredd syl-rika [barrlika], i kanten något sträffa; blomskäften ensamma, enblommiga, slutl. nedböjda. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D. suppl. 79. H.N.f.4, n:o 48.  
Kalkberg, r. (Gottl. Hangvar och Fleringe; vid Bredsunds fiskeläge i Väskinde; norr om Visborgs kalkugn etc.) Buskväxt med fingerlånga grenar. Fröhus 3rummigt, med lätt från skalen lossnande skiljeväggar. — *Cistus L. Fumana procumb.* Godr. & Gren.
- 2 *H. ölandicum Pers.* stammen träktigt, något uppstigande; bladen utan stipler, motsatta lancettlika eller ovala, trubbad, med hårkantade skaft; blrna i klasar; kronbladen urnupna; fruktskaften utsperrade. 2 6, 7, g. blr. —  $\beta$  *canescens*: bladen under ljust gråbludna. Fig. Sv.B.499. H.N.f.4, n:o 46;  $\beta$  47.  
Kalkberg, r. (Öl. söder om Råpplinge; i norra delen sparsamt. —  $\beta$  Öl. mellan Ottenby och södra Möckleby.) Vanl. fingerlång buskväxt; stund. 1—2 quart. lång, utbredd, mycket grenig och risaktig.  $\alpha$ , som är föga hårig, dock aldrig fullkomligt glatt, öfvergår genom allt mer håriga former, *ciliatum*, *hirtum*, *alpestre* etc., till  $\beta$ . — *Cistus L.  $\beta$  C. canus L. C. Marifolius E.B.*
- 3 *H. vulgare Gärtn.* stammen nedtill något träktigt, med uppstigande grenar; bladen med stipler, motsatta, aflånga, under, vanl. gråbludna; blrna i klasar; kronbl. hela; fruktskaften nedböjda. 2 2 7, g. blr. —  $\beta$  *obscurum*: bladen under gröna. —  $\gamma$  *petraeum*: bladen dubbelt mindre, under vitgrå. Fig. Sv.B.391. Fl.D.101.  
Äpptsback. (Sk.—Gestr. Helsl. Friggensund i Bjuråker. Dal. Ner. VG. Hall. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Sk. Blek. Ronneby. Smål. Ubbemåla i Algutsboda: Scheutz. —  $\gamma$  Öl. Gottl. Hoburgen, och Bogevik i Othem: O. Nordst.) Har stora, n. tumsvida, lutande blr, hos  $\gamma$  dubbelt smärre. — *Cistus Helianth. L. —  $\beta$  H. obscurum Pers.*

- 45 Fam. **VIOLARIÆ DC.** Krona oregelbunden [med sporre]. Stånd. 5, med mer och mindre sammanhängande knappar. Stift 1. Fröh. enrumm., med fröfästen på skalen.

265. **VIOLA Lin.** Viol.

† Blomskäften från rotstocken.

\* Pistillens märke vinkelrätt nedböjdt.

- 1 *V. odorata L.* med krypande grenskott; bladen rundadt hjertlika, tätt naggade, jemte skaften n. glatta och glänsande; blomfoderlikarne rundadt trubbiga; endast det nedersta kronbl. urnupet. 2 4, 5, viol. blr. Fig. Sv.B.8. Fl.D.309. H.N.f.4, n:o 41.  
Lund. gamla park. r. (Sk.—Uppl. Gestr. Gefle, vid Kastet. Ner. Riseberga kloster. Hall. Öl. här och der från Ventlinge till Horn i Högby sn. Gottl. Visby. På Öl. inhemsk, för öfrigt sannolikt endast förvildad. — N. Hardanger.) Blrna mycket väl-luktande; fruktskaft och kronlösa blr lika följ. arts.
- 2 *V. hirta L.* utan grenskott; bladen aflångt hjertlika, tätt naggade, glanslösa, jemte skaften småbludna; foderlikarne trubbiga; alla kronbl. urnupna. 2 5, 6, b. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.543. Fl.D.618. H.N.f.8, n:o 30.  
Lundar. (Sk.—Uppl. Medelp. Siljeberget. Vestml. Ner. VG. Göteborg, i Gamlestads-bergen. Hall. Öl. Gottl. — N.) Rotstocken något tjock, ofta tapplik; blr utan lukt. Har de sednare blrna kronlösa och mycket små, på korta till jorden böjda skaft, men sällande mogen frukt.

\*\* Märket rakt ell. föga böjdt; foderlik. spetsiga.

- 3 *V. umbrosa Fr.* utan grenskott; bladen mycket tunna, hjertlika, glest naggsågade, gles-håriga; kronsporre lång, punglikt vidgad nedåt. 2 5, 6, b. stund. hv. blr. Fig. H.N.f.5, n:o 28.

**Fukt.** st. vid bäckstränd, etc. r. (*Um. Lpm. Jeml.* Åreskutan, vid Mörviksån. *Horjed.* Ulfberget; *E. Collind. Dal.* Falun; Sättersdalen. *Verm.* Kyrkebol i Ny; Ränneberget i Östmark; Strandås och Syssebäck i Dalby sn. *Ängml.* Ramsle och Sollefteå. *Medelp.* Sundsvallsberget; Rösåsberget i Sättna sn m. fl. st. *Helsl.* i Hög och Norrbo sn; Forssa sn: Wistr. — *N.* Fondsfjellet i Merager. Här och der från Vang i Valders och Tofte till Christiania och Porsgrund.) *Rotstocken späd och trådig; bladen med djup och smal inskränning vid basen, tvärr sammandragen spets.* — *V. hirta*  $\beta$  *Wg.* *V. borealis* Weinm.

\*\*\* Märket som i föreg. afd.; foderfl. trubbiga.

- 4 *V. uliginosa* Schrad. bladen *utdraget hjertlika*, glest naggsågade, n. glatta; blomskärmen *ofvan* skaflets midt; kronbladen *aflånga, alla i spetsen intryckta.* 2, 6, viol. blr. Fig. Fl.D.2709. Reich.f.107. H.N.f.5, n:o 27.

Öfversvåmm. stränd. r. (*Uppl.* Dalelven på öar mellan Elfkaröns bruk och Söderfors, såsom Aspen, Ångsön, Björkö, Kallöarne etc.: Örnäs i V. Ryd sn enl. G. v. Ced. *ÖG.* mell. Husbyfjöl och Gistorp. *Smål.* Kalmar län, vid åar i Ljungby. Arby och Madesjö m. fl. snr. *Öl.* mell. Vickelby kyrka och Karlevi hamn enl. Ekstr.) *Utväxta bladen 1—1½ t. breda, 2—2½ t. långa, med djup urskränning vid basen, på undre sidans nerver omärkl. gleshåriga. Har, likasom V. pal., 2 former, den ena med n. dubbelt större blr än den andra.*

- 5 *V. suecica* Fr. bladen *rundadt hjertlika* med kort spets, *det nedersta njurlikt*, glest naggade glatta ell. under glest småhåriga; blomskärmen *ofvan* blomskaflets midt; foderflik. *aflånga; de 4 öfre kronbl. ovala trubbiga, i spetsen hela.* 2, 5, 6, b. blr. Fig. Reich.f.105. H.N.f.3, n:o 29.

Dyga stränd. r. (*Lpl.—Smål.* *Öl.* Resmo. — *N.* Finnm. och Nordl. mångenst.: Norm. Nedalen; Dovre, Drivstuen och Kongsvold. Vang i Valders. Fondsfjellet i Merager.) *Större än följ., från hvilken den knappt torde vara tillräckligt skiljd. Var. med hv. blr. Äfven denna art skjuter nya kronlösa blr på högsommaren från rotstocken liksom V. hirta.*

- 6 *V. palustris* L. bladen *rundadt njurlika*, glest naggade glatta; skärmen *vid eller nedom* blomskaflets midt; foderflik. *ovala; för öfr. som föreg.* 2, 5, 6. Fig. Fl.D.83. H.N.f.8, n:o 31.

\* *epipsila* Led. örten, och blrna större; öfversta bladet med kort spets. Fig. Fl.D.2405. H.N.f.8, n:o 32.

Våt gräsmark, a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* till Finnm.: Norm. — \* *Ängml.* Sollefteå. *Helsl.* *Verm.* Råda sn. *Ner. Södm.* Tveta sn enl. Leffl. *ÖG.* Vinnerstad. *Smål.* Femsjö; Åhs. *Sk.* Lindved m. fl. st. enl. F. Aresch. *Hall.* *Liten, med små blekgredelina, stund. hvita, ådriga blr. Äldre bli bladen mycket större, men alltid släta och glänsande.* \* *Stor som föreg., till hvilken den bildar en tydlig öfvergång, är V. scanica* Fr. *S.V.Sc.* *V. fennica* Nyl.

†† Första blrna från rotstocken; de sedan utvecklade på en bladig stielk, kronlösa.

- 7 *V. mirabilis* L. stielk och bladskafst *längsefter ena sidan* håriga; bladen *njurlikt hjertlika*, med spets, glest naggade; foderflikarne *spetsade.* 2, 4, 5, hvitblå blr. Fig. Jacq. A.t.19. Fl.D.1045.

Lund. (*Sk. Blek.* Ronneby och Vämö. — *Lpl.* Sälls. norr om Uppl. Vestml. och Verm. *Öl. Goutl.* — *N.* till Salten.) *De tidigaste blrna på skafst från rotstocken, med kronbl. samt väl lukande, men ofruktsumma; de, som sedan framskjuta, sitta i bladvecken på en bladbärande stielk och sakna n. alltid kronbl., men utveckla frukt.*

††† Blrna alltid på en bladbärande stielk.

\* Blrna enfärgadt blå ell. hvita.

a — Bladen icke nedlöpande på skafsten.

- 8 *V. silvatica* Fr. bladen *bredt hjertlika*, rundadt naggsågade, *glatta* ell. omärkligt småhåriga, *tunna*, med korta lancettlika stipler; foderflik. *lancettlika* spetsiga, med tvärhuggna bihang, kortare än kronsporen; fröh. *aflångt, glatt.* 2, 5—7. —  $\beta$  *Rivi-*

- niana*: blrna stora i jemf. med örten, med rundade kronblad, hvitgul sporre. Fig. Sv.B.290. Fl.D.1453. H.N.f.6, n:o 25.
- Skogsäng. lund. a. (Sk.—VB. och Jemtl. Öl. Gottl. — N. till Finnm.: Norm.) *Ofta stor, alltid bredbladig; blrna rent blå ell. stund. hvitaktiga. En sednare sommarform är V. canina frustranea Wg. med lång nedligg. stjelk och blr utan kronbl. — V. silvestris Reich.*
- 9 *V. arenaria* DC. bladen *rundadt hjertlika*, naggade, *tätt småludna, blågröna och fasta*, med bredt lancetull. stipl.; foderflik. som hos föreg.; fröb. äggformigt, småludet. 2 4, 5. Fig. Reich.f.142—149. H.N.f.6, n:o 26.
- Hed., sandback. (Sk. Smål. vid Vettern och i öst. del. — Ängml. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) 2—4 tum hög, *lufvadl mångstjeltig; bladen små, afvensom de blåged. blrna: sporren ofta hvit. En n. glatt form bildar öfvergång till föreg. art. — V. Allioni Pio.*
- 10 *V. canina* L. bladen *af långt hjertlika*, rundadt naggågade, *glatta, blågröna och fasta*; stipl. lancetlika ell. aflånga, de nedre alltid kortare än bladskaftet; fröb. *af långt, glatt. 2 5—7, b. stund. hv. blr. Fig. Fl.D.2646. H.N.f.4, n:o 42.*
- \* *montana* L. stipl. aflånga groftandade; kronbladens skifva rundad, sporren af foderbihagens längd. Fig. Sv.B.682. H.N.f.10, n:o 36.
- \* *stricta* Horn. stjelen utdragen upprät; de nedre stipl. af halfva, de öfre af hela bladskaftets längd; sporren meränd. längre än foderbihangen. Fig. Fl.D.1812.
- Skog. back. a. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N. — \* *mont. Lpl.—Gestr. Verml. Blek. — N. — \* stricta* i lundar, helst vid stränder. *Blek. Smål. Kalmar. Södm. Strengnäs etc. Uppl. Gefle flerstädes. Medelp. på Marmens strand i Åu-mar. Dalsl. Björsäter i Gunnarsnäs enl. Lemm. — N. Christiania.) Utmärkt af de mer äggrunda bladen, hvilka hos stricta mycket nära sig dem hos följ. art. Afarterna synas nog afvikande, helst deras yppigare former; men någon bestämbar gräns finnes icke i naturen. Äfven till de 2 föreg. finnas medelformer, ehuru icke så tydliga. — *V. stricta* är *V. nemoralis* Kütz.; och *V. mont.* är *V. Wahlenbergii* Beurl.*
- b — Bladen nedlöpande på de derigenom vingkantade skaften.
- 11 *V. stagnina* Kütz. *glatt*; bladen *äggrundt ell. något hjertlikt lancetlika, small nedlöpande* på skaftet, glest naggade; stiplerna *jembredt aflånga tandade*; kronsporren kägellik; fröb. aflångt. 2 6—8. Fig. Reich.f.208. H.N.f.4, n:o 43.
- Fukt. st. stränd. (Sk.—Gestr. och Vestml. Ner. Verml. Sällsynt längre norr upp till Jemtl. Öl. Gottl. — N. till Salten.) *Vanl. upprät, flerstjeltig; stipl. variera från halfva bladskaftets längd till längre än detta; kronbl. bredt aflånga, mycket lysblå ell. nära hvita. Synes, att döma af Linnés Herb., hafva varit inbegripen i hans V. montana. — V. persicifolia Fr. V.Sc. — Viola lancifolia Thore.*
- 12 *V. pratensis* MK. *glatt*; bladen *lancetlika med äggrund bas, bredt nedlöpande* utföre hela skaftet, glest naggade; stiplerna *lancetlika*, vid basen inskuret tandade, de mellersta på stjelen längre än bladskaften; kronsporren punglik; fröb. äggformigt. 2 7, 8, b. ell. hvitakt. blr. Fig. Reich.t.99,f.c—f. H.N.f.4, n:o 44.
- Fukt. st. på kalkbotten, r. (VG. vid Jarlehus. Öl. Gottl.) *Rotstocken tjock, n. tappformig, flerstjeltig; stjelen än nedliggande, än upprät; sporren jemntjock, kort. — V. lactea Fries H.N.*
- 13 *V. elatior* Fr. *vanl. småluden*; bladen *lancetlika, med något intryckt bas, glest naggade*; stiplerna *mycket stora, bladlika, längre än bladskaftet, aflånga*, vid basen tandade. 2 6, 7, ljusbl. blr. Fig. Fl.D.suppl.68. H.N.f.4, n:o 45.
- Bäckstrand. r. (Öl. ymnigast i Thorslunda vid Skogshy och Tveta; mera spridd i Vickelby, Hulterstad, Runsten samt Kastlösa i stora Dalby skog. Gottl. Storgärdet vid Walls prestg. — N. enl. Hornem.) *Större växt än föreg.; bladen 2 tum långa ell. mera; blrna stora. — V. persicif. Wg.*

\*\* Blrna rent gula ell. flerfärgade.

- 14 *V. biflora* L. stj. *vanl. 2blommig; bl. njurlika, rundnaggade, med små, hinnaktiga, helbrädd. stipler. 2 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.753. Fl.D.46. H.N.f.5, n:o 29.*
- Fjelltr., i bäckdalar. (Lpl.—nor. Helsl. och Dal. Idre. — N.) *Späd, knappt quartershög.*

- 15 *V. tricolor* L. de nedre bladen *hjerterlikt äggrunda*, de öfre lancettlikt *aflånga*, gles och trubbigt sågade, n. glatta; stiplerna *mycket stora*, *lyrformigt flikiga*; sporen af foderbihangets längd. ☉ 4—9. — *β arvensis*: fodret af kronans längd ell. längre. Fig. Sv.B.44. Fl.D.623, *β* 1748.

Berg, åkrar och odl. st. a. (Sk.—Lul. Lpm. och VB. nor. del. — N. till Finnm. Tromsøe.) Var. i hög grad till blrnas färg, vanl. *violetta och gula*, stund. *rent gula eller hvitgula*. Den *rent gulblommiga* anses af Koch och Fries som var. *saxatilis*. — *β: V. arvensis* Murr., har mest gulhvita blr med föga blått.

- 46 Fam. **DROSERACEÆ** DC. Krona regelbunden. Stånd. 5, fria. Stift flere. Fröh. 1- ell. ofullständigt flerrumligt, med fröfästen på skalen.

266. *PARNASSIA* Lin. Visil.

- 1 *P. palustris* L. bladen *hjerterlika*; honingsfjäll *mångstråliga*. 2 7, 8, hv. blr. — *β tenuis*: med omkr. 9stråliga honingsfjäll, mer äggrundt stjelkblad. Fig. Sv.B.172. Fl.D.584. Våta äng. (Sk.—Lpl. — N. — *β Lpl. Ängml.* Junsele sn och vid Fjellsjö. Medelp. Sättna prestg. Gottl. — N. Öst-Finm. mell. Gornitak och Bunæs.) Stjelkbladet omfattande den enblommiga stjelken; rotbl. skafade. *β* spådare med liten blomma.

267. *DRÓSERA* Lin. Daggört, Sileshår.

- 1 *D. rotundifolia* L. blomstängeln *upprät, betydligt* högre än bladen; dessa *runda*, med bredden större än längden; frön omgifna af en *lös och slät* hinna. 2 7, hv. blr Fig. Sv.B.688. Fl.D.1028. Kärr, a. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N.) Omkring *quartershög*. Bladen hos alla arterna hafva i kanterna *långa röda glandelbärande hår*, som utsippra en *kläbbig vätska*; blrna öppna sig endast i solen.

- 2 *D. longifolia* L. stängeln som hos föreg.; bladen *tung- ell. spadlika*; fröen som hos föreg. 2 7, hv. blr. — *β obovata*: bladen *spadlika* [ell. hälften så breda som långa]; märkena urnupna. Fig. Sv.B.689. Fl.D.1093; *β* 2715. H.N.f.5, n:o 30; *β* n:o 31.

Kärr. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finm. — *β Smål. — Ängml. VB.* Nilsmyran vid Björkforss. Lul. Lpm. Storholmen m. fl. st. Ands. Boh. i Krokstad sn: Lem. Hall. Hasslöf: Theor. Gottl. Sällsyntare i de vestra prov. — N. Christiania m. fl. st.) Stängeln 3—6 tum hög; bladen hos *a*, utom skafen, n. *tumslånga*; hos *β* kortare och bredare, närmande sig till följ., men till alla delar större. — *D. anglica* Sm. *β D. obovata* Koch och H.N.

- 3 *D. intermedia* Hayne: stängeln *uppböjd, knappt* högre än de omv. äggrunda eller spadlika bladen; fröens skal *fast och grynprickigt*. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.D.2108. H.N.f.5, n:o 32.

Kärr. (Sk.—Lpl. — N.) Stängeln ofta kortare än bladen, stundom något längre, sällan 2 tum hög, fröen svartbruna, mycket knottiga, saknande den lösa hinnan, som finnes hos de föreg.

47 Fam. **SILENACEÆ** *Braun.* Fodret sambladigt, upptill tandadt. Kronbl. 5, likform., med lång klo, jemte de 10 ståndarne fästade på ett under pist. förlängdt fäste. Fröb. af ett, eller flere ofullkomliga rum, med upptill fritt centralfäste.

1 Flocken **Lychnidese.** Fröhus af 3—5 skal och med lika många stift.

268. **SILÈNE** *Lin.* Glim.

† Blomfodret uppblåst äggformigt: *Behen L.*

1 *S. inflata Sm.* stjelken mer och mindre *upprät*, med *kllynnedeladt* blomknippe; skärmb. *hvita, hinnaktiga*; fodret glatt, nätådrigt, med spetsiga tänder; kronbladens skifva 2klufven nedom midten. 24 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.914.

Äng. a. (Sk.—*Lpl.* — *N.* till Finnm.) *Ofta alnshög blågrön*; kronbladen utan märkliga bikronblad, endast med ett par oydliga knölar vid skifvans bas. — *Cucubalus Behen L.*

2 *S. maritima With.* rotstocken meränd. bärande *talrika, nedliggande*, vid blomningen uppstigande, 1—3blommiga stjelklila grenar; skärmb. *gröna, örtartade*; fodr. som föreg.; kronbls skifva till ell. något nedom midten 2klufven. 24 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.857. H.N.f.4, n:o 51,52.

Grus. hafsstr. (Sk.—*Boh.*—*VB.* Haparanda skärg. Öl. mell. Vickleby och Resmo. — *N.* till Finnm.) *Rotstocken vanl. ljoct, djupt nedligg. bland stenarne, uppåt smal, grenad i flere slaka, ofta risaktigt nedligg. grenar; bladen smalare och köttigare, blrna färre och större än hos föreg.; kronan än med små fjäll-likå bikronblad, än blott med knölar som föreg., ehuru något större.*

†† Fod. cylindriskt ell. utdraget aflångt: *Viscago Fr.*

3 *S. nutans L. småluden*, säll. *glatt*; rotbladen bredt tunglika; stjelkbl. smalt lancettlika; blomknippet med motsatta, *utdragna* grenar. *lutande* blr; kronbladsskifvan 2delad, med 2 *syl-likå* bikronblad vid basen. 24 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *glabrata*: *glatt*. Fig. Fl.D.242. H.N.f.4, n:o 50.

Backar. (Sk.—*VB.* nor. del. *Dal. Verm. Dalsl. Öl. Gottl.* — *N.* —  $\beta$  *Sk. Öl. Gottl.*) *Upptill något klubbhårig.* —  $\beta$  *S. infracta Kit.*

4 *S. viscosa Pers. klubbhårig*; bladen lancettlika, i kanten *vågiga*; knippe n. *axligt*, med motsatta korta, 1—flerblomm. grenar; fodertänder *trubbiga*; kronbladsskifv. djupt 2klufven utan bikronblad. 24 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1209. H.N.f.13, n:o 53.

Hafsstr. r. (Blek. Utklipporna.—*Rosl.* Grisslehamn på skären. Öl. vid Holmudden i Böda sn.) *Upprät enkel, mycket tätbladig och högst klubbig växt.* — *Cucubalus L.*

5 *S. noctiflora L. klubbhårig*; de nedre bl. omv. äggunda, de öfre lancettlika; blrna 1—2, ell. i *kllynnedeladt* knippe i stj:s spets; fodret 10nervigt, med *långa syl-likå* tänder; kronbladsskifv. 2klufven, med 2, *tvårhuggna* bikronbl. vid basen. 24 7, 8. Fig. Fl.D.2470. H.N.f.9, n:o 37.

Åkr. och odl. st. r. (Sk.—*Uppl. Gestr.* vid Lärkbo. *Jemtl. Åreskut.* vid Mörviken. *Dal. Vestml.* sydöstra del.; *Sala. Ner.* Vinteråsa och Tysslinge. *Verm. Råda sn*, enl. Lem. *Dalsl.* i Ed sn. *Boh.* Lindö; *Uddevalla, Kuröd. Öl. Gottl.* — *N.*) *Var. enkel och med stort knippe af hvita, ell. i synnerh. utanpå rödlåtta blr.* — *Melandrium Fr.*

††† Fod. uppåt vidgadt ell. båglik: *Atocion Fr.*

6 *S. rupestris L.* vanl. tufvad, med *uppråta* stjelkar; bladen *bredt lancettlika, glatta*; blrna i *kllynnedeladt knippe*; kronbl. urnupna; fröh. omv. äggformigt, *fåga* utskjutande ur fodret. 24 7, hv. blr. Fig. Fl.D.4. H.N.f.14, n:o 39.

Berg. r. (*Lpl.*—*Smål.* Kalm. läns nor. del samt Femsjö och Rستهled i Jönk. län. *Blek. Carlshamn. VG. Boh. Hall.* — *N.* Finnm. — *Christiania och Skien.*) *Skall genom grenskott stundom bli flerårig.*

7 *S. acaulis L.* tufvad, med *nedligg.* ell. *uppböjda* stjelkar; bladen *smalt jemnbreda*—*n. syl-likå, härbråddade*; blrna *ensamma* i bladvecken; kronbl. urnupna; fröh. n. cylindr., *långt* utskjutande. 24 7, r. säll. hv. blr. Fig. Fl.D.21 [♂]. H.N.f.14, n:o 40; f.15, n:o 39.

Fjellv. (*Lpl.*—*Herjed.* — *N.*) *Växer i ofta vidsträcktå 1—2 tum höga, lifligt gröna mattor; blrna meränd. 2byggare, honblrna smärre.*

269. *MELANDRIUM* Röhl. Klint-blåra.

- 1 *M. silvestre* R. luden af långa mjuka hår; bladen ovala—aggrunda, kortspetsade; honblommans fodertänder utdraget aggrunda, spetsade. icke nående öfver fröhuset. 2½ 5—8, r. säll. hv. blr. Fig. F.I.D.2172.
- \* *crassifolium* Fr. lågväxt, med lancettlika, tjocka, mjukludna bl.; blrna i hopdraget knippe. Fig. H.N.f.16, n:o 43.
- Lundar, \* stränd. (Sk.—Lpl. Öl. — N. — \* N. på kusten vid Christiansand.) Bladen var. till formen, men äro n. alltd bredare i jämf. med längden än hos följ.; blrna luklösa, var. i Norrl. blekröda: var. *carneum*, samt i Finnm. rent hvita: *lacteum*. — *M. diurnum* Fr. *Lychnis dioica* L. L. silv. Schk.
- 2 *M. pratense* R. kort gråhudn; bladen lancettlika, långspetsade; honblommans fodertänder från något bredare bas utdraget jemnbreda, nående öfver fröhuset. 2½ 7, 8, hv. säll. rödl. blr. Fig. F.I.D.792.
- Åkr. odl. st. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Öl. Goutl. — N.) Blrna stora, vanl. snöhvita och vålluktande, särdeles om afsnarne, då de mest öppna sig, hvaras namnet *Lychn. vespertina* Sibth. — *Mel. vesp.* Fr. *Lychnis dioica* β L. L. prat. Schk.

270. *VAHLBERGELLA* Fries. Fjellklint.

- 1 *V. apetala* Fr. stielken enblommig; bladen lancettlikt jemnbreda; kronbladen föga längre, slutt. kortare än det upplåst äggformiga fodret; fröen med vidgade upp-svållda kanter. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Lin.F.I.L.t.12,f.1. Wg.F.I.L.t.7. F.I.D.807. H.N.f.11, n:o 39.
- Fjellv. r. (Torn. Lpm. Lul. Lpm. vid Alkaware och Wirihau, samt Kallowarats vid Rovejaure enl. H. Widm. — N. Finnm. och Nordl.; Dovre; Tyedalsfj.; Tronsfjellet etc.) Vid blomm. ett par tum, slutt. quartershög ell. mera, med 1, säll. 2, lutande blr, upprätt frukt. — *Lychnis L. Melandrium* ed.9.
- 2 *V. affinis* Fr. stj. 1—3blomm.; bladen som hos föreg.; kronbl. betydligt längre än det aflånga, icke upplåsta fodret; fröen bredt hinnkantade. 2½ 7, 8. Fig. F.I.D.2170. H.N.f.9, n:o 36.
- Fjelltr. r. (Torn. Lpm. på fjellet Nuljalaki vid Torn. Träsk. — N. Finnm. Bossekop, vid Rajpas: Th. Fr.; samt i fururegionen längs efter Alten elv.) Lik föreg., men spåddare, med upprätta blr och frukt, lätt omsluten af fodret. Kronbl. hvita ell. rödlåta. — *Lychn. affinis* J. Vahl. L. triflora F.I.D. *Melandr.* ed.9.

271. *VISCARIA* Röhl. Tjårblomma.

- 1 *V. vulgaris* R. stielkens öfre ledstycken linaktigt klubbiga; bladen n. jemnbreda, de öfre ulliga i kanten; kronbl. hela ell. grundt urnupna. 2½ 6, 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.672. F.I.D.1032.
- Ängsback. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Boh. Öl. Goutl. — N.) Blrna gytttrade. Var. i Blek., der den växer tills. med följ., med djupare urnupna kronblad, och glattare stielblad: *V. purpureo-alpina* (media) Fr. H.N.f.15, n:o 38. — *Lychnis viscaria* L. *V. purpurea* Fr.
- 2 *V. alpina* Fr. stielken glatt [icke klubbig]; bladen jemnbreda, glatta; kronbl. 2klufna. 2½ 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.693. F.I.D.65. H.N.f.9, n:o 35; f.4. n:o 49 [var.].
- Back. stränd. m. m. helst i fjelltr. (Lpl.—Dal. och Helsl. söd. del. Vestml. Bjurfors i Norberg. Boh. Koön. Hall. Marbäck i Snöstorp enl. Theer. Södm. Hökberget i V. Vingåker sn. Blek. Jemjö och Thorhamn m. fl. snr; Nätraby på Mycklamoberget. Öl. på södra Alvaren etc. — N. Finnm. ned till Kongsberg, på Jonsknuden.) 6—10 tum hög med smärre blr än föreg. Var. på Öl. med låg och spenslig ört: var. *petraea* Fr. S.V.Sc. — *Lychn. alpina* L.

272. *LYCHNIS* Lin. Gök-blomma.

- 1 *L. Flos cuculi* L. stielken sträf; bladen lancettlikt jemnbreda, glatta; blrna i klynnegrenigt knippe; kronbladens skifva 4delad. 2½ 7, r. säll. hv. blr. Fig. F.I.D.590.
- Fukt. äng. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Boh. Öl. Goutl. — N. till Lofoden och Tromsöe.) Vanl. alnshög med glest blomknippe.

273. *AGROSTEMMA* Lin. Kläut.

- 1 *A. Githago* L. stråfluden; bladen smalt jemnbreda; foderlikarne smalt lancettlika,

meränd. längre än de omv. hjertlika kronbladen. ☉ 7, r. blr. Fig. Sv.B.448. Fl. D.576.

Åkrar. (Sk.—söd. Lpm. — N.) *Vanl. alnshög, med stora vackra blr. Var. 6—7 tum hög, enblommig med dubbelt mindre blomma, korta foderflikar: var. nana. — Lychnis Gith. Koch. Githago segetum Ledeb.*

2 Flocken **Dianthese.** Fröh. af 2 skal och med 2 stift.

274. SAPONARIA Lin. Såpört.

† 1 *S. officinalis* L. bladen äggrundt lancettlika; blrna i qvastlikt knippe; fodret glatt. 2 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.338. Fl.D.543.

Od. st., helst gamla kyrkogård. r. (Sk.—Uppt. Vestml. och Ner. Boh. Hall. Öl. Götll. — N. Skien.) *Fordom odlad, nu förvildad.*

275. DIANTHUS Lin. Nejlika.

† Kronbladen odelade.

1 *D. Armeria* L. småluden; bladen jemnbreda; blrna *talrika, i tätta qvastlika knippen*; foderholklbladen 4, lancettlikt *syl-lika, n. af blomfodrets längd*; kronbl. i spetsen *svagt tandade*. 2 7, 8, mörkr. blr. Fig. Fl.D.230. H.N.f.16, n:o 42.

Åkrar, lund. och betesm. r. (Sk. Blek. Skärva; Nettraby. Smål. nor. del. af Kalm. län. OG. här och der i öst. slättbygden: Kindb. Stockh. Tyresö; Munsön. Boh. Koön, vid Halsen: Stud. Thorstenson; Oroust; S. Koster; samt Holl. Släp sn enl. Leml. Öl. Borgholm; Resmo m. fl. st. Götll.) *Vanl. 2—3 qv. hög.*

2 *D. deltoides* L. fint småluden; bladen jemnbreda; blrna *få [1—4] och åtskiljda*; foderholklbladen *vanl. 2, äggrunda* spetsiga, *mycket kortare än fodret*; kronbladen i spetsen *djupt tandade*. 2 7, 8. — *β glaucus*: blågrön; foderholklbladen *merändels 4, de nedre slutl. fränskiljda*; blrna *hvitaktiga*. Fig. Sv.B.477. Fl.D.577. *β* H.N. f.7, n:o 31.

Äng. etc. a. (Sk.—Jemt. och Ängml. Öl. Götll. — N.) *6—8 tum hög, vanl. med röda blr. — β D. glaucus* L.

†† Kronbladen mångklufna.

3 *D. arenarius* L. tufvig, af *talrika grenskott och mest enblommiga* stjelkar; stjelklbl. smalt jemnbreda, *icke bredare än stjelken*; foderholklbl. äggrunda kortspetsiga; kronbl. håriga. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.613. Fl.D.suppl.72. H.N.f.1, n:o 37.

Sandfält, r. (Sk. Ljungby till Cimbritsbamn; Käflinge; Malmö etc. Blek. Sölvisborg. Hall. Boh. på Otterö.) *Quartershög n. glatt; kronbladen stundom n. glatta på insidan, vålluktande.*

4 *D. superbus* L. tufvig af *glesa grenskott och upptill meränd. greniga och flerblommiga* stjelkar; stjelklbl. jemnbredt lancettlika. *mycket bredare än stj.*; foderholklbl. och kronbladen som hos föreg. 2 7, 8, ljusr. blr. Fig. Sv.B.436. Fl.D.578.

Ängsmark, r. (Sk. vest. Vram; Löddeköping; Bosarp; Lund etc. Hall. Laholm; Eldsberga; Snöstorp och Knäred enl. Theor. VB. Tornio. — N. Finnm. Porsanger och Varanger; Tanafjord: Norm.) *Folshög, med något lancettlika rotblad, svag lukt. Var. på hafstr. lågväxt, med en ell. 2, hv. blr: β pumilus ed.9., D. plumarius Gunn. och Vahl. enl. Fries.*

276. TUNICA Scop. Höls-nejlika.

1 *T. prolifera* Sc. bladen jemnbreda; blomhufvudet ovalt. ☉ 7, ljusr. blr. Fig. Fl.D.221. H.N.f.2, n:o 44.

Sandback. och torra st. r. (Sk. Kåseberga, samt deremell. och Sandhammar enl. F. Aresch.; fordom äfven nära bäcken, som skiljer Raflunda och Torups egor. OG. Stenbro i Dagsberg och Hjortstorp i St. Johannes sn enl. Kindb. Öl. Resmo; Borgholm, samt på Holmudden. Götll. Visby; Ålskog i Kräcklingbo; Thorsborg; lilla Carlön etc.) *Mest enkel stjelk med ett blomhufvud af torra, färglösa skärblad, små, föga utskjutande kronblad. — Dianthus prolifer* L.

277. GYPSOPHILA Lin. Fänting, Såprot.

1 *G. fastigiata* L. stjelken *upptill grenad*; bladen n. jemnbreda. trubade; blrna i *tätta, qvastlika knippen* med *korta, klubbhåriga* skaft. 2 7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.4, n:o 53.



Torra st., sandfält, r. (Sk. vid Snogeholmsjön; mell. Snogeholm och Tågra, samt mell. Söfde och Söfdeborg: F. Aresch. Dal. mell. Mora och Garberg. Öl. Gottl.) 6—10 tum hög, tuffad vid roten; var. på Gottl. mer glesblommig: *G. arenaria* Kit.

- 2 *G. muralis* L. stjelen ända från basen mycket grenig; bladen syl-likl jemnbreda; blrna åtskiljda, på utdragna, glatta skaft. ☉ 7, 8, rödl. blr. Fig. Fl.D.1268. H.N. f.15, n:o 40.

Torra st. r. (Sk.—ÖG. Stockh. vid Edsviken. Uppl. Öfvergran, nära Varpsund; Sigtuna; Uppsala vid Alsike. Hede. Arbrå sn: J. A. Wistr. Vestml. Vesterås; Badelunda sn flerst. VG. Hall.) Sällan mer än 2—4 tum lång, utstående grenig, med små blr på n. hårfinna skaft. Var. med urnupna [*G. serotina* Hay.] och hela kronbl. på samma stjeln.

- 48 Fam. **ALSINACEÆ** Bartl. Fodret fribladigt. Kronblad likformiga, med kort klo, stund. inga. Stånd, af samma ell. dubbelt så stort antal som foderbl. Fröh. som föreg. fam. med fritt fröfäste.

- 1 Flocken **Stellariæ**: blad utan stipler. Fröh. öppnande sig med dubbelt så många skal som stift.

### 278. MALACHIUM Fr. Vatten-ärv.

- 1 *M. aquaticum* Fr. stjelen slak; bladen hjertlikt ägrunda, de öfre stjelkomfattande; blrna i stjelen spets, samt i de öfre blad- och grenveckan; fröh. n. klotrundt. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1337. H.N.f.6, n:o 27.

Stränd. fukt. st. (Sk.—Gestr. och Dal. Boh. Gottl. Visby gamla hamn, engång funnen. — N. sällsynt; Christiania och på Ringerige.) Bladen stundom tumsbreda, de nedre ofta skaftade. — *Cerastium* L. *Larabrea* DC.

### 279. STELLARIA Lin. Stjernblomma.

† Bladen ägrunda ell. hjertlika, de nedre skaftade.

- 1 *S. nemorum* L. stjelen vanl. upprät, öfverallt småluden; de nedre bladen hjertlika, de öfre oskaftade ägrunda spetsade; blomknippet i stjelen spets; kronbladen klufna nedom midten, längre än fodret. 2 6, hv. blr. Fig. Fl.D.271. H.N.f.6, n:o 28. Bäckdalar etc. r. (Sk.—Lpl. Mest i de vestra prov. — N. till Finnm.) Stor, med mer än en tum breda, 2 t. långa blad.

- 2 *S. media* With. stj. vanl. nedliggande, ensidigt hårig; alla bladen ägrunda ell. ovala; blrna både i stjelen spets och i bladveckan; kronbl. 2delade, kortare än fodret. ☉ 4—10, hv. blr. — *β neglecta*: större, med längre kronbl., 10 ståndare. Fig. Fl.D.525; *β* 438.

Od. st. etc. a., *β* skog. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. — *β* Sk.) Bladskafen vingkantade; hufvudformen har oftast 3—5 ståndare. — *Alsine media* L. *β St. neglecta* Weib.

†† Bladen smala, alla oskaftade; kronbl. till midten 2klufna; fröh. klotrundt.

- 3 *S. holostea* L. bladen smalt lancettlika långspetsade, i kanten sträfvä; blrna i knippe i stjelen spets; kronbl. längre än de nervlösa spetsiga foderbladen; frön mycket stora och taggiga. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.2650. H.N.f.16, n:o 45.

Lundar, r. (Sk.—ÖG. och Boh. Öl. — N. Stavanger, Findöe, Vigefjell, Norrfjord etc.) Har stora blr; bladen sträfvä af korta, styfva hår i kanterna; fröen stora som små hamfrön, tätt taggiga af höga trubbiga vårtor.

††† Bladen som i föreg. afd.; kronbl. n. till basen 2delade; fröh. aflångt—äggformigt.

\* Blomskafen med hinnaktiga skärmbld.

a — Kronbl. märkbart längre än foderbl.

- \*4 *S. longipes* Gold. stj. nedliggande med långa, uppräta grenar; bladen lancettlika—

- jernbreda; blrna i fåblommigt knippe på långa, uppräta skaft i grenarnes spets; foderbl. äggrunda—afånga, *otydligt* nerviga; fröh. *mycket längre* än foderet; fröen *slåta*. 2? 7, hv. blr. Fig.
- Fjelltr. r. (N. Finnm. »Talvig, på Wassbottenfjellets fuktiga afsatser, ej långt från den stora permanenta snödrifvan»: J. E. Zett.) *Varierar i hög grad, glatt ell. småluden, rent ell. blåaktigt grön. Bladen styfva, mycket kortare än hos följ., ofta lussittande.* — S. Edwardsii Br.
- 5 *S. palustris* Retz. stjelen meränd. *upprät*; bladen jernbreda; blrna i knippe i stjelen spets; skärmb. glatta; foderbl. äggr. lancettlika långspetsade, *upphöjdt* 3nerviga; fröh. *knappt längre* än foderet; fröen *grynprickiga*. 2, 6, 7, hv. hlr. —  $\beta$  *micropetala* Kr. kronbl. små, icke längre än foderbl. Fig. Fl.D.2115. H.N.f.7, n:o 33.
- Fukt. äng. stränd. (Sk.—Angml. Dal. Verm. Boh. Öl. — N. —  $\beta$  Stockh. på Ellgarn: Krok.) *Var. rent grön: S. Dilleniana Mönch, samt blågrön: S. glauca With., hvilken sednare är vanligast. Blrna mycket större än hos följ.*
- b — Kronbl. af foderbladens längd, ell. kortare.
- 6 *S. graminea* L. stjelen slak; bladen som hos föreg.; blrna i knippe i stjelen spets; skärmb. *hårbräddade*; foderbl. *som hos föreg.*; fröh. *längre än foderet*; fröen *grynprickiga*. 2, 6—8, hv. blr. Fig. Fl.D.2116.
- Äng. etc. a. (Sk.—VB. och Lpl. — N.) *Bladen med föga smalare, ofta något hårbräddad bas, stund. mera tunna och platta:  $\beta$  juncea; kronbl. än af foderets längd, än något längre; hela blomman dock alltid mindre än hos föreg., med hvilken denna är mest beslägtad.*
- 7 *S. Friesiana* Ser. stjelen slak, upptill vanl. sträf; bladen platta, jernbreda, med *smalare*, hårbräddad bas, i kanten sträfva; blrna *som hos föreg.*, ell. i de öfre bladvecken; skärmb. *glatta*; foderbl. *otydligt* 3nerviga; fröh. *n. dubbelt längre* än foderet; fröen *glänsande slåta*. 2, 6—8, hv. blr. Fig. Sv.B.506. Fl.D.suppl.1,t.16. H.N.f.2, n:o 45.
- \* *alpestris* Fr. stjelen glatt, bladen med något bredare bas. Fig. H.N.f.7, n:o 34.
- Fukt. skog. (Sk.—VB. och Lpl. — N. till Finnm. — \* Torn Lpm.) *Till alla delar späddare än föreg., med smärre blr, hvilkas foder knappt visa spår till nerver före fruktens utbildning, då de vanl. blifva tydligare.* — *S. longifolia* Fr. \* *S. alpestris* Fr. S.V.Sc.
- 8 *S. uliginosa* Murr. stjelen uppstigande, glatt; bladen *afånga—lancettlika, något tjocka, blågröna*, vid basen hårbräddade; blomskafven *ensamma i bladvecken ell. i små glesa knippen*; skärmb. *glatta*; foderbl. *som hos föreg.*, längre än kronbl.; fröh. *af foderets längd*; fröen *grynprickiga*. 2, 5—8, hv. blr. Fig. Fl.D.2535. H.N.f.3, n:o 32.
- Källdrag etc. (Sk.—Medelp. och Herjed. Boh. Öl. — N. till Finnm. Tromsöe.) *Vanl. lågväxt, bräcklig, med blomknippena oftast i bladvecken.*
- \*\* Blomskafven vanl. i öfre bladvecken, alltid utan hinnaktiga skärmb.
- 9 *S. borealis* Big. stjelen slak, vanl. uppstigande; bladen *smalt lancettlika, tunna*, vid basen hårbräddade; foderbl. *spetsiga, längre* än de snart afallande kronbl.; fröh. *mycket längre* än foderet; fröen *slåta*. 2, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.2535. H.N.f.3, n:o 31.
- Fukt. st. i fjelltr. (Lpl.—Herjed. Angml. Täsjöby; Ramsel sn, Vikens fåbodar: Arn. — N. Finnm. — Dovre; Trysilfjell i Österdalen; Christianiatrakten, nära Tyri-fjorden: Åx. Bl.) *Grön, spädd, med små, ofta felande kronblad. Då blrna någon gång sitta i knippe, tillkomma skärm, men gröna och liknande förkrympta örtblad.*
- 10 *S. crassifolia* Ehrh. stjelen slak och uppstigande ell. upprät; bladen *afånga—ägrundt lancettlika, glatta, något tjocka* och spröda; foderbl. *spetsiga, kortare* än kronbl.; fröh. *som hos föreg.*; fröen *knoltriga*. 2, 7, hv. blr. —  $\beta$  *subalpina*: n upprät; med blomskafven i gles knippe; bladen lancettlikt äggrunda. Fig. Fl.D.2114. H.N.f.5, n:o 33;  $\beta$  f.11, n:o 41.
- Hafsstr.  $\beta$  helst i fjellen, r. (Sk.—Boh. Öl. Högsum sn. Gottl. Kyles hamn. VB hafsstr. nära Sangiselfvens udl. — N. till Finnm. —  $\beta$  Torn. Lul. Pil. Lpm. Angml. Täsjö sn. VG. vid Barnesjön i Åsaka sn, Vartofta härad. — N. Dovre vid Tofte och Jerkind.) *Var. i hög grad och är vanl. 5—6 t. hög, stund. föga mer än*

tumshög; mest skiljd af de utskjutande kronbladen och de något köttiga, styfva örtbladen.

- \*11 *S. humifusa* *Rollb.* stjelen ända från basen delad i talrika, nedligg. ell. uppstig. grenar; bladen aflånga—ovala, glatta, något tjocka; foderbl. aflånga trubbiga, föga kortare än kronbl.; fröb. af fodrets längd; fröen släta. 2 7, 8, hv. blr. Fig. *Vet. Ak.H.1789,t.6,f.1. H.N.f.8, n:o 35; f.12, n:o 52 [var.]*.

Ishafvets kust, r. (N. Finnm. Varanger, Tana- och Ältenfjord; Hammerfest etc. ned till Hardanger i Bergens st.) Liknar stundom föreg:s smärre, mer bredbladiga former.

## 280. *CERASTIUM* *Lin.* Hönsarv.

† Kronbladen betydligt [omkr. dubbelt] längre än fodret.

\* Stjelen fåblommig.

- 1 *C. alpinum* *L.* stjelen 1—3blommig, meränd. ludna; bladen aflånga; skärmbladen med hvit hinnaktig spets; stift 5; fröb. cylindriskt, krökt, med små grynprickiga frön. 2 7, 8, hv. blr. Fig. *Sv.B.745. Fl.D.6; 979 var. H.N.f.3, n:o 33.*  
Fjelltr. a. (*Lpl.—Dal. Medelp. Randklöfven. VG. Hunneberg. — N.*) Enkel, ell. grenad vid roten i flere, vanl. 2blommiga stjekar. Var. glatt: *glabratum*, och tjockt ullhårig: *lanatum*.

- 2 *C. latifolium* *L.* stj. som föreg., glandelhåriga; bladen ovala—aflånga; skärmbl. n. helt och hållet gröna; stiften 5; fröb. smalt äggformigt, rakt, med stora, på ytan rynkiga frön. 2 7, 8, hv. blr. Fig. *E.B.473. H.N.f.9, n:o 29.*  
Fjellv. r. (*Torn. Lpm. på fjellen Ripanes och Nuljalaki vid Torn. träsk. Lul. Lpm. Qvikkjokk, Njuonjes vid Tarrejokk; Wiribaure; Rovejaure: H. Widm. Pit. Lpm. Tjiddjokk. — N. Finnm. Tromsø; Tsatsa. Dovre, på Finnsjø och Knudshø; vid Stölan och Nystuebäcken; Fogstuen; Joradalen etc.*) Mer tuffig och nedliggande än föreg.; blrna större, med längre kronbl.

- 3 *C. trigynum* *Vill.* stj. nedligg. 1—4blomm., n. glatta, med finhåriga blomskäft; bladen aflånga, något spetsade och rigtade åt en sida, glatta; skärmbl. utan hinnkant; stiften meränd. 3; fröb. uppåt smalare, n. rakt, med frön som hos föreg. 2 7, 8, hv. blr. Fig. *Sv.B.744. Fl.D.92. Fl.N.2,t.6,f.2. H.N.f.7, n:o 35.*  
Fjellv. (*Lpl.—Dal. Gröfvelsjön i Idre. — N.*) Har stundom 4 ell. 5 stift. Är för öfrigt spädare och mer glänsande mörkgrön än de föreg. — *Stellaria cerastoides L. C. stellarioides Ed.1.*

\*\* Stjelen mångblommig.

- 4 *C. arvense* *L.* stj. grenig, vanl. småluden; bladen lancettlikt jemnbreda spetsade; skärmbl. med hvit hinnkant; fröb. något krökt. 2 7, 8, hv. blr. Fig. *Fl.D.626. H.N. f.15, n:o 41.*

Torra st. (*Sk.—Uppl. Verml. Dalsl. Åmål: Stud. Thorstenson. VG. mell. Falköp. och Ranten, samt i Slöta enl. Nordst. Öl. Götll. — N. Christiania till Romsdalen.*) Vanl.  $\frac{1}{2}$  aln lång, mångstjelig, med kronbl. mer än dubbelt så långa som fodret; bladen mer och mindre finkludna, ända till stråfludna, stund. n. glatta.

†† Kronbl. föga eller icke längre än fodret.

\* Med grenskott vid rothalsen.

- 5 *C. vulgatum* *L.* stjelen nedligg. ell. uppstigande, småluden; bladen äggrundt lancettlika ell. aflånga; skärmbl. hinnkantade; kronbladen 2klufna; fröb. krökt, dubbelt längre än fodret; fröen öfverallt grynprickiga. 2 ☉ 6—8, hv. blr. —  $\beta$  flisforme: enårig, trådsml n. upprät, 1—4blommig. Fig. *Fl.D.1645. H.N.f.10, n:o 40; f.15, n:o 42, var.*

\* alpestre: örtbl. n. ovala; kronbl. utskjutande. Fig. *Sturm. 63 häft.*

Allmän. (*Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  N. Buskeruds fögd. vid Sorteberg. — \* Torn. Lpm. allmän. Lul. Lpm. Quikkjokk. Jemtl. Frostviken sn. på Mejsklumpen. — N. Finnm. — Dovre.*) 1—2 qv. lång, meränd. med kort hårighet, men var. öfven i söd. Sv. glatt: *holosteoides [H.N.f.15]*, på Götll. stråfluden: *anomalum*, och i fjelltr. klubbhårig: *viscidum*; bladen stundom mycket smala, n. jemnbreda. — *C. viscosum* *Sm. E.B. och Wg.Fl.L. C. vulgare* *Hn. C. triviale* *Link.*

## \*\* Utan grenskott.

a — Fröh. krökt, dubb. längre än fodret.

- 6 *C. viscosum* L. stj. meränd. upprät, kljtbluden af långa hår; bladen rundade eller ovala; skärmb. utan hinnkant; kronbl. 2flikiga, af fodrets längd; fröh. kort skaftade; fröen i kanten grynprickiga. ☉ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1931. H.N.f.14, n:o 41.  
 Fukt. gräsväxta st. (Sk.—Hels. Ängml. Nyland i Ytter-Lännäs och Ulånger sn. Dal. Verml. södra delen. Boh. Hall. Öl. — N. till Opdal i Trondhjems st.) Var. större och mindre, samt utan kronbl.: apetalum, då stånd. oftast äro blott 5; blrna i början lätt gyttade, vid fruktmogn. åtskiljda; fröen på sidorna n. släta ell. omärkligt prickiga. — *C. vulgatum* Lin. herb. och Sm. i E.B. *C. ovale* Pers. *C. glomeratum* Thuill..

b — Fröh. n. rakt, föga längre än fodret.

- 7 *C. brachypetalum* Desp. stj. meränd. upprät, jemte de aflånga ell. äggrunda bladen och blomfodret stråfhårig; skärmb. utan hinnkant; kronbl. 2flikiga, kortare än fodret; fröhs skaft långa, i spetsen krökta; fröen öfverallt, men glest prickiga. ☉ 5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.2536. H.N.f.1, n:o 38.  
 Back. torra st. r. (Sk. Gladsax-hallar; Cimbritshamn; Lund vid Fogelsång m. fl. st. Blek. Carlskrona på Vemmö; Ronneby vid Bustorp etc. Smål. i Tryserums och Malmbackas snr. ÖG. Gusum: Kindb. Södm. Bränningeklunt enl. Leffl. Hall. Öl. Borgholm. Götll.) Quartershög eller mera. Blr tidigt, såsom de följ. — *C. strigosum* Fr.  
 8 *C. tetrandrum* Curt. stj. upprät ell. uppstig., jemte de aflånga bladen kljtbluden; skärmb. utan hinnkant; blomdelarne 4—5flikiga; kronbl. 2flikiga, något kortare än fodret; fröhs skaft långa, raka och uppräta; fröen öfverallt grynprickiga. ☉ 5, hv. blr. Fig. Fl.D.2117 och Sturm. D.Fl.h.63. H.N.f.15, n:o 44.  
 Hafsstr. r. (Boh. där utanför Göteborg, t. ex. Halleskär, Buskär, Varö etc.; Sydskoster enl. Leffl. — N. på kusten: Bl. enl. Lindeb.) Stor som följ., med hvilken den är närmast beslägtad; ofta grenad ända från basen. De nedersta skärmb. äro större än örtbladen, bredt äggf.—n. runda. — *C. atrovirens* Bob.

c — Fröh. n. rakt, nära dubb. längre än fodret.

- 9 *C. glutinosum* Fr. kljtbluden; bladen ovala; skärmb. med smal ell. ingen hinnkant; kronbl. 2flikiga, något kortare än fodret; stånd. 10; fröhs skaft utstående ell. utböjda; fröen öfverallt, glest grynprickiga. ☉ 5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *obscurum*: mörkgrön och n. klynnegrenig; skärmen n. utan allt spår till hinnkant. Fig. H.N.f.4, n:o 54.  
 Tor. st. r. (Sk. Blek. ÖG. Söderköping; Gränsö i Jonsberg; Fredberga i V. Stenby, och flerest. vid Linköping enl. Kindb. VG. Kinnekulle. Öl. Götll. —  $\beta$  Blek. Carlskrona. Götll. Carlsvärd. — N. Stavanger.) 2—4 tum hög, med mycket gröfre och stadigare stjerk än följ., som lätt skiljes med sina bredt hinnkantade skärmb. — *C. pumilum* Koch och Bab.  
 10 *C. semidecandrum* L. kljtbluden [ $\beta$  glatt]; bladen ovala; skärmb. med bred hvit hinnkant; kronbl. kortare än fodret, urnupna ell. naggade; stånd. 5; fröhs skaft i början nedböjda, slutl. alla ell. till en del uppräta; fröen som hos föreg. ☉ 5, hv. blr. —  $\beta$  *macilentum*: liten och glatt. Fig. Fl.D.1212. H.N.f.1, n:o 39;  $\beta$  f.15, n:o 43.  
 Torra st. a. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Verml. Philipstad, Carlstad m. fl. st. i söd. delen. Hall. Öl. Götll. — N. —  $\beta$  Blek. vid Gredby.) 1—4 t. hög; vanl. gulaktig, stund. tunnt grågul. —  $\beta$  *C. macilent. Aspegr.* med djupare inskränning hos kronbl. och smalare stjerkbl. har ett mycket afvikande utseende.

## 281. HOLÖSTEUM Lin. Fogelary.

- 1 *H. umbellatum* L. bladen ovala ell. lancettlika; blrna i flock; fröhs skaft nedböjda. ☉ 4, 5. Fig. Fl.D.1204. H.N.f.1, n:o 40.  
 Mur. sandfält, r. (Sk. Blek. Tromsö tegelbr. och Skillinge. Smål. Kalmar; Vestervik, vid Grantorpet. Öl. Götll.) Blågrön, med hv. ell. något rödl. blr. Lik ett *Co-rastium*.

282. *ARENARIA* Lin. Sandnerv.

† Fröen med en hvit fästknöl. [Bladen stora,  $\frac{1}{2}$ —1 tum]: *Moehringia* Koch.

- † *A. trinervia* L. stjelen uppstigande, grenig; bladen kortskäftade äggrunda, spetsiga, 3—5nerviga; blrna ensamma i de öfre bladvecken; foderbl. lancettlika, spetsiga, längre än både kronan och fröhuset.  $\textcircled{D}$  6, hv. blr. Fig. Fl.D.429.

Skog. (Sk.—VB. och Jeml. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm.: Norm.) 3—7 tum hög.

- \*2 *A. lateriflora* L. stj. enkel ell. delad vid roten i flere, långa och n. enkla grenar; bladen n. oskäftade, ovala—lancettlika, 1—3nerviga; blrna 1—3 tillsammans på skaft i bladvecken; foderbl. äggrunda trubbiga, mycket kortare än kronan. 2 7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 39.

Fukt. gräsväxta st. r. (N. Ost-Finnmarken, Sydvaranger, vid Klösterelf.) Något lik föreg., men mera enkel och med nära  $\frac{1}{2}$  tum vid blomkrona.

†† Fröen utan fästknöl. [Bladen 1—2 lin. långa.]

- \*3 *A. ciliata* L. tuffig, med talrika grenskott; bladen oskäftade, omv. äggrunda—tunglika spetsiga, vid basen meränd. hårbräddade otydligt nerviga; fodret kortare än kronan. 2 6—8, hv. blr. Fig. Fl.D.346. H.N.f.10, n:o 41.

\* *norvegica* Gunn. bladen något köttiga, icke hårbräddade; foderbl. äggrunda, otydl. 3nerviga. —  $\beta$  *humifusa*: blomgrenarne mycket korta, 1—2blommiga. Fig. Fl.D.1269. Fl.N.t.9.f.7—9. H.N.f.5, n:o 35.

Fjelltr. och berg, r. (N. Finnm. Porsanger, vid Kulvig och Staburselv: Norm.; Bosekop, vid Rajpes samt nedom Sakkabani vid Kaaffjord: Th. Fr.: Maahselv, vid ån Divielv och Thronenäs, vid Skamland: samt Nordl. Ofoten och Gildeskaal: Norm. — \* Finnm.; Hardanger; Sogn på Ravnasasi i Umland: Ax. Bl. —  $\beta$  *Lul. Lym.* Wirihauere, på Unna Tokiware, numera näst utrotad enl. H. Widm.) 1—4 tum lång; fröh. söga längre än fodret. Hufvudarten är utmärkt af smalare och mer spetsiga foderblad, med tydliga, något upphöjda nerver, men talrika öfvergångar till \* låra enl. Norm. förekomma i Finnm.

- 4 *A. gothica* Fr. stjelen grenig från basen, utan grenskott; bladen oskäftade, aflånga, hårbräddade, otydligt nerviga; foderbl. trubbad, kortare än kronbl. och fröh.  $\textcircled{C}$  6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.suppl.1.t.15. H.N.f.5, n:o 34.

Tor. st., kalkberg, r. (VG. Kinnekulle, Öster- och Vesterplana. Gottl. en fjerdingväg öst. om Visby; Thorsborg; samt Hau i Fleringe enl. G. v. Ced. — N. Salten?) Stor som föreg., hvilken den liknar vida mer än följ. Grenarne meränd. enkla, upprätta, fåblommiga, med teml. stora blr.

- 5 *A. serpyllifolia* L. utan grenskott; bladen oskäftade, bredt äggrunda spetsiga, tydligt fternnerviga; foderbl. lancettlika, spetsiga, längre än kronbl., af fröhs längd.  $\textcircled{C}$  6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *lenuior*: dubbelt spädare, med hälften så stora blr och fröhus. Fig. Fl.D.977.  $\beta$  H.N.f.16, n:o 46.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och Jeml. Pit. Lpm. Ischjakk. Dal. — N. till söd. Finnm.: Norm. —  $\beta$  Gottl. vid Thorsborg; Svalstade i Vamlingbo: O. Nordst.) Hela växten något gråaktig, sträf, stund. något klubbhårig, vanl. mycket grenig, från ett par tum till nära fotskög.

- 2 Flocken *Alsineae*. Fröhusets skal af samma antal som stiften. Stipler 0.

283. *HALIANTHUS* Fr. Saltarv.

- 1 *H. peploides* Fr. bladen äggrunda—lancettlika köttiga; blrna ensamma, på skaft i öfre bladvecken. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.624.

Sandiga hafstr. (Sk.—Hels. Hudiksvalls skärgård. Ångml. Hernösand. VB. Haparanda skärg. Boh. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) Bladen låderaktigt tjocka, vanligen så tät sittande, särdeles de öfre, att de nä öfver stjelen mellanleder; var. dock med bladen vida glesare och smalare: var. *oblongifolius*. — *Arenaria* L. *Alsine* Wg. *Honkenya* Ehrh. *Ammadenia* Gmel.

284. *ALSINE* Wahlenb. Nörel.

† Enåtig, aldrig tuffad.

- 1 *A. tenuifolia* v. *viscosa* Schreb. stjelen upprät, från basen n. klynnegrenig; bladen Hartman, Skandinavians Flora (10:de uppl.).

*syl-rika*; foderbladen *kvass-spetsade*, *längre än* kronan. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D. 389 och 1754. H.N.f.1, n:o 41.

Sandfält, r. (Sk. Ifråtofta ned till Raflunda och Degeberga, Cimbritshamn etc.) 2—5 tum hög, mångblommig; den i Sv. förekommande var. *skiljd endast genom sin hårlighet från den vanl. alldeles glatta kufvudformen*. — *Arenaria L. Sabulina viscosa Reich.*

†† Fleråriga, tufvade växter.

2 *A. biflora* Wg. delad vid roten i flere, meränd. 2blommiga, särdeles upptill håriga grenar; bladen syl-liket jemnbreda, trubbiga, utan tydl. nerver; foderbl. *trubbiga*, 3-nerviga, något kortare än de aflånga kronbladen, mycket kortare än fröh. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1789,t.1,f.1. Sv.B.763. H.N.f.5, n:o 37.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. till Ost-Finnm.) 1—3 tum hög, med trubbiga, ofta urnupna, någongång rödlätta kronblad. — *Stellaria L. Alsinella Sv.*

3 *A. hirta* Hn. delad vid roten i 1—2blommiga, upptill glandelhåriga grenar; de nedre örtbladen jemnbreda, de öfre lancettlika, alla upphöjdt 3nerviga; foderbl. *spetsiga*, 3nerviga, längre än de ovala kronbl., lika långa som fröh. 2 7. — *a foliosa*: grenarne utdragna slaka, med 3—6 bladpar; blrna hvita. — *β rubella*: gren. n. upprätta enblomm., med 1—2 bladpar; blrna rödlätta. Fig. Fl.D.1518 och 1646. H.N.f.5, n:o 38. *β* Wg. Fl.L.6. Sv.B.764.

Fjellv. r. (N. Ost-Finnm. Dovre, på Finnhöe; i Drivdalen från Kongsvold till Vaarstien upp till snögränsen. — *β Tornio* träsk. Lul. Lpm. mycket sparsamt. — N. Finnm.—Dovre.) *a* har fingerlånga, slaka, vanl. 2blomm. grenar; *β* är tätare tufvad och mer upprätt, 1—2 tum hög. — *Aren. hirta* och *Gieseckii Fl.D. Alsine verna varr. Ledeb. β A. rubella Wg.*

4 *A. stricta* Wg. delad vid roten i ganska långa upprätta 1—2blommiga, glatta grenar; bladen syl-rika trubbiga glatta, utan tydl. nerver; foderbl. *spetsiga*, nervlösa, n. af kronbladens och fröhs längd. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1799,t.3. Sv.B.762. H.N.f.5, n:o 36.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Nuljalaki och Ripanes. Lul. Lpm. Wiribaure; på en kulle vid Stalajokk: H. Widm. Pit. Lpm. Um. Lpm. Högsta by. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan; Mejsklumpen i Frostviken. Herjed. Helagsfjellen; Midtåkläpparne; Hamra och Skarffjellen etc. — N. Finnm. på fjellet Silfavarre i Porsanger: Norm.; Mortensnes i Varanger: Th. Fr. Dovre.) Örtan vid basen bladig; blomgr. 2—6 tum långa, vanl. endast med ett eller annat bladpar vid och nedom midten. — *Spergula Sv. V.Ac.H.*

## 285. SAGINA Lin. Hönsbet.

† Blommans delar 5taliga: *Spergella Reich.*

\* Kronbl. betydligt större än foderbl.

1 *S. nodosa Fenzl.* delad vid roten i flere, upprätta ell. uppstig. mångblommiga grenar, upptill knutiga af små bladgyttringar; bladen syl-rika trubbiga; foderbl. trubbiga, af fröhs längd. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.96.

Stränd., fukt. st. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Vanl. 3—6 tum hög; var. glatt och smått glandelhårig. — *Spergula L.*

\*\* Kronbl. af foderbladens längd, ell. kortare.

2 *S. subulata Presl.* stielken tufvad; bladen jemnbredt syl-rika med lång nål-lik udd, meränd. glest glandelhåriga; blomskaften utdragna, slutl. upprätta; foderbl. trubbiga, af kronbls längd, kortare än fröh. 2 6, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1789,t.1,f.3. Sv.B.708. Fl.D.858. H.N.f.4, n:o 56.

Klipp. och fukt. st. helst nära hafvet, r. (Sk. Hall. Boh. Smål. Femsjö; Odensjö; Ljunga och Vilstad; Unnaryd m. fl. st. VG. Göteborg; Alingsås. Öl. Runsten. — N. södra och västra del.) Stielkarne korta, med 1—1½ tum långa blomskaft; den färglösa bladudden betyd. längre än bladets bredd. — *Spergula subulata Sv. Sp. saginoides Osb. och Lin. i herb. Sp. laricina Fl.D.*

3 *S. nivalis Lindbl.* tät tufvad; bladen tegellagda, från bred bas syl-liket spetsade med

udd; blomskafven korta, uppräta; foderbl. trubbiga, af kronbls och fröhs längd 2½, 7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.12, n:o 51.

Hög fjellv. r. (Torn. *Lpm.* fjellen Ripanes och Nuljaleki. *Lul. Lpm.* Wirihauere; Kal-lowarats vid Rovejaure: H. Widm. *Pil. Lpm.* Kåbrenåwe och Tjiddjakk. *Herjed.* Helagsfjellen. — N. Finnm. vid innersta viken af Lyngensfjord. Dovre, Fogstuen; vid Nystuebäcken; Knudshøe, vid öfre delen af Sprenbäcken; Finnshøe, på högsta toppen; Vaarstien, ymnig; klipporna midt för Drivstuen.) *Hela växten tumshög; den späda roten bärande en tät tufva stjelkar med små, föga lutande blr. Var. med slakare, nedligg. grenar och mer åtskiljda blad. En medelform mell. föreg. och följ* — *Sperg. saginoid. var. Blytt.*

4 *S. saxatilis* Wimm. stj. mycket kort, med långa utbredda grenar; bladen smalt syl- lika, kort uddspetsiga, glatta; blomskafven utdragna, uppstigande, med lutande blr; foderbl. trubbiga, längre än kronbl., dubb. kortare än fröh. ☉ 2½ 6—8, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1789,t.1.f.2. Sv.B.765. Fl.D.1577. H.N.f.9, n:o 40.

Fjelltrakt. a. (*Lpl.—Dal. Ängml.* Tåsjöberget. *Medelp.* Liden sn. — N.) Något större och med längre blomskafv än följ. art, hvarifrån närv. är föga skild, helst den stundom har 4taliga blomdelar och ofta små eller inga kronblad. — *Spergula saginoides* Sw. *S. Linnæi* Ledeb.

†† Blommans delar 4taliga: *Sagina* L.

\* Alla foderbladen trubbiga.

5 *S. procumbens* L. nedliggande, med grenar och blad som föreg., glatt; blrna lutande; foderbl. mycket längre än kronbl. [som oftast felslå], något kortare än fröh. ☉ 5—8. Fig. Fl.D.2103. H.N.f.15, n:o 45 [var.].

Fukt. st. a. (*Sk.—Lpl.—N.*) Grenarne 1—3 tum långa; stånd. vanl. 4—7; pist. 4, 5. Träffas någongång med fyllda blr af talrika kronblad, långa som fodret. — *Sperg. Sagina* Sw.

6 *S. stricta* Fr. stjelen upprät, n. klynnegrenad med uppräta grenar, glatt; bladen syl- lika, halftrinda, utan märklig udd, vanl. glatta; blrna uppräta, utan kronbl; foderbl. af fröhs längd. ☉ 5—7. Fig. Sv.B.562,f.2. Fl.D.845, 2104. H.N.f.1, n:o 43 och f.10, n:o 42.

Fukt. st. nära hafvet, r. (*Sk.—Boh. Blek. Smål.* Påskallevik; Kalmar samt på Furön m. fl. st. Öl. Färjestaden m. fl. st. på vest. sidan; Böda hamn etc. *Gottl.* Bursviken i Öja sn; Klintehamn, och vid Storugns m. fl. st. Fårön på stranden nedom Landt- näs; Lilla Carlson. — N. Christiania etc. efter kusten.) *Liten, äldre något styf ört. Var. eml. O. Nordst. vid Ronneby med hårbräddade bl. — S. marit. Don. S. apetalata* β *Wg.*

7 *S. apetalata* L. v. *cæspitosa* Aresch. stj. tufvad, jemte grenarne upprät, glandelhårig; bladen syl- lika, uddspetsiga, vid basen glest hårbräddade; blrna uppräta; kronbl. inga ell. mycket kortare än foderbl.; dessa kortare än fröh. ☉ 6, hv. blr. Fig. (hufvudformen) Fl.D.2102 (öfversta fig.). H.N.f.13, n:o 54.

Tor. st. r. (*Sk.* på sandiga trädesåkr. mell. Stenshufvud och Rösum: F. Aresch.) *Hufvudformen, som ännu icke blifvit funnen i Sv., är högre och spädere.*

\*\* Två foderblad uddspetsiga.

8 *S. ciliata* Fr. nedliggande med utbredda grenar, glatt ell. upptill glandelhårig; bladen syl- lika, uddspetsiga, vid basen hårbräddade; blrna något lutande, med kronbl. som föreg.; foderbl. kortare än fröh. ☉ 6, hv. blr. Fig. Sv.B.562,f.1. Fl.D.2102 (nedersta fig.). H.N.f.1, n:o 42.

Åkrar, r. (*Sk.* vid Snårestad, mellan Ystad och Trelleborg; Hvellinge; Sandhammar; Hököpinge etc. *Boh. Domsö.*) Blrna mindre än hos föreg. — *S. apetalata* *Wg.*

3 Flokken **Lepigonæe**. Blad med hinnaktiga stipler.

286. SPERGULA Lin. Spergel.

1 *S. arvensis* L. stjelen klubbhårig, säll. glatt; bladen kranssittande, trådlika, med en långsgående fära på undre sidan; fröen tjocka, med en smal och slät hinnkant. ☉ 7, 8, hv. blr. — *a vulgaris*: frön beströdda med hvita, slutligen brunaktiga klubblika

vårtor. — *β sativa*: frön utan vårtor, prickade. — *γ maxima*: dubbelt större, n. glatt; frön som *α*. Fig. Fl.D.1033. Reich.f.705, *β* 704.  
Åkrar, stränd. etc. *α*. (Sk.—Lpl. — *N.* till Nordl.) *Blirna* hos begge arterna i gvaslikt knippe. *Blir* stund. mycket liten och har då vanl. blott 5 ståndare. De 2 varr. upplagas som arter af Reich.

2 *S. vernalis* Willd. stj. glatt; bladen som hos föreg., utan fåra på undre sidan; fröen plattade, i kanten grynprickiga och vingade med en bred strålstrimmig hinnkant. ♂ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.308. Fl.D.1940. H.N.f.4, n:o 55.

Torra skogsberg. (Sk.—Uppl. Helsl. Ångml. Jemtl. Frösön. Vestml. Ner. Verm. Boh. Öl. Gotl. — *N.* söd. del., t. ex. Arendal på Kloppehöjen. Christiania.) Öppnar sällan blirna; vanl. glatt och mer stel än föreg. — *S. arvensis* Sv.B. var. *β* Wg. *S. pentandra* Ed.6 och de festa Sv. förf., men icke *L.*, hvars art af detta namn tillhör södra Europa och har spetsiga kronblad och släta frön, hvaremot vår art har kronbl. trubbiga och fröen med en prickig kant inmanför hinnkanten. *S. Morisonii* Bor. och Ed.9 dr, såsom *Lange* visat, ett mycket yngre namn.

### 287. LEPIGONUM Fries.\*) Fjällnarv.

1 *L. rubrum* Fr. stipl. äggrundt lancettlika, med vanl. utdragen och finklufven spets; fröh. ungefär af fodrets längd; fröen n. päronformiga, gråakt. bruna ell. svartaktiga, ovingade, knöliga. ♂ 24. Kronbl. vanl. mörkt lila-röda. Fig. Kindb. Monogr.t.3, f.29. H.N.f.8, n:o 36.

Tor. st. (Sk.—VB. nor. del. — *N.* till Nordl.) Växten oftast mörkgrön och upptill klibbluden, vanl. grenig och uppstig. med glänsande stipl., utdragna och bladiga blomklasar samt långa fruktskaft. Stjelkens ledstycken vanl. n. längre än de plattade ell. halvtrinda, oftast uddspetsiga bladen, men stund. mycket förkortade (såsom hos var. *radicans* [Presl.] Kindb.). Var. från ett par tum till fotslång; fröh. omkr. 4, fröen omkr. 0,5 m.m. långa. — *Aren. rubra* a *L. Alsine* Wg. *Spergularia* Pers.

2 *L. caninum* Leffl. stipl. äggrundt triangulära, med vanl. föga utdragen ell. klufven spets; fröh. mer ell. mindre utskjutande ur fodret; fröen tresidigt rundade—plattade, bruna, ovingade ell. vingade, knöliga ell. släta. ♂ 24. — Sinsemellan sammanflytande, men för synonymiens skull anmärkningsvärda äro följande varieteter:

*α salinum* (Presl.) växten upptill något klibbluden ell. n. glatt; kronbl. vanl. ljust lila-röda ell. hvitaktiga; fröh.  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  utskjut.; fröen knöliga. Fig. Kindb.t.3,f.27. H.N. f.15, n:o 46. — *L. neglectum* Kindb. Synops. och Hn.ed.9. *Spergularia salina* Presl. *Leipig. sal.* Kindb. Mon. *L. salinum* Fr. tyckes innefatta denna och *δ*.

*β sperguloides* (Lehm.) växten vanl. mörkgrön, tätt klibbluden, med oftast utdragna och kortbladiga klasar; kronbl. mörkt lila-röda; fröh. vanl. kort utskjut.; fröen knöliga ell. n. släta. Fig. Kindb.t.3,f.28 (dålig). — *Holost. spergul.* Lehm. *Lepig. salin.* \* *spergul.* Kindb. Mon.

*γ urbicum* Leffl. växten oftast späd och ljusgrön; fröh. litet, vanl. kort utskjut.; fröen släta ell. otydl. knöliga. Fig. Kindb.t.2,f.11. H.N.f.8, n:o 37. — *L. medium* Fr. (och Hn.ed.9), ett namn som stöder sig på det osäkra synon. *Arenaria media* *L.* och dessutom blifvit förut användt i annan bemärkelse.

*δ leiospermum* (Kindb.) fröen som hos *γ*, men större och plattare; för öfr. som *α*. Fig. Kindb.t.2,f.10. H.N.f.14, n:o 42. — *L. leiospermum* Kindb. *L. salinum* Hn. ed.9. *L. Wahlb.*

Varr. *α* och *δ* på hafsstr. teml. *α*. (Sk.—Boh. — VB. nor. del. — *N.* till Nordl. — *β* utmärkt på mudderupplag etc. vid Göteborg; osäkrare former på styf lerjord flerst. t. ex. Carlskrona och Uddevalla. — *γ* gator i Upsala, Vesterås, Gefle, Visby, Lund m. fl. städer [ofta inuti landet]; på hafsstr. vanl. oskiljbar från *δ*.) Bladen hos alla formerna halvtrinda ell. plattade, utan ell. med kort udd i spetsen; foderbl. vid basen mörkfläckade. Fröh. 4—7, frön 0,5—1 m.m. långa. Blomklasarne, stödjebladens och fruktskaftens längd, växtens storlek m. m. högst förändrliga.

\*) Detta släkte är redigeradt af J. A. Leffler.



3 *L. marinum* Wahlb. (till en del). stipl. som föreg.; fröh. vanl. långt utskjutande; fröen som hos föreg., oftare vingade och släta, mörkbruna, ell. sällan svartakt. 24. Kronbl. vanl. ljust lila-röda. — Varierar:

*α marginatum* DC. fröh. stort och oftast till hälften utskjutande; fröen vanl. stora, vingade, mörkbruna och släta. Fig. Kindb.t.1.f.6. H.N.f.8, n:o 38. — *Spergularia media* Pers. *Arenaria marginata* DC. *Ar. media* Wallr. *Lep. marinum* Wahlb. *L. marginatum* Koch., men beskrifn. tvetydig. — Äldre synonym. än Wahlb. teml. osäkra, såsom innefatt. vingfröiga former afven af föreg. art.

*β fasciculare* (Lönnr.) Lge. fröh. smärre och mindre utskjut.; fröen små, ovingade, svartaktiga och ofta knöliga. — *L. fascicul.* Lönnr. till en del (form med sammanträngd blomsamling och lått tufvade stjelkar etc.)

Hafsstr.; *α* mindre allm. än föreg. (Sk.—Boh. och Små. — N. till Finnm.? — *β* mycket sällsyntare: Boh. Midtskär bland Väderöarne. Götll. Klintehamn etc. — Mellanformer finnas flerstädes.) Skild från föreg. genom sin olika habitus, till alla delar gröfre växt, större och bredare fröh. m. m. Fröh. 7—10, frön 0,7—1,2 m.m. långa. Blomskaft vanl. långa och klasarne utdragna, ofta alldeles bladlösa, hvilket hos föreg. högst sällan är fallet.

49 Fam. **ELATINEÆ** Juss. Fod. 3—5klufvet. Kronbl. lika många. Stånd. af samma ell. dubbelt antal. Fruktämne 3—5rummigt, med centrala fröfästen. Fröhvite 0. .

### 288. ELATINE Lin. Lonkeserf.

1 *E. Hydropiper* L. bladen aflångt omv. äggrunda, långt skaftade; blr oskaftade i bladvecken; kronbl. och foderflik. 4; stånd. 8; fröh. 4rummigt. ☉ 6—9, rödl. blr. Fig. Sv.B.597. Fl.D.156. H.N.f.9, n:o 41; f.6, n:o 29 [var.].

\* *orthosperma* v. Dub. fröen n. raka.

Stränd. vid och i vatt. (Sk.—VB. Haparanda. Lul. Lpm. enl. Ands. — N. Nittedalselv i Skydsmoen nära Christiania; Romerige.) Liten krypande och rotslående ört, på det torra vanl. rödaktig; blommande under vattnet, saknar den kronbl. Frön hos *α* hästskoformigt krökta, hos \* [E. *spathul.* Gorsk. enl. Walp. Repert.] nära raka, hvilket synes vara tillfälligt, då på samma lokal än den ena, än den andra formen olika är förekommer.

2 *E. triandra* Schk. bl. som föreg., kort skaftade; blr oskaftade; kronbl., foderflik. och stånd. 3; fröhus 3rummigt. ☉ 6—9, rödl. blr. Fig. Sv.B.597. H.N.f.6, n:o 30. Stränd. r. (Blek. vid Lyckeby å m. fl. st. ÖG. Vetterns strand vid Bisp-Motala. Södm. Strengnäs, Nabbviken samt Norrstacken. Gestr. Gefle, Stenborgsviken och Avaåns mynning. Ängml. Själevad, vid Vestansjö by. VB. Neder-Kalix; Tornio. Vestml. Svartön; Kärrbo; Kungsör. Ner. sjön Qvismaren. Verm. vid Venern; Rådasjön; Möckeln, vid Bredgården: Reuterm. VG. Göteborg.) Till alla delar något större än föreg. med bredare blad på kortare skaft. Fröen foga krökta. — *E. callitrichoides* Rupr.

3 *E. hexandra* DC. bl. som hos föreg.; blrna utdraget skaftade; kronbl. och foderflik. 3; ståndare 6; fröh. 3rummigt. ☉ 7, rödl. blr. Fig. Reich.f.599. H.N.f.11, n:o 43. Stränd. r. (VG. Göteborg vid elfven, samt vid Gunnebo; Venersborg. Kasen. Dalsl. i Viksjön vid Ryr, i n. Ryr sn. Verm. i sjön Värmeln, vid Finnebäck i Brunsborg sn; Kila sn, i Harfjorden enl. Leml.; Karliskoga, i Timselfven vid Björkborn, och i Möckeln, vid Bredgården: Reuterm.) Utmärkt af blomskaften, som äro 1—2 linier långa. Frön som hos föreg. — *E. paludosa α hexandra* Godr. & Gren.

### 3 Serien: CALYCIFLORÆ.

#### 7 KLASSEN

#### FAUCIFLORÆ.

- 50 Fam. **CUCURBITACEÆ** Juss. Blr skiljökönade, med samväxta kronblad. Stånd. 5, till en del hopväxta. Fruktämne 3—5rumm. med fröfästen på väggarne, slutl. bär.

##### 289. BRYONIA Lin. Hundrosva.

- 1 *B. alba* L. bladen hjertlika handflikiga med 5 tandadeflikar, sträsprickiga; blrna i qvast, sambyggare. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.105. Fl.D.813.  
Vid gärdesgård. etc. r. (Sk.—Uppl. Vestml. Vesterås; Strömsholm. Hall. Hasslöf: Theor. Öl. Gottl.) *Klångväxt, med blad, som likna lönnens, och trådlika klängen från stjelen; hanblrna större än qblrna; bären svarta.*

- 51 Fam. **RIBESIACEÆ** Reich. Kronbl. och stånd. 5, fria. Fruktämne enrummigt, slutl. bär med 2 fröfästen på väggarne.

##### 290. RIBES Lin. Ribs.

† Grenarne väpnade med taggar.

- †1 *R. Grossularia* L. grenarnes taggar vanl. 2—3 tillsammans; bladen 3flikiga; blomskäften ensamma 1—3blommiga. 3 4, 5, brungr. blr. —  $\beta$  *Uva crispa*: fruktämnena finhåriga; bären glatta, gröngula. —  $\gamma$  *reclinatum*: grenarne båglikt utböjda; bären glatta röda. Fig. Sv.B.133. Fl.D.546.

Torra st. vid väg. byar,  $\beta$  allmänna. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. Årendal; Hedemarken etc.) *Frukten saftfull, söt: krusbär.*

†† Utan taggar.

- 2 *R. nigrum* L. bladen 5flikiga, under hartsprickiga; blrna i lutande klasar, klocklika, med spetsade skärm, kortare än de enskildta blomskäften. 3 5, brungr. blr. Fig. Sv.B.169. Fl.D.556.

Skugg. st. mest nära vatt. r. (Lul. Lpm. Gellivare, Skräselfven, Saivitskölen; samt VB. Pajala: H. Widm.; Kengis. Skärgården från Torn. till Stockholm; där i Mälaren. Uppl. Hacksta sn: E. Hensch. Södm. Åkerö och Södertelge; Nyköpingstrakten: C. Ind. Vestml. Ner. flerst. Smål. Jönköpingstrakten: Eds kapell. Boh. Hall. Sk. — N. vid kusten upp till Söndmör. Ost-Finnm. Svanvik vid Colmejavre.) *Bladen starkt luktande; frukt svarta vinbär.*

- 3 *R. rubrum* L. bladen 5flikiga, icke hartsprickiga; blirna i lutande ell. hängande klasar, skålförmiga, med rundade skärm, kortare än blomskäften.  $\frac{1}{2}$  5, g. blr. —  $\beta$  *pubescentis*: blad och blomklasar smäludna; blirna djupare, brunfläckade, med hårbäddade foderflikar. Fig. Sv.B.199. Fl.D.967. H.N.f.4, n:o 57.
- Lundar. (Lpl.—Hall. och Sk. — N. till Finnm. —  $\beta$  Lpl. — Gefle. Uppsala, Läby trask. Smål. Skeen i Annerstad sn. Verml. Boh.) Frukt röda vinbär.  $\alpha$  har gläslare, glattare, mer slaka blomklasar samt enfärgade blr.  $\beta$  har tätare och mer håriga klasar, som någon gång träffas n. uppröda. *R. petraeum* Wulf. är knappt skild från  $\beta$ .
- 4 *R. alpinum* L. bladen 3—5flikiga, under glänsande glatta; blirna i uppröda klasar, skållika, med skärm längre än blomskäften.  $\frac{1}{2}$  5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.223. Fl.D.968. Fl.N.2, t.2. H.N.f.13, n:o 56.
- Skogsback.  $\alpha$ . (Sk. Smål. mell. och öst. del.—Ängml. Herjed. Funnesdalen. Jemtl. Öf. Götll. — N. till Nordl. Ost-Finm. Svanvik.) Är ofta 2byggare genom ena könets felslagning. Bären röda: måbär.

- 52 Fam. RHAMNEÆ R. Br. Kronbl. och stånd. 4, 5, fria och motsatta. Frukt. 2—4rummig stenfrukt, med enfröiga rum.

## 291. RHAMNUS Lin. Toste.

- 1 *R. cathartica* L. grenarne tornspetsade; bladen ovala sågade; blirna 2byggare, 4-klufna med fjerdeladt märke.  $\frac{1}{2}$  7, gröng. blr. Fig. Sv.B.307. Fl.D.850.
- Skogsback. (Sk.—Helsl. Tuna sn. Vestml. Ner. Verml. på öar i Venern. Dals. Boh. Öf. Götll. — N. Christiansands och Aggerhus st.) 3—4 aln. högt träd ell. buske; stenfrukterna först gröna, slutt. svarta, vanl. 4fröiga. Skall enl. Sv.B. på Alleberg finnas quartershög och krypande.
- 2 *R. Frangula* L. oväpnad; bladen ovala helbräddade; blirna 2könade, 5klufna, med enkelt märke.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.109. Fl.D.278.
- Skogsäng. (Sk.—Pit. Lpm. och VB. nor. del., Gädetrask. — N. till Trondhj.) 3—4 alnars buske; stenfr. först röda, slutt. svarta, mest 2fröiga. — *Frangula vulgaris* Reich.

- 53 Fam. SAXIFRAGEÆ Juss. Fod. mer ell. mindre vidväxt det 2skaliga, 1—2rummiga fruktkämnat. Fröh. öppnande sig i 2, af stiftet sprötade skal.

## 292. SAXIFRAGA Lin. Bräcka.

† Bladen odelade.

\* Stjelen bladig; rotbladen i rosett med hvit, brosklik, finsågad kant: *Chondrosea* Haw.

- 1 *S. Cotyledon* L. stjelen långt ned delad i blom bärande grenar; rotbladen tunglika, kantade med hvita sågtänder; blomfodret glandelhårigt; kronbl. bredt tunglika. 2 8, hv. blr. —  $\beta$  *maculata*: mindre, med omv. äggrunda rotbl., smal blomsamling, bredare och kortare, rödfläckiga kronblad. Fig. Fl.D.244. H.N.f.5, n:o 42.  $\beta$  Lin. Fl.L.t.2, f.2.
- Fjellklipp. r. (Tornio trask. Lul. Lpm. Namnats vid Qvikkjokk; Njuonjes vid Tarrejokk; H. Widm. Jemtl. Frostviken; vid Anjens utlopp i Kallsjön. — N. Finnm. Kaafjorden—Christiania; Krokkleven och Hortecken; Gousta fj. —  $\beta$  Nordl. mell. Mavasjaure och Ballaur vid gränsen till Pit. Lpm.) 8—18 tum hög, vanl. mycket rikblommig. Kronbl. icke runda som på figg.

- \*2 *S. aizoon* Jacq. stielken upprät, *upptill delad* i en n. qvastlik blomställning; rot-bladen aflånga—omv. äggrunda, med kant som föreg; blomfod. *glatt*; kronbl. bredt *äggrunda*. 2/8, hv. blr. Fig. Fl.D.2352. H.N.f.14, n:o 43.

Fjellklipp. r. (N. Nordl. med föreg. β. Aggerhus st. enl. Fr. Ligger äfven i Vahls herb. från N. enl. Blytt.) *Fingerhög, med flere bladrossetter vid roten; bladen på Norska ex. små, ovalt—omv. äggrunda; stielken oigrenad utom i toppen; blirna mycket mindre än hos föreg.*

\*\* Bladlös stängel; bladen vid roten.

- 3 *S. stellaris* L. bladen *aflångt vigglika spetsiga*, gles *hvasv-sågade*; blirna i *gles, qvastlikt knippe*; kronbl. lancettlika, *längre än det nedböjda fodret*. 2/7, 8, hv. blr. — β *comosa*: meränd. enblommig, med knippe af en mängd små gyttringar af fjälllika blad; kronbl. äggrunda med klo. Fig. Fl.D.23. H.N.f.15, n:o 47. β Lin. Fl.L. t.2.f.3. Fl.D.2354.

Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N. — β Torn. — Pit. Lpm. — N. Finnm.—Dovre.) *Kron-bladen något olirkformiga*. — *Spathularia* Haw.

- \*4 *S. hieracifolia* Kt. bladen ovala—lancettlika *spetsiga, grundt bugtländade*; blirna i gles *axlik klase*; kronbl. kortare än fodret. 2/7, 8. Fig. Fl.D.2351. H.N.f.14, n:o 44.

Fjellv. r. (N. öfre Gudbrandsdalen vid Vaage; Beshögden; Grasvigsätteren; Solläl-sätteren i Lom; Dovre, på Storhøe omkr. en mil ofvanför gården Tofte nära snö-gränsen, samt vid Tvärån nära de beständiga snödrifvorna.) *Något lik följ., men större; kronbl. små, grönaktigt röda*. — *S. stricta* Chr. Smith. *Micranthes* Don.

- 5 *S. nivalis* L. bladen *rundade* ell. omv. *äggrunda trubbiga, trubbsågade*, n. glatta; blirna i *täta, n. hufvudlika knippen*; kronbl. *af fodrets längd*. 2/7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Lin. Fl.L. t.2.f.5, 6. Sv.B.728. Fl.D.28. H.N.f.9, n:o 44.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. Medelp. Randklöfven i Borgsjö sn. — N.) 3—6 *tum hög, med en ell. flere, vanl. rundade, stundom mer glesa blomgyttr. i toppen, ofta understödda af ett mindre och aflångt skärblad; var. mera spåd, n. glänsande glatt, med något skafade blr: β tenuis* Wg. — *Dermasea* Haw. *Micranthes* Don.

\*\*\* Stielken slak, 4sidigt täckt af motsatta blad: *Antiphylla* Haw.

- 6 *S. oppositifolia* L. stielken nedligg. ganska grenig; bladen äggrunda ell. omv. äggr., jemte foderlikarne hårbräddade, i spetsen tvära med en intryckt punkt; blirna *ensamma* i grenarnes spets; kronbl. 2—3 *gr längre* än fodret. 2/6, 7. Fig. Lin. Fl.L. t.2.f.1. Fl.D.34. H.N.f.5, n:o 41.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Lång och slak med grenarne i början 4kantiga af de täta bladen, hvilkas hår sakna glandler; blirna blå- ell. viol.röda, säll. hvita*.

\*\*\*\* Stielken bladig; alla bladen strödda, smala: *Lejogyme* Don.

- 7 *S. aizoides* L. stj. *grenig nedliggande*, med uppstig. blomgrenar; bladen jemnbreda, n. halftrinda, med en liten grop nära spetsen; blirna *plattade*; kronbl. *föga längre* än de *utstående* foderbl. 2/7, g. blr. — β *aurantia*: med större blad och blr, mörkgula kronblad, röd pistill. Fig. Sturm 35 häft. H.N.f.14, n:o 45. β Fl.D.72. H.N. f.11, n:o 46.

Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N.) *Bladen stundom glatta, oftare med styfva hår i kanterna: S. autumnalis* L.Sp.Pl.

- 8 *S. Hirculus* L. stielken *enkel upprät*, fåblommig; bladen smalt lancettlika, trubbad; blirna n. *klocklika*; kronbl. 2—3 *gr längre* än det stult. *nedböjda* fodret. 2/7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.625. Fl.D.200. H.N.f.1, n:o 45.

Torfkärr, r. (Sk. Hyby, Eksholmen, Roslätt; Böringe; Yngsjö etc. *Smål. mell. Bona* gästg. och kommunisterbostället i Bredestad; Lannaskede helsobrunn; Forssarum vid Kallsåg. VG. Vartofta; Hunneberg; Berga i Vejinge sn. *Vestnl.* vid Norråsbo by i Nora sn. *Jemtl.* Ragunda och Hammerdal. *Angml.* Långsele sn, Ledinge. *VB.* Koddis i Umeå sn: Dr Håkanson. *Umeå—Torn. Lpm.* — N. Ost-Finm. Syd-varanger; samt Vest-Finm. mell. Masi och Lappojavre: Norm.) 8—12 *tum hög, med fritt fruktlämne inom blomman*.

†† Bladenflikiga eller inskurna.

\* De nedre bladen rundade ell. njurlika.

- 9 *S. granulata* L. stjelken vid basen omgifven af ett knippe smålökar, rak och upprät, mångblommig, utan knopplökar i bladvecken; rotbladen njurlika inskurna, med rundadeflikar, de öfre stjelkl. n. vigglika, med aflångaflikar. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.153. Fl.D.514.

Äng. a. (Sk.—Gestr. och Dal. Ängml. Forssé bruk: Arn. Öl. Gottl. — Södra Norge.) Fotshög, med öfter  $\frac{1}{2}$  tum långa, klocklika blr.

- 10 *S. cernua* L. stjelken med smålökar vid basen, något flerböjd, vanl. enkel och enblommig, med knopplökar i öfre bladvecken; de nedre bladen njurlika, till midten klufna i meränd. 5, rundade ell. äggrunda, kortspetsigaflikar; de öfversta bl. odelade aflånga. 2 7, 8, hv. blr. —  $\beta$  *racemosa*: med 3—6 blr i toppen. Fig. Lin. Fl.L.2.f.4. Sv.B.630. Fl.D.390. Fl.N.2.t.8. H.N.f.5, n:o 43.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. på Skarf- och Ljungdalsfjellen; st. Midtåkläppen. — N. Finnm.—Dovre och Quamskleffen i Valders. —  $\beta$  Torn. Lpm. Kåbdåvanka. — N. Tromsøe; Tana på fjellet Kåjmokaisse etc.) Omkr. quartershög, spenslig; blrna stora med långa kronblad. —  $\beta$  *S. bulbifera* Gunn.

- 11 *S. rivularis* L. stj. utan smålökar vid basen, uppstigande, 1—2blomm., utan knopplökar; rotbladen som föreg., med rundadt trubbigaflikar; det öfversta stjelkbladet odeladt, äggrundt ell. omv. äggrundt. 2 7, 8, hv. ell. r. blr. Fig. Lin. Fl.L.2.f.7. Sv. B.729. Fl.D.118. H.N.f.8, n:o 40.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. Helags- och Skarffj.; Midtåkläppen; Ösjökläppen. Dal. Fulu-fjell i Särna, vid Njupaskärs vattenfall. — N. Finnm. — Dovre och Filefjell; Gousta-fjell.) 1—3 tum hög, med små blommor och kronblad.

\*\* De nedre bladen vigglika, 3—7flikade.

a — Med tätbladiga grenskott vid stjelkens bas.

- 12 *S. caespitosa* L. tät tufvad; grenskottens blad 3—5klufna, med aflånga ell. jemnbreda, trubbadeflikar; stjelkl. få [1—3], mindre flikiga, det öfversta vanl. odeladt, aflångt. 2 6, 7, hv. ell. gulakt. blr. —  $\beta$  *palmata*: quartershög, med 5—6 hvita blr; bladen kantade med långa ledade bår. —  $\gamma$  *repens*: med utdragna, nedligg. grenskott och uddspetsiga bladflikar. Fig. Sv.B.731. Fl.D.1388. Fl.N.2.t.7. H.N.f.3, n:o 35.  $\beta$  Fl. D. suppl.1, t.14. H.N.f.13, n:o 57.

Fjellv. (Lpl. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan på Blå-sten; flerst. i Frostvikén; Grubb-fjellet i Fölingene. Herjed. Skarffj.; Ljungdals- och Funnesdalsbergen. Ängml. Nora sn, Eden samt vid Rödåsen: Arn.; Skuluberget. Medelp. Randklöfven. — N. —  $\beta$  Dovre—Modum på Hovlands fjell. —  $\gamma$  Ost-Finm.) Fingerhög, något kort-hårig, oftast 1—3blommig. — *S. decipiens* Ehrh.  $\gamma$  *S. hypnoides* ed.4.

b — Utan grenskott.

- 13 *S. adscendens* L. stj. upprät, upptill vanl. grenig; bladen omv. äggrunda ell. vigglika, 3—7lådade ell. grundt flikade i äggr. ell. ovala flikar, klibbiga; blrna i glesa klasar; frukten af omkr. skafstets längd. 2 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *hutea*: blrna gula. Fig. Fl.D.1.68. Fl.N.2.t.9. H.N.f.8, n:o 39.

Klipp. r. (Lpl.—Herjed. Medelp. Rosl. Östhammar; Harg. Stockh. på Kungsholmen. Södm. Forssa Storäng m. fl. st. enl. C. Ind. ÖG. Skenningetrakten enl. Kindb. Vestml. Sala grufva och Sättrabrunn; Arboga, Ållholmen. Ner. Örebro; Lillkyrka och Skyllersta snr. Verml. Carlstad etc. VG. Bergegården nära Venersborg. Dalsl. — N. —  $\beta$  Herjed. — N. Dovre.) Har stadigare, mer rak och upprät stjelk än följ. samt är till alla delar större. — *S. tridact.*  $\beta$  L.Fl.Sw. ed.2. och Herb. S. petraea Gunn. *S. controversa* Sternb.

- 14 *S. tridactylites* L. bladen vigglika, delade till ell. nedom midten i 3, säll. 5, lancettlika, mycket utstående flikar, klibbiga; fruktskafsten meränd. längre än frukten; för öfr. som föreg. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.476. Fl.D.1517. H.N.f.13, n:o 58.

Klipp. och sandback. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Verml. Jemtl. Boh. Uddevalla; Syd-koster: Leml. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm.: Norm.) Är vanl. 2—6 tum hög, spådd grenig, med små blr; stund. liten enkel, med odelade lancettlika blad; blomskafsten slutt. utstående och vanl. flere gånger längre än frukten.

293. *CRYSOSPLENIUM* Lín. Guldpuåra.

- 1 *C. alternifolium* L. stj. n. uppråt, endast i spetsen grenig; stjerkbladen njurlika; *skiftevisa*, på öfre sidan *glost håriga*; skärmb. halfrunda—ågrunda; stånd. 8. 2 5, g. blr. Fig. Fl.D.366. H.N.f.16, n:o 47.  
Kålldrag och fukt. st. (Lpl.—Sk. Öl. mell. Vickley och Fröbygårda. — N.) *Ljusgrön*; skärmb. *likasom hos de öfr. arterna gytttrade, hysande mellan sig de små, föga skaflade blrna*.
- 2 *C. tetrandrum* Th. Fr. stj. uppstigande, enkel ell. grenig; bl. *som föreg.*, på öfre sidan *glatta*; skärmb. *vigglika*; stånd. 4. 2 6, 7, gulgr. blr. Fig. H.N.f.11, n:o 42.  
Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Enontekis. — N. Ost-Finnm. allm. vid hela Varangerfjorden från Nyborg och Carlebotten till Vardö; Tanafjorden, Store-Lerpollen: Norm.) *Blekgrön*; hälften till flere gr mindre och spååare än föreg. — *C. alternifol.* β Lund.
- \*3 *C. oppositifolium* L. stj. *delad vid basen* i långa, *nedliggande* grenar; bl. njurlika *motsatta*, på öfre sidan *glost håriga*; skärmb. *rundade*; stånd. 8. 2 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.365. H.N.f.14, n:o 47.  
Kålldr. etc. r. (N. Christiansands st. vid Nærstrand. Bergens st. Hardanger, Bergen, Sausund, Svanöe, Sande etc.) *Af mörkare grön färg än de föreg.; stjerkbl. talrikare*.

54 Fam. *CRASSULACEÆ* Juss. Fruktåmmen lika många som kronbladen, slutl. enrummiga flerfröiga, kapsellikå karpeller, hvarje med eget stift.

294. *SEMPERVIVUM* Lín. Taklök.

- 1 *S. tectorum* L. stj. vid basen bärande rosetter af platt utbredda, omv. ågrunda blad; stjerkbl. lancettlika, alla spetsiga hårbreddade. 2 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.260. Fl. D.601.  
Klipp. tak. (Sk.—Söåml. och Ner. Vestml. Skinnskatteberg. VG. Kinnekulle; nära Lidköping etc. Hall. Öl. Götll. — N. söåra delen, t. ex. åarne vid Holmestrand; Skien vid Mikael's kyrka; Arendal etc.) *Vååten tjock och saåfull, fotshög ell. deruåfver*.

295. *RHODIOLA* Lín. Rosenrot.

- 1 *R. rosea* L. bladen tååittande, ovala—aflånga platta kottiga; blrna i tååa knippen i toppen, tvåbyggare. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.466. Fl.D.183.  
Fjelltr. (Lpl.—Dal. Boh. på Koön; Dyrö; samt vid Gullmarsviken. — N.) *Stj. uppråt, quartershög, med smårre bl. nedtill. Bladen vanl. helbrååå, mer såållan mot spetsen såågade. Rotstocken knölig, gul och våålluktande. — Sedum Rhodiola DC.*

296. *SEDUM* Lín. Fetknopp.

† Bladen breda platta [ehuru tjocka].

- 1 *S. Telephium* L. stjerkbl. uppråt; bladen bredt ågrunda—lancettlika såågade; blrna i tååa, nåågot rundade qvååstlika knippen. 2 8. — β *angustifolium*: bladen från smal bas lancettlika. Fig. Sv.B.447. Fl.D.2174; β 686.  
\* *purpureum* Fr. bladen bas afrundad; blrna röåa.  
Klipp. murar, tak, a. (Sk.—Ångml. VB. Umeå skåårg. enl. G. v. Ced. Vestml. Ner. Verm. Öl. Götll. — N. — β Sk. vid Mååsinge nära Torekow enl. A. Falck; foråom flerst. Söååml. Stafsjö bruk; Dr J. Samzelius. — \* Sk. på kyrkogåråar etc.: Lund; v. Sallerup; mell. Pugerup och Vembergå etc. Trelleborg. VG. Göteborg 1862; J. Hulting. Götll. Söåerbys i Vesterhelde; Vååls kyrkog.) *Bladen oskaååååå tjockå saååfulla, vanl. motsatta, stund. skiftevisa, de öfre hos hufvudf. med hjertlik bas; blrna hos samma form hvitgula. — Hufvudf. formen åå S. maximum Koch. \* S. purpurascens Koch.*

†† Bladen nästan trinda.

\* Med öfvervintrande grenskott vid basen.

a — Blommor gula.

2 *S. rupestre* L. grenskottens blad tätsittande, utstående ell. utböjda; stjelkbl. raka, alla trinda, jemnbredt syl-lik, uddspetsiga, blågröna, med sporrlikt bihang vid basen; blrna kortskafade, i knippsvis förenade klasar; foderbl. spetsiga, dubb. kortare än kronbl. 2 7, 8. Fig. Fl.D.113. H.N.f.4, n:o 58.

Bergstr. (Sk. Stenshufvud. Smål. Hingetorp i Thorsås sn enl. Ekstr.; Wista kulle i Skärstad: Scheutz. ÖG. Ner. Mårsätter i Hammar sn. Verml. VG. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Goull. — N. Christiania samt vestra delen upp till Trondhj. Stordalselvsn utlopp.) Var. med båglikt utböjda blad på grenskotten, och större blr i mer utdragna klasar: *S. reflexum* Koch.

3 *S. sexangulare* L. grenskottens blad 6radiga; alla bl. tätsittande, trinda, jemnbredt aflånga, trubbiga, blågröna, med spetsigt bih. vid basen; blrna som hos föreg.; foderbl. trubbiga, dubb. kortare än kronbl. 2 7. Fig. Fl.D.1644. H.N.f.9, n:o 43.

Backar. (Sk. Smål. Ed.—Gestr. Jeml. Åreskutan. Vestml. kring Mälaren. Ner. Goull. — N. Hitteren etc.) Har ljusgrön, något blåaktigt färg; i växtsätt lik följ., men utmärkt af de smalare, i 6 spiraltreder tegellagda bladen. — *S. boloniense* Godr. & Gren.

4 *S. acre* L. grensk:s blad otydl. 4—6radiga; alla bl. äggformiga, trubbiga, med afrundad bas, ljusgröna; blrna oskafade i knippen; foderbl. som hos föreg. 2 6, 7. Fig. Sv.B.149. Fl.D.1457.

Torra st. a. (Sk.—VB. nor. del. och Jeml. Boh. Öl. Goull. — N. till Ost-Finnm.) Mycket grenig af nedligg. grenskott.

b — Blommor hvita.

5 *S. album* L. bladen trinda aflånga trubbiga utstående; blrna i grenigt knippe; foderbl. trubbiga, flere gr kortare än kronbl. 2 7, 8. Fig. Sv.B.430. Fl.D.66.

\* *balticum* C. Hn. hela örten rent ljusgrön; blrna dubb. smärre, med gula knappar. Berghällar. (Blek.—Uppl. Helsl. Söderhamn; samt Kuggörns hamn enl. Wistr. Vestml. på Ångsön. Ner. vid Hjelmarén. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Goull. — N. till Romsdalen. — \* Södm. Tullgarn på Fridön; Utön, vid Albagen. Goull. Thorsborgen; mell. Fleringe och Bunge kyrkor; Othem, vid Slite och på Asundholmen; Visby, och Stenkyrka sn enl. G. v. Ced.) Bladen vanl. rödfäckiga, ståndarknapp. hos hufvudformen rödvioletta. — \* synes vara en väl skild form, trol. egen art.

\*\* Grenskott inga ell. helt små.

6 *S. anglicum* Huds. bladen något 3kantigt äggformiga, blågröna, glatta; blrna i n. bladlöst knippe; foderbl. mycket kortare än kronbl. 2 7, hv. ell. röd. blr. Fig. Sv.B.604. Fl.D.82. H.N.f.3, n:o 36.

Back. och klipp. r. (Boh. Styrsö nära väderqvarnen; Hallonskär; Koön vid Marstrand. — N. Arendal; Stavanger—Molde, efter kusten.) 1—2 tum hög; äldre rödaktig. — *S. rubens* Fl.D.

7 *S. annuum* L. bladen jemnbredt aflånga, halftrinda, glatta, något utböjda; blrna som hos föreg.; foderbl. n. af kronbladens längd. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.59. H. N.f.5, n:o 45.

Torra st. (Lpl.—Boh. och nordöst. Skåne. — N. Ost-Finnm.—Christiania, Sennäs etc.) Vanl. upprätt, 2—3 tum hög, mörk, ofta rödfäckig. — *S. rupestre* Fl.D.

8 *S. villosum* L. bladen jemnbreda, halftrinda, trubbiga, glandelhåriga; blrna skafade, i glandelhårigt knippe; foderbl. mycket kortare än de bredt äggr. kronbl. 2 7. Fig. Sv.B.746. Fl.D.24. H.N.f.6, n:o 31.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. nedom fjellet Ripanes: Rect. Forel. Pit. Lpm. Læst. enl. G. v. Ced. — N. Salten upp till Ballaur, nära Sv. gränsen. Vangsfj. Jettafjell vid Vaage, samt Lomseggen i Gudbrandsdalen; Filefjell; Valders i Quamskleven; Benshöjden i öfra Tellem. Slidre etc.) 2—3 tum hög, slutt. mot hösten med mycket små rundade grenskott; blrna ljusröda, torra violetta.

## 297. BULLIARDA DC. Fyrling.

- 1 *B. aquatica* DC. bladen jemnbreda; blrna i bladveckan, utan tydl. skaft. ☉ 6, 7, hv. blr. — *β prostrata*: stjelen nedliggande; bladen något bredare. Fig. Sv.B.724. Fl.D.1510. H.N.f.9, n:o 42.  
Sjöstr. fukt. st. (Sk.—*Angml.* VB. vid Lule-elf. Boh. Gottl.? — N.)  $\frac{1}{2}$ —2 tum lång ört, ofta med köttiga, n. sylformiga blad. — Tillæa L. *β T. prostrata* W.

- 55 Fam. LYTHRARIÆ Juss. Fod. klock- ell. bägarlikt af samväxta blad, tandadt. Fröh. fritt, flerrumm., mångfröigt, med centralfäste. Fröhvite 0.

## 298. LYTHRUM Lin. Fackelblomster.

- 1 *L. Salicaria* L. bladen motsatta ell. 3 i krans, sällan skiftevisa, oskaftade, lancettlika—afånga, med något hjertlik bas; blrna kransvisa i ax. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B. 256. Fl.D.671.  
Stränd. a. (Sk.—VB. nor. del. och Jeml. Stugu sn, Strånäset. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) 1—3 fot hög, med blomrikt ax, stjelkomfattande, stund. mjukludna blad.

## 299. PEPLIS Lin. Rödlonke.

- 1 *P. Portula* L. bladen motsatta, omv. äggrunda ell. spadlika, helbräddade; blrna vanl. utan kronblad. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.592. Fl.D.64.  
Vattengrop. sjöstr. (Sk.—söd. Lpm. Öl. — N.) Nedliggande, ell. i djupare vatten upprätt, med små, oskaftade blr i bladveckan.

- 56 Fam. ONAGRARIÆ Juss. Fod. trattlikt, med pipen omgifvande och vidväxt det flerrummiga fruktämnet. Frukt 2—4rumm. fröhus med centralfäste. Fröhvite 0.

## 300. OENOTHERA Lin. Gultraf.

- † 1 *O. biennis* L. stj. sträsprickig och hårig; bladen äggrundt lancettlika; ståndarne kortare än de i spetsen intryckta kronbladen. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.549. Fl.D.446.  
Odl. st. r. (Sk.—Uppl. Ner. och Verm. Öl. Glömminge. Gottl. Förvildad i och omkring trädgårdar. — N. förvildad: Ax. Bl.) Har stora blr med lång pip, oskaftade fröhus i skärmbbladens veck.

## 301. CHAMÆNERION Scop. Kropp.

- 1 *C. angustifolium* Scop. bladen strödda lancettlika, med n. vinkelrätt utstående sidonerver; blomklasen mångblommig. 2 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.130. Fl.D.289.  
Back. skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Oftast ett par alnar hög, i fjelltrakt. till alla delar mindre. — *Epilobium* L. *E. Gesneri* Vill. *E. spicatum* Lam.

## 302. EPILOBIUM Lin. Dunört.

† Märket 4deladt, med utböjda flkar.

- 1 *E. hirsutum* L. stj. slutl. mycket grenig, mjukluden; bladen motsatta, halftomfattande, lancettlika, tät sågade, mjukludna; foderlikarne med en syl-lik udd i spetsen. 2 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.326. H.N.f.5, n:o 39.  
Bäck. och fukt. st. r. (Sk. flerstädes ymnig. Hall. Halmstad. VG. Göteborg; Eggby sn. Smål. Jönköping, vid Racksjön; Vestervik vid Horns rusthåll. Stockh. Djurgården. Rosl. omkr. Norrtelge; Björnö etc. Uppl. Uppsala; Tierp sn, Gryttjom: Arn. Öl. Bredinge i Kastlösa sn; Borgby i Mörbylånga. Gottl. Visby, vid gamla hamn.) 1—2 alnar hög, med tumsvida vackra blr. Var. tätare luden, med hvitulliga fröh.: *E. intermedium* Reich. — *E. hirsutum* *β L.F.Su.*



- 2 *E. parviflorum* Schreb. stj. vanl. enkel, mjukhårig; bladen motsatta, oskaftade, lancettlika, glest naggsågade, småludna ell. glatta; foderflik. *spetsiga*, utan märklig udd. 2, 7, 8, r. blr. —  $\beta$  *glabratum*: bladen och nedre delen af stjelen glatta. Fig. Fl.D. 347. H.N.f.8, n:o 43;  $\beta$  f.5, n:o 40.

Fukt. st. diken, r. (Sk.—Uppl. Rosl. Vestml. Frösåker, samt vid Qvistberga i Kungsåra sn. Ner. Lanna i Hidinge sn. Boh. Nord-Koster. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Uppl. vid Bergsbrunna i Danmarks sn. ÖG. flerst. enl. Kindb. Smål. Svarttorp i Odensvi sn enl. Ekstr. Sk. enl. F. Aresch. Öl. Bredinge; Glömminge. Gottl. lilla Carlson.) 2—3 qv. hög, spåhare och med smärre blr än föreg. Var. med 3 blad i krans. — *E. hirs. a* L.Fl.Su.;  $\beta$  L. herb. *E. pubescens* Roth.  $\beta$  *E. rivulare* Wg.

- 3 *E. montanum* L. bladen motsatta, ganska kort skaftade, meränd. åggrunda, sågtandade, n. glatta; foderflik. n. trubbiga. 2, 7, 8, r. stund. hv. blr. Fig. Fl.D. 922. Skogsmark etc. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till Finnm. Tromsøe.) Var. *allsefter fuktigare ell. torrare lokal från alshög till några få tum hög, samt med större och mindre blad och blr; bladen stundom 3 i krans.* (*E. virgatum*.)

†† Märket helt, ell. slutl. olikformigt flikadt.

\* Stjelen trind och glatt med 2 hvitludna ränder.

- 4 *E. origanifolium* Lam. bladen kort skaftade, åggrunda, *spetsiga* sågtandade, glatta. 2, 7, 8, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.707, f.2. H.N.f.5, n:o 41. Fjelltr. vid källdrag etc. (Lpl.—Dal. ned till Svartnäs bruk och Helsl. nor. och vest. del. — N.) Vanl. 3—6 tum, stundom 2—3 quart. hög. På fjellen så varierande, att någon gräns mellan denna och följ. knappt står att finna. — *E. alpinum*  $\beta$  Ed.4. *E. alsinifolium* Vill.

- 5 *E. alpinum* L. bl. med korta ell. inga skaft, *ellipt.*—*aflånga trubbiga*, n. *helbraddade*, glatta. 2, 7, 8, r. säll. hv. blr. —  $\beta$  *dasy carpum*: fröhusen hvitludna. Fig. Sv. B.707, f.1. Fl.D.322. H.N.f.8, n:o 44.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. Angml. Tåsjöberget m. fl. st. Medelp. Torp sn. — N.) Var. som föreg., från 8—10 tum hög och n. upprätt [*E. Hornemanni* Reich. och Beurl.], till ett par tum låg, nedliggande, med 1—3 blr i den uppböjda toppen; en sådan liten form af denna ell. föreg. art var Linnés ursprungliga *E. alpinum*. —  $\beta$  *E. nulan* Schmidt. *E. sudeticum* Beurl.

\*\* Stjelen glatt, ell. öfverallt småluden, med 2—4, mer och mindre tydliga kanter.

- 6 *E. roseum* Schreb. med knoppbärande grenskott; stj. med vanl. 2, strimlika kanter, särd. upptill småluden; bladen skaftade, åggrunda lancettlika, glest småsågade, n. glatta; foderflik. *spetsiga*. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.742. Fl.D.1815. H.N.f.3, n:o 34. \* *purpureum* Fr. stj. från bladfastena nedåt grundt 2färad.

Fukt. st. r. (Sk.—Uppl. Uppsala; Norrtelge. Vestml. Köping. Ner. Verml. Christinehamn. Dalsl. Ödsköldt sn. Boh. Öl. — N. Christiania; Bergen. — \* Fordom funnen i Hall. vid Halmstad och i Södm. vid Eskilstuna.) 2—3 quart. hög, ofta mycket grenig.

- 7 *E. tetragonum* L. med rosett bärande grenskott; stjelen 4kantig, vanl. glatt; bladen något omsvallande ell. oskaftade, utdraget lancettlika—aflånga, lått sågtandade, glatta; foderflik. *spetsiga*. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.1267 (var.). Reich.t.198, 199. H.N.f.2, n:o 46; f.8, n:o 41, 42.

Fukt. st., r. (Sk.—Uppl. Uppsala. Ner. flerstädes. Boh. Marstrand. Öl. Gottl. — N. Arendal i Barbodalen.) Stjelen 2—4 qv. hög; bladen dels glatta och glänsande, stund. rödaktigt anslupna, dels, och hos oss kanske ofast, glanslösa och finhåriga: var. *obscurum*; vanl. motsatta, säll. 3 i krans.

- 8 *E. virgatum* Fr. med utdragna bladiga grenskott; stj. otydligt 2—4kantig, upptill ofta småluden; bladen oskaftade, knappt omfattande, stundom omärkligt skaftade, lancettlika, glest sågtandade; foderflik. *trubbade*. ☉ 7, r. blr. Fig. Fl.D.2588. H. N.f.10, n:o 46.

Fukt. st. diken, r. (Sk. Kropps sn, vid Björka; Reften, Esperöd m. fl. st. enl. F. Aresch. Dek. Djupedal; Aspö, Sjuhalla och Klackebäck enl. Gosselm. Smål. Femsjö; Jön-

köping; Bergqvåra nära Vexjö; Nässjö; Vestervik, vid Lugnet; Hjortheds prestg. och Rinkaby i Hosmo enl. Ekstr. ÖG. trol. mångenstädes: Kindb. Hall.) *Ofta mycket högväxt, 1—1½ aln. på en gång lik. föreg. och följ. — E. tetragonum* β Wg. *E. tetrag.* var. *chordorhizum* Beurl.

\*\*\* Stjelken öfverallt småluden, utan kanter.

- 9 *E. palustre* L. stjelen trind, slät; bladen *lancettlika*—*jernbreda*, helbräddade ell. glest naggade; foderflik. trubbiga; fröhusen *finludna*. 2½ 7, 8, r. säll. hv. blr. Fig. Fl.D.1574.
- Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Var. *mycket, enkel och grenig, med från ½ tum breda, fingerlånga blad, till 1 lin. breda, tumslånga: var. angustum* ed.9, som isynnerhet träffas i fjelltrakter och synes vara en öfvergångsform till följ.
- 10 *E. lineare* Mühlenb. stj. trind, med några upphöjda strimmor; bl. *smalt jernbreda*, helbräddade ell. glest naggandade; foderflik. som hos föreg.; fröhi. *glatta*. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.10, n:o 43.
- Fjelltr. (Lpl.—Herjed. Ängml. Bjertrå sn, i Rammeldalen; Stigsjö sn: Arn. Helsl. nedom Tenberget i Loos: Wistr. — N. Finnm.—Dovre och Hugelien i Torpen. Aggerhus st.) Vanl. *quartershög och föga skiljd från föreg:s smärre former.*

### 303. CIRCÆA Lin. Hexört.

- 1 *C. lutetiana* L. stjelen *finluden*; bladen *äggrunda*, glest småtandade, n. glanslösa, med okantade skaft; blomskäften *finludna*. 2½ 7. Fig. Sv.B.586. Fl.D.210. H.N. f.1, n:o 41.
- Lundar, r. (Sk. Hall. Boh. på Skaftölandet; Lyrön vid Oroust enl. Lem. VG. t. ex. Hunneberg på affallet till Bursleds gästg. etc. Blek. Åryd; Carlshamns kastell: Gosselm. Öl. Halltorp i Högrum och vid Resmo; Lökenäs i Glömminge. — N. Christiansands st. på flere ställen. Bergens st. i Goustalien vid Ous, samt på Borgöen.) 2—4 qv. *hög, stund. med något hjertlika blad; blomfod. grönt ell. brunaktigt; kronbl. rödlätta.*
- 2 *C. intermedia* Ehrh. stjelen *glatt*; bladen *hjertlika*, glest groftandade glänsande, med föga ell. icke kantade skaft; blomskäften *finludna*. 2½ 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.703. Fl.D.256. H.N.f.2, n:o 47.
- Böskog. (Sk. Hallandsås; Söderåsen; Helsingborg i Pålsjöskogen; vid Ringsjön m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. Husqvarna: J. E. Zett. Hall. i Hasslöf. — N. enl. Blytt.) 10—15 tum hög; fod. *grönaktigt. Föres som var. än till föreg., hvilken den liknar till storlek och blomning, än till följ., som den i omseende till bladen är närmast.*
- 3 *C. alpina* L. stjelen *glatt*; bladen *som föreg.*, med *tydligt hinnkantade* skaft; blomskäften *glatta*. 2½ 6, 7. Fig. Sv.B.576. Fl.D.1321. H.N.f.16, n:o 48.
- Skog. på fukt. st. (Sk.—Lpl. Boh. Hall. Öl. — N. till Ost-Finm.) *Dubbelt mindre än de föreg. med både fod. och krona hvila, säll. rödaktiga.*

- 57 Fam. HALORAGÆE Br. Fodret omgifvande och samväxt med fruktämnet, som är 1- ell. fierrummigt. Kronbl. flyktiga ell. inga. Frukt uppbristande i 1 eller flere nötlika rum med ett hängande frö i hvarje.

### 304. MYRIOPHYLLUM Lin. Vattenslinga.

- 1 *M. verticillatum* L. bladen kammligt parbladigt delade, de nedre med långa hårfina, de öfre med *mycket korta* flikar; alla blrna *kransvisa i de öfre bladvecken*; blomfodret tydligt; kronbladen med utdragen klo. 2½ 7, hv. blr. — β *pectinatum*: öfre bladen knappt längre än blrna. Fig. Fl.D.1046 [β]. H.N.f.16, n:o 51; β n:o 52.
- Vattenpöl. r. (Sk.—Gestr. Helsl. Tuna sn, vid Hallsta m. fl. st., samt vid Hudiksvall: Wistr. Ängml. Ytter-Lännäs sn, Nyland; Bjertrå sn, Strinnefjärden: Arn. Vestml. Ner. Örebro; stora Mellösa; Vinteråsa etc. VG. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Porsgrund; Drammen.) Stjelen *vanl. nedliggande, öfverst slutande i ett litet bladknippe; blomkrans. föga aflägsnade från hvarandra. — β M. pectinatum* DC.

2 *M. spicatum* L. bladen parbladigt delade, *alla* [hos hufvudformen] med *långa, hårfinna*flikar; *alla* blrna *kransvisa*, bildande *glesa* bladlösa ax; ♀-foder 0; kronbladen utan klo. 24 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.681. H.N.f.16, n:o 49.

\* *squamosum* Lest. de nedre stjelkbladen flere gånger mindre än de öfre, med mycket korta och breda flikar.

Sjöar och renare vatt. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. sälls. Äfven i Ost-Finnm.: Norm. — \*Torn. Lpm. Karesuando.) Blomskärmen tydliga, fjäll-lika. Hanblrnas kran-sar inlaga toppen af det afbrutna axet; honkran-sarne nedtill, men ofvan de öf-versta bladen. De nedre bladen hos \* likna fullkomligt föreg. arts öfversta, blrna stödjande blad.

3 *M. alterniflorum* DC. bladen som hos föreg.; honblrna kransvisa, till en del i de öfversta bladveckan; hanblrna skiftevisa, bildande ett bladlöst ax; för öfr. som föreg. 24 6, 7. Fig. Fl.D.2061. H.N.f.4, n:o 82.

Sjöar. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) Till alla delar mycket finare än föreg. Axet kortare, bladlöst, utom de nedersta ♀-kransarne, som vanl. understödas af de öfre stjelkbl.

### 305. HIPPOURIS Lin. Ledgräs.

1 *H. vulgaris* L. stjelken ledad, med kransvisa, jemnbreda—lancettlika, trubbadade blad. 24 6—8. Fig. Sv.B.335. Fl.D.87. H.N.f.14, n:o 50.

Sjöstränd. a (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Vanl. fotskög, upprät, med omkr. 8 blad i krans. Var. i rinnande vatten med lång kulliggande stjelk, talrika [omkr. 12] och långt utdragna blad i hvarje krans: var. *fluvialis*; samt vid hafsstr. med så [4—8], breda, stund. n. ovala bl. i kransen: var. *maritima*. Bägge for-merna öfvergå utan gräns i den vanliga.

## 8 KLASSEN

# ROSIFLORÆ.

58 Fam. **POMACEÆ** L. Blomkrona roslik. Stånd. många. Fruktämnen 1—flera, in-värta i, och med fodrets bas slutl. bildande en äplefrukt. Fröhvite 0.

306. **PYRUS** Lin. Apel (1), Päronsträd (2).

1 **P. Malus** L. bladen äggrunda kortspetsiga sågade; blrna i oskafad flock, med vid basen hopväxta stift; frukten med intryckt bas.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. ell. rödl. blr. —  $\beta$  *lomentosa*: undre sidan af bladen och de yngre fruktämn. ludna. Fig. Sv.B.229. Fl.D.1101. Löfbackar och ängar. (Sk.—Gestr. Vestml. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Toten och Romsdalen. —  $\beta$  sällsynt: Sk. Blinkarp vid Kyrkoålkern. Blek. Krono-varfvat i Carlskrona. Smål. Södm. Nyköping: C. Ind. Ner. VG. Göteborg. Boh. Hall. Varberg: Scheutz; Släp sn: Leff.) *Qvistarne hos  $\alpha$  ofta tornspetsiga; bladen på båda sidor glatta.*

2 **P. communis** L. bladen äggrunda smalspetsiga finsågade ell. helbräddade; blrna i qvast, med till basen fria stift; frukten afsmalnande mot skaftet.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *Pyrastr*: bl. rundade spetsiga; fruktämn. glatta. Fig. Fl.D.2118.

Hagar etc. r. (Sk.—Uppl. Vestml. Boh. Öl. Gottl.) *I vildt tillstånd äro grenarne tornspetsiga. Bladen hos den vanliga formen stull. glatta, endast i kanten fin-ludna; fruktämn. yngre småulliga. Fruktarna stund. [vanl. hos  $\beta$ ] rundade, men ej intryckta vid stjelnfästet som hos föreg. —  $\alpha$  P. comm.  $\alpha$  Achras DC. Prodr.*

307. **SORBUS** Lin. Oxel, Rönn (4).

1 **S. Aria** Crantz: bladen omv. äggrunda—smalt aflånga, hela, dubbelsågade, under täckta af enöhvitt ludd; blrna i tät qvast.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.302. H.N.f.6, n:o 38.

Bergsback. byar, r. (Sk. Kullaberg. Boh. i skären, t. ex. Lindö; Koster, vid Kile; Thorsby sn. Dalsl. Ed sn, på Falkberget vid st. Leesjön; Hedeberget i Dalskog. Södm. Landsort: C. Ind. Gottl. Visby, Snäckgårdet; bergen vid Iherevik; Lilla Carlsön, Sandön etc. — N. Christiania upp till Tellemarken. Arendal; Christiansand och Lindesnäs upp till Tutterön vid Trondhj.) *Frukten röd, bärlik: Oxelbär. Bladen vanl. omv. äggr., men var. i N. i Bergens skärg. smalt aflånga: var. salicifolia. — Crataegus Aria  $\beta$  L.Fl.Su. Pyrus W.*

2 **S. scandica** Fr. bladen äggrundt aflånga, inskuret flåkiga och sågade, under gråaktigt hvitludna; blrna som föreg.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. Fig. Sv.B.45. H.N.f.6, n:o 39.

Bergsback. byar. (Sk.—Medelp. och Dal. Boh. Grebbestad; Henån på Oroust. Öl. Gottl. — N. Porsgrund mellan Kalletangen och Öjenkast; nära Molde: Dr P. Olsson.) *Bladens och blomskafstens ludd mindre hvitt än hos föreg.; de förra dubbell djupare sågflakade; frukt som föreg.: Oxelbär. — Crat. Aria  $\alpha$  L.Fl.Su. Pyrus Aria Sv.B.*

3 **S. hybrida** L. bl. äggrunda—aflånga, vid basen parbladigt delade, uppåt endast flåkiga och sågade, under blekt hvitludna; blrna som föreg.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D. 301. H.N.f.6, n:o 40.

- Äng. byar, r. (Rosl. Vätö. Stockh. skärg. på Mörtön och Wellinge; Lidingön, nära Mölna udde; Kungshamn på Sicklaön; parken vid Svindensvik. *Smål.* Lunnaby i Öjaby sn enl. Scheutz. *Boh.* norr om Marstrand. *Gottl.* Eista; Bunge; Carlöarne; Fårö; Sandön etc. — *N.* Christiania upp till Ringerige; Arendal; Christiansand; Stavanger, på öarne, ymnig. Bergens st. Sælløe och Svanøe. Trondhj. på Hladehammeren.) *Träd mell. Oxel och Rönn.* — *S. ambigua* L. herb. *S. fennica* Kalm och Fr.
- 4 *S. Aucuparia* L. bladen parbladiga, med sågade, under glatta ell. finludna småblad; blrna i mindre tät qvast; frukten något aflängt rundad.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.145. F.I.D.1034.
- Bergiga skog., byar, a. (Sk.—Lpl. *Boh.* — *N.* —  $\beta$  *N.*) *Var. någon gång med flikiga småbl.: v. laciniata.*

## 308. CRATÆGUS Lin. Hagtorn.

- 1 *C. Oxyacantha* L. bladen othv. äggrunda, meränd. *grundt* 3—5flikiga glatta; blrna i flocklik qvast; foderflikarne bredt äggrunda, kortspetsiga; stiftan vanl. 2—3 [säll. 1].  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *laciniata*: bladen djupare klufna i aflånga, mer utstående flikar; stiftet meränd. 1. Fig. Sv.B.157. F.I.D.634.  $\beta$  H.N.f.9, n:o 45.
- Back. (Sk.—Uppl. och Vestml. Mälartrakten. *Boh.* Öl. *Gottl.* — *N.* till Romsdalen. Trondhj. Tutteröen.) *Torntaggit buske, med röda bärlika mjöliga frukter och meränd. 2 stift; bladen hos  $\alpha$  dels omärkligt och trubbigt flikade [C. oxyacanthoides Thuill.], dels till  $\frac{1}{3}$ del nära medelnerven, med spetsigare flikar: C. Ox.  $\alpha$  obtusata och  $\beta$  vulgaris DC. Prodr.  $\beta$  till bladen mera lik följ., men skiljd med de korta alltid hos frukten tillbakaböjda foderflikarne: C. monogyna Fingerh.*
- 2 *C. monogyna* Jacq. bl. meränd. *djupt* 3—5klufna glatta, med utstående, äggrunda spetsiga och sågade flikar; blrna som hos föreg.; foderflik. från bred bas lancettlika ell. n. jernbreda; stiftet *ensamt*.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. F.I.D.1162.
- Back. r. (Sk.—Gestr. vid Brynäs; Fleräng. Vestml. Ner. Göthlunda sn. Verml. Härön i Venern. Dalsl. *Boh.* Öl. *Gottl.* — *N.* upp till Romsdalen.) *Har oftare trädstam än föreg., ofta småludna fruktämnen och blomskäft; frukterna som föreg., något mer aflånga, med längre, mindre bestämdt nedböjda, ofta upprätta foderflikar. Både denna och föreg.:  $\beta$  variera med blad, som dro delade nära, eller ända till medelnerven: var. pinnatifida. — C. kyrtostyla Fingerh.*

## 309. COTONEASTER Med. Oxibärsbuske.

- 1 *C. vulgaris* Lindl. bladen äggrunda—oval, säll. lancettlika, helbräddade, under fint och tätt grå- ell. hvitludna; blomskäften i bladvecken, vanl. 1—3blommiga.  $\frac{1}{2}$  6, hv. ell. rödl. blr. —  $\beta$  *lutea*: bladen n. lancettlika; frukt. gula. Fig. Sv.B.295. F.I.D. 112. H.N.f.15, n:o 48 [var.].
- \* *nigra* Wahlb. blrna flere tillsammans; frukterna längre skaftade, svarta. Fig. F.I.D. suppl.73. H.N.f.6, n:o 37.
- Back. (Sk.—Gefle. Herjed. Jemt. på Åreskutan; Hackås sn. Vestml. Mälartrakt. Dalsl. *Boh.* Öl. *Gottl.* — *N.* upp till Snaasen. —  $\beta$  *Hall.* Varberg, på strandklippor vid Fiskläget. — \* *Sk.* Stenshufvud. Blek. Ronneby; Vämö, Fläskholmen. ÖG. Klingsberg enl. Kindb. Stockholm. Dalsl. i Änimskog, Ed och Skällerud snr. VG. Kinnekulle; Göteborg. *Boh.* Domsö m. fl. öar; Uddevalla. *Hall.* Varberg på Näset. *Gottl.* flerst. — *N.* Christiania.) 2—4 fot hög buske, vanl. med röda bärlika frukter. — *Mespilus Coton. L.* \* *C. melanocarpa* Blytt.

59 Fam. **SENTIOSÆ** L. Krona roslik. Fruktämnen flere, fria ell. insänkta i fodrets bas, slutl. en- ell. fåfröiga, åtskilda karpeller. Fröhvite 0.

1 Flocken **Rosæ**. Karpeller talrika, inneslutna i fodrets slutl. köttiga och bärlika pip [nypon].

310. **ROSA** Lin. Törne, Nyponbuske.

† Taggarne klotlikt krökta; bladen alltid 2—3pariga.

\* Småbladen dubbelsågade.

1 *R. rubiginosa* L. taggarne grofva, mycket krökta, blandade med smala raka; småbl. äggrunda, under och i kanten glandelbärande; nyponen äggformiga—oval, på meränd. glandelhåriga skaft.  $\frac{1}{2}$  7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.463. Fl.D.870. H.N.f.3, n:o 41.

Backar. (Sk.—Uppl. och Vestml. i Munktorp sn. Dalsl. Dalbobergen vid Venersborg. Boh. Öl. Götll. — N. Drammen, Laurvig etc.) Har starka taggar, meränd. glandelbörstiga nyponskaf, vålluktande blad. — *R. Eglanteria* L.Fl.Su.2. [men icke Herb.] Sv.B. *Rosa suavisfolia* Lightf.

2 *R. inodora* Fr. alla taggarne likformiga, klotlika; nyponskaf glatta; för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. H.N.f.10, n:o 51.

Backar, r. (Hall. teml. allm. i Tölö sn, vid Blomberget i Släp, samt i Fjärås enl. Leffl. Boh. vid Grinsbyvattnet på Oroust; samt mellan Henå och Rödberget; Kalfö; Askeröarne. VG. Kinnekulle, Vesterplana Störäng. Götll. i Mästerby sn enl. G. v. Cederv.) Lik *R. canina* med karakter af föreg., men har blrna mer ensamma, säll. 2—3 tillsamm. näst. alltid med hvita kronbl.; bladen utan märklig lukt, med smälare, mer sylspetsade sågtänder.

3 *R. Acharii* Billb. tagg. något klotlikt krökta; småbladen gles småhåriga; nyponen elliptiska, glatta, med glandelhåriga skaft och foderflikar.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. Sv.B. 577. H.N.f.6, n:o 42.

Back. lund. r. (Sk. Smål. i Kalm. län. ÖG. Södml. Nyköping flerst.: Int.; Örnön och Delarön. Stockh. Hagapark; Beckbruket m. fl. st. Vestml. VG. Trollhättan. Dalsl. Boh. Hall. Varberg; Släp sn, nära Prestbron; Leffl. Öl. Borgholm. Götll. Vänge och Follingbo snr. — N. vid Molde, samt Båevik vid Isfjorden.) Har rakare och smälare taggar än de 2 föreg., tunna småblad, med sågtänder, som i kanten hafva några smärre glandelbärande tänder; förenas af några förf. med följ. art. — *R. collina* Fr. Mant. 3.

\*\* Småbladen enkelsågade.

4 *R. canina* L. taggarne likformiga klotlika; småbladen ovala—lancettlika, släta och glatta; nyponen äggformiga—åflånga, jemte skaften glatta.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. —  $\alpha$  nitida: bladen glänsande; nyp. aflånga. —  $\beta$  opaca: bladen blåaktiga, utan glans; nyp. elliptiska. —  $\gamma$  sentiosa: tagg. föga krökta; nyp. rundade. Fig. Sv.B.541. Fl. D.1695. H.N.f.6, n:o 41.  $\beta$  Sv.B.29. Fl.D.555. H.N.f.8, n:o 45.  $\gamma$  Sv.B.475.

Back. etc. a. (Sk.—Ängml. Dal. Öl. Götll. — N. till Nordl.) Var. någongång t. ex. på Lilla Carlsons klippor n. tagglös. —  $\alpha$  *R. sarmentacea* Sw. *R. Schwartzii* Sv.B.  $\beta$  *R. venosa* Sw.  $\gamma$  *R. sentiosa* Achar.

5 *R. dumetorum* Thuill. tagg. som hos föreg.; småbladen bredt ovala, ojemna och småludna; nyponen elliptiska, jemte skaften glatta.  $\frac{1}{2}$  6, 7, ljusr. ell. hv. blr. Fig. Fl.D. 2718. H.N.f.7, n:o 43.

Back. etc. (Sk.—Hetsl. Ängml. Säbrå sn, Bondsjö och Själand: Arn. Dal. Ner. Dalsl. — N.) Bladens sågtänder äro tydligare framåtriktade än hos följ., der de oftast hafva spetsen utböjd. Utgör en medelform mell. föreg. och följ. — *R. collina* Wg.

6 *R. coriifolia* Fr. tagg. som hos föreg.; småbladen tjocka och ojemna, småludna; nyponen rundade, jemte de mycket korta skaften glatta.  $\frac{1}{2}$  6, r. ell. hv. blr. H.N. f.6, n:o 43.

Back. och lund. (Sk.—Uppl. vid Carlholms bruk. Gefle på Limöarne. Vestml. Boh. Öl. — N. södra del.) Svår att skilja från föreg.; i fruktstillståndet utmärktare af de stora rundade, stundom päronlika och tidigare nyponen, hvilkas foder-

*flikar qvarsitta, ej som hos föreg. snart affalla. — R. crassifolia Wallm. R. colina γ Wg.*

†† Tagg. raka, ehuru stund. något nedböjda ell. omärkligt krökta; bladen 2—3pariga.

\* Småbladen dubbelsågade: *R. villosa L.*

- 7 *R. pomifera* Fr. småbladen *aflånga* småludna; nyponen *runda*, mogna *lutande*, jemte skaften *stift glandelhåriga*.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.313. H.N.f.9, n:o 47.

Jordvall. back. r. (Sk.—Södm. Stockh. Vestml. Frösåker. Ner. Örebro; Almby sn; Riseberga etc. VG. Göteborgstrakten. Dalsl. Lättbyen i Gunnarsnäs sn. Boh. Koön; Christinedal vid Gustafsberg. Gottl. — N. Romsdalen.) *Nyponen i södra länderna stora som plommon, uppåt mellersta Sv. som krusbär och mindre lutande; skull. knappt skiljbara från större former af följ., med hvilken denna art synes sammanflyta. — R. villosa ed.9.*

- 8 *R. mollissima* Fr. småbl. *ovala*—n. *runda*; nyponen *klotrunda upprätta*, jemte skaften *glandelhåriga* med qvarsitt., *samtstående* foderflikar.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. —  $\beta$  *glabrata*: bladen glatta, glest glandelprickade. Fig. E.B.2459. H.N.f.7, n:o 44.

Ängsback. etc. (Sk.—Hels. Jemtl. Ner. Verm. Dalsl. Öl. Gottl. enl. G. v. Ced. — N. till Senjen: Norm.) *Låg buske med gråludna, ofta trubbiga ojemna blad, klotrunda ell. något nedplattade nypon, som mogna i medl. af Sept. och hafva föga flikiga foderblad. — R. villosa L. herb.*

- 9 *R. tomentosa* Sm. småbl. *oval* ell. *äggrundt lancettlika*; nyponen *elliptiskt rundade* ell. *oval*, *upprätta*, slutl. *glatta* med glandelhåriga skaft och vanl. *affallande*, *utböjda* foderflikar.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. —  $\beta$  *scabriuscula*: bl. tunna gråaktiga, föga ludna, något sträfv. Fig. Sv.B.571. Fl.D.2719.  $\beta$  E.B.1896. H.N.f.9, n:o 46.

Ängsback. (Sk. öst. del. Blek. Smål. Vestervik. — Geste på Holmudden vid fjärden. Hels. Söderhamn. Vestml. Ner. Boh. Öl. Gottl. enl. G. v. Ced. — N. Molde och Bævik vid Isfjorden.) *Högre buske, med något aflånga, hårdare och mer senmogna nypon än föreg.; foderflik. mer pardelade och utstående; än qvarsittande till mogningen, än icke. Denna och föreg. art ofta knappt skiljbara, om icke af den mogna frukten. — R. tomentosa γ subrubiginosa [med glandelbärande vallukande blad] Handb. ed.3.*

\*\* Småbladen enkelsågade.

- 10 *R. cinnamomea L.* småbladen *aflånga*—omv. *äggrunda*, vanl. *trubbiga*, under gråhvita och meränd. småludna; nyponen *klotrunda*, *jemte skaften glatta*.  $\frac{1}{2}$  6, r. blr. —  $\beta$  *turbinella*: nyp. i flock, päronlika. —  $\gamma$  *fluvialis*: n. tagglös, bladen under glatta, blott skaften och nerverna småludna. Fig. Sv.B.553. Fl.D.1214. H.N.f.7, n:o 45, 46.  $\gamma$  Fl.D.868.

Äng. och skogsback. (VB.—Sk. nor. del. Boh. Thorskog i Vesterlunda enl. Leml. Öl. Gottl. — N. —  $\gamma$  Smål. vid Elmhult i Långemåla enl. Ekstr. — N. vid Glommen och Randsfjorden.) *Bladen stundom spetsiga, strädeles de öfre; vid stiplernas vidfästning finnas n. alltid 2:ne taggar. Nyponen små och mjuka, lifligt röda. — R. majalis Retz. R. cinerea Sw. R. fluvialis Fl.D. R. spinosissima Wg. och L.Fl.Su.*

- 11 *R. carelica* Fr. stammen *lätt beklädd med taggar och borster*; småbl. *aflånga*—*äggrunda*, glest småhåriga, under gråaktiga; nypon. *aflånga* sneda, upptill jemte skaften *glest glandelhåriga*.  $\frac{1}{2}$  6, r. blr. Fig. Fl.D.suppl.75 H.N.f.13, n:o 59.

Skogsback. r. (VB. Skellefteå, vid Furunäs.) *Foderflikarne äro både på Sv. och i H.N. lemnade Rycka ex. hela, men icke helbräddade, samt mot basen håriga af glandler, som äfven sträcka sig ned på nyponets sneda spets.*

††† Tagg. raka; bladen 3—5pariga.

- 12 *R. pimpinellifolia L.* stammen vanl. *mycket taggig*; bladen 4—5pariga med rundade eller ovala, på båda sidor glatta, *enkelsågade* småbl.; nyponen *klotrunda*, jemte skaften *glatta*.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. Fig. Sv.B.559. Fl.D.398. H.N.f.10, n:o 52.

Backar, stränder, r. (Boh. Marstrand, på Koön. Sk. Kullaberg enl. F. Aresch. — N. Leervig på Storöen i Bergens st.) *Lätt skiljbar genom sina talrika små glän-*

sande småblad. Finnes någon gång flyktig ur trädgårdarne. — *R. spinosissima* Sm. m. fl. *R. pimpinellif.*  $\beta$  intermed. Godr. & Gren.

- \*13 *R. alpina* L. stammen med inga ell. borstlika taggar; grenarne tagglösa; bladen 3—5pariga, med ovala, glatta, dubbelsågade småbl.; nyp. aflånga, mogna hängande, glatta, på glandelhåriga skaft.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. Jacq. A. 279. H.N.f. 9, n:o 48 [odl.]. Fjelltr. r. (N. Eidsvold på Mistberget. Christiania, på Malmö.) *Foderflik. meränd. hela.* — *R. inermis* Mill.

- 2 Flocken **Sanguisorbese.** Karp. få [1—4], inneslutna inom det slutl. hårdnande blomfodret.

### 311. AGRIMONIA Lin. Småborre.

- 1 *A. Eupatoria* L. bladen olikparigt delade, med ägggrundt aflånga småblad; fruktfodret omv. äggformigt, säradt ända till basen med utstående kantborster. 2 7, g. blr. Fig. Sv.B. 99. Fl.D. 588.

Skugg. st. (Sk.—Gestr. Helsl. Söderhamn. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N.) Vanl. 3—4 quart. hög. Klasen lång och smal, axlik.

- 2 *A. odorata* Mill. blad. som hos föreg., under glandelprickiga; fruktfodret halvklotrundt klocklikt, slätt ell. blott till midten grundt säradt, med nedböjda kantborster. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D. 2471. H.N.f. 14, n:o 31.

Skugg. st. r. (Sk. Fogelsång, Gladsax och Jerresta hallar enl. F. Aresch.; Helsingborg. Blek. Carlskrona skärg., på Hästö, Fläskholmen och Aspö m. fl. st. enl. Gosselm. ÖG. i skären. Stockh. på Hästholmen. Rosl. Blidö sn allm. Dalsl. Heden i Dalskog sn. Boh. på Koön, Brännö, Hinsholmen etc. vid Göteborg; Uddevalla, söd. om Gustafsberg; vid Stora Bratteröd; Qville sn, på Hjertö och Väderöarne m. fl. st. samt Hall. Vallda vid Ulfås; Klefbergen i Släp, och Blixered i Tölö sn: Leml. — N. Bekkelaget och Malmö vid Christiania.) Liknar mycket föreg., men skiljes med fruktfodren, hvilka derjemte vanl. innesluta 2 karpeller [hos föreg. oflast blott 1], samt med kortare klasar på högre stjelk. Har terpeninaktig lukt. — *A. procera* Wallr.

### 312. SANGUISORBA Lin. Blodtopp.

- 1 *S. officinalis* L. glatt; bladen parbladiga; axen rundade ell. kort elliptiska; stånd. icke längre än blomkronan. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B. 305. Fl.D. 97. H.N.f. 6, n:o 51.

Fukt. äng. r. (Gottl. — N. Skien vid Gjerpen; Lister; Jedderen; Stavanger till Storöen i Bergens st.) Omkring alnshög, med blodröda ax.

### 313. POTERIUM Lin. Får-pimpinell.

- 1 *P. Sanguisorba* L. stjelen kantig, upprät; axen rundade ell. aflånga; fruktfodren hårda nätrynkiga, med 4, otydligt vingade, trubbiga kanter. 2 6, 7. Fig. Fl.D. 1939. H.N.f. 7, n:o 52; f. 11, n:o 48.

Backar, r. (Sk. mell. Stenshufvud och Rörum, samt vid Helsingborg enl. F. Aresch.; Limhamn. Små. Eds sn  $\frac{1}{2}$  mil öst, om Djursnäs; flerst. i Gamleby och Lofta snr. Stockh. i Drottningholms park. Uppl. mell. Sänga och Skå kyrkor, samt vid Svartsjö ladug. Gottl. Visby, Snäckgårdet.) Icke olik *Sanguisorba* off. med parbladiga blad och rundadt, men grönt ell. något brunaktigt ax; stjelen vanl. glatt, stund. nedtill hårig: var. hirta. — *P. dictyocarpum* Spach.

### 314. ALCHEMILLA Lin. Daggekåpa.

- 1 *A. vulgaris* L. bladen njurtlika 7—9flikiga, veckiga, med rundade, öfverallt sågade flikar, på begge sidor gröna; blrna i stjelen spets. 2 5, 6, gr. blr. —  $\beta$  montana: bladen något silkesludna, mest i kanterna. —  $\gamma$  hybrida: rotbladen handdelade. Fig. Sv.B. 261. Fl.D. 693.

Ang. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  N. Dovre.) Var. glatt och hårig; i fjelltrakter ofta storbladig och glänsande glatt:  $\beta$  grandis Bl. Enum.  $\gamma$  har rotbl. n. så djupt delade som följ., hvaraf den möjligen är hybrid, såsom väzande bland båda.

- 2 *A. alpina* L. bladen fingerlikt delade i 5—9, aflånga, endast i spetsen hvass-sågade, under silkesludna småbl.; blrna som hos föreg. 2 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B. 758. Fl. D. 49. H.N.f. 14, n:o 53.



Fjelltr. a., i söd. prov. r. (Lpl.—Dal. Ängml. Hernön. Boh. VG. Göteborg. Hall. Vållda: Leffl. Sk. nära Bälunge. — N.) Omkring quartershög.

3 *A. Aphanes* Leers: bladen skäftade 3delade, med 2—4klufvaflikar; blrna i bladvecken. ☉ 7—10, gr. blr. Fig. Fl.D.973.

Fält och åkr. (Sk.—ÖG. och VG. Billingen och Kinnekulle. Hall. Hasslöv och Skot-torp: Theor. Öl. Goull. — N. Holtaalen; osäker såsom sedan Gunners tid icke funnen.) 1—4 tum hög, enkel ell. ända från stjelkens bas grenig. — *A. arvensis* Scop. *Aphanes* arv. L.

3 Flocken **Dryadesæ**: Karp. talrika enfröiga, fria [på från fodret skildt fäste].

315. *RUBUS* Lin. \*) Hallon (1), Björnbär (2—14), Hjortron (18).

† Buske, med frukt. vid mognaden lossnande från det gemensamma fruktfästet: Hallonbuske.

1 *R. idæus* L. stammen trind borsttaggig; de nedre bladen meränd. 2parigt parbladiga, de öfre (stundom alla) 3fingrade ell. enkla; småbladen under meränd. hvita; foderbl. utv. gröna, i kanten hvitulliga; kronbladen aflånga upprätta. 5 6, 7, hv. blr. Fig. Sv. B.181. Fl.D.788.

Back. stenrösen, a. (Sk.—Lpl. Öl. — N. till Alten: Norm.) Var. med alla bladen 3fingrade, samt med aflånga och rundade, stund. flikigt inskurna småbl.: var. *laciniatus*, någon gång sammanflytande till ell. enda: var. *anomalus*. Det småhvila luddet under försvinner stundom. Bären röda, sällan hvita.

†† Buskar, med frukt. starkt fastsittande vid och affallande tillsammans med fruktfästet.

\* Stammen upprät [endast med toppen lutande].

a — Foderbladen utvändigt gröna, endast i kanten hvitulliga.

2 *R. suberectus* Anders. stammen n. trind, upptill trubbkantig, glatt, med raka ell. något nedböjda taggar; stambladen meränd. 5fingrade; småbladen åggrunda, under blekare och småludna, uddbladet något hjertlikt; blommor i klase, ell. gles kvast; kronbladen omv. åggrunda. 5 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1992. H.N.f.6, n:o 44.

Bergsrött. stenrös. (Sk. Broby; Ousby; Kullaberg m. fl. st. — Södml. Ner. Vestml. Barkarö. Verm. Öl. — N. Christiania och Dröbak. Molde.) Blomfodret nedböjdt; frukten svartröd. Var. med 3- och 7fingrade blad. — *Rub. fruticosus* var. *elegans* Myr.

3 *R. fruticosus* L. stamm. 5kantig strimmig, kroktaggig; stamblad. 5fingr.; småbl. något hjertlikt åggrunda, under gröna småludna; blommor i kvast; kronbl. omv. åggrunda. 5 7, ljusröda blr. Fig. Fl.D.2589. H.N.f.5, n:o 51.

Bergsrött. etc. i grannskapet af hafvet. (Sk.—Södml. Dalsl. Boh. Hall. Hallandsås: Theor. Öl. I Smål. funnen ända till 8 mil från hafvet vid Ida i Ljunga sn. — N. Christiania st.) Stammen glatt eller beströdd med mörka glandler; fodret nedböjdt; fr. svart, glänsande. — *R. plicatus* Weih.

4 *R. affinis* Weih. stammen kantig och färad, med raka, i klasen något krökta taggar; stambl. 5fingrade; småbl. ovala, uddbladet hjertlikt, alla under gröna småludna, afsmaln. mot basen; blr i enkel, utdragen klase; kronbl. ovala. 5 7, hv. blr. Fig. H.N.f.6, n:o 45.

Lund. stenbundna st. (Sk. Krappertup enl. F. Aresch.—Stockh. Hall. vid Algussered.) Stammen glatt; foder tilltryckt; fr. som hos föreg.

\*) Arterna 2—13 sammanfattas af Linné m. fl. i dess *R. fruticosus*. Årsstammen bär vanl. endast blad, meränd. 5fingrade, hos få arter (8, 10, 14) sällan mer än 3fingrade; då den året efter bär blr och frukt, blifva bladen, åtminstone de öfre, ofta endast af sednare alaget, t. o. m. enkla. Uddbladet vanl. mer och mindre hjertlikt. Med stam menas ofvan årsstammen; taggarne äro antingen klolikt krökta, ell. raka, ehuru stundom nedböjda, d. v. s. rigtade nedåt.

## b — Foderblad öfverallt hvitludna.

- 5 *R. thyrsoides* Wimm. stamm. rundadt kantig, färad, upptill *kroktaggig*; bladen 5fingr., småbl. äggrunda—åflånga, under meränd. *hvit- eller gråludna*; blr i utdragen klase ell. spira; kronbl. *uldragget* omv. äggrunda.  $\frac{1}{2}$  7, blekr. blr. Fig. Fl.D.2539. H.N.f.3, n:o 42.

Bergsrött. etc. (Sk.—ÖG. Stockholmstrakten, vid Mörtviken och Ahlby; Skurusund. Boh. på Marstrandsön; Kongelf. Hall. vid Malvik. Öl. — N. Dröbak på Haaö.) *Stammen glatt ell. småhårig; de nedre taggarne smärre och rakare; småbladen smalare än hos de flesta öfriga, stundom på undre sidan mer gröna; fr. som hos föreg.*

\*\* Stammen nedböjd ell. nedliggande.

## a — Stammen kantig, med platta sidor, hårig ell. luden.

- 6 *R. discolor* Weih. stamm. strimmig småluden, med *raka* ell. *något nedböjda* taggar; bladen 5fingr.; småblad. äggrunda eller ovala, under meränd. *hvit- ell. gråludna*; klase mycket grenig *kroktaggig*; kronbl. omv. *äggrunda*.  $\frac{1}{2}$  7, hv. ell. ljusr. blr. Fig. Fl.D.2414. H.N.f.8, n:o 48.

\* *umbrosus* Weih. bladen under gröna, ehuru något ljusare än ofvanpå. Fig. H.N. f.10, n:o 53; f.13, n:o 60.

Bland buskar etc. r. (Sk. mell. södra Åsen och Ljungby hed; Helsingb.; Kullaberg. Blek. Carlshamn; Listershufvud etc. enl. Gosselm. Södm. Vester-Hanninge sn, Häringe. Hall. Särö. Boh. — N. Christiansands st.) *Lik föreg., men med mer sammansatt och utbredd blomställn.; fodr. nedböjdt; fr. svartviolett. — R. vulgaris \* discolor* Arrh. Monogr.

- 7 *R. Radula* Weih. stamm. hårig, med *gröfre, raka* ell. *nedböjda* taggar, glest blandade med glandler och små raka borst; bladen *som föreg.*; klase grenig, med glandler och *raka* borstlika taggar; kronbladen *bredt* omv. äggrunda.  $\frac{1}{2}$  7, hv. ell. blekröda blr. Fig. Fl.D.2413. H.N.f.8, n:o 47.

Bergsrött. etc. vid hafvet, r. (Sk. Helsingborg; Kullaberg; Romeleklint och Stens Hufvud enl. F. Aresch. Boh. Långedalen; Koön vid Marstrand. Blek. Carlskronatrakten; Carlshamn; Ronneby. — N. södra del. Ax. Bl.) *Stamm. sträf som ett rifjern [radula] af de fina, lätt lossnande nällaggarne; bladen tunnare än hos föreg., som denna art för öfrigt mycket liknar. — R. vulg. \* Radula* Arrh. Monogr.

- 8 *R. horridus* Hn. stamm. upptill luden och glest glandelhårig, med *grofva krökta* och *finare raka* taggar; bladen 3fingr.; småbl. bredt äggrunda, under gröna håriga; klase kvastlik glandelhårig med *kroktaggiga* blomskaf och foder; kronbl. *åflånga*.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Fl.D.suppl.77. H.N.f.6, n:o 46.

Stenbundna st. nära hafvet, r. (ÖG. Rönö vid Ettersundet; Jonsberg. jemte många andra st. i skärg. enl. Kindb. Smål. Stenserus i Ukna sn: Dr A. Lund; Blidstena i Eds sn enl. Ekstr.) *Utmärkt af sin taggighet, låta ludd, blandadt med gröfre glandelhår, rundade småblad och flere små blomsaml. i de öfre enkla bladens veck. Bl.fodret nedböjdt; fr. liten, n. svart. — R. infestus* ed.3.

- 9 *R. teniarum* Lindeb. stamm. *som föreg.*, strimmig; bladen 5fingr.; småbl. n. omv. äggrunda, med kort spets, under *blekare*; klase glandelhårig, *kroktaggig*; kronbl. *äggr.*, i spetsen *urnupna*.  $\frac{1}{2}$  7, hv. ell. r. blr. Fig. Lindeb.Nov.Fl.Scand.t.1. H.N. f.15, n:o 50.

Bergsrött. nära hafvet, r. (Boh. Öarne Oroust och Kalfö, på många st. t. ex. vid Svanvik, Varekil, Henå.) *Ej olik föreg., men skiljes med de anförda kännetecknen. Bl.fodret vid blomn. utstående, sedan tilltryckt; fr. n. svart.*

## b — Stammen trind ell. rundadt kantig.

## a — Alla småbladen tydligt skaftade; stammen glandelhårig.

- 10 *R. glandulosus* Bell. stamm. *alldeles trind*, med gröfre och finare, *raka*, men något nedböjda taggar; bladen 3fingr.; småbl. äggrunda eller ovala, under, med undantag af nerverna, n. glatta; klase af 1—4blommiga, utsperrade borsttaggiga blomskaf; kronbladen *spadlikt åflånga*.  $\frac{1}{2}$  7, hv. blr. Fig. Fl.D.1696. H.N.f.5, n:o 52.

Stenbundna st. nära hafvet, r. (Smål. Misterhult på Snuggö; Brändö; Öro; Vesterums sn på Nötégårdsö etc.; Kålmårdsö och Loftahammar; Vestervik flerst. t. ex. vid

Hornsbygga: A. Lund. ÖG. Dela i Grebo sn enl. Scheutz; Missjö i S. Anna enl. Kindb. VG. Kinnekulle.) *Taggarne nälfina; stambladens småblad stora tjocka\**, med rundad bas, fint och n. likformigt hvass-sågade; fr. svart.

β — De 2 nedersta småbladen oskaftade; stammen glatt.

- 11 *R. Wahlbergii* Arrh. stamm. *rundadt kantig*, med korta *raka*, i qvasten något *krökta* taggar; bladen 5fingr.; småbladen *tjocka*, rhombiskt äggrunda, under blekt småludna och något *bleka*; blrna i sammansatt, kroktaggig och småluden qvast; kronbl. rundadt äggrunda.  $\frac{1}{2}$  7, r. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 49.

Stenbundna st. nära hafvet. (Sk. Kullaberg etc. — Södm. Utön; Vermdön; Tollarö. Stockh. Djurgården. Dalsl. Lättshyn i Gunnarsnäs enl. Leffl. Boh. Toltp; Grötö etc. Hall. Öl. — N. Arendal; Tönsberg.) *Stammens taggar raka och nog starka; blgrenarnes längre och något krökta; småbl. stora, rundade med kort spets och största bredden n. vid midten; uddbl. vanl. hjertlikt. Fr. svartblå, af stora småbär.*

- 12 *R. corylifolius* Sm. stamm. *trind, upptill något kantig*, med *raka* taggar; bladen 5-ell. 3fingr.; småbladen *tunna*, äggrunda, under omärkl. håriga *gröna*; blr som föreg. med raka, något nedböjda taggar på skaften; kronbl. bredt omv. äggrunda.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.187. Fl.D.2538. H.N.f.7, n:o 48.

\* *pruinosis* Arrh. stamm. *trind, daggbå*; bl. 5—7, säll 3fingr.; blrna i enkla, klase-lik saml.; kronbl. äggrunda. Fig. H.N.f.7, n:o 47.

Stenbundna st. bergsrött. (Sk. Ystad; Ramlösa; Kullen; Torsekow etc. Blek. Ronneby; Lyckeby. Smål. Kalmar; Öro. ÖG. Gusum. Hall. Boh. i skären. VG. Kinnekulle; Venersborg. — N. söd. del.: Ax. Bl. — \* *Smål. och ÖG. i skären. Stockh. skärg. Hall. Klef, Sannö m. fl. st. Boh. Koön etc. Öl. Borgholm.) Lik R. cæsius med tunna, ofta endast 3fingr. blad, raka, men längre och starkare taggar. Fodr. nedböjdt; fr. något blåaktigt svart, stundom finluden, af stora småbär. — \* *R. pruinosis* ed.9.*

- 13 *R. nemorosus* Hay. stamm. *rundadt kantig, daggbå*, med starka, nedtill *raka*, i klasen något *krökta* taggar; bladen 5fingr., småbl. *tunna*, rhombiskt äggrunda, under vanl. som hos föreg.; blr i gles och meränd. enkel klase; kronbladen n. aflånga.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. H.N.f.6, n:o 47.

Bergsrött. lund. helst i skärg. (Sk.—Södm. Utön m. fl. där i Stockh. skären. Boh. Instön, Koön m. fl.) *Lik föreg., men med smärre, ofta n. glatta småblad och smal klase. Fr. svartblå. Var. med under hvitludna bl.: var. tomentosus, samt med tätt taggiga blad- och blomskäft. Denna jemte de 2 föreg. arterna sammanflyta stundom med hvarandra och anses af flere förf., trol. med rätta, blott vara former af en enda art.*

- 14 *R. cæsius* L. stamm. *trind*, meränd. daggbå, med *raka borstlika* taggar; bladen 3fingr., småbl. som föreg., klasen qvastlik, något hårig; kronbl. bredt omv. äggrunda.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. blr. — β *paniculatus*: småbladen nära glatta; blrna i flocklik samling. Fig. Sv.B.241. Fl.D.1213.

Stenbundna st. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Romsdalen. — β *Blek. Lyckeby. Boh. Vingaö och Varö i Styrö sn. Gottl. Stora Carlön enl. G. v. Ced. — N. Langöe vid Holmestrand.) Stammen får någon gång på mycket drifvande, men skuggiga ställen 5fingr. blad; blmgrenarne stundom taggiga eller glandelhåriga; fodr. icke nedböjdt; fr. daggbå.*

+++ Örter.

\* Bladen 3fingrade.

- 15 *R. saxatilis* L. stjelen sträf *flerblommig, med krypande refvor*; småbl. ojemnt och n. flitigt grofsågade; blomskäften sällan längre än blomman; kronbladen lancettlika, föga längre än fodret; frukt af få, föga sammanhängande småbär.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. — β *hybridus*: kronbl. bredare, dubbelt längre än fodret, vanl. rödlätta. Fig. Sv.B.349. Fl.D.134.

\*) Tjocka och tunna blad tagas här endast relativt; de förra mer pergamentsfasta, de sednare n. som postpapper; på skuggiga ställen blifva dock bladen i allmänhet tunnare.

- Steniga skogslund. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. *Helsl.* Norrbo sn, norr om söd. Dellen: C. O. Berg. — N. Ost-Finnm. Fjellbma i Tanen.) *Frukten sammansatt af stora röda småbär.*  $\beta$  *R. triflorus* Hook. enl. Fr. öfvergår i följ., som mera liknar *R. arcticus*.
- 16 *R. castoræus* Læst. stjelen *fäblommig*, vanl. sträf och utan refvor; småbl. *hvas-sågade*; blomskäften utdragna; kronbl. *flere g:r längre* än fodret; frukt af (5—7) småbär. 2 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.766. Fl.D.suppl.76. H.N.f.3, n:o 43.
- Elf- och bäckstränder. (*Torn. Lpm.* mellan Karesuando och Muonioniska; Kurkiokoski; Jukkasjärvi. *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Jokkmokk: Ind. m. fl. st. enl. H. Widm. *Pit. Lpm.* nedanförr Käksa vid Hundviken. *VB.* nor. del, vid Gädträsk samt i Nilsmyran nära Björkfors. *Helsl.* Norrbo, med föreg's  $\beta$ ; Arbrå sn, vid Kyrkbyn och Hosätter: Wistr.) *Oftast lik följande; stundom mer lik föreg., hvaraf den synes hybrid. Bären syrliga.*
- 17 *R. arcticus* L. stjelen 1—3blommig, utan taggar och refvor; småbl. *trubbsågade*; kronbladen n. omvänt äggrunda *utdragna*; frukterna af talrika småbär. 2 6, r. blr. Fig. Sv.B.26. Fl.D.488 och suppl.17. H.N.f.3, n:o 44; f.12, n:o 53 [var.].
- Svedjel, dikeskanter etc. (*Lpl.—Gefle. Uppl.* Järlåsa sn. *Stockh.* i ett kärr bortåt Uggelviken och på en holme utom Blockhusudden. *Dal. Vestml.* vid Brattheden nära Ramnäs kyrka; Hedbo i Möklinta sn enl. Leffl. *Verm.* i Eldalen samt Ny sn. — N. Ost- och Vest-Finnm. ned till Hedemarken.) *Mörkröda, syrligt aromatiska bär: Åkerbär.*
- \*\* Bladen enkla.
- 18 *R. Chamæmorus* L. stjelen enblommig; bladen nästan njurlika, 5—7flikiga; blrna tvåbyggare. 2 6, hv. blr. Fig. Sv.B.469. Fl.D.1.
- Skogskärr. (*Lpl.—Sk.* och söd. *Hall.* enl. Theor. — N.) *Var. med 4taligt foder och krona. Har röda, stult. gula bär: Björtrön.*

## 316. FRAGARIA Lin. Smultron.

- 1 *F. vesca* L. bladen 3fingrade, säll. enkla, med utsperradt håriga skaft; blomskäftens hår *tilltryckta* ell. föga utstående; fruktfodret *tillbakaböjdt*; pistillernas fäste *glatt*. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.16. Fl.D.2235. H.N.f.12, n:o 54 [var.].
- Back. och skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Bären lösa, saftiga, lätt lossnande från fästet: Smultron. Småbl. sammanflyta någongång till en enda, hjertlik bladskifva: var. monophylla.*
- 2 *F. elatior* Ehrh. blomskäftens hår *utsperrade*; för öfr. som föreg. 2 5, 6, hv. blr. Fig. H.N.f.6, n:o 48.
- Ängsback. r. (Sk.—Gefle. *Vestml. Verm.* Venerstrakten, särd. vid Norselven. *Hall. Öl.* Troligen på de flesta ställen förvildad, såsom allmänt odlad.) *Betydl. större än föreg. En del stånd sätta aldrig frukt. — F. magna Thuill.*
- 3 *F. collina* Ehrh. blad och bladskäft som hos de föreg.; blomskäftens hår *föga utstående*; fodret *uppböjdt*; pistillernas fäste *hårigt*. 2 5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *calycina*: fodret långt som kronbl. Fig. Sv.B.548. Fl.D.1389. H.N.f.6, n:o 49.
- Torra ställen, back. (Sk.—Norra *Uppl.* och *Vestml.* Mälartrakt. *Ner. Dalsl. Boh.* Sör Edsvik i Tanum; Otterön: Leffl. *Hall. Öl. Gottl.* — N. Skien; Christiania; Ringerige; Toten etc. —  $\beta$  *Blek. Ronneby.*) *Bären mer hårda och fastsittande vid fästet. Var med större och mindre blr.*

## 317. COMARUM Lin. Kråklöfver.

- 1 *C. palustre* L. bladen 2—3pariga, med tunglika—afslånga, hvas-sågade, under blågrå småbl. 2 6, 7, rödbr. blr. Fig. Sv.B.310. Fl.D.636.
- Kärr, a. (Sk.—Lpl. — N.) *Kronbl. mycket kortare än fodret.*

## 318. POTENTILLA Lin. Fingerört.

† Bladen parbladigt delade.

- 1 *P. fruticosa* L. buske; bladen 2—3pariga, med *helbräddade* småblad. 2 6—8, g. blr. Fig. Sv.B.253. Fl.D.suppl.74. H.N.f.4, n:o 63.

Torra st. r. (*Öl*. södra delen, nedom Thorslunda. Förvildad flerest. i *ÖG*. enl. Kindb., samt vid Gunnebo nära Göteborg.) 2—3 fot hög.

- 2 *P. rupestris* L. *stjelken upprät*; bladen 2—3pariga, de öfre 3fingr.; småbladen ägg-runda, djupt sågade, de öfre större; blrna i knippe i *stjelkens spets*. 2 7, hv. blr. Fig. Jacq.A.114. H.N.f.11, n:o 45.

Bergshöjd, bland buskar, r. (*Smål*. Alsheda, Stenberga, Skirö och Skede snr; Döderhult sn: Scheutz; flerest. i Mörlunda sn enl. Ekstr. *VG*. på de högre bergen; mell. Degeberg och Stola; Åsaka i Vartofta härad etc. *Dalsl. Hall. Boh.* mell. Kongsbacka och Göteborg: Tjörn flerest. enl. Leffl.; Uddevalla; Smörkullen i Skredsvik, och flerest. i Foss sn: Leffl. — *N. Christiania*: Moe enl. Ax. Bl.)

- 3 *P. Anserina* L. *stjelken krypande*; bladen mångpariga, med olikstora bladpar; småbladen hyvssågade; blomskäften i bladvecken, enblommiga. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.152. Fl.D.544.

Betesm. väg. a. (*Sk.*—*VB*. och södra *Lpm.* — *N.* till Ost-Finnm.: Norm.) *Bladen merändels hvithåriga, särdeles på undre sidan, hvilken ofta är silfverhvit.*

†† Bladen fingerlikt delade; blomfodret 10klufvet; kronbl. 5.

\* Alla bladen 3fingrade.

- 4 *P. norvegica* L. *stjelken upptill klynnegrenig*; småbladen lancetlika—ovala, djupt sågade eller inskurna, under håriga och gröna; kronbladen icke längre än fodret. ☉ 6—8, g. blr. Fig. Fl.D.171 och 1874. H.N.f.3, n:o 45.

Torra, stund. fukt. st. r. (*Verm.* *Dal. Gestr.* och *Helsl.* ymnig, spridande sig derifrån sparsamt ända till *Blek. Sk. Hall.* och *Boh.*, samt till *Jeml.* och *Ängml.* *VB.* Umeå sn. *Gottl.* Rohnemyr enl. G. v. Ced. — *N. Christiania*, särdeles på öarne i fjorden; Österdalen, Hallingdalen, Voss etc. Ost-Finnm. vid Pasvigelv i Sydvaranger: Norm.) *Ofta 2—3 quart. hög, med små blr, snart försvinnande rotblad, hvilka stund. dro parbl. delade i 2—3 par småbl.*

- 5 *P. nivea* L. *stjelken uppstigande*, med slutl. ganska långa blomskäft; småbladen omv. äggrunda—vigglika, inskuret sågade, under meränd. hvitludna; kronbl. längre än fodret. 2 7, g. blr. — *β pallidior*: bladen under gråludna. Fig. Fl.D.1035.

Fjellv. (*Torn.*—*Pit. Lpm.* — *N. Finnm.* Porsanger: Norm. till Gudbrandsdalen. — *β N. Nordl.*; Tromsøe.) *Bladen under silfverhvita.*  
(*P. maculata* \* *gelida*.)

\*\* Alla bladen 5fingrade, endast de vid blrna stund. 3fingrade.

- 6 *P. reptans* L. *stjelken långt krypande*; småbl. tunglika—vigglika, under gröna, småludna, sågade, med platta kanter; blomskäften ensamma i bladvecken, enblommiga. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.709. Fl.D.1164.

Ängsrenar. (*Sk.*—*Helsl. Vestml.* och *Verm.* *Hall. Öl. Gottl.* — *N.* sällsynt.) *Stjelken ofta flere fot lång; blrna stora.*

- 7 *P. argentea* L. *stjelken uppstigande*, upptill grenad i qvaslikt knippe, med korta raka blomskäft; småbladen vigglika, under meränd. hvitludna, n. från basen stikandade, med fram- och utåt rigtadeänder, den yttersta utdragen, kanterna tillbakaböjda. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.865.

Torra st. a. (*Sk.*—*VB.* nor. del. och *Pit. Lpm.* *Lul. Lpm.* Njammats. — *N.* till Senjen: Norm.) *Stjelken fotshög; bladens undre sida snöhvitt luden, stundom n. bar och gröngrå: P. argentea β sordida Fr. H.N.f.4, n:o 64, ända till n. rent grön: var. virescens ed.9.*

- 8 *P. collina* Wib. *stjelkarne mest nedliggande*, från midten grenade i utdragna, slutl. båglikt utböjda blomskäft; småbl. som föreg., omv. äggrunda, under grågrönt ludna, kanterna meränd. platta. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.2591. H.N.f.7, n:o 49, 50.

\* *pallescens* Hn. småbladen aflångt vigglika, under omärkligt håriga, gulgröna, yttersta tanden föga utdragen. Fig. H.N.f.4, n:o 65; f.7, n:o 51.

Torra st. r. (*Öl. Gottl.* — \* *Sk.* Andrarum; Stens Hufvud: F. Aresch. *Blek.* på Verkö; Christianopol. *Smål.* Högsby sn,  $\frac{1}{4}$  mil v. om Staby; Påskallavik. *ÖG.* Le-nestad i Regna enl. Kindb. *Upps.* bot. trädg. förvildad. *Öl.* ymnig i Ventlinge sn, derifrån spridd till Ottenby och Persnäs.) *Stjelkarne utgående från sidorna af det centrala bladknippet, nedligg. eller uppböjda, mera greniga än hos föreg.; bladen*

under tunnare gråhudna. \* har högre och mer uppstig. stjelk, ljusgröna, under gulaktigt bleka småblad, med mindre utdragen uddland. — *a* *P. Wiemanniana* Günth. *P. Güntheri* Pohl. \* *P. collina* Lehm. och Fr. *S.V.Sc.* *P. intermedia* Lin. Herb. och Fr.

(*P. procumbens* \* *mixta*.)

\*\*\* Rotbladen 5-, stjelkbladen 3fingrade.

9 *P. verna* L. stjelkarne som hos föreg., jemte de veka blomskaften strävt långhåriga; rotbladen 5fingrade, med n. jemnbreda stipler; stjelkbl. 3fingrade, snart förvisnande; småbl. omv. äggrunda eller bredt vigglika, ofvan midten tandade, under enkelt håriga, gröna. 2 4, 5. Fig. Fl.D.2510. H.N.f.4, n:o 66.

Sandåsar. (Sk.—Uppl. Vestml. Dalsl. omkr. Änimm. Hall. Öl. Gottl. — N. Christiania etc.) Liten och nedliggande, med alltid grön stjelk och gula kronblad, som meränd. sakna den mörkare fläcken, hvilken utmärker *P. macul.* Bladlångerna små äggrunda, den yttersta vanl. kortare än de på sidan.

10 *P. incana* Moench: stjelk och blad, utom de glesare längre håren, tätt småhudna af ett stjernformigt ludd; för öfrigt som föreg. 2 4 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.2592. H.N. f.3, n:o 46.

Sandåsar, r. (Blek. Carlskrona på många st.; Silbhöfda sn; Fridlestad sn, t. ex. s. om Kuleryd gästgg. Smål. från Eksjö. Ökna, Färeda, Mörlunda och Högsby till Kalmar, Thorsås, Vissefjerda och Linneryd enl. Scheutz, VG. Öl. Gottl. Lilla Carlsön och i Burs sn enl. G. v. Ced.) Föga skiljd från föreg., hvarmed den af många förenas. — *P. cinerea* ed.9.

11 *P. maculata* Pourr. stjelkarne uppstigande, jemte de raka blomskaften småhudna och glest korthåriga; rotbladen 5fingrade, med aflångt äggrunda stipler; stjelkbl. 3fingrade; småbl. vigglikt omv. äggrunda, djupt sågtandade, under håriga. 2 4 5, 6. Fig. Fl.D.114. H.N.f.3, n:o 47.

\* *ambigua* Gaud. småbl. likade halfvägs till ryggnerven i aflånga samstående tänder.

\* *gelida* C. A. Mey. alla bl. vanl. 3fingr., n. glatta. H.N.f.15, n:o 52.

Torra ängsback. a. (Lpl.—Boh. nor. delen och Smål. Gottl. Öl. icke sällsynt. — N. — \* *amb.* i fjelltrakter. — \* *gel.* Lul. Lpm. flerst. kring Qvikkjokk: Ands. — N. teml. allm. på fjellen i Lom, Valders och Sogn: Ax. Bl.) Större och mer uppstigande än *P. verna*, ofta med röd stjelk. Kronbl. med en mörkare, brandgul fläck mot basen. Skiljes icke från *Pot. verna* af Linné. — *P. salisburgensis* Hænke. *P. alpestris* Hall. d. Yngr.

12 *P. opaca* L. hela örten långt mjukhårig; stjelkarne nedliggande; rotbladen 7—5fingrade, med tvärhuggna småbl., stipl. som hos föreg.; stjelkbl. 3fingrade, småbladen smalt vigglika, öfverallt sågade. 2 4 5, 6, g. blr. Fig. Sturm. 17 häft. Fl.D. 1648. H.N.f.1, n:o 51.

Sandåsar. (Sk. Käflinge och Lackalänge, Ivetofta, Årup etc. Blek. nära Skånska gränsen.) Liten, mångstjelig, rödaktig, med smalare och hårigare småblad, men för öfrigt lik *P. verna*.

+++ Foder meränd. Sklufvet och kronblad 4: *Tormentilla* L.

13 *P. Tormentilla* Scop. stjelken uppstigande; stipl. n. handdelade; bladen 3- ell. 5fingrade; stjelkbladen oskaftade, med aflånga—vigglika, ofvan midten djupt sågade småblad. 2 4 6—8, g. blr. Fig. Sv.B.19. Fl.D.589.

Betesm. skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. Alten: Norm.) Stiplerna stora, djupt delade. — *T. erecta* L.

14 *P. procumbens* Sibth. stjelken nedliggande; stipl. hela eller grundt 2—3flikiga; alla bladen skaftade, med 5 eller 3 småblad. 2 4 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1217 och 1819. H.N.f.2, n:o 51.

\* *mixta* Nolte: alla bl. 5fingrade; kronbl. 4—5.

Skogväxta betesm. etc. r. (Sk. Röstånga och Torlösa socknar; Dalby och Hellesta; Roslätt; Andrarum; Trolleholm; Pugerup etc. Blek. Carlskrona. Boh. Gustafsberg. — N. på Svanö i Bergens st. — \* *Blek.* Carlskrona.) Stiplerna små, mest hela; blrna betydligt större än hos föreg. — *P. nemoralis* Nestl. *Torm. reptans* L.

\*, som något liknar *P. reptans*, af hvilken några förf. anse den hybrid, har dock vid odling befunnits öfvergå i *a*.

319. *SIBBALDIA* Lin. Trefingerört.

- 1 *S. procumbens* L. bladen 3fingrade, med vigglika, i spetsen 3tandade småblad; blrna gytttrade. 2, 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.761. Fl.D.32. H.N.f.15, n:o 53.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) Blrna ganska små på korta, stull. förlängda grenar från rotstocken.

320. *GEUM* Lin. Kummer.

- 1 *G. hispidum* Fr. hela växten stråfhårig; stjelkladen pardelade; blrna uppråta, med omv. eggrunda kronblad längre än fodret; småfrukternas spröt längre än de mycket långhåriga märkena. 2, 7, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.78. H.N.f.5, n:o 53.

Buskväxta st. r. (Blek. Carlskrona på Saltö, Gastaskär etc. Smål. Klöfdala i Järeda sn; Tjustgöl och Svinskär i Misterhult; Vestervik; Lofa skärgård; Hagstaviken i Vesterum sn etc. ÖG. Gryt sn i skären, t. ex. på Fångö och lilla Ålö. Hall. Varberg och Karup.) Rotbl. hos alla arterna tyrformigt parbladigt delade; ändfliken hos närv. art parklufvet inskuren, hos de öfr. meränd. 3flikig. — *G. urbanum* β Wg.

- 2 *G. urbanum* L. mjukhårig; stjelkbl. 3delade, sågade; blrna uppråta, med omv. ägg-runda kronblad, sällan längre än fodret och med omärklig klo; småfrs spröt som hos föreg. med småhåriga märken. 2, 6, 7, g. blr. — β *hirtum*: mer hårig; kronbl. längre än fodret. Fig. Sv.B.94. Fl.D.672.

Buskväxta st. a. (Sk.—Medelp. Dal. Öl. Gottl. — N. till Nordl. — β Hall. VG. Göteborg på Danmarks Lilja.) β *G. hirtum* Wahlb.

× *G. intermedium* Ehrh. blrna något lutande; kronbladens skifva rundad, med kort klo; för öfr. som föreg. 2, 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1874. H.N.f.6, n:o 50.

Buskväxta st. (Sk.—Helsl. Tuna sn. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Strömstad; Vinga m. fl. st. Öl. Runsten etc. Gottl. Hessle i Fleringe. — N. Christiania; Trondhjem; trol. flerstädes.) En tydlig hybriditet af *G. urban.* och *rivale*, än närmande sig mer den förra, än den sednare, hvarföre den af en del förf. föres som afart än till den ena, än till den andra.

- 3 *G. rivale* L. mjukhårig; stjelkbl. 3delade, tandade; blrna lutande; kronbladen af fodrets längd, med utdragen klo; småfrs spröt af de långhåriga märkenas längd. 2, 5, 6. Fig. Sv.B.231. Fl.D.722.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Har nästan hängande blr med omv. hjertlika blekgula brundåriga kronblad. Stundom utvöxa foderflikarne till stora fliktandade blad, hvarjemte kronbladens antal förökas: *G. hybridum* Wulf.

321. *DRYAS* Lin. Fjellvippa.

- 1 *D. octopetala* L. bladen aflånga, grofsågade, under hvitludna. 2, 8, hv. blr. Fig. Sv.B. 427. Fl.D.31. H.N.f.15, n:o 51.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. från Finnmark. ned till Langesund enl. Ax. Bl.) Blrna likna *Hvilsippor*.

- 4 Flocken *Spirææ*. Karpeller 5—10, fröhuslika, flerfröiga, fria.

322. *SPIRÆA* Lin. Kassöta.

- +1 *S. salicifolia* L. buske; bladen odelade, lancettlikt aflånga dubbelsågade glatta; blr i tät spira. 5, 6, 7, ljusr. blr. Fig. E.B.1468.

Od. st. (Allmänt odlad, och mångenstädes förvildad.) 3—4 fot hög.

- 2 *S. Ulmaria* L. ört; stjelen kantig; bladen parbladigt delade, uddbladet större, 3-kluftvet, sido-småbladen odelade dubbelsågade, vanl. på undre sidan hvitludna; blr i knippen; karpeller sammanvridna. 2, 6, 7, hv. blr. — β *denudata*: bl. på undre sidan gröna. Fig. Sv.B.189. Fl.D.547.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Har starkt luktande blr.

- 3 *S. Filipendula* L. ört; stj. trind; bladen parbladigt delade med talrika par af fli-

*kiga*, på undre sidan gröna och glatta småblad; blr i knippen; karpeller *raka*. 24  
7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.154. Fl.D.635.  
Torra äng. a. (Sk.—Gestr. och Dal. Um. Lpm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Sönd-  
möer.) *Foderfäkar och kronblad vanl. 6—7; rotträdarne med hängande knölar.*

60 Fam. DRUPACEÆ L. Krona roslik. Fruktämne fritt, inom blomman, slutl. sten-  
frukt med en enda sten.

### 323. PRUNUS Lin. Slån, Kirs, Hägg (6).

† Blr 1—3 ur samma knopp före ell. samtid. med bladen, kortskaftade; frukt  
blådaggig, med plattad sten.

†1 P. *domestica* L. utan tornar; bladen ovala naggsågade, under *smålundna*; blomskäften  
mest parvisa, *fånhåriga*; fruktämn. och frukter slutl. *aflånga*. 5, 6, hv. blr. Fig.  
Sv.B.193 [med undant. af fig. d].

Odl. och förvild. (Sk. Broby skog enl. F. Aresch. Blek. enl. Gosselm. ÖG. flerst.  
förvildad: Kindb. Hall. vid Åsbro nära Viska-ån. VG. Göteborg i Rosenlund;  
Tunhem; Kinnekulle m. fl. st.) *Lågt träd med aflångt äggrunda kronbl. samt mer  
aflång och plattad sten än hos följ. Den äggformiga frukten har många för-  
ändringar, uppkomna genom odling: Plommon.*

2 P. *insititia* L. [i vildt tillstånd] med tornar; blad och blomskäft *som hos föreg.*;  
fruktämnen och frukter *n. klotrunda*. 5, 6, hv. blr. — *β rustica*: träd utan tor-  
nar; frukterna större. Fig. Fl.D.2651. *β* E.B.841. H.N.f.5, n:o 50. Sv.B.193, f.d.  
[frukten].

Back., *β* odl. st. r. (Sk. nor. del. enl. F. Aresch. Blek. Carlskrona; Ronneby. Smål.  
Markaryd. ÖG. här och der: Kindb. Stockh. Gäddviken. Öl. Borgholm. — *β* Sk.  
Ifö. Hall. Hallandsås, Torup och Getinge. Smål. Femsjö; Unnaryd vid Rangalsbro  
m. fl. st. ÖG. Mogata. Gottl. Hesse i Fleringe. Flerest. upp till Gestr. i bond-  
täppor. — N. enl. Fr. S.V.Sc.) *Buske med större blr och frukt än följ., som  
arten i vildt tillstånd liknar (v. rupestris Fr. i S.V.Sc.). Odlad blir den ett litet  
träd med temligen stora svartblå frukter: Krikon [β].*

3 P. *spinosa* L. med tornar; bladen lancettlikt omv. äggrunda, finsågade, *n. glatta*;  
blomskäft. 1—2, *glatta*; fruktämnen och frukter *klotrunda*. 5, hv. blr. Fig. Sv.B.  
151. Fl.D.926.

Back. (Sk.—Uppl. Vestml. Verml. Ölmehärad. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. södra  
del.) *Buske med blr på bar qvist, dock stundom med något utvecklade blad:  
var. coetanea. Frukt. likna stora daggbålar: Slånbär. Tornarne, ofta 2 tum  
långa, uppkomma, likasom hos föreg., af blommande sidoqvistar.*

†† Blr 1—flere i flock, samtidiga med bladen, långt skaftade; frukten utan  
daggöfverdrag, med klotrund sten: *Cerasus Adams.*

†4 P. *Cerasus* L. bladen ovala spetsiga småsågade, *öfverallt glatta*, utan glandler på  
skaftet; blomflockarne *n. oskaftade*. 5, hv. blr. Fig. E.B.706.

Odl. och förvildad, r. (Sk. Hall. Smål. Visingsö; samt här och der upp till Gestr.)  
*Bladen fasta och släta; fr. svartbrun: Kersbär. — Cer. acida Barkh. C. vulga-  
ris Mill.*

5 P. *avium* L. bladen äggrundt ell. omv. äggrundt ovala, med smal spets, *olikformigt  
grofsågade*, på undre sidan *gleshåriga*; bladskäften nära skifvan 2glandlade; blom-  
flockarne oskaftade. 5, hv. blr. Fig. Sv.B.205. Fl.D.1647.

Skogsäng. mest i bergstr. r. (Sk. Kullaberg; Helsingborg; Trolleholm; Håckeberga etc.  
Blek. Ronneby; Lyckebytrakten: Gosselm. Smål. Ekesjö, Skurugatan; mell. Jönköp.  
och Grenna; Husqvarnabergen, samt på Norrlandet vid Vestervik. ÖG. mångenst.,  
särd. mell. Stångån och Vettern enl. Kindb. Stockh. Djurgården m. fl. st. Vestml.  
på Hallingen. Verml. på Lurön. Dalsl. Dalskog sn. VG. Billingen, Kinnekulle  
etc. Boh. mell. Strömstad och Tistedalen; Tanum sn, Klefva vid stranden etc.



*Hall.* Österö. *Gottl.* i När sn. — *N.* Arendal; Eger; Svanöe i Bergens stift.) *Bladen stora, tunna och ojemna; frukterna röda ell. svarta, kallade Fogelbär. — Cer. avium Mönch.*

+++ Blr i klase, senare än bladen; frukten som i föreg. afd.: *Padus Koch* (Hägg).

6 *P. Padus L.* bladen ovala hvass-sågade, med 1—2 glandler vid basen; blomklasarne utdragna, något slaka.  $\frac{1}{2}$  5, hv. blr. Fig. Sv.B.121. Fl.D.205.

Skogsäng. a. (Sk.—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finnm.) *Frukterna små, svarta.*

61 Fam. **PAPILIONACEÆ** *Lin.* Krona fjärl-lik. Frukt ärtbalja. Fröhvite 0.

1 Flocken **Vicieæ**. 9 ståndare samväxta, en fri [diadelphiska]. Baljan enrummig. Hjerterblad tjocka. [Örtbladen parbladiga utan uddblad, oftast med klänge.]

### 324. PISUM *Lin.* Ärtor.

1 *P. arvense L.* stipl. groft hvassnaggade; bladen 1—2pariga; blomskäften 1—2blommiga; fröen ojemna släckiga. ☉ 7, rödviol. blr. Fig. Sturm. 4 häft.

Äkr. etc. (Sk.—*Gestr.* *Ängml.* *Vestml.* *Verm.* — *N.* till Trondhj.) *Den eg. vilda: P. arv. infestum Fr., är till alla delar mindre än de odlade grädärterna: var. cereale Fr., hvilka äfven ofta förekomma bland säden.*

### 325. LATHYRUS *Lin.* Vial.

+ Stjelken med 2 vingkanter.

1 *L. silvestris L.* stipl. icke bredare än stjelken; bladen enpariga, med vingkantade skaft och lancettlika småblad; blomfodrets 4 öfre tänder n. likstora, bredt syl-lika; fröärret omgifvande halfva fröet.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.325. Sv.B.254. H.N. f.12, n:o 55.

\* *platyphyllus Retz.* småbladen elliptiska—aflånga. Fig. Fl.D.785.

Ängsback. (Sk.—*Gefle.* *Helsl.* Bergsjö sn, Storön i Kyrksjön. *Ängml.* *Dal.* *Ner.* *Verm.* *Dalsl.* *Öl.* *Gottl.*? — *N.* söd. del: Ax. Bl. — \* *Sk.* Kullaberg; Ramåsa. *Smål.* Kalmar, vid Skälby. *ÖG.* flerest. enl. Kindb. *Hall.* Karup. *Boh.* Lilla Edet; Vingaö; Musön i Tanum; Otterö; Styrsö etc.) *Småbladen smala, svärdlikt spetsade; hos \* mer aflånga, vanl. trubbiga med en liten udd, var. från  $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$  tum breda: L. latifolius L.Fl.Su.*

2 *L. heterophyllus L.* stipl. vanl. bredare än stjelken; bl. 1—2pariga, med bredt vingkantade skaft och elliptiskt lancettlika småblad; fodrets 2 öfversta tänder kortare och bredare än de öfriga, trubbiga med udd; fröärret till  $\frac{1}{2}$ del omgifvande fröet.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. H.N.f.4, n:o 62.

Steniga lundar, r. (*Smål.* Vissefjerde; Kalmar; Hagelsrum och Lockebo i Mälilla sn; vid Krigsdala prestg.; Skureda i Lommaryd etc. *ÖG.* mångenstād. i nor. skogsbygden, Stångådalen och Somnabygden enl. Kindb.; Motala sn nedom Hållberget. *Ner.* Hökerkulla äng; Snaflunda sn flerestādes. *VG.* vid de större bergen; vid Grimstorp och Grimmerstorp i Sandhem sn. *Boh.* Koön. *Gottl.* Martebo i Prestängen.) *Vanl. gröfre än föreg.*

3 *L. palustris L.* stipl. af stjelkens bredd; bladen 2—3pariga med ovingade, ofvanpå kölade skaft och lancettlika—jemnbreda småblad; fodertänd. som hos föreg., men spetsiga.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.399.

Våta äng. (Sk.—*VB.* Neder-Kalix och *Dal.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Ost-Finnm.) *Var. med  $\frac{1}{2}$  tum till 2 linier breda småblad.*

++ Stjelken 4kantig, n. ovingad.

4 *L. tuberosus L.* bladen enpariga; småbladen aflånga, ell. något omv. ägrunda, trubbiga; de öfre fodertänderna breda, n. triangulära.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.382. Fl.D.1463. H.N.f.1, n:o 50.

Åkr. äng. r. (Sk. Hendriksfelt vid Glemminge: Eug. Hemb.; Trelleborg och Björns-  
torp enl. F. Aresch. Fordom på flere andra st. ÖG. vid Åby i Horns sn. Södm.  
Aspö sn, Skärs äng; Vibyholm. Stockh. vid Ulfunda; Näsby i Täby sn. Uppl. Sjö  
slott, ymn. Vestml. Björksta sn enl. G. v. Ced.) *Rolstockens grenar uppsvållda  
till tumslånga alliga knölar, hvarföre växten fordom blifvit odlad och trol. för-  
vildad.*

5 *L. pratensis* L. bladen som hos föreg.; småbladen lancettlika spetsiga; alla foder-  
tänd. sylspetsade. 2½ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.49. Fl.D.527.

Äng. a. (Sk.—VB. Umeå. Jemt. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm.) Var. med bre-  
dare och smalare småblad, glatt och hvittluden.

6 *L. maritimus* Big. bladen 3—8pariga, med ovala småblad, stora n. hjertlika stipler.  
2½ 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.338. H.N.f.2, n:o 50.

Grus. hafsstr. r. (V.B. Neder-Kalix skärg. — Helsl. Hudiksvall. Södm. Landsort;  
Muskön; Ålön etc. Sk. Boh. Strömstradstrakten; Tanum sn, Finnö. — N. till Ost-  
Finnm.) Var. glatt och mer ell. mindre hårig, samt i Boh. enl. Leffl. med  
smärre, bredt lancettlika småbl.: *β acutifolius* Bab. — *Pisum* L.

### 326. *OROBUS* Lin. Vippärt.

1 *O. vernus* L. stjelen upprät, enkel, ovingad; stipl. halft pillika, spetsiga, vanl. kor-  
tare än blaskaften; bladen 2—4pariga, med ågrunda långspetsiga småblad. 2½  
5, r. ell. viol., säll. hv. blr. Fig. Sv.B.640. Fl.D.1226. H.N.f.16, n:o 54, var.

Lund. (Sk.—Ängml. och Jemt. Boh. Öl. Gottl. — N. upp till Lysöen i Trondhjems  
stift.) Småbladen ofta tumsbreda, stundom såsom hos ex. i H.N. knappt tredje-  
delen så breda, small lancettlika: *β angustifolius* Fr. — *Lathyrus* Wimm.

2 *O. tuberosus* L. stjelen uppstigande, enkel, vingkantad; stipl. halft pil-lika spetsade,  
vanl. längre än blaskaften; bladen 2—4pariga, med smalt afånga—elliptiska små-  
blad. 2½ 5, 6, purpur. ell. viol., säll. hv. blr. Fig. Fl.D.781. H.N.f.5, n:o 49, var.

Ängsback. a. (Sk.—Ängml. och Dal. Öl. Gottl. — N.) Småbladen meränd. trub-  
biga, stund. n. jemnbreda: var. *tenuifolius* H.N. — *Lathyrus macrorrhizus* Wimm.

3 *O. niger* L. stjelen upprät, grenig, ovingad; stipl. smala, halft pil-lika sylspetsade,  
af blaskaftens längd; bladen 5—8pariga, med bredt lancettlika småblad. 2½ 6, 7,  
purp. blr. Fig. Fl.D.1170.

Ängsback. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Göthlunda. Verm. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. —  
N. till Bergen.) Stundom alnshög. Svartnar gerna torr; baljorna långa, mång-  
fröiga. — *Lathyrus* Wimm.

### 327. *VICIA* Lin. Vicker.

† Klasar mångblommiga, långt skaftade.

\* Bladen högst 5pariga.

1 *V. pisiformis* L. bladen 3—5pariga, småbladen hjertlikt ågrunda trubbiga med  
udd, nedersta paret fästadt utan skaft tätt vid stjelen; pist: märke öfverallt ånudet.  
2½ 7, grönula blr. Fig. Sv.B.608. H.N.f.5, n:o 48.

Skogsback. berg. r. (ÖG. flerstäd. i Åtvedatrakten, Stångådalen och Sommarbygdens  
enl. Kindb.; Östra Ryd; Omberg. Smål. vid sjön Tynn i Dalhem sn: Stud. P. A.  
Nilsson; Husqvarnabergen: Stud. C. A. Eurén enl. Zett. I Bot. Not. åfven uppgifven  
för Ed sn, men origitt enl. Dr Lund. VG. vid Bursle på södra sidan af Hunne-  
berg. — N. Christiania.) Stor bredbladig växt; stiplerna hela eller bugtandade;  
klasarne med talrika blr.

2 *V. dumetorum* L. bladen 3—4pariga, småbladen ågrunda, trubbiga med udd, alla  
kort småskaftade, något tillbakaböjda; märket ofvanpå glatt. 2½ 7, purp. blr. Fig.  
Fl.D.1464. H.N.f.16, n:o 53.

Lundar. r. (Sk. vid Kaddsjö i Kaslösa sn; Krageholm; Öfvedskloster; Stenbyhällar i  
Benestad sn; Baldringskogen etc. Smål. Högsby sn: Stud. Lunell enl. Ekstr. ÖG.  
Stegeborg. Stockh. Sickla-ön. Hall. bland Slån och Törnbuskar på Halmstads gårde;  
i ångar söder om Vrearpas g.g.) Liknar mycket föreg. Stipl. fiktandade; kla-  
sarne vanl. med 6—8 blr.

\*\* Bladen minst 6pariga.

a — Pistillens märke rundtomkring småludet.

3 *V. silvatica* L. stipl. halfmånlika, *syttandade*; bladen *med klänge*; småbl. äggrundt aflånga; blomklasarne *längre* än bladen, *utan* skärm. 2 7, 8, hvita blåstrimmiga blr. Fig. Sv.B.136. Fl.D.277.

Skogsäng. (Sk.—*VB.* och *Jemtl. Boh.* Öl. vid Horn. *Gottl.* i Follingbo sn. — *N.* till Salten.) *Stjelken klängande*; bladen *med långt, grenigt klänge*.

\*4 *V. Orobus* DC. stipl. halft spjutlikt lancettlika, *helbräddade*; bladen *utan* klänge; småbl. äggrundt lancettlika; blomkl. *något längre* än bladen, *utan* skärm. 2 6—8. Fig. Fl.D.98. H.N.f.7, n:o 41.

Ängsback, nära hafvet. (*N.* från Lister till Svanöe i Bergens st.) *Blrna hvita och viol. med mörkare ådror, i korta klasar; i stället för klänge en borstlik udd i bladspetsen.* — *Orobus silvaticus* L. *Vic. cassubica* Fl.D.

5 *V. cassubica* L. stipl. *som hos föreg.*; bladen *med klänge*; småbl. aflånga—elliptiska; blomklas. *kortare* än bladen, *med* borstlika skärm af småskaftens längd. 2 7, 8, viol. blr. Fig. Fl.D.1395. Jacq.A.229. H.N.f.3, n:o 40.

Lund. r. (Sk.—*Södm.* Stockh. Nacka- och Danviksbergen; Beateberg m. fl. st. på Vermdön; Drottningholm. VG. Halle- och Hunneberg; på en ö i Tidan vid Ullevad. *Dalsl.* Stora Wahlberg vid St. Leesjön, samt på Boxåsen i Färglunda sn. *Boh.* Lackarebäcks oxhage i Fässbergs sn. *Hall.* Öl. Älgutsrum på en kulle vid Möllstorp.) *Stjelken styf och upprät; klängen långa greniga.*

b — Märket ofvanpå glatt.

6 *V. villosa* Roth: *ulligt luden*; stj. klängande; småbl. aflånga ludna; blomfodrets nedre tänder långa, syl-lika; kronsegets skifva *halften kortare* än klon; baljorna *oval* aflåfröiga. ☉ 7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.166? Fl.D.2599. H.N.f.4, n:o 61.

Åkr. (Sk.—*Ängml.* och *Jemtl.* Lith sn. Öl. *Gottl.* Pavik i Eskelhem sn enl. G. v. Ced. — Södra N.) *Har nästan dubbelt större, mer i purpur dragande blr än följ., som den kommer nog nära; balj. 3—6fröiga.* — *V. Cracca* Sv.B.

7 *V. Cracca* L. kort småluden; stj. slak ell. klängande; småbl. utdraget lancettlika, *trubbade* med udd; fodrets trenne tänder *n. likformiga*, kort lancettlika; kronsegets skifva *af klons längd*; baljorna *cylindriska* 6—10fröiga. 2 6—8, b. blr. Fig. Fl.D.804. H.N.f.8, n:o 42.

Åkrar, äng. a. (Sk.—*VB.* och *Päl. Lpm.* *Lul. Lpm.* Storbacken: Ind. — *N.* till Ost-Finm.: Norm.) *Cracca major* Godr. & Gren.

8 *V. tenuifolia* Roth: kort och glest stråfhårig; stj. *styf, flerböjd*; småbl. jemnbreda, *spetsiga* med udd, under upphöjdt nerviga; fodrets *nedersta tand syl-lik*, de 2 sidotänderna äggrunda sylspetsiga; kronsegets skifva *längre* än klon; baljorna *något plattade*. 2 6—8. Fig. Fl.D.2177. H.N.f.13, n:o 61.

Back. åkerren. (Sk. mångenstād. helst i östra delen. ÖG. Hagebyhöga sn; Omberg. VG. Göteborg. Öl. *Gottl.*) *Blrna blå, eller viol. med bleka klor; bladen stund. något trubbiga. Föga skild art.*

†† Klasar fåblommiga, ganska kort skaftade.

9 *V. septum* L. bladen mångpariga, med aflångt äggrunda helbräddade småblad, de öfre mindre; klasarne i öfre bladvecken, 3—5blommiga, med uppräta (stund. blott 1—2) baljor; märket ofvanpå glatt. 2 5, 6, purpur. ell. viol. blr. Fig. Sv.B.326. Fl.D.699. Ängsback. a. (Sk.—*Ängml.* och *Jemtl.* Öl. *Gottl.* — *N.* till söd. Finm.)

††† Blommor ensamma ell. parvisa i bladvecken.

10 *V. sativa* L. stipl. *tandade*; bladen 5—7pariga, småbladen aflångt viggliga, tvärhuggna, med udd; blrna *parvisa*; balj. *håriga*; fröen något *plattade*. ☉ 7, purpur. blr. Fig. Sv.B.230. Fl.D.522.

Åkr. (Sk.—*Ängml.* VB. Björkfors och Neder-Kalix. *Jemtl.* Dal. Boh. Öl. *Gottl.* — *N.* till Trondhj.) *Mycket större än följ., med bredare och plattare, mer ludna baljor.*

11 *V. angustifolia* Roth: stipl. *tandade*; bladen 3—4pariga; småbl. lancettlika—jemn-

breda, de nedersta bladens kortare, urnupna; blrna 1—2; balj. tunnt småludna, slud. *n. glatta*; fröen *klotrunda släta*. ☉ 7, purpurr. sällan hv. blr. —  $\beta$  *Bobartii*: de öfre bladens småblad nästan parallelt jemnbreda, i spetsen intryckta. Fig. Fl.D.1340. H.N.f.12, n:o 56.

Åkr. back. etc. (Sk.—*Helsl. Vestml. Ner. Verml. VG. Boh. Hall. Öl. Gottl.* — *N. södra del.*) 1—2 fot lång; med 1—2 linier breda blad; fodertänd. vanligtvis kortare än pipen. — *V. sativa*  $\beta$  *nigra* L. *V. segetalis* Thuill.

- 12 *V. lathyroides* L. stipl. *helbräddade*; bladen 2—3pariga, de nedres småblad omvänt äggrunda, med intryckt spets, de öfres aflånga; blrna *ensamma*; balj. *glatta*; fröen *prickiga*. ☉ 5, 6, viol. blr. Fig. Fl.D.58. H.N.f.14, n:o 55.

Grus. st. r. (Sk. *Blek. Smål.* vid Kalmar; Vestervik; Taxås i Stenbrohult; Madesjö, samt Segersgårde i Lofta sn; Sandsjö i Kronob. län. ÖG. Gryt; Engelholm i S. Anna, samt Norrköping enl. Kindb.; Håradshammar. Stockh. Uppl. vid Wijks slott. VG. Göteborg. Hall. Öl. Gottl. vid Lärbro kyrka enl. G. v. Ced. — *N. Christiansand.*) 3—5 tum hög.

### 328. ERVUM Lin. Lins.

- +1 *E. Lens* L. bladen omkring 6pariga; blomklasarne 1—2blommiga, med ett borstlikt bihang nedom blrna; fodret af kronans längd; baljorna breda, 2fröiga *glatta*. ☉ 6, 7, blåhv. blr. Fig. Sturm, 52 häft.

Förvild. r. (ÖG. i Hällestas, Nykil, V. Tollstad och V. Stenby snr; Skenninge; Örnberg. Allt enl. Kindb. Gutt.) *Större än de följ. med korta och mycket breda baljor, plattade frön: Linser.* — *Lens esculenta* Mönch.

- 2 *E. hirsutum* L. bladen 6—8pariga, med n. jemnbreda, vanl. tvärhuggna ell. urnupna småbl.; blomklas. meränd. *flerblomm.*, utan bihang; kronan längre än fodret; balj. *ludna* 2fröiga. ☉ 6, 7, ljusblå blr. —  $\beta$  *angustifolium*: småbl. spetsiga; klas. vanl. 2blomm. Fig. Fl.D.639.

Torra st. åkr. (Sk.—*VB.* nor. del. och *Um. Lpm.* — *N.*) *Blrna mycket små.* — *Vicia* Fr. *S.V.Sc.* *Cracca minor* Godr. & Gren.

- 3 *E. tetraspermum* L. bladen 3—4pariga, med n. jemnbreda, trubbad, uddspetsiga småblad; blomklas. 1—3blommiga; kronan som hos föreg.; balj. *glatta*, 4—6fröiga. ☉ 6—8, ljusblå blr. —  $\beta$  *tenuis*: småbl. spetsiga; blrna ensamma. Fig. Fl.D.95.

Torra st. (Sk.—*Gestr.* och *Dal.* Öl. Gutt. — *N.*) *Blrna små, med kort foder. Var. med 3blommiga klasar och 5—6fröiga baljor.* — *Vicia* Fr. *S.V.Sc.*

- 2 Flocken *Hedysareæ.* Stånd. diadelphiska. Balja affallande hel eller ledvis [ledbalja. Örtbladen parbladiga med uddblad].

### 329. CORONILLA Lin. Kronärt.

- 1 *C. Emerus* L. buske, med kantig stam; bladen 3—4pariga, med omv. äggrunda småbl.; blomklas. 2—3blommiga; kronbladens klo 3 gång. längre än fodret.  $\frac{1}{2}$  6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.343. Fl.D.suppl.89. H.N.f.4, n:o 60.

Kalkberg, r. (Öl. på kalkbergets afsättningningar mell. Vickelby och Resmo kyrkor; Borgholms slott,  $\frac{1}{2}$  mil på södra sidan ymnig; Rösslösa. Gutt. Thorsborgens samt Mullvalds i Ardre. — *N. vestra kusten.*) 1—2 fot hög, med stora blr, långa och smala baljor.

### 330. ORNITHOPUS Lin. Klovicka.

- 1 *O. perpusillus* L. bladen mångpariga, med äggrunda—elliptiska småbl.; blrna i hufvud; baljorna något plattade, krökta nätrynkiga. ☉ 5, 6. Fig. Fl.D.730. H.N. f.2, n:o 49.

Betesm. vid hafvet, r. (Sk. Ystad, mellan Köpinge och Kabusa; Köpingsberg enl. F. Aresch. Fordom äfven i Smål. på Stensö, Svinö och Engö vid Kalmar.) Späd, vid basen grenig ört, med röda och hvita blr.

### 331. ONOBRACHIS Gärtner. Helghö.

- +1 *O. sativa* Lam. bladen mångpariga, med aflånga—lancettl. småbl.; foderlikarne af halfva kronkölens längd, längre än vingarne; baljan borsttaggig, i framkanten kölad.  $\frac{1}{2}$  6, 7, violetteröda blr. Fig. Fl.D.2243.

Äng. r. (Sk. Malmö vid Limhamnsvägen och på en pilvall nära Rosenlund; Torup på en backe, ymnig. ÖG. Omberg etc. enl. Kindb. Stockh. Ulsunda. Gottl. Visby, Snäckgården. Fordom odlad.) *Alnshög*; *bl.klasar axlika, 2—4 tum långa*. — *Hedysarum Onobr. L.*

- 3 Flocken *Astragaleae*. Stånd. diadelphiska. Balja genom ena fogens invikning mer och mindre 2rummig. [Blad som föreg. flock.]

### 332. ASTRAGALUS Lin. Backsöta.

† Birna gula.

- 1 *A. glycyphyllus L.* stjelen nedliggande; stipl. äggrundt lancettlika, spetsiga; bladen 5—6pariga, med äggrunda—elliptiska, trubbiga glatta småblad; blomklasarna kortare än bladen; baljorna trekantiga, något krökta. 24 6, 7. Fig. Sv.B.237. Fl.D.1108. Lund. (Sk.—Stockh. och Södm. Uppl. Funbo sn, vid Löfsta. Helsl. Carlsberg och Tenberget i Loos sn. Medelp. berget Klacken i Hafverö sn. Jemtl. Håsjö sn. Dal. Hykjeberget. Vestml. Klacken i Norberg. Ner. Verm. VG. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Christiania till Näs på Hedemarken. Arendal etc.)

†† Birna blå ell. violetta.

\* Stiplerna trubbiga.

- 2 *A. oroboides Horn.* stjelen uppstigande; stipl. äggrunda; bladen 5—7pariga, med aflånga trubbiga glatta småblad; klasskaften längre än bladen; balj. äggrunda, till hälften innesluten i blomfodret, nedböjda. 24 7, 8, b. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.12,f.4. Fl.D.1396. H.N.f.3, n:o 39.

Fjellv. (Lul. Lpm. Titir njarka vid Wirihaur; Kallowarats vid Rovejaure, samt vid Puolaure; H. Widm. Jemtl. Snasabögen; Åreskutan; Helagsfjellen. Herjed. vestl. fjell. — N. Ost-Finnm.; Saldalen; Stuedal; Dovre; Lom etc.) *A. Leoninus Wg. Fl.L. Phaca oroboides DC.*

- 3 *A. alpinus L.* stjelen i början mycket kort, slutligen uppstig.; stipl. äggrunda; bladen 8—10pariga med aflånga under mjukhåriga småblad; klasskaften längre än bladen; balj. 3kantiga, med ur blomfodret utskjutande bas. 24 6, 7. — *β dilutus Norm.* fodr. och balj. ljust gulhåriga. Fig. Lin.Fl.L.t.9,f.1. Wg.Fl.L.t.12,f.1. Fl.D.51. H.N.f.14, n:o 56.

Fjelltr. a. (Lpl.—Helsl. nordvestra socknarne. VB. Torn. elfs nedre lopp; Öfver-Kalix, vid elfven. Ängml. Tåsjö och Fjällsjö. — N. Finnm. ned till Hardanger. — *β Jemtl.* Åreskutan; Getvalen; R. Hn. — N. Finnm. Alten; Norm.) *I början knappt fingerhög, likasom med stängel från roten, sedan 6—10 tum hög, grenig; blrna mest hvita blåstrimmiga, stundom rent blå ell. hvita. Fodret och balj. hos hufvudformen svarthåriga. — Phaca astragalina DC. Ph. minima Less.*

\*\* Stiplerna spetsiga.

- 4 *A. hypoglottis L.* stjelen som hos föreg.; stipl. äggrundt lancettlika; bladen 8—12pariga, med äggrundt aflånga, glesl långhåriga småblad; klasskaften längre än bladen; balj. kort äggrunda med hjertlik bas. 24 6, 7, blå ell. viol. blr. Fig. Fl.D.614. H.N.f.11, n:o 49.

Gräsväxta st. r. (Sk. strandängar mell. Malmö och Lomma. Smål. Kalmar, vid vägen mell. Lindelund och Engö.) 2—6 tum hög, med aflångt äggformiga iäblommiga klasar. — *A. arenarius Fl.D. A. danicus Retz.*

- 5 *A. arenarius L.* stjelen nedligg. ell. uppstigande, grenig hvitluden; stipl. hinnaktiga, äggrundt lancettlika; bladen omkr. 4pariga, småbladen jemnbredt lancettlika, med uppvikna kanter, under hvitludna; klasskaften icke längre än bladen, fåblommiga; balj. cylindriska. 24 6, 7, rödviol. blr. Fig. Sv.B.734. Fl.D.suppl.87. H.N.f.1, n:o 49. Flygsand, r. (Sk. Vidtsköle på Stora Drifvan, samt derifrån spridd dels åt Köpinge och Lyngby, dels längs hafs-kusten till Hvitemölle enl. F. Aresch.) 4—7 tum hög, med djupt gående grenig rotstock; småbladen på öfre sidan gröna; klasen 4—8-blommig.

### 333. PHACA Lin. Fjellvicker.

- 1 *P. frigida L.* stjelen upprät; bladen 4—5pariga, småbladen äggrundt aflånga; blom-Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

klasarne 2—4, jernhöga; baljorna nedböjda, med ur fodret utskjutande bas. 2/7, g. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.10.f.2. Fl.D.856. H.N.f.9, n:o 51.  
 Fjellv. r. (Torn. Lpm. Lul. Lpm. Nammats vid Laidaure: F. Björkm. enl. H. Widm. Um. Lpm. vid Högsta by. Jemil. Snasahögen i Åre sn; Smällhögarne och Helagsfjellen. Herjed. Midtåkläppen etc. — N. Finnm.; Salten; Trondhjem i Stuedalen på Väkerhögarne etc. Ramsfjellet; Tronsfjellet; Dovre.) *Ph. alpina* L.Fl.Su.

## 334. OXYTROPIS DC. Kloärt.

1 *O. pilosa* DC. stjelken täckt af långa mjuka, n. vinkelrätt utstående hår; bladen mer än 10pariga, med lancettlika ell. aflånga, meränd. spetsiga, på båda sidor ludna småblad; balj. upprätta trinda spetsiga håriga. 2/6, 7, ljusgula blr. Fig. Fl.D.suppl. 88. H.N.f.6, n:o 36.

Torra st. r. (Smål. östra del. ÖG. Omberg på klippor mot Vettern; Högby sn vid Skogssjö; Norrö i Heda: Kindb. Götll. Vestergarn. Skansholmen; Väskinde sn, vid Bredsunds fiskläge; på hafsstr. norr om Skålsö; Öfverstegvarn etc.) Götll. exempl. hafva den vanligen upprätta, 8—10 tum höga stjelken sällan quartershög, oflast nedtryckt, stängelformig. — *Astragalus* L. *Phaca* Wg.

2 *O. lapponica* Gaud. stjelken ganska kort, grenig, tilltryckt hårig; bladen omkr. 10—12pariga, med lancettlika spetsade gråludna småblad; balj. nedböjda, för öfr. som hos föreg. 2/7, blårröda blr. Fig. Wg.Fl.L.t.12.f.3. Fl.D.suppl.20. H.N.f.5, n:o 47.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka; Nuljalaki vid Torn. träsk. Lul. Lpm. Wirihauere, på Unna Toki, Jälle etc.; Kallowarats nära Rovejaure: H. Widm. Pit. Lpm. Akarisfjell; Tjiddjakk. Herjed. Midtåkläppen; Åxhögen etc. — N. Finnm. Tsatsa, ofvan Lyngen, Kaafjorden och Senjen; Maalselv och Salangdal m. fl. st.: Norm. Saltdalen. Dovre. Lom etc.) Liknar mest *Astrag. alp.* med fingerhöga klas-skaft, men har mindre och färre blr; bladen stund. nära glatta ofvanpå. — *Ph. montana* Wg. Fl.L. *Phaca lapp.* Wg.Fl.Su.

3 *O. campestris* DC. stängeln uppstigande, med glesa, utstående hår; bladen som hos föreg., med spetsade silkesludna småblad; balj. upprätta, äggrunda—aflånga, uppblåsta mjukhåriga. 2/6, 7. —  $\beta$  sordida: blrna gula med viol. ell. blå fläckar, stund. rent blå; fodertänderna mer jemnbreda och längre än hos  $\alpha$ . Fig. H.N.f.3, n:o 38.  $\beta$  Fl.D.1041. H.N.f.10, n:o 50.

Torra st.,  $\beta$  i fjelltr. r. (Smål. mellan Järeda och Klöfdaläsåg; mellan Fröreda och Prestnäs; Mållilla sn vid Årena; Alsheda, vid Kibbe och Ädelfors enl. Scheutz. Öl. ymnig på Landtborgarne och Alfwaren, samt nära stränderna. Götll. Närs holme; samt vid Torpet på Sandön: Vestö. —  $\beta$  N. Finnm. Skuggevare i Tana och längs efter norra sidan af Varangerfjord; ymnig; Bugönäs i Sydvaranger: Norm.) Blrna hos  $\alpha$  gula; balj. n. 2rummiga, uppblåsta, på Öl. ex. 3—4 gånger längre än sprölet, ehuru mer äggrunda än hos  $\beta$ , hvilket dock torde variera. — *Phaca* Wg.  $\beta$  *Astrag. uralensis* L.Fl.Su. och Herb. *A. sordidus* W.

2 Flocken **Trifoliese.** Stånd. diadelphiska. Balja enrumm. Hjerthblad tunna. [Örtblad 3fingrade.]

## 335. TETRAGONOLOBUS Scop. Klöfverört.

1 *T. siliquosus* Roth: småbladen omv. äggrunda; blomskäften enblommiga; blomskärmen lancettlika. 2/6, 7, g. blr. —  $\beta$  maritimus: mera glatt; bladen köttiga, glest härkantade. Fig. Jacq.A.361. H.N.f.1, n:o 48;  $\beta$  f.4, n:o 59. Sv.B.448. Fl.D.800.

Fukt. st. och hafsstr. r. (Sk. Benestad på kalkbackar vid bäckarne. Smål. Kalmar. Öl. Borgholm; Sörby i Gärdslösa sn etc. — N. Lofoden vid Kunnen. —  $\beta$  Hafsstr. Sk. på Hven; Tjörndala enl. F. Aresch. Blek. Smål. Värnanäs; Kalmar; Öro; Tjust t. ex. Gränsö. Öl. Götll.) Hos hufvudformen äro stjelk, blomfoder och bladen undre sida håriga. — *Lotus* L.  $\beta$  *L. maritimus* L.

## 336. LOTUS Lin. Gigelsärt.

1 *L. uliginosus* Schk. stjelken n. upprätt; stipl. äggrunda; småbl. omv. äggrunda—n. ovala; blomhufvuden 6—12blommiga; fodertänderna före blomm. utsperrade; baljorna raka jemnbreda, ut- ell. nedböjda. 2/6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1521. H.N.f.15, n:o 56.

Fukt. st. r. (Skånska slätten vid stränder. Smål. Vestervik. ÖG. Kärna sn. Södm. Stigtomta sn, numera trol. utgången: Ind. Hall. vid Laga-, Löje- och Nissa-år.

Gottl. St. Carlson. — N. Brevig.) *Större och mera upprät än följ.; stjelen tydl. ikålig.* — *L. major* Sm.

- 2 *L. corniculatus* L. stj. nedliggande; blomhufv. 2—6blommiga; fodertänd. före blomn. tilltryckta; för öfr. som föreg. 2 5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.334. Fl.D.991. H.N.f.13, n:o 55, var.

Betesmark etc. a. (Sk.—VB. och Jemtl. — N. till Finnm.) Var. glatt och luden, samt får på stränder köttiga blad: var. *crassifolius* H.N.

- 3 *L. tenuifolius* Reich. stj. nedligg.—upprät; stipl. lancettlika; småbladen lancettlika—aflånga och mot spetsen bredare; för öfr. som föreg. 2 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.1995. H.N.f.12, n:o 58.

Fukt. st. helst nära hafvet. (Sk. mell. Skanör och Landskrona; Skillinge på öst. kusten enl. F. Aresch. Smål. Kalmar. Hall. Särö.) Mycket spädare, ehuru ofta med längre grenar än föreg., mer glatt och fåblommig. — *L. tenuis* Kt.

### 337. MEDICAGO Lin. Luzern, Småre.

† Baljorna oväpnade, öppnande sig vid mogna den.

- †1 *M. sativa* L. stjelen n. upprät; de nedre stipl. något tandade, de öfre helbräddade; småbladen aflånga—omv. äggrunda, mot spetsen tandade; blrna i klase, med skaft kortare än blomskärmen; kronseglet ända till spetsen ådrigt; baljorna småckformigt vridna, n. glatta. 2 6, 7, viol.—g. blr. Fig. Fl.D.2244. H.N.f.7, n:o 37.

Ängsback. r. (Sk. vid Tågarp nära Trelleborg; Malmö; Landskrona etc. Blek. Carlskrona. Smål. Skramstad i Gamleby sn; Vestervik; Visingsö. ÖG. Södm. Målsåker. Stockh. vid Skönstavik; Djurgården; Vermdön. på Vindön etc. Uppl. Ekolsund. Ner. flerstädes. Öl. Näsby i Ås sn. Gottl. Malm i Helvigs sn; Slite hamn.) *M. sat. versicolor* Koch.

- 2 *M. silvestris* Fr. stj. uppstig. ell. nedliggande; stipl. och småbl. som hos föreg.; blrna i kort klase, med skaft meränd. längre än skärmen; kronseglet som hos föreg.; balj. halvcirkelformigt ell. mer krökta. 2 7, 8. —  $\beta$  *procumbens*: stjelen nedliggande; stiplerna större, tandade. Fig. H.N.f.7, n:o 38,  $\beta$  39.

Ängsback. åkerrenar. r. (Sk. Malmö, Lund m. fl. st. enl. F. Aresch. Stockh. på Stora Höggarn. Uppl. Höja. VG. Kinnekulle. Hall. Halmstad, vid Nissa-ån: Theor. Öl. Gottl. —  $\beta$  *Uppsala*. Öl. Gottl.) Blrna mest gula, men var. som föreg. i grönt och viol. Är en medelform mell. föreg. och följ. samt trol. *M. media* Pers., hvilken dock föres till än den ena, än den andra.

- 3 *M. falcata* L. stj. uppböjd; småbl. aflånga ell. jemnbreda, mot spetsen tandade; blrna som hos föreg., med blott nedtill ådrigt segel; balj. aflånga halfmåntlikt böjda, något håriga. 2 6, 7, g. säll. viol. blr. Fig. Sv.B.248. Fl.D.233. H.N.f.7, n:o 40.

Back. åkerrenar. (Sk.—Uppl. Boh. Öl. Gottl. — N. Christiania; Bergen; aldrig funnen vild af Prof. Blytt.) Småbladen smalare än hos de föreg.

†† Baljorna affallande öppnade.

- 4 *M. lupulina* L. stj. och grenar nedligg. ell. uppböjda; stipl. helbräddade; småbl. omv. äggrunda, i spetsen tandade; blrna i ovala täta mångblomm. hufvud; baljorna njurlika oväpnade enföriga. ☉ 6—8, g. blr. —  $\beta$  *Willdenowiana*: balj. med ledade glandelhår. Fig. Fl.D.992.

Åkerrenar, väg. (Sk.—Helsl. Medelp. Selånger sn, Silje; Sundsvall: Ind. Ångml. Utansjö bruk: Arn. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N.) Späd med mycket små blr.

- 5 *M. minima* Lam. stj., stipl. och småbl. som hos föreg.; blrna i rundade, 3—6blommiga hufvud; balj. småckformigt tätt hopridna, med krokuddiga taggar. ☉ 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.211. H.N.f.1, n:o 47.

Sandback. r. (Sk. vid Kåseberga i branterna mot hafvet. Sedan flere år förvildad i Södm. kring Nyköping enl. Ind.) Småbl. ofta smalare än hos föreg.; baljorna klotrunda, af större arters storlek, med nästan en linie långa taggar. — *Med. polymorpha*  $\mu$  *minima* L.

### 338. MELILOTUS Adans. Amur.

† Stiplerna syl-lika, helbräddade.

- 1 *M. officinalis* (L.) Willd. småbladen omv. äggrunda—aflånga, sågade; alla kronbladen

*lika långa*; baljorna kort skafade, äggrunda, kortspetsiga rynkiga småhåriga.  $\gg$  7, g. blr. —  $\beta$  *macrorhiza* Pers. de öfre bladens småbl. aflånga. Fig. FLD.934. H.N.f.6, n:o 33;  $\beta$  32.

Äng. vid väg etc. (Sk. teml. allmän. Eljest sälls., kanske oftast förvildad. Blek. Carlskrona. Småbl. Kalmar; Vestervik; Jönköping enl. Scheutz. ÖG. mångenstäd, enl. Kindb. Södm. Tullgarn; Nyköping, vid Rosenkälla: Ind. Stockh. Medelp. Vifsta varf; Sundsvall enl. Leffl. Verml. Ölmeårad vid Långnäs. Ner. Latorp; Askersund. Vg. Kinnekulle. Boh. Strömstad; Qville sn, Hjertö; Koön. Öl. Götll.) Stjelken uppstigande, hög; blrna större än hos de följ. arterna. — *Trifolium Melilotus officinalis* L. *M. macrorhiza* ed.8.

2 *M. arvensis* Wallr. småbl. som hos föreg.; kölen kortare än de öfriga lika långa kronbladen; baljorna kort skafade, omvändt äggrunda, trubbiga med udd, n. släta och glatta.  $\gg$  7, g. blr. Fig. Sv.B.69. Sturm, 15 häft. H.N.f.6, n:o 34.

Torra st. r. (Sk. Småbl. Kalmar. ÖG. Söderköping: L. V. Djurb.; Dagsmosse; Kars-torp vid Svartån enl. Kindb. Stockh. vid Stockby i Danderyd sn. Rosl. Östhammar på Söderöns stränder. Hall Halmstad: Theor. Öl. Stundom förvildad, såsom vid Uppsala, och Gefle på Brobänken samt Vestml. vid Nordanby. — N. Porsgrund; Christiania etc.) Bladtänderna korta, mest trubbiga, försvinnande nedom småbladets midt; baljorna hos denna och föreg. art långt utskjutande ur fodret; blrna mindre än hos föreg., blekare och stundom nästan hvita, då den blir *M. Petioperreana* Willd. — *M. officinalis* Lam. och ed.8.

3 *M. alba* Lam. småbl. smalt omv. äggrunda—aflånga, sågade; vingarne och kölen kortare än seglet; baljorna oskafade, äggrunda nätrynkiga och glatta, till hälften inneslutna i fodret.  $\gg$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.69.f.d. FLD.1705. H.N.f.6, n:o 35.

Gat. och odl. st. r. (Sk.—Gefle. Helsl. Söderhamn, Bollnäs etc. Medelp. Sundsvall. Dal. Vestml. Vesterås. Ner. Tysslinge och Asker snr. Verml. Björkelors i Sunne sn. Boh. Strömstad; Marstrand. Hall Halmstad: Theor. Götll. — N. Christiania och södra prov.) Stjelken vanl. upprät, stundom manshög och busklíkt grenig; bladen varierade mycket till formen, men arten skiljes lätt af de oskafade baljorna. — *M. vulgaris* Willd. Trifol. Melil. var. L.

†† Stipl. med borstlika tänder vid basen.

4 *M. dentata* Pers. småbladen aflånga, tätt taggsågade; blrna som hos föreg.; baljorna oskafade, ovala föga rynkade, glatta.  $\gg$  7, g. blr. Fig. FLD.1883. H.N.f.10, n:o 49. Hafsstr. r. (Skånes vestra kust vid Borreby, Hillesborg i Härslof sn.) Har kortare blomklasar än de föreg., föga längre än bladen; blrna mycket små; småbladens sågtänder föga utmärkta af annat än de borstlika uddarne.

### 339. TRIFOLIUM Lín. Våpling, Klöfver.

† Blrna gula ell. bruna; seglet merändels refblad, med nedböjd spets.

\* Alla småbladen oskafade; stipl. lancettlika.

1 *T. spadiceum* L. stjelken upprät; stipl. kortare än bladskaften; småbl. aflånga—smalt omv. äggrunda; blomhufvud elliptiska, tätblomm., med håriga blomfoder.  $\gg$  6—8. Fig. Sturm, 16 häft. H.N.f.3, n:o 37.

Äng. r. (Medl. Sverige. ÖG. Södm. Ner. och Verml. — Ängml. och Jeml. Öl.), Har i början gulaktiga, sedan bruna glänsande blomhufvud.

2 *T. agrarium* L. stjelken merändels upprät; stipl. icke kortare än bladskaften; småbl. som hos föreg.; blomhufvud ovala tätblommiga, med mycket fårade segel, n. glatta blomfoder.  $\gg$  7, g. blr. Fig. FLD.558. H.N.f.9, n:o 52.

Äker- och ängsback. (Sk.—Gestr. Gefle och Ofvansjö kungsgård. Helsl. Hudiksvall. Medelp. Siljeberget. Ängml. Sidensjö sn; Hernön: Arn. Dal. Boh. Hall. nor. del.: Lem. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Fodrets tänder hos denna och följande hafva några få hår. Var. i södra Sv. med nedliggande stjelk. — *T. aureum* Poll., saml. Godr. & Gren.

\*\* Mellersta småbladet skafadt; stipl. äggrunda.

3 *T. procumbens* L. stjelken merändels nedliggande; stipl. kortare än bladskaften; småbl. omv. äggrunda—vigglíka, trubbiga ell. urnupna; blomhufvud låga ovala, med



n. glatt blomsfoder, *mycket* fårade segel. ☉ 6, 7, g. blr. — *β humile*: småbladen vigglika urnupna; blomhufvudskäften längre än bladen. Fig. Sturm, 16 h. H.N.f.9, n:o 53. *β* Fl.D.796.

Torra betesm. (Sk. allmän. — Stockh. Ner. Verml. Boh. Öl. Gutt. — N. Arendal; Spjärland, Svinesund; Hvalöarne; Christiania.) *α* 6—10 tum lång, till alla delar större och mer nedliggande: *T. campestre* Schreb.; *β* mindre, oflast upprät och mycket grenig: *T. procumbens* Schreb. i Sturms Fl. — *T. agrarium* Godr. & Gren.

4 *T. filiforme* L. stjelken meränd. nedliggande; stipl. ungefär af bladskäftens längd; småbl. som hos föreg.: blomhufvud *glesa*; blomsfodr. n. glatt; seglen omärkligt strimmade, n. *slåta*. ☉ 6, 7, blekg. blr. Fig. Fl.D.1707. E.B.1256. H.N.f.2, n:o 48; f.9, n:o 54.

Betesm. r. (Sk. ymnig. *Blek*. i Lyckebytrakten och nor. delen. *Smål.* Kalmar; Vester-vik; Hagby; Elmeboda: Scheutz. *VG.* Degeberg. *Boh.* Hall. Öl. Gutt. Hoburgen m. fl. st.; Fårön. — N. Laurvig. Christiansands st. upp till Fjändö.) *Har 2 former, en större, med mer utdragen stjelk, omv. åggrunda blad, rikare och tätare blomhufvud: T. minus* Sm. [*T. procumbens* Godr. & Gren.], samt en mindre. med vigglika blad och fåblommiga *glesa* bl.hufvud: den ursprungliga *T. filif.* Razi Synops. t.14,f.4 [samt Godr. & Gren.].

†† Birna hvita ell. hvitröda.

\* Blomsfodren slutligen blåslikt uppsvålda.

5 *T. fragiferum* L. stjelken nedliggande; blomhufvuden klotrunda, skaftade; blomsfodrets öfre del slutl. *upplåst*, hårig, jemte tvänne af fodertänderna nedböjd. 2 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.714. Fl.D.1042. H.N.f.11, n:o 50.

Sjö- och hafsstr. r. (Sk.—*Uppl.* vid Mälaren etc. t. ex. Stockholm vid Carlbergs kanal; Ulriksdal etc. *Rosl.* Hargs bruk; Söderön etc. *Medelp.* Sundsvall. *Vestml.* Barkarö; Vesterås, i Biskopshagen. *Hall.* Boh. Öl. Gutt. — N. Hvalöarne; Mandal; Christiania etc.) *Småbladen små ovala mycket nerviga, i spetsen något intryckta.*

\*\* Blomsfodren glatta, icke blåslika.

6 *T. repens* L. stjelken *krypande*, med *långa* blomhufvudskäft från bladvecken; småbladen meränd. *omv. åggrunda*, i spetsen intryckta; blomsfodrets tänder *märkbart oliliklånga*. 2 6—9, hv. stund. rödl. blr. Fig. Sv.B.344. Fl.D.990.

Ang. a. (Sk.—*Lpl.* — N. till Ost-Finnm.) *Var. med n. åggrunda småblad.*

7 *T. hybridum* L. stjelken *uppstigande, grenig*, med blomhufvudskäft i öfre bladvecken; småbladen *oval* ell. *åggrunda* trubbiga; blomsfodrets tänder *n. liklånga*. 2 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.129. Fl.D.1706. H.N.f.7, n:o 36.

Äng. (Sk.—*Ängml.* *VB.* Björkfors i nor. delen. *Jeml.* Östersund. *Vestml.* Ner. Verml. *VG.* Hall. Öl. Gutt. — N. Christiania; Drammen.) *Baljorna få sällan mer än 2 mogna frön, hos föreg. vanl. 3—4.*

\*\*\* Blomsfodren håriga, icke blåslika.

8 *T. montanum* L. stjelken rak upprät; småbl. bredt *lancettlika*, spetsiga, *taggsågade*; blomhufvuden *klotrunda skaftade, utan skärmblad*; fodret *kortare* än kronan; seglet smalt, utdraget, dubbelt längre än vingarne. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1172.

Torra st. (Sk.—*Gestr.* *Helsl.* Friggesund i Bjuråker: Wistr. *Vestml.* Ner. *VG.* Falbygden. *Hall.* Hasslöf: Theor. Öl. Gutt. — N.) *Roten tapplik; baljorna enfröiga håriga.*

9 *T. striatum* L. stjelken som hos föreg.; småbl. *omv. åggrunda, otydligt sågade*; blomhufvuden *åggformiga, de på sidan oskaftade, inom skärmblad*; blomsfodret ludet, med *upphöjda* nerver, syl-lika tänder, *knappt kortare* än kronan. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B. 616. Fl.D.1171. H.N.f.15, n:o 54.

Torra st. r. (Sk. Ystad; Cimbritshamn; Köpinge; Trelleborg; Lund; Malmö; Skabersjö; Rå; Helsingb. etc. *Blek.* Carlskrona, Tyskbagarebergen; Ronneby m. fl. st. *Smål.* södra delen af Kalmar län. Norra *Hall.* vid berget Klefskyrka i Släp sn. Öl. Ramsåtra; Thorslunda och Kastlösa snr: G. v. Ced. Fordom äfven på Gutt. i Lindarfe.) *Öfverallt mjukhårig; birna små rödlåta.*

10 *T. arvense* L. stj. som hos föreg.; småbl. *n. jembreda*, mot spetsen bredare, *n.*

*helbräddade*; blomhufvuden *afstånga*, *skaftade*, utan skärmbld., mycket håriga; fodret med borstlika tänder, *dubbelt längre* än kronan. ☉ 6, 7, rödlätta blr. Fig. Fl.D.724. Back. (Sk.—Gestr. *Helv.* Tuna sn vid Vi by. *Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Styrso;* Tanum sn. *Öl. Gottl.* — *N. till Trondhj.*) *Hela växten mjukhårig. Var. med nedtryckt, utsperradt grenig stjelm: var. prostratum Myr.*

+++ Blommorna högröda.

- 11 *T. pratense L.* stjelmken uppstigande, *rak*; stipl. *äggrunda*, uddspetsiga; småbl. *äggrunda*—omv. *äggrunda*, svagt tandade; blomhufvuden 1—2 tillsamm., vanl. oskaftade, *äggformiga*; blomfodrets nedre tand *föga längre* än foderpipen. 2 6—8, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.268. Fl.D.989.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — *N. till Senjen*: Norm.) *Blomhufvud vanligen inom skärmbld, stundom kort utskjutande; fodret öfverallt hårigt. Hela växten stundom silkestuden.*

- 12 *T. medium L.* stjelmken uppstigande, merändels *flerböjd*; stipl. *n. jemnbreda*, sylspetsade; småbl. *lancettlikt afstånga*, svagt tandade; blomhufvudet ensamt, slutl. *skaftadt, klotrundt*; blomfodrets nedersta tand *föga längre* än pipen. 2 6—8, r. blr. — *β strictum*: rakare stjelm, smalare blad. Fig. Sv.B.460. Fl.D.1273.

Äng. löfskogsbäck. (Sk.—Ängml. och *Jemtl. Boh. Öl. Gottl.* — *N. till Lofoden.* — *β Öl. Gottl.*) *Har nästan helbräddade småblad, axen ofta utan skärm; blomfodren n. glatta, med håriga tänder. β tages ofta för T. alpestre. — T. flexuosum Jacq.*

- 13 *T. alpestre L.* stjelmken *rak*; stipl. *syl-lika*; småbl. smalt *lancettlika*, svagt tandade; blomhufvuden *oskaftade, klotrunda, tvänne* tätt sittande inom samma skärmbld; fodrets nedre tand 2—3 gånger *längre* än pipen. 2 7, 8, r. blr. Fig. Jacq.A.433. H.N.f.13, n:o 62.

Ängs- och skogsbäck. r. (Sk. i synnerhet södra delen. Af Prof. Fries tagen vid Harlösa; äfven funnen vid Roslätt och Kullaberg. Sannolikt icke återfunnen i sednare tider: F. Aresch.) *Blomhufv. synes före blomningen fullt med långa borst, mycket längre än de outslagna blrna, härrörande af fodrets ofvannämnda långa tand.*

- 5 Flocken **Genistese.** Stånd. monadelphiska. Balja enrummig. Hjärtbl. tunna. [Örtbl. vanl. 3fingrade ell. enkla.]

### 340. SAROTHAMNUS Wimm. Hare-ris.

- 1 *S. scoparius Koch.*: grenarne kantiga, utan taggar; bladen enkla och 3fingrade, med *afstånga* småblad. 5 6. Fig. Sv.B.421. Fl.D.313.

Torra st. r. (Sk. Engelholm. Höja; Söfde; Gualöf; Torup etc. *Hall.* Gåsevadsholm; Hasslöf och Skottorp, i furuplant.: Theor. *VG.* på en ö i Venern; Göteborg. mellan Elfsborg och staden. *Boh.* Gunnebo, Färsbergs sn. *Smål.* Nottebäck; Åsheda sn. *Stockh.* nära Rydboholm. *Gottl.* Slite. och vid Etebols i Lummelunda enl. G. v. Ced. — *N. Mandal*, införd med ballast.) 2—5 *fots buske med stora gula blr, som ofta bilda rika klasar.* — *S. vulgaris Wimm. Spartium L.*

### 341. GENISTA Lin. Ginst.

- 1 *G. germanica L.* stammen med sammansatta taggar; blomgrenarne oväpnade, *jemte de lancettlika bladen långhåriga*; blomklasarne i toppen, med omärkl. blomskärm; baljorna *ludna*. 5 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.547. Fl.D.1826. H.N.f.13, n:o 64.

Bland ljung. r. (Sk. Saxåljung i Finja sn: Doc. P. Olsson enl. G. v. Ced. *Hall.* mellan Fostaby och Enslöfs färjställe, vid Hålvägen på venstra vägkanterna, då man kommer från Fostad; Skedala exercisfält: Theor; fordom på Mikedala berg i Vapnö socken. *Dalsl.* på en ljungbacke nära Sunnanå i Holms sn.)

- 2 *G. tinctoria L.* stammen *oväpnad*, med uppräta trinda och upphöjdt strimmiga grenar, *jemte de lancettlika bladen nästan glatta*; blomklasarne i toppen, med skärm vid blrna; baljorna *glatta*. 5 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.451. Fl.D.526. H.N.f.5, n:o 46. Betesmark. r. (*Hall.* Halmstad, allmän: Theor. *VG.* mellan Börstorp och Slätevalla; på en höjd i Malma på Hunnebergssidan; Lyrestads prestgård i Nordängen; på kanalbankarne nära Sjötorp, m. fl. st.) *Fotshög buskväxt.*

- 3 *G. pilosa L.* stammen *oväpnad*, nedliggande, knölig; bladen lancettlika, mot spetsen bredare, på undre sidan *jemte kronan silkeslåriga*; blrna 1, eller flere tillsammans,

på grenarnes sidor, närmade till klasar i dessas topp; baljorna *småludna*.  $\frac{1}{2}$  5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.678. Fl.D.1225. H.N.f.1, n:o 46.  
Ljunghedar, r. (Sk. nordvest. delen. Hall. i söd. del. ymnig. Smål. Femsjö, vid Elmås; Vrå.) *Några tum stor, nedtryckt buskväxt.*

## 342. ONONIS Lin. Ställört.

1 *O. campestris* Koch & Ziz. stjelen upprät, ell. uppstigande, *skiflevis* på en sida tydligare hårig, taggig af nedtill parvisa tornar; småbl. n. glatta, aflånga; blrna mest ensamma, i bladiga klasar; balj. äggrunda, icke kortare än fodret.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. E.B.682. H.N.f.10, n:o 44.

Torra äng. r. (Sk. Limhamn och på stranden nedom Edenryds gästg.; Lund, flerstäd; Ystad, på fl. st.; Oppmanna. Gottl. Visby gamla hamn; Sandön, vid Torpet; Stud. Eisen och Stuxberg. — N. Arendal; Christiania.) *Stjelen mer tråktigt än hos följ., öfverallt småluden, med en sida långhårig; de långa tornarne hafva vanl. en mindre torn ned vid sidan; bladen smalare och mera glatta. — O. spinosa Koch. Syn. O. antiquorum Lin. herb.*

2 *O. arvensis* L. stjelen nedligg. eller uppböjd, *likformigt småluden*; yngre oväpnad, skull. med enkla tornar; småbl. ovala eller bredt aflånga; blrna som hos föreg.; balj. äggrunda, kortare än fodret.  $\frac{1}{2}$  7, 8, röd. stund. hv. blr. Fig. Sv.B.243. Fl.D.783, enl. Reich. H.N.f.10, n:o 45 och 46.

Torra äng. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N.) *Nedligg., ofta rotlödande vid basen, med uppstigande toppar; mer glandelhårig än föreg. Har stundom parvisa blr. Föga skiljd art. — O. spinosa L.Fl.Su. O. repens L.Sp.Pl. O. procurrens Wallr.*

3 *O. hircina* Jacq. stjelen upprät, ell. uppstig. jemte grenarne *öfverallt långt klubbhårig, alltid oväpnad*; småbladen meränd. äggrunda; blrna parvisa, n. i ax; balj. som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  7, r. blr. Fig. Fl.D.1584. Jacq.H.93. H.N.f.10, n:o 47.

Äng. åkerrenar. (Sk.—Uppl. Jemt. vid Östberget på Frösön. Vestml. Ner. Verm. vid Christinehamnselfven. Boh. Öl. Gottl. Sandön, vid Torpet; Eis. och Stuxb. — N. södra och vest. delar upp till Lysöen i Trondhjems st.) *Stjelen mer örtartad än hos de föreg., mycket mer luden; illaluktande.*

## 343. ANTHYLLIS Lin. Getväpling.

1 *A. Vulneraria* L. bladen parbladiga, uddbladet störst; blomhufv. tvänne, tättsittande i stjelen spets.  $\frac{1}{2}$  7. —  $\beta$  ochroleuca: blrna gulaktigt hvita. —  $\gamma$  coccinea: med röda blr. Fig. Sv.B.395. Fl.D.988; 2728 och 2729, varr. H.N.f.10, n:o 48.  $\gamma$  H.N. f.14, n:o 57.

Ängsback. (Sk.—Uppl. och Dal. Herjed. Ulfberget vid Viken. Jemt. Åreskutans södra Hummel; Fölinge sn; Rödön och Frostviken. Um. Lpm. Storforsen. Lul. Lpm. Qvikkjokk. Boh. Öl. Gottl. — N. till Älten. —  $\beta$  Öl. Gottl. —  $\gamma$  ÖG. Kanalbankarne vid Husby. Öl. Gottl.) *Har vanligen gula blr.*

## 9 KLASSEN

### CENTRIFLORÆ.

62 Fam. **ERICINEÆ Juss.** Blr samkönade, af 4—5, mer och mindre samväxta ell. fria kronblad. Frukt flerrummigt, mångfröigt fröhus eller bär, med centralt fröfäste. Stift enkelt.

1 Flokken **Vaccinieæ.** Frukt inom och beklädd af fodrets bas [under blomman], bärlik.

#### 344. MYRTILLUS Gilib. Blåbärsbuske.

1 *M. nigra* Gil. grenarne kantiga; bladen äggrunda sågade, glatta; blrna i bladvecken; kronan n. klotformig. 2½ 5, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.163. Fl.D.974. Skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Fodret odeladt, ringformigt; bären svariblå: Blåbär. — *Vaccinium Myrtillus* L.

2 *M. uliginosa* Drej. grenarne trinda; bladen omv. äggrunda, helbräddade glatta; blrna gyttrade i grenarnes spets; kronan äggformigt klocklik. 2½ 5, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.331. Fl.D.231.

Skogskärr, a. (Sk.—Lpl. — N.) Bären blå, större än hos föreg.: Uddbär ell. Odon. — *Vaccinium* L.

#### 345. OXYCOCUS Pers. Tranbär.

1 *O. palustris* Pers. stielken trådlik, krypande, glatt; bladen äggrunda, med tillbakavikna helbrädd. kanter, under hvitgrå. 2½ 5, 6, r. blr. Fig. Sv.B.12. Fl.D.80.

\* *microcarpus* Turcz. till alla delar spådere, med hälften mindre blr och bär; blomskäften och foderflikarnes kanter glatta.

Tufviga kärr, a. (Sk.—Lpl. — N. — \* Helst i fjelltr. Torn. Lpm. Lul. Lpm. Qvikkjokk. Jemtl. VB. Uppl. Tibble: allt enl. Th. Fr. Blek. Johannishus enl. G. v. Ced. — N. hela Finnm.: Th. Fr. Nordl.: Norm. Lomsfjellen: Moë.) Bären stora och röda. Blomskäften hos hufvudformen mjukhåriga och foderflik. hårbräddade. — *Vaccinium Oxyc. L. Schollera* Roth.

#### 346. VACCINIUM Lin. Lingonris.

1 *V. vitis idæa* L. bladen omvänt äggrunda med nedböjda naggsågade kanter, under punkterade; blrna klasvisa i toppen, med utskjutande stift. 2½ 5, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.116. Fl.D.40.

Skogsback. a. (Sk.—Lpl. — N.) Bären röda, säll. hvita.

2 Flokken **Ericææ.** Frukt fri, inom blomman. Frön utan hylle.

#### 347. ARCTOSTAPHYLOS Adans. Mjölönris.

1 *A. officinalis* W. & Gr. bladen aflångt omv. äggrunda, läderaktiga, helbräddade, släta med intryckta nerver. 2½ 5, rödl. blr. Fig. Sv.B.85. Fl.D.33.

Skogshed. a. (Lpl.—Sk. nor. del. och Hall. söd. del. Götth. — N.) *Beständigt grönskande, med röda saflösa bär. — Arbutus Uva ursi L.*

2 *A. alpina* Spr. bladen omv. ägggrunda, sågade, ojemna af på undre sidan upphöjda nerver. 2 ½ 6, hv. blr. Fig. Sv.B.487. Fl.D.73.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. — N.) *Bladen vissna öfver vintern; bären svarta saftiga.*

### 348. ANDRŌMEDA Lin. Rosling.

1 *A. polifolia* L. bladen lancettlika—jemnbreda, med tillbakavikna kanter, under gråhvita; blomskäften flockvis gytttrade i toppen, med äggformiga blr. ½ 5, 6. Fig. Lin.Fl.L.t.1,f.2. Sv.B.445. Fl.D.54.

Kärr. (Lpl.—Sk. nor. del. och Hall. söd. del. Öl. Borga träsk. Götth. — N.) 1—2 qv. hög, med vackra hvita, mer och mindre rödl. blr.

2 *A. tetragona* L. bladen n. trekantiga med pil-lik bas, tegellagda i 4 rader; blomsk. ensamma från bladvecken, med klocklika blr. ½ 7, hv. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1,f.4. Fl.D.1030. H.N.f.8, n:o 50.

Fjellv. r. (Torn.—Pil. Lpm. — N. Finnm.—Saltén.) 1—3 qv. hög buskväxt, liknande grof ljung. — *Cassiope* DC.

3 *A. hypnoides* L. bladen syl-lika, tätt sittande; blomsk. ensamma i toppen, med klocklika blr. 2 ½ 7, 8. Fig. Lin.Fl.L.t.1,f.3. Fl.D.10. H.N.f.8, n:o 51.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. Finnm.—Dovre; Sölenfeld vid Fämundsjön; Valders; Tind etc.) *Liten, beständigt grönn, n. lik en moss; blrna hvita med rödl. bräm. — Cassiope* DC.

### 349. ERICA Lin. Klockljung.

1 *E. Tetralix* L. bladen mest 4 i krans, lancettlikt jemnbreda, med tillbakavikna kanter, glandelhåriga; blomkronorna vidgad äggformiga, i hufvudlika flockar. ½ 6—8, ljusr. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.439. Fl.D.81.

Ljungkärr. (Sk.—Verm. och Ner. Blek. vest. delen. Smål. Kalm. län, i Madesjö sn; Vimmerby; Bänarp i Lönnberga sn; Scheutz. Södm. i Kila sn; C. Ind. Mest i de vestra prov. — N. till Finnm.) *Bladkanterna mindre betäckande undre bladytan än hos följ.*

\*2 *E. cinerea* L. bladen mest 3 i krans, barrlika, under konvexa, med en smal fåra efter midten, glatta; kron. aflångt äggformiga, n. i hufvud eller grenig klase. ½ 7, 8, violetteröda blr. Fig. Fl.D.38. H.N.f.11, n:o 51.

Klipp. och back. r. (N. Stavangerfjorden på Rennsöe. Bergens st. vid Evenvig, Stensund, Husöe etc.)

### 350. CALLUNA Salisb. Ljung.

1 *C. vulgaris* Sal. bladen motsatta oskaftade, med pil-lik bas; blrna i ensidiga klasar. ½ 8, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.53. Fl.D.667.

Hedar och skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Grenarne 4kantiga af de tattsittande bladen; stundom utvåxa dessa och blifva syl-lik jemnbreda och utböjda. Var. glatt och småtuden. — C. Erica* DC. *Erica vulg. L.*

### 351. PHYLLODOCE Salisb. Lappljung.

1 *P. coerulea* Sal. bladen jemnbreda, i kanten sträfvä; blrna lutande på skaft gytttrade i grenarnes spets. ½ 7, viol. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1,f.5. Sv.B.535. Fl.D.57. H.N.f.3, n:o 48.

Fjellv. (Lpl.—Dal. — N.) 3—8 tum hög. — *Andromeda* L. *Menziezia* Smith.

### 352. AZALEA Lin. Krepling.

1 *A. procumbens* L. stammen nedtryckt; bladen aflånga trubbiga glatta, med tillbakaböjda kanter; blrna i grenarnes spets. ½ 7, 8, r. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.6,f.2. Fl.D.9. H.N.f.15, n:o 58.

Fjellv. (Lpl.—Dal. — N.) *Har fingerlånga vedartade grenar, alltid grönskande blad. — Loiseleuria* Desv. *Chamaedon* Link.

### 353. RHODODENDRUM Lin. Alp-ros.

1 *R. lapponicum* Wg. bladen ägggrunda trubbiga, punkterade och kådprickiga; blrna

flockvisa i toppen, med glatta kronor.  $\frac{1}{2}$  6, 7, viol. blr. Fig. Lin. Fl. L. t. 6. f. 1. Sv. B. 481. Fl. D. 966. H. N. f. 9, n: o 55.

Fjellv. r. (Torn. tråsk. *Lul. Lpm.* teml. allm. i alla de högre fjelltrakterna: C. Ind. *Pit. Lpm.* Tjidsjakk. — N. Finnm. på Goskevare och Sakkavare i Alten-Talvig past., m. fl. st. Nordl. Sulitälma. Kaddåive: H. Widm. Gudbrandsdalen, Lomseggen på sidan åt Båfverdalen.) Några få tum hög buskväxt, uppskjutande blott qvistarnes topp med blad och blr öfver jordytan. Ståndarne 5 eller 10, längre än kronan. — *Azalea L.*

### 354. LEDUM Lin. Squattram.

1 *L. palustre L.* bladen jemnbreda—aflånga, med tillbakavikna kaurer, under brunulliga.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. —  $\beta$  *dilatatum*: bladen aflånga. Fig. Sv. B. 18. Fl. D. 1031. H. N. f. 15, n: o 57.

Tufviga skogskärr. (*Lpl.*—*Sk.* nor. del. och *Hall.* söd. del. *Öl.* nor. del. *Gottl.*—*N.*) *Alnshög buske*, med blr i tät flock.  $\beta$  har dubbelt bredare blad än den vanliga, men ej så ovala som *L. grönlandicum Retz.*

3 Flocken **Pyrolaceæ.** Frukt fri. Frön omgifna af ett aflångt hylle.

### 355. PYROLA Lin. Vintergrön.

† Blrna i klase; ståndarknapparne utan bihang.

\* Stiftet nedböjdt.

1 *P. rotundifolia L.* bladen rundade, läderaktiga, af skaftens längd; blrna i rak mångblommig klase, vidöppna; foderflikarne lancettlika fränböjda; stiftet längre än kronan.  $\frac{1}{2}$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv. B. 304. Fl. D. 1816.

Skog. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finm.) Bladen 1— $1\frac{1}{2}$  tum långa och n. lika breda.

2 *P. chlorantha Sw.* bladen som hos föreg., kortare än deras skaft; blrna i vanl. flerböjdt, fåblommig klase, vidöppna; foderflik. *triangulära tilltryckta*; stift som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  7, 8, blekg. blr. Fig. Sv. B. 453. Fl. D. 1693. H. N. f. 13, n: o 65.

Barrskog. (*Sk.*—*Ångml.* och *Jeml.* Boh. Oroust, i Svineviks skog. *Hall.* Torup; Skottorp: Theor. *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Nordl. Bejeren: Norm.) Bladen knappt 1 tum i längd och bredd.

\*\* Stiftet rakt, upprätt.

3 *P. media Sw.* bladen rundade, läderaktiga; blrna i allsidig klase, halft klotrunda, något slutna; stiftet kort utskjutande.  $\frac{1}{2}$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv. B. 311. Fl. D. 110. H. N. f. 9, n: o 56.

Skog. r. (*Sk.*—*Helsl.* Ångml. Skog sn, Gallsättsbölen. VB. Umeå: Reuterm. *Jeml.* Dal. Vestml. Ner. Verml. *Gottl.* — *N.* Christiansands och Bergens stift. Molde. Sölde i Österdalen. Finnm. Renöe; Skjervö: Norm.) Har dubbelt större blr än följ.; bladen vanl. större än hos någon af de öfr. arterna. — *P. rotundifolia Fl. D.*

4 *P. minor L.* blrna n. klotrunda tillslutna, med inneslutet stift; för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Sv. B. 550. Fl. D. 55.

Löskog. etc. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.*) Blrna hv. ell. rödlätta, smärre än hos föregående arter; bladen stund. n. ovala. Fig. i Sv. B. dålig. — *P. rosea Sm.*

5 *P. secunda L.* bladen ovala, spetsiga, finsågade; blrna i ensidig klase, aflånga; stiftet långt utskjutande.  $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Sv. B. 566. Fl. D. 402.

Skog. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finm.) Blrna grönaktigt hvita.

†† Blomman ensam; ståndarkn. med 2 från hvarandra böjda hornlika bihang vid basen: *Moneses Sal.*

6 *P. uniflora L.* bladen rundade, hvass-sågade; blomman nedböjd, vidöppen, med långt rakt stift.  $\frac{1}{2}$  7, hv. blr. Fig. Sv. B. 176. Fl. D. 8.

Fukt. skog. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finm.: Norm.) *Fingerhög; blomman väl-luktande; frukten upprätt.* — *Chimaphila Fr. S. V. Sc. Mones. grandiflora Salisb.*

+++ Birna i flock; stånd. som i föreg. afd.; stiftet omärkligt.

- 7 *P. umbellata* L. bladen läderartade, vigglika, ofvan midten sågade; blomflocken 3—6blommig. 2 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  8, rödl. blr. Fig. Sv.B.27. Fl.D.1336. H.N.f.16, n:o 55.  
 Barrskog. r. (Sk. Baldringe; Blekmåsa enl. Scheutz. Smål.—Helsl. och Dal. Verml. Dalsl. Boh. Hall. Halmstad. Öl. Gottl. — N. Dramsfjorden mell. Hurum och Holmsboe; Ulderud; Christiania.) Omkr. *quartershög buskväxt*; bladen n. *kransvisa, trubbiga ell. kortspetsiga*. — *Chimaphila Nutt.*

356. MONOTROPA Lin. Gultopp, Tallört.

- 1 *M. Hypopitys* L. blomklasen i yngre tillstånd nedböjd; sidoblarna med 8 ståndare. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8, g. blr. —  $\beta$  *glabra*: blommans delar alldeles glatta. Fig. Sv.B.97. Fl.D.232;  $\beta$  2051. Reich.f.675.  
 Skog. r. (Sk.—Gestr. Helsl. Kölberget i Hanebo sn. Vestml. Ner. Verml. VG. Dalsl. Boh. Oroust, i Svineviks skog m. fl. st. enl. Leffl. Öl. Gottl. — N.) *Hela växten blekgul, bladlös, fjällig; kronbl. och ståndare hos  $\alpha$  håriga; roten bestående af en massa mögel-likn. trådar och gulaktiga rotnölar, fast hopgyttrade med jord och andra växters rottrådar*. — *M. hirsuta Nolle. Hypopitys multiflora Scop.*  $\beta$ , eller *M. Hypophegea Wallr., Hypopitys glabra Bernh.*, är vida sällsyntare.

- 63 Fam. *EMPETREÆ Nutt.* Blr skiljdkönade, med 3taliga blomdelar. Fruktämne fritt, [3-] 9rummigt, slutt. ett bär, med lika många frön som rum.

357. *EMPETRUM* Lin. Kråkris.

- 1 *E. nigrum* L. låg, n. glatt buske, med nedliggande grenar; bladen barrlika, jemnbredt aflånga, med en blekare fära på undre sidan.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Sv.B.259. Fl. D.975.  
 Hedar etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Bladen ihåliga, likasom med kanterna tillbakavikna och sammanväxta i ryggsåran; blarna i bladvecken, små, med mörkvioletta kronbl. och knappar; bären svarta.*

- 64 Fam. *EUPHORBIACEÆ Juss.* Blr skiljdkönade. Fruktämne fritt, 2—3rummigt, med centralfäste; slutt. 2—3 fria småfrukter. Frön hängande, 1—2 i hvarje rum.

358. *EUPHORBIA* Lin. Törel.

+ Blomflocken mångstrålig; fleråriga arter.

- 1 *E. palustris* L. stjelk- och grenbladen lancettlika *trubbiga*, alla likformiga; svepebl. *äggrunda*; flockskafen först 3-, sedan 2delade; kalkflik. utan borstlika bihang. 2 $\frac{1}{2}$  3, 6, g. blr. Fig. Sv.B.329. Fl.D.866. H.N.f.4, n:o 67.  
 Kärräng. r. (Öl. Öfver nästan hela ön. Gottl. mellan Ejsta och Sproge; Gothem; Tänglingsmyr i Etehem. Boh. i skären — N. Christiania; Krageröe; Arendal etc.) *Störst bland de Skand. arterna, stundom 2 alnar hög, buskformig. Bladen hos alla arter i afdelningen helbräddade.*  
 2 *E. Esula* L. stjelk- och grenbladen jemnbredt lancettlika *spetsiga*, alla likformiga; allmänna svepets blad bredt lancettlika, det enskildtas *njurlika, uddspetsiga*; de större kalkflik. med 2 borst- ell. hornlika bihang. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1270. H.N.f.4, n:o 68.  
 Åkrar, murar etc. r. (Sk. Tågarp; Kabusa; Huaröd etc. Blek. Vedby. Smål. Kalmar, Karlsberg. ÖG. Norrköp. Vestralund etc. Stockh. Uppl. Rasbo; Uppsala, Malmsgårde. Gestr. Hillevik. Helsl. Ljusdal, vid Moravallen: Wistr. Dal. Säter; Furudal; Sunnansjö bruk. Vestml. Sala; Skinnskatteberg. Ner. Örebro; Tysslinge, Vinter-

åsa och Hidinge snr etc. *Hall.* Vallda, vid Vällås och Gustafsberg enl. Leffl. *Öl.* Algtusrum m. fl. st.) *Omkring 3 kvarter hög; bladen 2—4 linier breda, grenbladen något smalare.*

- 3 *E. Cyparissias* L. stielkbladen jemnbreda *trubbiga*, grenarnes mycket smalare; allm. svepet blad *jemnbreda*, det enskildtas *njurlika*, vanl. *trubbiga*; kalkflik. *som hos föreg.* 2½ 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.2052. H.N.f.10, n:o 55.

Sandback., gamla kyrkog. r. (Sk. Andrarum, Hvitaby, Maltesholm, Brösarps kyrkogård, mest i östra Sk., dock äfven vid Björnstorp i Göddelöfs sn. År på de flesta dessa ställen försvunnen, men i sedn. tider funnen i Rafunda; Loushults och Örkeneds kyrkog. *Smål.* mell. delen, icke vest. om Lagan; i Kalm. län, på Lönnberga kyrkog.: Ekstr. *ÖG.* Skönberga prestg.; Asby m. fl. st. enl. Kindb. *Hall.* Dömmestorp och Hasslöfs kyrkog.: Theor. *Gottl.* Halfvars i Vesterhejde.) *Mindre än föreg.; bladen omkr. en linie breda, mot spetsen något bredare; grenarne tätbladiga, ofta öfverskjulande blrna i stielkens spets.*

†† Flocken 3—5strålig; ettåriga arter.

- 4 *E. exigua* L. stielkbladen oskaftade, *jemnbreda*, *trubbiga* med kort udd, *helbräddade*; svepebl. *lancettlika*; flocken 3- (säll. 5strålig), med klynnedelade strålar. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.635. Fl.D.592. H.N.f.1, n:o 52.

Åkr. r. (Sk. i sydvest. del., t. ex. kring Lund, Trolleberg, Lomma, Malmö och derifr. till Hvellinge och Trelleborg; F. Aresch. *Vestml.* Kärrbo sn vid Springsta. *Uppl.* Enköping. *Medelp.* Sundsvall, på ballastplatser. *Gottl.* Taxstens i Lärbro sn; Enges i Alfva sn enl. G. v. Ced.) *Vanl. fingerhög, stund. fotshög och mycket grenig.*

- 5 *E. Peplus* L. stielkbladen skaftade, *omv. äggrunda*, *helbräddade*; svepebl. *äggrunda*; flocken 3strålig, med klynnedelade strålar. ☉ 7—9, gulgr. blr. Fig. Fl.D.1100.

Odl. st. a. (Sk.—*Gestr.* och *Vestml.* *Ner.* *Verm.* Carlstad. *Boh.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Trondhj.) *Vanl. ända från rothalsen grenig.*

- 6 *E. Helioscopia* L. stielk- och svepebladen *omv. äggrunda* vigglika *småågade*; flocken 5strålig, med först 3-, sedan 2-delade strålar. ☉ 7—9, g. blr. Fig. Sv.B.70. Fl.D.725.

Odl. st. och täppor, a. (Sk.—*Ängml.* och *Jemtl.* *Boh.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Nordl.) *Vanl. fotshög, föga grenig; stundom fingerhög och enkel.*

### 359. MERCURIALIS Lin. Bingel.

- 1 *M. perennis* L. stielken *enkel*; bladen skaftade, eggrundt lancettlika, *sträfhåriga*; honblrnas gemensamma skaft *udraget.* 2½ 5. Fig. Sv.B.455. Fl.D.400.

Lundar. (Sk.—*Södml.* *Stockh.* Rosl. Sessön i Norrtelgetrakten; Frötuna vid klockstapelsbacken. *Vestml.* *VG.* *Dalsl.* *Boh.* *Öl.* *Gottl.*? — *N.* Dröbak, Laurvig etc. upp till. Storöen i Bergens stift.) *Har i bladvecken glesa az af små gröna blr; svartnar torr.*

- \*2 *M. annua* L. stielken *grenig*; bl. skaftade, n. äggrunda, *glatta*; honblommornas skaft *ganska kort.* ☉ 7—9. Fig. Fl.D.1890. H.N.f.13, n:o 66.

Odl. st. etc. (*N.* på flere st. enl. Fr. S.V.Sc. troligen öfverallt införd med ballast såsom vid Christiania, äfvensom i Sv. vid Hernösand, Gefle, Kalmar och *Gottl.* vid Killejshamn.)

- 65 Fam. TAMARISCINEÆ Desv. Foder- och kronblad 5. Fruktämne fritt, enrummigt, slutl. 3skalligt fröhus med fröfästen på väggarne. Frön med fjun, utan hvite.

### 360. MYRICARIA Desv. Klådris.

- 1 *M. germanica* Desv. buske; bladen aflånga ell. från en bredare bas jemnbreda oskaftade *trubbiga*; blomskärmen längre än blomskaftet. ½ 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.670. Fl.D.234. H.N.f.3, n:o 49.

Stränd. r. (*Ängml.* Sollefteå och Ed snr, vid Ångermanelfven. *Jemtl.* och *Medelp.* längs Indalselfven från Dövikén i Ragunda ned till Liden sn; Indals sn, Lagmansö



fiskelläge. — N. Staburs- och Börselv i Porsanger, samt på Skjervö: Norm.; Altenelv; Salten; Namselven i Grongs och Overhaldens snr; Stördalselven; Drivelven; Lougenelv upp mot Dovre; Over- och Vårdalen; Leyerdalselven nedom Gallerna. Öar i Bergens fjord.) 2—5 fot hög, till grenar och blad icke olik grof ljung. — *Tamarix* L.

- 66 Fam. **PORTULACACEÆ** Juss. Foder vanl. 2bladigt. Frukt ett enrumm. mångfröigt fröhus med centralt fröfäste.

361. *MONTIA* Lin. Lunk.

- 1 *M. fontana* L. bladen motsatta n. spadlika. ☉ 6—8, hv. blr. — *a minor*: stjelken mindre, mer upprät; frön med matt glans. — *β rivularis*: stj. utdragen flytande; frön med starkare glans. Fig. Sv.B.540. Fl.D.131; *β* 1926. H.N.f.14, n:o 58.  
Fukt. st. källdrag, *β* i bäckar. (Sk.—*Torn. Lpm.* — N. till Ost-Finnm.) Lik en liten *Stellaria*. Har hvita blr, nedböjda fröhus, svarta frön. De begge formerna anses af några förf. för skilda arter. På punkteringen hos fröen kan förf. ej finna någon märklig skilnad, likasom glansen icke är synnerligt olika. — *M. minor* Gmel. *β M. rivularis* Gm.

- 67 Fam. **PARONYCHIEÆ** S:t Hil. Fod. 5deladt ell. flikadt. Stift 2—3. Frukt. enrummigt fröhus med centralfäste och ett enda frö.

362. *HERNIARIA* Lin. Knytling.

- 1 *H. glabra* L. bladen aflånga—omv. äggrunda, glatta; blrna talrika, gytttrade i öfre bladvecken. 2 7, 8. Fig. Fl.D.529.  
Torra st. a. (Sk.—*Medelp.* och *Dal. Hall. Öt. Gottl.* — N. söd. och vest. delar.) Liten, platt, tryckt till marken; blrna små, gulgröna, stundom bildande axlika, bladiga gylltringar.

363. *SCLERANTHUS* Lin. Knafvel.

- 1 *S. perennis* L. blomkalkens flikar trubbiga, bredt hinnkantade, slutl. plattadt slutna omkr. frukten. 2 6. Fig. Fl.D.563. H.N.f.12, n:o 62.  
Back. (Sk.—*Medelp. Vestml. Ner. Verm. Boh. Öt. Gottl.* — N. söd. del till Bergen.) Örten fingerhög blåaktig; bl. syl-lika; blrna genom den bredare hinnkanten mer hvitaktiga än hos följ.  
2 *S. annuus* L. kalkflik. spetsiga ell. något trubbiga, smalt hinnkantade, alltid utstående. ☉ 6, 7, gr. blr. — *β biennis* Fr. tvåårig; blrna tätare gytttrade, med något trubbiga kalkflikar. Fig. Fl.D.504. *β* H.N.f.12, n:o 61.  
Back. åkr. a. (Sk.—*VB.* och *Jemtl. Öt. Gottl.* — N.) Grönare, mer risaktigt utbredd än föreg. Blomkalkens flikar hos den ettåriga hufvudformen spetsiga. — *β S. verticillatus* Tausch.

- 68 Fam. **POLYGONEÆ** Juss. Blomkalk 3—6delad. Frukt enfröig nöt.

364. *FAGOPYRUM* Gärtn. Bokhvete.

- +1 *F. esculentum* Gärtn. bladen pilformigt hjertlika; blrna i tåla klasar; fruktens kanter hela. ☉ 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. E.B.1044. Sturm 18 häft.  
Åkr. r. (Sk.—*Uppl. Helsl.* Gnarp och Bjuråker snr: Wistr. *VB.* Neder-Kalix, vid Åkroken. *Ner. Ekeby* och *Asker* snr. *VG. Hall. Gottl.* Öfverallt förvildad. —

*N. Christiania*, Christiansands och Bergens stift; öfverallt förvildad.) *Stjelken krokig, ehuru upprät; hufvudsakligen skild från följ. med frukten.* — *Polygonum* *Fagopyrum* *L.*

†2 *F. emarginatum* *Gärtn.* blad. som hos föreg.; blrna i *glesa* klasar; fruktens kanter *bugtandade*. ☉ 7. Fig. Vet.Ac.Handl.1744,t.4. Fl.D.2649.

Åkr, etc. r. (Sk. särdeles i östra delen förvildad. — *N.* söd. delen: Ax. Bl.) *Lik föreg., men blrna smärre och mer grönaktiga.* — *Polygonum tataricum* *L.*

365. POLYGONUM *Lin.* Slideknå.

† Stjelken upprät enkel, med ett enda ax i toppen; ståndare 8: *Bistorta* *Tourn.*

1 *P. Bistorta* *L.* bladen äggrunda med *tvärrhuggen* eller *hjärtlik* bas, *nedlöpande* på skaftet, de öfre omfattande; axet aflångt äggformigt. 2 6, 7, rödl. blr. Fig. Fl.D.421. H.N.f.11; n:o 52.

Fukt. äng. r. (Sk. Vegeholm; Dufeske; Hurfva; Krageholm etc. *Blek.* Silltorp. *Smål.* Vexjö, vid Tufvan; Stenbrohult; Öhrs. Aringsås och Blädinge kyrkog. etc. enl. Scheutz. *Stockholm*, vid Byströms villa; Lill-Sikla och Skuggan. *Vestml.* Vesterås, nära Carlberg. *Hall.* Halmstad: Theor.)

2 *P. viviparum* *L.* bladen jemnbreda—bredt lancettl., *åt båda ändar spetsiga*, med *tillbakavikna* kanter, *icke* nedlop. på skaftet; axet *cylindriskt*. 2 6, hv. ell. rödl. blr. — *β alpinum*: med bredare, stund. n. ovala blad. Fig. Sv.B.336. Fl.D.13.

Äng. a. (Lpl.—Smål. Sk. nor. del. sälls. Boh. och Hall. — *N.* — *β* i fjelltrakter.) *Azet blommor först nedtill och sätter små knopplökar i stället för blr.*

†† Stjelken vanl. grenig, med bladlösa ax i toppen; stift 2—3, meränd. nedtill samväxta: *Persicaria* *Gärtn.*

\* Axen tjocka, tät blommiga.

3 *P. amphibium* *L.* bladen aflånga med *något hjertlik* bas; axet *ensamt*, på *glatt* skaft; ståndarne 5. 2 7, 8, ljusr. blr. — *α aquaticum*: stjelen och bladen flytande, glatta; stånd. längre, pist. icke längre än kalken. — *β terrestre*: upprät; bladen från bredare bas lancettl. spetsiga; stånd. kortare, pist. längre än kalken. Fig. Fl.D.282.

*α*, *β* vid vatten etc. (Sk.—Lul. Lpm. Råneelf mellan Gellivare och Jokkmokk. — *N.* till Ost-Finnm.)

4 *P. lapathifolium* *L.* stipelslid. med *inga* ell. *korta* hår i kanten; bladen *äggrunda—bredt lancettlika*; axen *flere*, på *sträpprickiga* skaft; stånd. 6; stiften endast *vid basen* hopväxta; nötterna på sidorna intryckta. ☉ 7, 8, blekg. ell. rödl. blr. — *β nodosum*: med mycket uppsvällda stjelnleder, smalare ax, smärre blr. — *γ incanum*: bl. under gråakt. och vanl. hvitludna; stipelslid. hårbräddade. Fig. Fl.D.2412, *β* 2648. H.N.f.4, n:o 69, 70; *β* 71, 72; *γ* 73.

Odl. st. etc. a. (Sk.—Lpl. — *N.* — *γ* Sk. — *Helsk.* Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — *N.*) *Bladen ofta på midten tecknade med en brun fläck.* — *β P. nodosum* *Pers.* *γ P. incanum* *Schmidt.*

5 *P. Persicaria* *L.* stipelslid. kantade med *långa* hår; bladen *lancettlika glatta*, under föga blekare; axen *flere*, på *glatta* skaft; stånd. 6; stiften n. till midten hopväxta; nötter dels plattade, dels 3kantiga. ☉ 7, 8, r. ell. hv. blr. Fig. Fl.D.702. H.N.f.4, n:o 74 och 75; f.10, n:o 57.

Fukt. st. stränd. (Sk.—Medelp. Dal. Verml. och Dalsl., mest i Venerstrakten. Boh. Öl. Gottl. — *N.* upp till Finnm.) *Var. i storlek från att tästa med P. lapathif. [H.N.f.10, n:o 57] till fingerhög och spåd som P. minus Huds. [f.4, n:o 75]. Märkena i ett mindre antal blr 3:ne; dessa gifva de 3kantiga nötterna.* — *P. biförme* *Wg.*

\*\* Axen smala, glesblommiga; stånd. 6.

6 *P. mite* *Schrank*: stipelslid. *långt* hårbräddade; bladen utdraget lancettlika—jemnbreda platta; kalkbladen *glatta* [utan glandler]; stiften hopväxta n. upp till märkena. ☉ 7—9, r. ell. hv. blr. Fig. Reich.f.686. H.N.f.4, n:o 76; f.7, n:o 56.

\* *minus* *Huds.* mindre; bladen n. jemnbreda; nötterna dubbelt smärre. Fig. Fl.D.2230. H.N.f.4, n:o 75; f.11, n:o 53.

Fukt. st. r. (Sk.—Held. VB. Neder-Kalix sn, på Fahlen-ön. Vestml. Ner. Verm. Hall. Öl. — N. söd. del.: Ax. Bl.) Var. som föreg., men utmärkt af sin vekhet, tunna blad och smala, vanl. glesa ax; lätt skiljd från följ. genom sin milda smak. — *P. laxiflorum* Weihe. \* *P. mile* \* *strictum* Fr.

- 7 *P. Hydropiper* L. stipelslid. borsträddade; bladen lancettlika vågiga; kalkbladen glandelprickiga; stiftan hopväxta vid basen. ☉ 8, 9, gul. ell. rödakt. blr. Fig. Sv.B. 424. Fl.D.1576.

Diken etc. a. (Sk.—VB. — N.) Bladen hafva en brännande bitter smak; kalken ofta 4delad.

+++ Blommorna 1—4, i bladvecken eller i bladiga ax: stiftan fria: *Avicularia* Meisn.

- 8 *P. aviculare* L. stjelen meränd. nedligg. och grenig; stipelslid. hvita ell. hvitröda, glesst enkelnerviga, sargade; bladen lancettlika—ovala, i kanten sträva, ådriga; nötterna innesluta i kalken, finprickiga, n. glanslösa, svartbruna. ☉ 5—10, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.406. Fl.D.803.

Odl. och trampade st., stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Var. i hög grad, från ett par tum hög och upprät, till alndång, risaktig och nedliggande, samt på hafsstr. med något tjocka, blågröna bl., stora stipelsidor.

- 9 *P. Ragi* Bab. stjelen som hos föreg., vid basen vedartad; stipelslid. som hos föreg., mot basen bruna; bladen lancettlika, blågröna, ådriga; nött. till hälften utskjutande, n. släta, glänsande, ljusbruna. 2/7—9, hv. ell. rödl. blr. Fig. E.B.2805.

Hafsstr. r. (Sk. vid Tjörndala och Brantevik, samt Kulla Gunnarstorp enl. F. Aresch. Finnes äfven fr. Sk. i L. Borgströms herb., men utan närmare angifven lokal.) Närmast den ulländska *P. maritimum*, som dock skiljes med latrikare och greniga nerver på stipelslid. — En medelform mell. närr. och föreg. art, måhända blott en strandform af den sednare, upptages af F. Aresch. i Sk.Fl. såsom *P. Robertii* Lois., ell. namn som Meisner af namngifvarens egna ex. sunnit beteckna en blandad art, omfattande former af både *P. Ragi* och *aviculare*.

+++ Stjelen slingrande; blomklasar i bladvecken; stånd. 8; stiftet enkelt med 3knöligt märke: *Tinearum* Meisn.

- 10 *P. Convolvulus* L. stjelen kantig; bladen hjertlikt pil-lika, spetsade; blrna i utdragna glesa klasar; kalkbladen småhåriga, icke vingkantade; nötterna finprickiga, glanslösa. ☉ 7. Fig. Fl.D.744.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. Alten.) Enskildta blomskafen kortare än den invändigt hvita, utv. gröna blomman.

- 11 *P. dumetorum* L. stj. n. trind; kalkbladen glatta, bredt vingkantade; nötterna släta och glänsande; för öfr. som föreg. ☉ 7. Fig. Fl.D.756. H.N.f.13, n:o 67.

Skogsback., svedjeland. (Sk.—Ångml. Pil. Lpm. Iustjakk. Verm. Venerstrakten. Dalsl. Boh. Öl. — N.) Blomskafi af den med hvita vingkanter försedda blommans längd.

### 366. RUMEX Lin. Syra.

+ Alla eller de flesta blrna 2könade: *Lapathum* Tournef.

\* De 3, frukten inneslut. kalkbladen \*) smalt rutformiga, långtandade.

- 1 *R. maritimus* L. örtbladen n. jemnbreda; blomkransarne tätsittande; de 3 kalkbladen grynårande, med borstlika tänder längre än kalkbladets bredd. 7/8. Fig. Sv.B.706. Fl.D.1208. H.N.f.1, n:o 54.

Hafs- och sjöstr. r. (Sk. Blek. Smäl. från söd. gränsen till Kalmar. ÖG. Omberg; Linköping; Laxfjällen etc. Stockh. Södm. Nyköping: C. Ind.; Julitha sn, vid Öljaren. Ner. norra Hjelmarestanden genom Lillkyrka och Göthlunda snr. Verm.

\*) Då kalkbladen i det följande beskrifvas, förstås endast de 3 inre ell. större, hvilka innesluta nöten, och som böra undersökas vid dennes mogningstid på hösten. Blrna i detta släkte gröna ell. brunaktiga.

vid sjön Banken nedom Vee i Väscharad. VG. vid sjön Ymsen enl. Wahlstedt. Hall. Öl. Gottl. — N. till Romsdalen samt Skognen vid Trondhjemsfjorden. Blir vid fruktmogningen hell och hållet gul, hvaraf den fått namnet aureus With. Bladen meränd. vågiga.

- 2 *R. palustris* Sm. örtbladen smalt lancettlika; blomkransarne åtskiljda; de tre kalkbladen grynbarande, med syl-rika tänder, kortare än kalkbladets bredd. 7. 8. Fig. Fl.D.1873. H.N.f.2, n:o 52.

Stränd. och kärr, r. (Sk. hela söd. och vest. slättbygd. enl. F. Aresch. Gottl. Visby gamla hamn.) Liknar föregående; bladen vanl. jemna.

- 3 *R. Steinii* Beck. rotbladen bredt aflånga, med hjertlik bas; stjelkl. från afrundad bas lancettlika; blomkrans. glesblommiga och åtskiljda; kalkbl. som hos föreg. 2 7—9. Fig.

Fukt. st. r. (Sk. vid Lilla Hammar, bland *R. palustr.* och *conglom.*) Bladen jemna. Lik föreg. till kalkbl., följ. till habitus. Allt enl. F. Aresch.; osedd af utg.

\*\* Kalkbladen aflånga, helbräddade; blomkransar åtskiljda.

- 4 *R. conglomeratus* Murr. de nedre bladen äggrundt ell. hjertlikt lancettlika, de öfre lancettl.; blomkrans. tätblommiga; alla kalkblad grynbarande. 2 7. Fig. Fl.D.2228. H.N.f.9, n:o 57.

Fukt. st. r. (Sk. sydvest. del, t. ex. mellan Lilla Hammar och Kämpingeljung etc.) Bladen något våtiga; blomkransarne med små skärmbld. — *R. Nemolapathum* Ehrh.

- 5 *R. sanguineus* L. de nedre bladen hjertlikt aflånga, spetsiga, de öfre från bredare bas lancettlika; blomkrans. glesblommiga; ell. enda kalkblad grynbarande. 2 7. 8. Fig. Sv.B.653. Fl.D.2229. H.N.f.1, n:o 53.

Fukt. bokskog. r. (Sk. Roslätt; Ölvedskloster på Fruali; Helsingb. i Pålköpsskogen; Kullaberg etc. Smål. Värnanäs i Halltorps sn; omkr. Arby. Hall. Hallandsås: Theor. Öl. Thoroslunda; Halltorp etc. — Södra N.) Mycket lik föreg.; bladen något våtiga; endast de nedre blomkrans. med skärmbld. — *R. Nemolapathum* Wg. och Fries. *R. nemorosus* Schrad.

\*\*\* Kalkbl. utdraget triangulära ell. [*R. acutus*] något hjertlika, hvasstandade; blomkrans. åtskiljda.

- 6 *R. obtusifolius* L. rotbladen hjertlika, vanl. trubbiga; stjelkl. smalare, alla jemna; blomkrans. tätblommiga, de nedre med bredt lancettlika skärmbld; kalkbl. triangelformiga, gles hvasstandade, alla grynbarande. 2 7. —  $\beta$  *divaricatus*: rotbl. rundadt trubbiga; kalkbl. bredare, upphöjdt nätådriga, långt syltandade, ett i synn. grynbar. Fig. Fl.D.1335. F. Aresch. i Öfers. af K.V.A.Förh. 1862, t.3, f.1. H.N.f.5, n:o 54;  $\beta$  f.7, n:o 57.

Fukt. st. vid byar. (Sk.—Helsl. och Vestml. Verml. Carlstad. Dalsl. i Ånimskog; Fröskog. Boh. Öl. Gottl. — N. Vestanfjells. —  $\beta$  Sk.—Uppl. VG. Hall. Öl. Gottl.) 3—5 fot hög; bladen äggrundt hjertlika, ofta ganska stora, vid fruktmogn. qvarsittande, friska och gröna. Ena kalkbladets gryn vanl. något större än de 2 öfriga. —  $\beta$  *R. divaric.* Fr., *R. Friesii* Godr. & Gr., *R. obtusifol.* Wallr. lärar enl. F. Aresch. och fl. utan gräns öfvergå i  $\alpha$ , som är *R. silvestris* Wallr.

- 7 *R. acutus* L. rotbladen aflånga; de nedre stjelkl. hjertlika, de öfre lancettlika, alla krusigt våtiga; blomkrans. n. bladlösa; kalkbl. bredt triangelformiga med hjertlik bas, tätt och kort hvasstandade, alla grynbarande. 2 7. Fig. F.A.l.c.f.2.

Stränd. r. (Sk. östra delen, t. ex. Cimbrishamn och Esperöd; i sydvest. del. vid Hammarlöf och Skegrie m. fl. st. enl. F. Aresch. Blek. Carlskrona, Kronovarvet och vid Björkholmen: Gossehl.) Förväxlad under namnet *R. pratensis* Koch med former af föreg.;  $\beta$  från hvilken. utom anf. kar., de vid fruktmogn. bortvissnade bladen skilja den. Anses af F. Aresch., som fullständigt utredt denna hos oss allmänt misskända art, för en hybriditet af föreg. och följande. — *R. cristatus* Wallr. — Hit lär ock, enl. F. Aresch. och Lönnroth, den sednares *R. gentilis* höra.

\*\*\*\* Kalkbl. rundadt hjertlika, helbräddade ell. [*R. conspers.*] otydl. småtandade; blomkrans. tattsittande.

a — Kalkbladen grynbarande.

8 *R. crispus* L. örtbladen lancettlika, spetsiga, krusigt vågiga; alla 3 kalkbladen grynbarande, hjertlika helbräddade. 2½ 7. Fig. F.I.D.1334. F.Ar.f.4. H.N.f.7, n:o 55. Fukt. st. a. (Sk.—Ängml. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Kalkbladens gryn stora, vanligen ett större än de öfriga, hvilka stundom 'ej utväxa; örtbl. vid fruktmogn. vissnande. — Anm. *R. propinquus* J. E. Aresch. i Bot.Not.1840,p.22, *F. Aresch.f.3,f.6*, har bredare och vid basen mer intryckta kalkbl., och torde sannolikast vara hybrid af *R. crisp.* och *domest.*

9 *R. conspersus* Hn. rotbladen äggrundt aflånga, med hjertlik bas; stjelkl. hjertlikt äggrunda ell. smalare, alla jemna; blomkrans. bladlösa; kalkbl. bredt hjertlika, något spetsade, småtandade, ett enda grynbarande. 2½ 7, 8. Fig. F.Ar.f.3. H.N.f.7, n:o 54; f.9, n:o 58.

\* *platyphyllus* F. Aresch. nedre bladen bredare; kalkbl. längre spetsade, derigenom aflångt hjertlika. Fig. F.Ar.f.7.

Stränd. r. (Sk. Blek. Carlskrona, på Kronovarvet; Gosselm. Smål. Kalmar. — Gefle. Vestml. Vesterås m. fl. st. Ner. Skogaholm. Dalsl. vid Dalbobron nära Venersborg. Hall. Särö, och söd. Boh. Öl. — \* Stockh. och Uppsala.) Stjelken omkr. 2 alnar hög, rödfläckig; bladen vid fruktmogn. qvarsittande friska, kalkbl. grundt, stundom omärkligt tandade. Förmodas af Prof. Andersson, trol. med rätta, vara hybrid af *R. domest.* och *obtusifol.*, till hvilken sednare enl. hans åsigt *R. gentilis* Lönnr. skulle vara en tydlig öfvergångsform.

(*R. acutus.*)

b — Kalkbladen bara (med inga eller otydliga gryn.)

10 *R. domesticus* Hn. örtbladen bredt lancettlika, krusigt vågiga, med eller utan hjertlik bas; kalkbladen rundade hjertlika bara, helbräddade. 2½ 7, 8. —  $\beta$  *latifolius*: större; bladen hjertlika. Fig. F.I.D.2349. Fr.Ar.f.5. H.N.f.7, n:o 55.

Byar, stränd. a. (Sk.—Lpl. — N.) 2 å 3 fot hög. Örtbladen vid fruktmogn. qvarsittande friska; rotbladen n. aflånga, stundom med snedt hjertlik bas. —  $\beta$  har bladen ända in på stjelken nog stora och hjertlika, ehuru mer aflånga än hos följ., hvarmed den blifvit sammanblandad. — *R. longifolius* DC. *R. Hippolapathum* Fr. Nov.ed.2. *R. aquaticus*  $\beta$  Wg.Fl.Lapp.

\*\*\*\*\* Kalkbl. triangulära ell. äggrunda, n. helbräddade; blomkrans. tätt sittande.

a — Kalkbl. bara.

11 *R. Hippolapathum* Fr. örtbladen bredt hjertlika, jemna; blomkransarnes skärmb. äggrundt lancettlika; kalkbl. äggrunda, med två bas, trubbiga. 2½ 7. Fig. Sv.B. 209. F.Ar.f.8. H.N.f.5, n:o 55.

Stränd. (Sk. Köpingsåns stränder vid Högsta Fyla enl. F. Ar. Uppl. Södm. och Vestml. omkr. Mälaren och närmare halvet. Helsl. Hudiksvall och Ströms bruk: Wistr. Ängml. VB. nor. del. Um., Pil. och Torn. Lpm. Jemtl. Lith sn. Dal. Leksand; Grycksbo bruk. VG. Mariestad. Boh. Strömstad; Kongell m. fl. st. vid Göta elf. — N. till Ost-Finnm.) 2—3 alnar hög; rotbladen stora, n. triangelformiga, stundom med blodrött skaf och ryggner; stjelkladen ofta hjertlika med n. rärliniga kanter. Kalkbladen, äfven vid sin högsta mognad, hafva sällan någon märkbar intryckning vid basen, så att de öfver hufvud icke kunna kallas hjertlika. — *R. aquaticus* Lín. Herb. *R. Friesii* J. E. Aresch. Bot. Not.1840.

b — Kalkbl. grynbarande.

12 *R. maximus* Schreb. örtbladen hjertlika spetsiga, platta; kalkblad triangelformigt aflånga, alla grynbarande. 2½ 7. Fig. Sv.B.161. F.I.D.2347. H.N.f.6, n:o 53.

Stränd. (Sk. vid Köpingså. Smål. Kranklösaholm vid Hosmo-ån. ÖG. Linköp., vid Nyqvarn; Åvedaberg enl. Kindb. Södm. Rosenbergs bruk; Ekensberg; Sundsörs tegelbruk; Nyköping: C. Ind. Stockh. vid kanalerna i Hagapark; Djurgårdsviken m. fl. st. Uppl. Skokloster; Ultuna; Norrtelge, på Björnö etc. Vestml. Tortuna, i

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

12

Bocksjön; Kärrbo, i Ångsjön. VG. Göteborg.) 2—3 alnar hög stielk; bladen hjertlikt äggrunda, ofta en fot långa, 4—6 tum breda. Äldre kalkbl. vid basen smålandade. — *R. acutus* Sv.B.

- 13 *R. Hydrolapathum* Huds. alla örtbladen lancettlika, platta; kalkbl. som hos föreg. 24 7. Fig. Fl.D.2348. H.N.f.6, n:o 52.

Stränd. (Sk.—Uppl. och Dal. Verml. vid sjön Hyngen i Bro sn. Dalsl. Nordkärr i Holm sn; Lockerud nära Venersborg. Gottl.? — N. Christiania.) Liknar mycket föreg., undantagande bladen, som äro spetsade åt båda ändar, de nedersta 1—2 fot långa, ljusgröna. — *R. aquaticus* Fr. *R. acutus* Wg.Fl.Su.

†† Tvåbyggare. Bladen pil- ell. spjutlika: *Acetosa* T.

\* De inre kalkbladen mycket större än nöten, hinnaktiga.

- †14 *R. scutatus* L. örtbladen giffformiga ell. spjutlika med äggrunda basflikar; blrna både 1- och 2kånade; de yttre kalkbl. tilltryckta, de inre hjertlika rundade helbräddade. 24 6, 7. Fig. Sturm 74 häft.

Back. r. (Uppsala på Slottsbacken, förvildad; flerstädes enl. Fr.) Bladen något tjocka, blåaktiga.

- 15 *R. Acetosa* L. örtbladen bredt lancettlika—äggrunda, med pil- ell. hjertlik bas; blrna tvåbyggare; de yttre kalkbl. nedböjda, de inre som hos föreg. 24 6, 7. —  $\alpha$  vulgaris: bladen lancettl. med pil-lik bas. —  $\beta$  alpestris: bl. äggrunda med hjertlik bas, nerv. mer upphöjda. Fig. Sv.B.190. Fl.D.2534.  $\beta$  H.N.f.11, n:o 54.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  i fjelltr. Torn. Lpm.—Herjed. — N.)  $\beta$ , som af några ansetts vara den Sydeurop. *R. Arifolius* All., öfvergår i våra fjelltrakter till  $\alpha$ .

- 16 *R. thyrsoides* Desf. örtbladen aflängt lancettlika, med spjutlik bas; blrna i mycket sammansatt, stor och tät samling, tvåbyggare; de yttre kalkbl. som hos föreg., de inre rundadt njurformiga. 24 7, 8. Fig. H.N.f.16, n:o 56.

Äng. r. (VG. Kinnekulle, från Husaby till Martorp, isynnerhet på sedn. stället. Smål. Kalmar; Stenbrohult sn mell. kyrkan och Elmhult; Jönköping enl. G. v. Ced. Gottl. vid Botvede i Sanda sn.) Oftast 2—3 fot hög, mycket gröfre än de öfriga i afd., och från dem utmärkt isynnerhet af den stora och täta blomsamlingen. — *R. subhastatus* Lindgr. *R. Acetosa* var. *thyrsiflora* Fr. *R. thyrsiflorus* H.N.

\*\* De inre kalkbl. knappt större än nöten, och tätt omslutande denna.

- 17 *R. Acetosella* L. örtbl. lancettlika—jemnbreda, meränd. spjutlika af 2, utstående flikar vid basen; blrna tvåbyggare; de yttre kalkbl. tilltryckta, de inre äggrunda, helbräddade. 24 6, 7. Fig. Fl.D.1161.

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. röd till färgen; bladen stundom mycket smala, saknande än den ena, än båda flikarne vid basen.

367. OXYRIA Hill. Fjellsyra.

- 1 *O. digyna* Campd. blad n. endast vid roten, njurlika, hela ell. urnupna. 24 7. Fig. Sv.B.692.

Fjellbäckar. (Lpl.—Herjed. Dal. Särna sn, Fulufjellet. — N.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med tumsbreda blad. — *Rumex* L. *Rheum* Wg. *Oxyria reniformis* Hook.

368. KOENIGIA Lin. Königsört.

- 1 *K. islandica* L. de nedre bladen skiftevisa, n. spadlika trubbiga glatta, de öfre gyttade omkring blrna. 7, 8. Fig. Sv.B.513. Fl.D.418. H.N.f.5, n:o 57.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. Muorateskåbbo, Kåbrek, Ståkkejokk, Stuortoki Wassja: H. Widm., m. fl. st. Pit. Lpm. Kåbrenäiwe. Jemll. Ekorrdörren. — N. Finnm. allm. kring hela Varangerfjorden; Berlevaag, samt Nordkap. Nordl. Salten. Kålahögen vid Jemtska gränsen; Dovre; Gousta; Hardanger; Stuedalen.) En half till 2 tum hög, saftig växt, med ganska små gulaktiga blr; bladen med stipelsidor.

## 4 Serien: INCOMPLETÆ.

### 10 KLASSEN

### BRACTEIFLORÆ.

69 Fam. **ARISTOLOCHIACEÆ** *Juss.* Stånd. fästade vid pistillen. Fruktämne under blomman, 3—6rummigt, med centrala mångfröiga fröfästen.

#### 369. **ARISTOLOCHIA** *Lin.* Hållrot.

†1 *A. Clematitis* *L.* stjelken upprät; bladen hjertlika trubbad; blrna flere i hvarje bladveck, med enläppigt, utdraget äggrundt bräm. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.377. Fl.D.1235. Odl. st., gamla trädg. etc. r. (*Sk.* Helsingborg. För öfr. förvildad här och der upp till mellersta Sv. — *N.* Laurvig: Ax. Bl.) 1—2 fot hög med krypande rotstock.

#### 370. **ASARUM** *Lin.* Hasselört.

1 *A. europæum* *L.* bladen njurlika, trubbiga ell. urnupna; kalkflikarne spetsiga. 2 5. Fig. Sv.B.31. Fl.D.633. H.N.f.11, n:o 55.

Lund. r. (*Vestml.* Sättra brunn: Prof. Hedenius enl. Frist. Fordom i *Sk.* vid Heckeberga och på Romeleklint. Skall äfven vara funnen i *VG.* på Alnsö i Hornborgasjön, samt i *Verm.* vid Ölmeherads prestgård i ett alkärr. — *N.* uppgifven för Tellemarken, men enl. Blytt trol. af misstag.) *Blomman ensam mellan de 2 toppbladen, utanpå mörkgrön, inuti brunröd.*

---

70 Fam. **SANTALACEÆ** *Br.* Kalk med i toppen kantlagda flikar samt lika många på flikarnes bas fästade ståndare. Fruktämne inväxt i kalkens bas, enrumm., enfröigt.

#### 371. **THESIUM** *Lin.* Spindelört.

1 *T. alpinum* *L.* bladen jemnbreda, något rännformiga; blrna i något ensidig klase, fästade inom 2:ne småskärm på det större, jemnbreda skärmbladets skaft, meränd. 4klufna. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.611. Fl.D.suppl.t.10. H.N.f.3, n:o 50.

Back. r. (*Blek.* vid Fuhrs gästg. *Smål.* från Åreda gästg., Lenhofda, Högsby och Oskarshamn upp till Vestervik, Grönhult, Locknevi, S. Wi, Rumskulla, Ekesjö, Olsatorp i Askeryd, Öggestorp och Forssarum: Scheutz. *ÖG.* i Kinds, Ydre och angränsande härader mångenstädes enl. Kindb. *VG.* vid Semsholm i Skölväned sn: J. Hult. och O. v. Zweigh.) *Quartershög, med små, utanpå gröna, inuti hvita blr. — Th. Linophyllum L.Fl.Su.*

---

- 71 Fam. **THYMELEÆ** Juss. Kalk med pip och i knoppen tegellagdaflikar. Stånd. fästade i pipen, dubbelt så många som kalkflikarne. Fruktämne fritt, inom kalken, enrumm., med ett hängande frö.

372. **DAPHNE** Lin. Tibast.

- 1 **D. Mezereum** L. blrna oskaftade, gyttrade 3—5 tillhopa på den ännu bladlösa stamens sidor.  $\frac{1}{2}$  4, 5, r. blr Fig. Sv.B.7. Fl.D.268.

Fukt. skogsäng. (Sk.—Lpl. — N. till Salten.) *Alnshög buske, hvars lancettlika blad framkomma i grenarnes spets först efter de vålluktande blrna; stenfrukterna röda, giftiga.*

- 72 Fam. **ELÆAGNEÆ** Br. Kalk som föreg. fam. med stånd. fästade i mynningen. Främne fritt, slutl. falsk stenfrukt, bildad af den saftiga kalken och den nötliska 1-fröiga frukten.

373. **HIPPÓPHAÆ** Lin. Haftorn, Finnbär.

- 1 **H. rhamnoides** L. bladen jernnbredt lancettlika, under hvitfjälliga.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B. 385. Fl.D.265.

Hafsstr. (VB. Haparanda.—Rosl. — N. Nordl. Stegen enl. Norm.; mell. Salten och Trondhj.) Omkr. 3 alnar hög, tornig buske, med tidiga, små och gulaktiga blr i bladvecken; frukten bärlig, gul.

- 73 Fam. **ULMACEÆ** Ag. Blr 2könade. Främne fritt, med 2 stift, slutl. enrummig, enförig, platt vingfrukt.

374. **ULMUS** Lin. Alm.

- 1 **U. montana** Sm. bladen aflånga—omv. äggrunda, med tvärt sammandragen spets, dubbelsågade, på öfre sidan *sträfvä*; blomskäften n. kortare än kalken; blrna samlade i rundade gyttringar; ståndarne 5—6; frukterna ovala ell. rundade, n. *glatta*, i spetsen *grundt* 2klufna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  *major*: grenarne korkbarkiga; bl. större. —  $\gamma$  *nitida*: bl. glatta och glänsande. Fig. Sv.B.13. Fl.D.632 och 2532. E.B.1887. Reich.t.1332. H.N.f.12, n:o 63.  $\beta$  E.B.2542.

Skogsäng. berg. (Sk.—Helsl. Delsbo, på Gryttjesbergen. Medelp. Borgsjö sn. Ångml. Skuluberget. Jemtl. upp till Frostviken. Dal. Verml. Dalsl. Boh. Öl. nor. del. Götll. [var.  $\gamma$ ]. — N. till Helgeland; Bejeren: Norm.) *Högt träd med brunakt. blr på bar qvist; vid basen sneda blad.* —  $\beta$  *U. major* Sm.

- 2 **U. campestris** Sm. bladen ovala, spetsiga, dubbelsågade, på öfre sidan *föga sträfvä*; blrna n. *oskaftade*, med 4 ståndare, för öfr. som föreg.; frukt. omv. äggrunda ell. cirkelrunda, *glatta*, i spetsen 2klufna *ända ned till fröet*.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *suberosa*: grenarne med korklik, kantig bark. Fig. Fl.D.2531. E.B.1886. Reich.t.1331,  $\beta$  1333.  $\beta$  H.N.f.4, n:o 80.

\* *glabra* Mill. bl. smälare, något tjocka, glatta; frukt. små, n. cirkelrunda med smal urskärning. Fig. H.N.f.8, n:o 57.

Lund. r. (Öl. södra del. Götll. —  $\beta$  Öl. Götll. — \* Öl. Högsums kyrkog. enl. Lessl. Götll. Gothem m. fl. st.) *Träd med smärre frukter och blad än föreg., hvarmed denna art förenades af Lin. under namnet campestris.* —  $\beta$  *U. suberosa* Ehrh.

- 3 **U. effusa** W. bladen som hos föreg., glest småludna; blomskäften *flere gånger längre än kalken*; stånd. 6—8; frukt. omv. äggrunda ell. cirkelrunda, i kanten ludna, *djupt* 2klufna.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Reich.f.1337. H.N.f.4, n:o 81.

Lund. r. (Öl. i vestliga, mellersta delen, såsom vid Borgholms kungsgård, Högsum, Rönnerum, Skogsby m. fl. st.) *Blrna med 3—7 lin. långa skaft.* — *U. ciliata* Ehrh. *U. pedunculata* Lam.



74 Fam. **URTICACEÆ Juss.** Blr skiljckönade, med 1 stift. Frukt enfröig nöt.

375. *Hemulus Lin.* Humle.

1 *H. Lupulus L.* stjelken slingrande; bladen handflikiga, med sågade flikar, på öfre sidan stråfbåriga. 2 7, gulgr. blr. Fig. Sv.B.332. Fl.D.1239.

Bergsrött. stenrös, r. (Sk.—Jeml. Ängml. flerest. enl. Arn. VB. Degerselsby i Råne: H. Widm. Boh. Öl. Gottl. — N. södra del till Ringboe i Gudbrandsd. och till Sellöe i Bergens st.; Sundalsören i Trondhj. st.: Scheutz.)

376. *Urtica Lin.* Nässla.

1 *U. urens L.* bladen motsatta, ovala, fliksågade, med skaft meränd. längre än de parvisa blomgyttringarne; sambyggare. ☉ 6, 7, gulgr. blr. Fig. Sv.B.206. Fl.D.739.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Mindre och mer ljusgrön än följ.

2 *U. dioica L.* bladen motsatta, mer och mindre hjertlika spetsade, grofsågade, med skaft kortare än de klaselika blomgyttr.; tvåbyggare. 2 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.68. Fl.D.746.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Var. med bredare och smalare, ända till äggrundi lancetlika blad, samt finluden, n. utan brännborster: var. *holosericea*, mer sällan glatt: var. *glabra*.

377. *Parietaria Lin.* Blidnässla.

†1 *P. officinalis L.* stjelken n. upprät, föga grenad; bladen utdraget äggrunda, punkterade korthåriga. 2 7, 8, hvitgr. blr. Fig. Fl.D.521. Reich.D.Fl.f.1317. H.N.f.1, n:o 58. Vid vägar och hus, r. (Sk. omkr. Cimbrishamn; Malmö. Ursprungl. förvildad.) Blrna små, gytttrade i bladvecken. — *P. erecta Mert.*

75 Fam. **AMARANTACEÆ Juss.** Kalk hinnaktig färgad [hvit eller röd]. Stånd. utgående från fruktfästet. Frukt enrummig, en-[fler]-fröig fröblåsa, affallande öppnad.

378. *Amarantus Lin.* Amarant.

1 *A. Blitum L.* stjelken med utbredda grenar; bladen äggrunda urnupna; blrna knippevisa i bladvecken, och i stjelkens spets bildande ax; ståndarne 3. ☉ 6—8. Fig. Fl. D.2246. H.N.f.1, n:o 55.

Odl. st. gator etc. r. (Sk. Lund. Smål. vid Smedby i Dörby sn: Ekstr. Stockh. Kungsholmen; Bergianska trädg. m. fl. st. Hall.) Liknar *Chenopod. polyspermum*, som stundom blifvit misstagen för denna; äfven skild från *Chenop.* med föga annat än kalken, hvars blad hafva en bred hvit genomskinlig hinnkant. — *Alberisia Kunth.*

76 Fam. **CHENOPODIACEÆ Juss.** Kalk örtartad, foderlik. Stånd. fästade i kalkens botten. Frukt hinnaktig enfröig fröblåsa, affall. öppnad.

379. *Atriplex Lin.* Gråmålla.

† Kalkbladen \*) rundade och helbräddade, åtskiljda till basen.

†1 *A. hortensis L.* stjelken upprät; bladen något hjertlikt 3angelformiga, bugttandade, på båda sidor af samma färg; kalkbl. rundade med omärklig spets. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Sturm 79 häft.

Odl. st. stränd. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. VG. Hall. som ogräs i plantager och dessas grannskap.) 1—3 fot hög med stora, ofta röda ell. gula blad.

\*) Med kalkblad afses i detta och följ. slägte de, som tillhöra honblrna och omgifva frukten, vid hvars mognad arterna böra undersökas.

†† Kalkbladen rut- ell. 3angelformiga, hopväxta vid basen.

\* Kalkbl. vid mogn. gråhvita, med tillhårdnad bas.

- 2 *A. rosea* L. bladen n. äggrunda bugttandade, under hvitmjöligen; kalkbl. bredt triangelformiga småtandade, med 3 upphöjda nerver på den hvitmjöligen basen. ☉7, 8, gr. blr. Fig. Sv.B.626. H.N.f.4, n:o 77.

Byar, hafsstr. r. (Sk. Lomma, Borreby etc. Smål. Kalmar; Förlösa. ÖG. Grytön m. fl. st. i Gryt sn: Kindh. Södm. Nyköping, v. om staden: C. Ind. Ö. Skogsby i Thorslunda; vid Färjestaden och på ön Norman etc. — N. södra kusten.) *Bladen stundom på båda sidor hvitmjöligen*. — *A. laciniata* Wg.

\*\* Kalkbl. fortfarande gröna, bladartade (icke tillhårdn.).

a — Bladen meränd. med tvär ell. något hjertlik bas.

- 3 *A. calotheca* Fr. örtbladen spjutlikt triangelformiga, fliktandade, enfärgade; kalkbl. 3angelf., upphöjdt nätdrigen, *flikade i syl-lik*a tänder. ☉7, 8. Fig. Sv.B.627. Fl. D.1638. H.N.f.1, n:o 56; f.8, n:o 55.

Hafsstr. etc. r. (Sk. Kullaberg; Malmö; Lomma etc. Blek. Smål. Kalmar slott. Hall. Boh. Öl. — N.) *Här mycket tandade, likasom taggiga kalkblad, hvilka ofta utväxa stora och bladlika, med långa flikar: A. hast. calotheca* Rafn. — *A. hastata* Lin. herb. [genom förväxling]. *A. laciniata* L.Fl.Su. enl. beskrifn.

- 4 *A. hastata* L. örtbladen spjutlikt 3angelformiga, bugttandade ell. helbräddade; kalkbl. rufformiga, i kanten och på ryggen *tandade*. ☉7—9, gr. blr. — *β salina*: upprät, med under hvitmjöligen blad. Fig. Fl.D.1286. H.N.f.8, n:o 54. *β* Sv.B.628. *Utmärktare former, som af några förf. anses som egna arter, dro:*

\* *Babingtonii* Woods. utsperradt grenig, vanl. nedtryckt, med stora breda tjocka och spröda blad. Fig. Fl.D.2712, 13. Lindeb.Nov.Fl.Sc.t.2,f.2. H.N.f.14, n:o 60? *A. crassifolia* Fr. och ed.7.

\* *delloidea* Bab. n. upprät; bladen utdraget äggrunda, spjutlika af 2, horisontalt utstående, ell. bakut rigtade flikar vid basen [hvilka dock stundom saknas]; kalkbl. mycket större än de släta fröen.

\* *microsperma* Kt. n. upprät; bladen som hos föreg. n. helbräddade, med tvärhuggen bas och horiz. flikar; kalkbl. föga större än fröen.

\* *prostrata* Bouch. nedtryckt, vanl. lefverbrun; bladen små, spjutlikt 3angelform. ell. äggrunda, tandade, med 2, rakt utstående flikar vid basen; de öfversta bladen vid fruktgytt. n. jemnbreda, vanl. med spjutlik bas. *A. hast. \* depressa* Ed.9.

Stränd. fukt. st., *β* hafsstr. (Sk.—Helsl. Ångml. Hernösand; Nora etc.: Arn. VB. Haparanda. Vestml. Ner. Verml. Carlstad. Boh. Öl. Goutl. — N. till Ost-Finnm.: Norm. — \* *Bab.* Sk. söd. och vest. kust. Hall. Boh. Väderöarne. — N. söd. del. Finnm. Hammerfest. — \* *delt.* Sk. vest. kust. — Boh. — N. — \* *microsp.* Sk. Malmö; Lomma. Blek. Saltö; Carlshamn. — \* *prostr.* Sk.—Boh. Blek. Smål. Lindö vid Vestervik: Dr Lund. Goutl.) *Var. i hög grad, nedligg. och upprät, med stora och breda bl. till äggr., groftandade och n. helbrädd., små och stora kalkbl. o. s. v. — A. hastata* L. enl. synonym. och växtställen. *A. latifolia* Wg. *A. patula* Sm.

b — Bladen med afrundad ell. afsmaln., aldrig tvär bas.

- 5 *A. patula* L. stielken meränd. upprät; de nedre grenarne korsvisa *utsperrade*; de nedre bladen *äggrundi lancetlika*, med 2, utdragna, något *framåt rigtade flikar* vid basen, de öfre lancetl.—jemnbreda, helbräddade; kalkbl. rufformiga spetsade *helbrädd.* ell. *något tandade*, på ytan släta ell. småtandade. ☉6—9, gr. blr. — *β angustifolia*: nedligg.; alla bladen n. jemnbreda. Fig. Fl.D.1285, *β* 2226. H.N. f.8, n:o 53.

\* *longipes* Dr. kalkbl. vanl. skåfada, ofta med hjertlik bas. Fig. Fl.D.2714.

Odl. st. stränd. a. (Sk.—Ångml. Dal. Verml. Öl. Goutl. — N. till Ost-Finnm. — \* Hafsstr. i Sk. Blek. Boh. Öl. enl. Vestert.) *Stundom af tillfälliga orsaker nedliggande; bladen var. i bredd och tandning, äfvensom kalkbl. i storlek. — A. angustifolia* Sm.

- 6 *A. litoralis* L. stj. och grenar upprätta; bladen jemnbreda; kalkbl. *smalspetsiga*,

*tandade* på ytan och i kanterna. ☉ 6—8, gr. blr. —  $\beta$  *maritima*: bladen bredare, glest och oliktformigt bugttandade. Fig. Fl.D.1287. H.N.f.5, n:o 58, 59.

Hafsstr. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall: C. Ind. Boh. Öl. Götth. — N. till Nærø vid Nordl's söd. gräns: Norm.) Bladen hos  $\alpha$   $\frac{1}{2}$ —2 lin. breda, hos  $\beta$  2—3 $\frac{1}{2}$ ; var. med större och mindre kalkbl. samt stund. nedligg. stielk. —  $\beta$  *A. marina* L. enl. Sm.

### 380. HALIMUS Wallr. Saltmålla.

† *H. pedunculatus* Wallr. bladen omv. äggrunda—aflånga, helbräddade; kalkbl. långt skaftade, omv. hjertlika, med en liten udd i urskärningen. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Fl. D.304. H.N.f.1, n:o 57.

Hafsstr. r. (Sk. vestra kusten från Skanör upp till Kullen; Hven. Hall. Varberg. Boh. Skaftö; Oroust, Henån. Smål. Kalmar vid Törnebacksbros. Öl. Ottenby etc. Götth. Eista, Sproge, Grötlingbo etc.) Vid blomn. vanl. fingerlång, sedan större, med blomgyttr. i toppen och öfre bladvecken; utmärkt af de  $\frac{1}{2}$  tum långa fruktskaften. — *Atriplex* L.

### 381. BLITUM Lin. Rödmålla, Sminkbär.

† Blomkalken vid fruktmogn. uppsvälld saftig, hvarigenom fruktgyttringarne slutl. likna röda bär: egentl. *Blita* L.

†1 *B. capitatum* L. bladen spjutlikt äggrunda, med få och glesa tänder; de flesta blomgyttr. bildande ett bladlöst, afbrutet ax i stielkens topp. ☉ 6, 7, gr. blr. Fig. Sturm 74 häft.

Odl. st. r. (Sk. Lund enl. F. Aresch. Smål. Kronoberg. ÖG. flerst.: Kindb. Södm. Strengnäs; Stafsjö bruk: C. Ind. Stockh. Bondgatan på Söder, och på Djurgårdsslätten. Uppl. Elfkarlöbruk omkr. herregården. Dal. Grycksbo Bruk. Vestml. Vesterås. Ner. Iboholm i Boo sn. — N. Christiania; Langesund.) De mogna blomgyttringarne ej olika smultron; endast de nedre hos denna art i bladvecken.

†2 *B. virgatum* L. stielken bladig ända till toppen; bladen spjut- ell. 3angelformigt äggrunda, oliktformigt och tätt hvasstandade; blomgyttr. i bladvecken. ☉ 6, 7, gr. blr. —  $\beta$  *chenopodioides*: fruktgyttr. saftlösa gröna. Fig. Sturm 74 h.  $\beta$  H.N.f.8, n:o 52.

Odl. st. r. (Sk. Kullaberg. Smål. Håkanstorp i Bredaryd sn; Ahlsborg i Hvena sn enl. Ekstr. ÖG. Motala; Adelsnäs enl. Kindb. Södm. Stockholm. Uppl. Gestr. Vestml. Ner. Örebro. VG. Sköfde. — N. Kongsberg. — Förvildad i och omkr. plantager. —  $\beta$  Uppsala, vid Hammarby. — N. Christiania.) Bladen med bred, tvär bas, mycket tandade; frukt som hos föreg.

†† Fruktgyttr. icke bärlika: *Chenopodia* L.

3 *B. rubrum* Reich. bladen äggrunda trubbiga, djupt trubbtandade, tjocka glänsande; blomgyttringarne i *greniga*, något bladiga ax; alla fröen utom toppblommans i hvarje gyttring stående på kant. ☉ 7—9, gr. ell. r. blr. Fig. Fl.D.1149.

Odl. st., str. (Sk.—Gestr. Helsl. Hudiksvall och Söderhamn: Wistr. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Götth. — N.) Stielkar och blomgyttr. stundom röda; bladen n. fiktandade, mer säll. n. helbräddade, på strand. köttiga.

4 *B. glaucum* Koch: bladen aflånga ell. äggrundt aflånga trubbiga, grundt och bugtigt trubbtandade, under blågrå; blomgyttr. i bladlösa ax; fröen dels horizontala, dels på kant. ☉ 7—9, gr. blr. Fig. Fl.D.1151.

Gator, str. a. (Sk.—Gestr. Helsl. Hudiksvall: Wistr. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Götth. — N.) Stielken vanl. nedligg., mer sällan upprätt.

5 *B. Bonus Henricus* C. A. Mey. bladen spjutlikt 3angelformiga, n. helbräddade; blomgyttr. i långa och täta, upptill bladlösa ax; alla fröen utom toppblirnas kantstående. 2 $\frac{1}{2}$  6—8, gr. blr. Fig. Fl.D.579.

Väg. gård. a. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Götth. — N. till Bergen.)

(*B. virgat.*  $\beta$ .)

## 382. CHENOPODIUM Lin. Målla, Mell.

† Bladen tandade.

\* Fröen glanslösa.

- 1 *C. hybridum* L. bladen något hjertlika spetsade, djupt, men glest groftandade, tunna; blomgyttr. i utsperradt greniga klasar; fröen gropigt punkterade. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. F.I.D.2049.
- Odl. st. (Sk.—Uppl. Dal. Ner. Verml. södra delen. Hall. Öl. Götll. — N. Christiania.) *Bladen stora, n. fiskigt tandade.*
- 2 *C. urbicum* L. bladen 3angelformiga trubbtandade ell. n. hela, något tjocka; blomgyttr. samlade i utdragna uppräta ax dels i stjelkens topp, dels i bladvecken; fröen finprickiga. ☉ 7, 8, gr. blr. —  $\beta$  *intermedium*: bladen mer gröna och glänsande, spetsigt groftandade. Fig. Sv.B.459. F.I.D.1148.  $\beta$  Sturm 75 häft.
- Byar, gat. (Sk.—Gefle. Dal. Ner. Verml. Hall. Öl. Götll. — N. Christiania; Asker; Ringerige. —  $\beta$  Södm. Eskilstuna; flerst. enl. Fr. S.V.Sc.) *Bladen vanl. blåaktiga och glanslösa.*
- 3 *C. murale* L. bladen äggrunda, spetsiga, hvasstandade, yngre glänsande; blomgyttr. i utsperradt greniga klasar; fröen finprickiga. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. F.I.D.2048. H. N.f.15, n:o 59.
- Odl. st. mur. r. (Sk. Ystad—Höganäs. Hall. nor. del. VG. Göteborg. Blek. ÖG. Linköping; Lunna i Appuna; Svénneby i Örtomta m. fl. st. enl. Kindb. Öl. Runsten. Götll. i Wall sn.) *Bladen och de talrika bladländen spetsigare än hos öfr. arter; fröen med hvasare kant. Har enl. Fr. en var. med helbräddade blad: crassifolium.*

\*\* Fröen glänsande.

- 4 *C. album* L. bl. äggrunda trubbtandade, de öfre lancetlika, meränd. helbräddade, glanslösa, oftast under hvitmjöligen; blomgyttr. i greniga ax; fröen n. släta. ☉ 7—9, g. blr. —  $\alpha$  *spicatum*: blomgyttr. i sammansatta täta uppräta hvitmjöligen ax. —  $\beta$  *viride*: mindre hvitmjöligen, ända till rent grön; axen vanl. utböjda. —  $\gamma$  *glomerulosum*: bladen tunna, mera och hvasare tandade; blomgyttr. mycket små och glesa. Fig. Sv.B.411. F.I.D.1150.
- Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. —  $\gamma$  vid Gefle, trol. flerstädes.)  $\alpha$  *C. album* L.  $\beta$  *C. viride* L. Fig. i Sv.B. visar en medelform mellan båda: *C. peganum* Reich. —  $\gamma$  *C. glomerul.* Reich. *C. opulifolium* Drej. Fl. Hafn.

†† Bladen helbräddade.

- 5 *C. polyspermum* L. upprät ell. nedligg., icke kläbbmjöligen; bladen äggrunda glatta och gröna; blomgyttr. i toppen och bladvecken, slutl. utväxande i greniga klasar; ståndarne meränd. 3. ☉ 7, 8, gr. blr. —  $\beta$  *acutifolium*: bladen spetsiga. Fig. F.I.D.1153.  $\beta$  E.B.1481.
- Odl. st. stränd. (Sk.—Gestr. Oslätfors. Helsl. Söderhamn. Medelp. Tuna sn, Vii. Vestml. Ner. Verml. Kohlsäter. Hall. Öl. Götll. — N. söd. del.: Ax. Bl.) *Kalken öppen, icke tillsluten omkr. den stora rödbruna fröblåsan. Hufvudformen har rundadt trubbigt blad.*
- 6 *C. Vulvaria* L. hela växten nedliggande, kläbbmjöligen; bladen rulligt äggrunda; blrna gytttrade i täta ax. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. F.I.D.1152. H.N.f.16, n:o 58.
- Gator etc. r. (Sk. Ystad; Trelleborg; Lund; Landskrona etc. Blek. Carlshamn. Smål. Kalmar. ÖG. vid Roxen. Stockh. Uppsala. Götll. Visby. — N. Mandal etc.) *Mycket stinkande ört; kalken tillsluten omkring fröblåsan. — C. olidum* Curt.

## 383. KOCHIA Roth. Saltört.

- 1 *K. hirsuta* Nolle: stjelken upprät, jemte de jemnbreda halftrinda trubbiga bladen mjukluden; blrna parvisa oskaftade i bladvecken, ludna. ☉ 7. Fig. F.I.D.187. H.N. f.4, n:o 79.
- Hafsstr. r. (Öl. Ottenby schäferiäng, samt något öst. och söd. derom.) *Lik Schoberia marit., men är större; yngre upptill hviluden af långa mjuka hår. Blrna synas på torra ex. gulaktiga. — Salsola* L. Sueda Reich. *Chenopodium* Wg.

384. *SCHOBERIA* C. A. Mey. Saltört.

- 1 *S. maritima* Mey. stjelken nedligg. ell. upprät; bladen jemnbreda ell. syl-lik, half-trinda glatta; blrna gytttrade i bladvecken; stiften 2. ☉ 7, 8, grönakt. blr. Fig. Fl.D. 489. H.N.f.4, n:o 78.

Hafsstr. (Sk.—Boh. Öl. Ottenby etc. *Gottl.* Öja sn, vid Stockviken; Sproge; Rohnehamn; Gothem: G. v. Ced. — *N.* till Nærø: Norm.) *Chenopodium* L.

385. *SALSOLA* Lin. Sodaört.

- 1 *S. Kali* L. stjelken nedligg., meränd. hårig; bladen trinda hvasst sylspetsiga, blrna ensamma i bladvecken; kalkflikarnes bihang slutl. rundade och utstående. ☉ 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.471. Fl.D.818.

Hafsstr. (Sk.—Södml. Ålön och Nottarön. Boh. Öl. *Gottl.* — *N.*) *Vanl. nedtryckt grenig ört, taggig af de hvassuddiga styfva bladen; kalkbihangen utbildas vid frömogningen.*

386. *SALICORNIA* Lin. Glasört.

- 1 *S. herbacea* L. stjelken enkel ell. med motsatta, i toppen kolfbärande grenar; ledstyckena upptill något vidgade och urnupna. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.252. Fl.D.303.

\* *biennis* Afz. tvåårig med nedtill träaktig stjelk, n. jemntjocka ledstycken. Fig. H.N. f.10, n:o 58.

Hafsstr. (Sk.—Boh. Blek. Smål. ÖG. Dagsbergs sn. Södml. Mörkö sn, mell. Skansen och Hörningsholm. VB. Neder-Kalix skärg., på Hvitgrundet. Öl. *Gottl.* — *N.* till Senjen: Norm. — \* Sk. på Hven. Hall. vid Onsalaviken; Varberg på Getteröns östra kust. Boh. Gåsö; Skafstö; Uddevalla. Öl. Långöre Kapell.) *Var. upprät och nedliggande: S. prostrata* Osb. Fl.D.1621; samt med mycket långa och tjocka blomkolfvar: var. *pachystachys* Koch [H.N.f.16, n:o 59], hvilken form enl. *Leffl.* i Boh. tydligt öfvergår i hufvudformen. — \* *S. fruticosa* Retz.

## 11 KLASSEN

### JULIFLORÆ.

- 77 Fam. CUPULIFERÆ Rich. Sambyggare. Honblommans hylle vidväxt det 2—6 rummiga främnet, och sedan quarsitt. såsom s. k. bägarfoder omkring den genom felslagning enrummiga, enfröiga nöten. Fröhvite 0.

#### 387. QUERCUS Lin. Ek.

- 1 Q. *Robur* L. bladen med korta skaft. aflånga, meränd. bugtlikade med rundade skär, glatta; gemensamma fruktskaftet flere gånger längre än bladskriften.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *lanceolata* H. v. Post: bl. utdraget lancettlika, oflikade. Fig. Sv.B.73. Fl.D.1180. Reich. D.Fl.f.1313.

Skog. äng. a. (Sk.—Gestr. Vestml. söd. Dal. Verml. Öl. Gottl. — N. till Nordmör samt Näs på Hedemarken. —  $\beta$  Smål. i en hage på ön Keanäs i Bruddsjön vid Berga i Högsbo sn. Fordom äfven i Blek. på Sternö.) Stort träd, med om hösten affallande blad. Blr och bl. hos begge arterna samtidiga. — Q. *pedunculata* Ehrh.

- 2 Q. *sessiliflora* Salisb. bladen längre skaftade, under vid nerv. småludna, för öfr. som hos föreg.; gemensamma fruktsk. omärkligt ell. kortare än bladskriften.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *intermedia*: bladen under håriga; frukter något längre skaftade. Fig. Reich. f.1309.

Skogsback. (Sk.—ÖG. och VG. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. Løjsta; Sandön enl. G. v. Ced. — N. allmän i de sydl. delarne.) Anses af många förf. icke skiljd från föreg. Bladen skola vissnade quarsitta öfver vintern; skaften 3 gånger längre än hos föreg. Ollonen kortare och flere hopgyttrade. — Q. *Robur* W.  $\beta$  Q. *intermedia*. Don.

#### 388. FAGUS Lin. Bok.

- 1 F. *silvatica* L. bladen äggrunda, föga tandade, glänsande glatta, hårbräddade.  $\frac{1}{2}$  5, Fig. Sv.B.361. Fl.D.1283. H.N.f.1, n:o 59.

Skog. (Sk.—ÖG. Omberg; Börshult i Torpa; Kindb. VG. Boh. Dalsl. vid Vågsäter i N. Ryr sn. Öl. vid Rålla [ett enda träd]. — N. i Grefskaperna; på vestra kusten till 4 mil norr om Bergen; Molde: Dr P. Olsson.) Högstamligt träd med slät bark. Blr och bl. samtidiga.

#### 389. CARPINUS Lin. Annbok.

- 1 C. *Betulus* L. bladen aflångt äggrunda, djupt och hvasst dubbelsågade; frukthängets fjäll 3klufna, mellersta fliken mycket större, aflång.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B.433. Fl.D.1345. Löfskog. (Sk. Hall. söd. om Lagaån: Theor. Blek. Smål. söd. delen. Öl.) Lågväxt träd eller buske; blr på bar qvist.

#### 390. CORYLUS Lin. Hassel.

- 1 C. *Avellana* L. bladen rundade med hjertlik. bas och smal spets, flikigt dubbelsågade;

bågarfodret klocklikt öppet, med sargadt tandade flikar.  $\frac{1}{2}$  3, 4. —  $\beta$  *laciniata* H. v. *Post.*: bl. parflikigt inskurna. Fig. Sv.B.139. Fl.D.1468.  
 Skogsäng. a. (Sk.—nor. Ängml. Själevad sn, vid Billaberget. Dal. söd. del. *Verm.* Boh. Öl. *Gottl.* — N. till Nordl. samt i Gudbrandsdalen. —  $\beta$  ÖG. Regna sn, i prestg's äng bland den vanl. formen.) *Bladen tunna ojemna; blr på bar qvist.*

78 Fam. **SALICINEÆ** Rich. Tvåbyggare. Hänge af tegellagda enkla fjäll, hysande i sin vinkel ett glandel- eller strutlikt hyämnne. Frukt ett enrumm. 2skaligt fröhus, med fröfasten på väggarne och talrika frön med fröfjun, utan hvite.

391. *PÓPULUS* Lin. Poppel, Asp (1).

† Hängfjällen härbräddade.

1 *P. tremula* L. bladen *rundade*, groft trubbtandade, säll. sågade, på båda sidor gröna och glatta [undant.  $\beta$ ], med plattade skaft.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  *villosa*: bladen på båda sidor hvitludna. Fig. Sv.B.103. Fl.D.2184. H.N.f.16, n:o 61 [var.].

Skog. och äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. —  $\beta$  *Verm.* Risäter vid Rådasjön. Sk. Gladsaxgården enl. F. Aresch. — N. Christiania.) *Högt träd med långa grå-ludna hängen på bar qvist. Rotskottens blad hjertlika ludna. Var. i Verm. enl. ex. i L. Borgstr. herb. med små, halftunstora blad: microphylla; samt enl. H.N. vid Uppsala med regelbundet småsågade bl.: var. serrulata Frist. —  $\beta$  P. villosa Lang.*

†2 *P. canescens* Sm. bl. som hos föreg., under grå-ludna; de yngsta i qvistarnes topp, något hjertlika, hela.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. E.B.1619. Fl.D.2183.

Fukt. st. vid byar, herrgård. etc., ursprungl. odlad. (Sk. Lund i Paradislyckan; Svane-holm i Skurup sn, etc. Derifrån odlad i parker här och der upp till Stockh. och Uppsala.) *P. alba L. Fl.Su. och Willd. P. hybrida M.B. Anses af en del förf. såsom hybrid af föreg. och följ.*

†3 *P. alba* L. bl. som hos föreg., under snöhvitt ludna; de yngsta hjertlika, 3—5flikiga.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. E.B.1618. Fl.D.2182. H.N.f.13, n:o 69.

Som föreg. (Sk. Lund; Kronetorp; Krageholm, på bolmen Hamburg; Bäckaskog vid Oppmannasjön etc. Sedan odlad upp till Uppsala.) *P. nivea W. (P. balsamifera.)*

†† Hängfjällen glatta, i kanten smalflikiga.

†4 *P. nigra* L. grenarne *utstående*; bladen deltoidiska med n. tvärhuggen bas, *utdragen* spets, trubbsågade, på båda sidor samt i kanten *glatta* och gröna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. E.B.1910. Reich.f.1275. H.N.f.12, n:o 64.

Plantager. (Sk. Blek. Hall. etc. upp till Uppsala.) *Träd med vidgad krona.*

†5 *P. pyramidalis* Roz. grenarne *upprätta*; bladen *ruiformiga* spetsade, grundt trubbsågade, för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig.

Plant. (Sk.—Medelp.) *Buskformigt, men högt träd med smal krona af de nästan rakt uppväxande grenarne; bladens bas icke så tvärhuggen som hos föreg., utan bildande en trubbig vinkel mot skaftet. — P. dilatata Ait.*

†6 *P. monilifera* Ait. bladen deltoidiska, med något hjertlik bas [mer breda än långa], spetsade, sågade, med trubbiga framåt böjda sågtänder, i kanten *finludna*.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig.

Plant. (Sk.—Gefle.) *Har slutl. quarterslånga glesa hängen af stora fröhus.*

†7 *P. balsamifera* L. bladen *ågrunda* spetsade trubbigt *finsågade*, *glatta*, under bleka nätdriga; knopparne mycket *balsamkådiga*; hängfjällens flikar med några långa hår  $\frac{1}{2}$  5. Fig.

Plant. (Sk.—Medelp. och Verm.) *Träd, stund. buske, med knoppar och yngre blad kläbbiga och starkt, n. Rhabarberlikt lukande, af en seg, balsamisk kåda. Sprider sig mycket genom krypande rotskott.*

392. *SALIX* Lin. Pil, Vide, Sälg.

† Träd eller högre buskväxter med enfärgadt ljusgula hängfjäll; 2 honingsglandler [hos *S. undul.* blott 1] i hvarje blomma: *Amerina* Fr.

\* Hängfjällen snart affallande. Vanligen träd.

1 *S. pentandra* L. bladen med glandler på skaften, aflånga—omv. äggrunda smalspetsiga, fint och tätt sågade, glatta; ståndarne 4 eller flere \*); fröhusen slutt. kort skaftade glatta, med kort stift \*\*). § 5, 6. Fig. Lin. Fl. L. t. 8, f. 7. Sv. B. 325. Fl. D. 943. Ands. Sal. Lapp. f. 1; Mon. Sal. i K. V. A. Hanl. 1867, t. 2, f. 24. H. N. f. 9, n:o 60; f. 11, n:o 59. Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Porsanger: Norm.) Vanl. 3—5 alnar hög buske stundom temligen högt träd, med glänsande, bredare ell. smalare blad. *S. cuspidata* Schultz [H. N. f. 15, n:o 61], med glandler på bladskafven och flere ståndare såsom föreg., men med smala blad och halft hjertlika stipl. såsom följ., af hvilka två arter den anses hybrid, har enl. Ands. och Thed. funnits i Stockholmstrakten.

2 *S. fragilis* L. bladen lancetlika, vanl. snedspetsade, sågade, glatta, under isgrå; hängena slaka; stånd. 2; fröh. som hos föreg. § 5. Fig. Sv. B. 373. Fl. D. 2484. Ands. Mon. t. 3, f. 28. H. N. f. 1, n:o 60; f. 9, n:o 61.

Vid stränder etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. Verml. och Dalsl. i Venerstrakten. Öl. Götth. — N. till Trondhj.) Träd med vid basen utsperrade grenar och qvistar, sköra i vecken, hvarföre de lätt blåsa af och, då de falla i vattnet, bortföras och slå rot, vid stränderna. Stipl. på höstqvistarne halft hjertlika. Honträdet mycket sällsynt i öfre delen af riket. Var. stundom med qvistarnes bark gulglänsande och deras nedre blad trubbnade: var. *decipiens* [H. N. f. 9].

† 3 *S. viridis* Fr. bladen smalt lancetlika, likformigt spetsade, tätt småsågade, glatta; hängena upprätta; stånd. 2; fröh. som hos föreg. § 5. Fig. Fl. D. 2486. Ands. Mon. t. 3, f. 29. H. N. f. 1, n:o 61.

Stränd. och vid vägar, r. (Sk. Smål. Jönköping; Kalmar etc. ÖG. nära Hofgården: Kindb. Södm. Thuringe sn, Nyquarns bruk; Nyköping, vid Harg: C. Ind. Stockh. Verml. i söd. och särd. vest. delen. VG. Nygård i Venersb. trakten. Dalsl. Frendefors sn enl. Leff. Boh. — N. Christiansands st.; Christiania; Tellemarken; Hadeland.) Bladen mer uldragna, grenarne upprättare än hos föreg.; de sednare icke bräckliga i vecken. Enl. Wimmer och Ands. hybrid af föreg. och följ.; honträdet mest likt den förra, honträdet den sednare arten. — *S. alba* γ Wg. Fl. Su. ed. 2.

† 4 *S. alba* L. bladen lancetlika smalspetsade finsågade, på undre sidan silkeshåriga; häng. upprätta; stånd. 2; fröh. glatta, med ganska korta skaft, n. intet stift. § 5. Fig. Sv. B. 523. Fl. D. 2552. Ands. Mon. t. 3, f. 30. H. N. f. 1, n:o 62.

Stränd. och vid väg. (Sk.—Mälaren. Gefte vid Kastet. Hall. Öl. Götth. Klinte sn. Urspr. förvildad. — N. Vid Leerelven i Skydsmoe sn. Flerestades planterad.) Mindre träd; liknande *S. fragilis*, men har mer upprätta och vidjelika grenar, som dock hafva nästan samma skörhet; yngre bladen på båda sidor silfverhåriga; stipl. smala lancetlika. Var. med glatta blad.

\*\* Hängfjällen quarsittande. Buskar ell. låga träd.

5 *S. triandra* L. bladen aflånga—lancetlika, spetsiga, sågade glatta, under mer ell. mindre isgrå; stånd. 3; fröhusen äggrunda skaftade glatta, med omärkligt stift. § 5, 6. Fig. Fl. D. 2558. Ands. Sal. Lapp. f. 2; Mon. t. 2, f. 17. H. N. f. 3, n:o 51.

Stränder, r. (VB. Neder-Torneå. Ängml. mell. Sollefteå och Bota; Styrnäs sn; Mjellån i Viksjö sn: Arn. Medelp. vid Sättna-ån och Indalselven. Gestr. Persbacka vid Avaån; Ofvansjö prestg. vid ån. Uppl. vid Elfkärlaby, nedom gästgg. ÖG. Omberg. Dal. Tuna sn, vid elfven. Verml. Klarelfven, i söd. Sv. stundom odlad. — N. Christiania; Porsgrund; Glommen mell. Kongsvinger och Elverum. Gudbrandsdal. Gulealen. Ringebo etc.) Träd eller trädlik buske; bladen 2—3 tum långa, stund.

\*) Då ståndarnes antal ej uppgifves, äro de alltid 2.

\*\*) Stifftet kallas kort, då det är kortare än märkena, långt eller utdraget, då det är längre än dessa.



tumsbreda, med kort spets. *♂*hängen talrika, 2—3 tum långa, smala och slaka, med gula fjäll. Stipl. halft hjertlika. — *S. amygdalina* L. och ed.9.

- +6 *S. undulata* Ehrh. bladen jemnbredt lancettlika, tätt finsågade, glänsande glatta, under blekare; stånd. 3; fröh. äggrundt kägelformiga skaftade småludna eller glatta, med utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Fl.D.2550. Ands.Mont.2.f.19. H.N.f.3, n:o 55.  
Odl. st. stränd. r. (Sk. Blek. Stockh. i Hagaparken och vid Roslagstull. Södm. Eskilstuna; Nygvarns bruk. Uppl. Uppsala, vid Fyrisån. Öl. södra delen.) *Buske eller lågt träd; bladen ofta vågiga i kanten, 3—4 tum långa, sällan öfver  $\frac{1}{2}$  tum breda, långt och smalt spetsade, med  $\frac{1}{2}$  tum långa skaft, hängen ludna. Stipl. som hos föreg. Enl. Ands. och flere förf. hybrid af föreg. och *S. viminalis*.*

†† Högre buskar ell. träd, med åtm. i spetsen bruna, liksom svedda, hängfjäll; 1 honingsglandel i hvarje blomma.

\* Fröh. oskaftade, med omärkligt stift: *Helix* Fr.

- +7 *S. purpurea* L. bladen lancettlikt jemnbreda, mot spetsen något bredare och sågade, glatta; ståndarne hopväxta till 1; fröh. äggformiga hviluludna, med klubblikt märke n. utan stift.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *Helix*: hängen större, kort skaftade; stiftet tydligare. Fig. Sv.B.589. Fl.D.2554. H.N.f.2, n:o 56;  $\beta$  57.  
Stränd. etc. (Sk. Blek. Lyckeby och Vämö. Smål. Markaryds gästgg. Hall. I de öfre prov. odl. upp till Gestr. —  $\beta$  Sk.) *Buske med vidjelika grenar, vanl. röd bark,  $\beta$  med gulgrön; hängen oskaftade, tumslånga smala, ofta motsatta. ♂ knappt funnen i Sv. —  $\beta$  anses af en del förf. såsom egen art. — Anm. *S. rubra* Huds. Fr. H.N.f.10, n:o 60, skild med blott till hälften hopväxta ståndare, utdraget stift och jemförelsevis bredare blad, lærer enl. Andr. vara hybrid af *S. purp.* och *viminalis*, samt aldrig hos oss förekomma annat än odlad.*

\*\* Fröh. oskaftade, ell. med skaft kortare än honingsglandeln; utdraget stift: *Vetrix* Fr. [med undantag af *S. glauca*].

a — Äldre bladen fullkomligt glatta.

- 8 *S. daphnoides* Vill. qvistarnes bark daggbå; bladen bredt lancettlika, sågade; hängen mycket ludna; fröh. glatta, med utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Reich.f.1253. H. N.f.6, n:o 54.

Stränd. r. (Dal. Mora kyrka, på sandängarne norr om elfven. Verml. på Klarellvens stränder från Dalby sn till utloppet. — N. mell. Ourdal och Land till Randsfjorden; mell. Ringeböe och Biri vid Lougen; Ringerige; Glommen upp till Elverum.) *Träd ell. hög buske med oftast glatta och daggbå grenar, 2 tum långa, tjocka hängen; bladen likna *S. triandra*; stipler halft hjertlika. — *S. acutifolia* Horn. — Anm. *S. acutifolia* W. Fr. H.N.f.8, n:o 58, med mer jemnbreda blad, och lancettl. stipler, lär enl. Ands. hos oss icke förvildas, ehuru den ofta planteras i söd. och mellersta Sv.*

b — Äldre bladen håriga ell. ludna; yngre grenar långa. raka och vidjelika.

- +9 *S. viminalis* L. bladen lancettlikt jemnbreda, med helbräddade tillbakaböjda kanter, under silfverglänsande silkeshåriga; hängfjällens hår kortare än fröh.; fröh. n. oskaftade, hviluludna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Sv.B.211. Fl.D.2485. H.N.f.1, n:o 64.

Stränd. och odl. st. (Sk.—Boh. Verml. vid Klarellven. Öl.; samt flerstädes ända upp till Gestr. odlad och förvildad.) *Hög buske, stundom träd, med uppräta, n. enkla, vidjelika grenar, långa konhängen; fullväxta bladen omkring  $\frac{1}{2}$  tum breda, 4 tum långa.*

- +10 *S. mollissima* Ehrh. bladen n. jemnbredt lancettlika, i kanten glest glandelnaggade, under omärkligt silkeshåriga, något gråglänsande; hängfj. hår nående öfver märkena; fröh. som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Fl.D.2604. H.N.f.1, n:o 65.

Odl. st. r. (Sk. Lund, på Kanikmarken m. fl. st. Odlad.) *Bladen  $\frac{1}{2}$  tum breda, 4 t. långa, under knappt märkligt håriga, grågröna. Enl. Ands. hybrid af föreg. och *S. triandra*.*

- 11 *S. Smithiana* Willd. bladen utdraget lancettlika, n. helbräddade, under tätt silkes-

*ludna*, slutl. *hvitulliga*; hängs: s hår icke nående öfver märkena; fröh. kort skaft, hvitludna.  $\S$  4, 5. Fig. Fl.D.2551. H.N.f.1, n:o 63; f.2, n:o 59.

Od. st. (Sk. Hall. Ursprungl. odlad. Hanväxten funnen endast i Sk. vid Kullen i Brunby sn. — N. vid Laurvig.) *Trädstam eller högre buskväxt; bladen lika föreg., men dubbelt bredare, med en omärklig tand här och der i kanten. Enl. And. hybrid af S. vimin. och caprea. — S. lanceolata Fr. S. mollissima Sm.*

c — Blad som i föreg. afd.; grenar korta och knöliga. [Nordliga arter].

- 12 *S. lanata* L. bladen ovala eller *rundade*, under *ojemna* af det upphöjda ådernätet; hängena *oskaftade*, ell. med korta *småbladiga* skaft; fröh. n. *oskaftade*, *glatta*.  $\S$  6. —  $\beta$  *chrysantha*: hängen ludna af långa guldfärgade hår. —  $\gamma$  *glandulosa*: bladen föga håriga, glandelsågade. —  $\delta$  *subhastata*\*): bl. ovala glatta; stipl. långspetsade. Fig. L.Fl.L.7 och 8, f.x. Ands.Sal.Lapp.f.3.  $\beta$  Fl.D.1057. H.N.f.8, n:o 59.  $\gamma$  Wg.Fl. L.1,26,f.1.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. —  $\gamma$  N. Finnm.) 2—4 fot hög buske med tjocka och breda blad, hvilka variera från mycket ulliga till nära glatta, under något gro-piga mellan ådernätet. Hängen i grenarnes topp, tjocka och grå- eller gul-håriga. —  $\beta$  *S. chrysantha* Vahl. —  $\delta$  *S. Hartmanniana* Ands.

- 13 *S. glauca* L. bladen lancettlika—bredt ovala *trubbiga*, meränd. helbräddade. med *platt kant*, *slätta* meränd. mjukludna; hängena med *bladiga* skaft; fröh. meränd. *oskaftade*, *ulliga*, med föga utdraget stift.  $\S$  5, 6. —  $\beta$  *angustifolia*: bladen smalt lancettlika, helbräddade, ludna. —  $\gamma$  *appendiculata*: bladen ludna, helbräddade, med åggrunda stipler. —  $\delta$  *pallida*: bladen helbräddade glatta, under isgrå. —  $\epsilon$  *subnigricans*: bladen anflånga eller lancettl. småågade, vid torkning lätt svartnande. Fig. L.Fl.L.7,f.5. Ands.Sal.Lapp.f.21. Fl.D.1058. H.N.f.3, n:o 52.  $\gamma$  Fl.D.1056.

Fjellv. (Lpl.—Dal. Verm. bergslagen, vid skansen på Persherget. VB. Piteå sn: Dr Håkanson. Ångml. — N.) Omkring 2 alnar hög buske, med på båda sidor hvit-ludna, sällan glatta blad. Stiftet kortare än hos alla andra arter i afd., knappt längre än märket. —  $\beta$  *S. glauca*  $\gamma$  *Lapponum* Wg. c: *nivalis* Fr. —  $\gamma$  *S. appendiculata* Vahl. —  $\epsilon$  *S. Amandæ* Ands

- 14 *S. Lapponum* L. bladen ovala—lancettlika spetsade, merändels *helbräddade*, särdeles under *glänsande* hvitludna, kanterna något *tillbakavikna*; fröh. *oskaftade*, *hvit-ulliga*.  $\S$  5, 6. Fig. L.Fl.L.8,f.1. Wg.Fl.L.16,f.4. Ands.Sal.Lapp.f.4. H.N.f.7, n:o 58; f.12, n:o 67, var.

Kärr. (Lpl.—Uppl. Vestml. Ner. Göthlunda: O. G. Blomb.; Dylta. Verm. Sällsynt nedom Helsl. — N. Finnm. ned till Oudalen och Skien.) 2—4 alnars hög buske, med slutl. 3 tum långa, tjocka blad, varierande mellan utdraget lancettlik och åggrund form; omväxla åfven till ludenhelen, ända till nära glatta. En medelform till *S. nigricans*, ell. enl. Ands. troligen hybridet, är *S. Ångströmi-ana* Ands., funnen i Lycksele, med hängen af Lapp., blad af *nigric.* En annan form, ansedd af Ands. som hybrid af Lapp. och *myrsinites*, är *S. phæophylla* Ands. från Finnm. Lyngen. — *S. limosa* Wg. En bredbladig form är *S. n:o 362.L.Fl.L.* *S. arenaria* L. Herb. *S. lapp. v. leucophylla* Fr.

- 15 *S. Læstadiana* Hn. bladen anflängt lancettlika—omv. åggrunda, merändels spetsiga, omärkligt och *glest naggade*, under tätt gråludna, utan glans; fröh. kort skaftade gråludna.  $\S$  6. —  $\beta$  *obtusifolia*: bladen utdraget omv. åggrunda, de nedre trubbiga. Fig. Ands.Sal.Lapp.f.5. H.N.f.5, n:o 64.

Fjelltr. r. (Torn.—Pit. Lpm. Ångml. Säbrå sn, ännu kvarlevande: Arn. — N. Salt-dalen.) Högre buskväxt, stundom med trädstam; hängen långa, n. fingertjocka af mycket tätt sittande fröhur; bladen vanl. spetsiga, på båda sidor tätt fjnludna, särdeles under gråflåda, men utan glans. — *S. canescens* Fr. *S. caprea*  $\beta$  L.Fl. Su. ed.2 enl. O. Rudbecks fig. [Bot.Not.1841,p.65], ehuru ex. i Linnés Herb. sårare är en form af *S. glauca*. Anses af Ands. i Mon.Sal. innefatta 3 former, alla blott hybrida, näml. den småbladigaste af *Lapponum* och *caprea*, de bred-

\*) Detta slähtes arter variera i hög grad och synas hybridisera, så att mellanformer uppkomma; en del af dessa förmodade hybriditeter upptagas här tillsvidare såsom varieteter, men betecknas med tillägget *sub*; *subhastata* en medelform till *S. hastata* o. s. v.

bladiga dels af Lapp. och cinerea, dels af Lapp. och aurita; i D.C. Prodr. upp-  
tages S. Læst. sednare af samme förf. såsom egen art, med antydning om dess möj-  
ligen hybrida ursprung.

(S. caprea γ.)

\*\*\* Fröh. långt ell. tydligt \*) skäftade, med intet eller kort stift:  
Caprea Fr.

a — Bladen, isynnerhet yngre, skrynkligt ojemna och nätådriga,  
oftast gråldna.

- 16 S. caprea L. grenarne glatta; bladen aflånga—omv. åggrunda spetsade, slutl. vågigt  
groftandade ell. sågade, ofvan glatta, under gråldna eller håriga; häng. meränd.  
oskaftade och bladlösa \*\*); fröh. ulliga, med kort stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  alpestris:  
buske; bladen bredt lancettlika, föga ludna. —  $\gamma$  lanatafolia Björnstr. bl. starkt  
hvitulliga; småqvistarne gråldna; fruktskaft och stift något längre. Fig. Sv.B.98.  
Fl.D.2603. Ands.Sal.Lapp.f.6; Mon.Sal.t.5.f.45.

Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  Pil. Lpm. på Käksa. Lul. Lpm. Njuonjes vid  
Tarrejokk.) Temligen högt träd (Sälg), stundom hög buske, med korta och tjocka  
hängen, stiplerna liknande en gåsot. Var. i högsta grad; en smalbladig form:  
var. angustifolia Ands. Mon. har hos oss varit tagen för S. grandifolia Ser.,  
hvilken art dock enl. Ands. icke förekommer i Skand.

- 17 S. cinerea L. de vidjelika [yngsta] grenarne gråldna; bladen lancettlika eller af-  
långa—n. omv. åggrunda, vid eller ofvan midten bredast, kortspetsade sågade, ofvan  
småldna, under meränd. gråldna; häng. oskaftade, n. bladlösa; fröh. ulliga, med  
omärkl. stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Fl.D.2601. Ands.Sal.Lapp.f.7; Mont.4.f.44. H.N.f.7, n:o 59.

Stränd. diken etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Buske med föga grenade, vidjelika upprätta  
smågrenar, breda, n. njurlika stipler; vågigt sågandade, under n. hvita blad.  
Var. med tunna, på båda sidor gröna blad: c. virgulosula Fr.

- 18 S. aurita L. grenarne vanl. glatta; bladen omv. åggrunda, med kort, tillbakaböjd  
spets, n. helbräddade, slutl. glest småtandade, ofvan småldna, under meränd. grå-  
ldna, ojemna; häng. n. oskaftade och bladlösa; fröh. meränd. ludna, med omärkl.  
stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  sublivida: fröhus och blad slutl. glatta. — \* rugulosa Ands.  
hängskaft bladiga; fröh. glatt, med kort stift. Fig. Sv.B.565? Fl.D.2600. Ands.Sal.  
Lapp.f.8; Mont.4.f.43. H.N.f.7, n:o 60. \* Ands.Sal.Lapp.f.20; Mont.5.f.55.

Våta skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. — \* Pil. Lpm. Galgkärn. Herjed. vid  
Kolsätt.) 3—6 alnars buske med brun, n. glatt bark på qvistarne; breda, ofta  
njurlika stipler. Bladen variera i hög grad. — S. cinerea Sv.B.  $\beta$  är troligen  
hybrid af aurita och vagans  $\beta$  livida. \* S. palud. Ed.4, S. aurita \* palud. Ed.9,  
S. finmarkica Fr. anses af Ands., som visat dessa namns olämplighet, vara hybrid  
af aurita och myrtilloides.

- × S. ambigua Ehrh. bladen omv. åggrunda—lancettlika, merändels naggsågade, ofvanpå  
intryckt nerviga, under upphöjdt nätådriga och småldna; häng. med kort, småblad-  
digt skaft; fröh. silkesludna, med mycket kort stift.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Fl.D.2670. Ands.  
Mon.Sal.t.6.f.65. H.N.f.2, n:o 58; f.11, n:o 63, 64.

Skogsäng. (Sk.—Södm. Strengnäs; Nyköping: C. Ind. Stockh. nära Sund-  
sta. Uppl. Uppsala, Lassby-backar. Rosl. mellan Frötuna k:a och Stegelbacken.  
Ner. Viby. Boh. VG. Göteborg.) Lik S. repens till storlek och växtsätt; bladen  
lika S. aurita, men mindre; till formen olika: lancettlika, ovala o. s. v.; något  
styfva, med utböjd, litet sammanviknen spets. Utan tvifvel hybrid af de båda  
nyssnämnda, med hvilka den alltid växer blandad. — S. spathulata W., den  
form som mest liknar aurita; S. plicata Fr. Nov. den, som mest liknar repens.  
S. incubacea Fr. Mant. 1 och S.V.Sc.

- 19 S. vagans Ands. bladen bredt lancettlika—oval, helbräddade eller glest naggsågade,  
merändels glatta, under isgrå; häng. med kort, småbladigt skaft; fröh. långt skaf-  
tade, vanl. silkesludna, med ganska kort stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  livida: fotsböj buske

\*) Skäftet åt m. dubbelt längre än honingsglandeln.

\*\*) Med undantag af några få fjäll-lika blad, som vanl. understöjda hängat eller kläda  
det hos äldre hängen stund. förlängda skäftet.

med tunna, n. genomskinliga blad. —  $\gamma$  *cinerascens*: bladen större, gles småludna slutl. ofvanpå glatta. Fig. Fl.D.suppl.t.38. Wg.Fl.L.t.16 ( $\beta$ ). Ands.Sal.Lapp.f.14; Mon.t.5.f.51. H.N.f.5, n:o 63.

Fukt. skogsäng. (Lpl.—Sk.—N.— $\beta$  Lpl.—Helsl.—N. Romerige etc.— $\gamma$  Torn. Lpm.—N. nordligaste del: Ands.) 1—3 fot hög buske, med korta, mer och mindre bladiga hängskäft, stundom n. inga. Svartnar icke vid torkning. Var. mycket sällan med de mogna fröhusen glatta: var. *glabrata* Ed.9, *S. hirtula* Ands.? —  $\alpha$  *S. bicolor* Fr. *S. depressa* Ed.9, ett namn, som enl. hvad Ands. ådagalagt trol. icke af Linné varit gifvet åt närv. art. —  $\beta$  *S. livida* Wg. *S. arbusc.*  $\gamma$  L.Fl.Su. ed.2. —  $\gamma$  *S. sphacelata* Somf.

b — Bladen alltid släta, vanl. smala och helbräddade, yngre silkes-håriga.

20 *S. repens* L. bladen aflånga—ovala, merändels helbräddade, med vanl. tillbakaböjda kanter, yngre under silkeshåriga, slutl. isgrå [hos  $\beta$  på båda sidor hvitludna]; fröh. långt skaftade, aflånga, med kort stift.  $\gamma$  4, 5. —  $\beta$  *argentea*: yngre bladen på båda sidor, de äldre på undre sidan, tjockt silkesludna. Fig. Fl.D.2489. Reich.f.1239. H.N.f.6, n:o 55.  $\beta$  Fl.D.2605.

\* *rosmarinifolia* L. bl. smalare, jemnbredt lancettlika, med platta kanter, under silkes-håriga; hängen korta; fröh. hvitludna. Fig. Fl.D.2556. Ands.Mon.Sal.t.6.f.64. H.N.f.6, n:o 56.

Kärr, sand. str. a. (Sk.—VB. Piteå. Herjed. — N. till Nordl. — \* Sk. Andrarum; Roslätt. Hall. Götll. — N.?) Låg buske, vanl. endast uppskjutande grenarne ur marken; bladen ofta äldre alldeles glatta, varierande från n. jemnbredt till oval form; ståndarknapparne gula; fröh. dels ludna, dels glatta: var. *glabrata*. En medelform till *S. myrtilloides*, ell. enl. Ands. hybriditet, är *S. aurora* Læst., Ands. Mon.Sal.t.5.f.57, med små. under blågröna bl., som yngre äro silkeshåriga. —  $\beta$  *S. arenaria* L. Öl. och Götll. Resa. — Apm.: Förf. anser *S. incubacea* L.Fl.Su. ed.2 vara en form häraf med under silkeshåriga blad [parallela hår]; *S. fusca* L. [Reich.f.1240] en form med bredare, under mer håriga blad, hvilket Rudbecks af L. citerade fig. samt Linnés Herb. äfven bestyrka.

× *S. Friesiana* Ands. bladen jemnbredt lancettlika, med helbräddade tillbakaböjda kanter, under glänsande silkeshåriga; fröh. tydligt skaftade, silkesludna, utan märkligt stift.  $\gamma$  4. Fig. Fl.D.2557. Ands.Mon.Sal.t.6.f.66. H.N.f.2, n:o 60, samt f.5, n:o 65 [en bredbladig form].

Sand. hafsstr. r. (Sk. i Köpingeåns gamla strömfåra vid dess fordnä utlopp. Hall. Halmstad; vid Storåns utlopp.) Bladen likna dem hos *S. viminalis*, men busken är låg, med nedligg. stam och med föga mer än  $\frac{1}{2}$  l. långa hängen vid blomningen. Enl. Ands. m. fl. tydligt hybrid af föreg. och *viminalis*. — *S. angustifolia* Ed.9, icke Wulf. enl. Ands.

c — Bladen alltid släta och glatta; hängskäften långa bladiga.

21 *S. myrtilloides* L. hela växten glatt; bladen elliptiskt ovala eller aflånga med intryckt bas, trubbiga helbräddade, under blåaktiga.  $\gamma$  6. Fig. Sv.B.646. Fl.D.suppl.t.111. Wg.Fl.L.t.18.f.1. Ands.Sal.Lapp.f.19; Mon.t.5.f.53. H.N.f.8, n:o 63.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. VB. nordliga del, teml. allm. Ångml. Medelp. Hafverö, Kölsildret. Helsl. Ljusdal sn, nedom Backa: Wistr. Smål. i nor. ändan af Spetsmossen vid Hof nära Vexjö; Kalm. län, i S. Wi. — N. Ost-Finnm. mell. Elvenes och Jarfjord i Sydvaranger; samt Vest-Finnm. vid Sjuosjåvre och Maalselven: Norm. Nordl. i Soelvigmarken.) *Alnshög*, till alla delar glatt buske, endast hängfjällen hafva vanligtvis några långa hår i spetsen. Stipler finnas enl. Ands. endast på luxurierande skott och äro mycket små, åggrunda.

\*\*\*\* Fröh. långt ell. tydligt skaftade, med utdraget ell. långt stift.

a — Bladen glatta ell. håriga, lätt svartnande vid torkning; stift mycket långt.

22 *S. versifolia* Wg. bladen lancettlikt aflånga snedspetsade helbräddade, under småludna med upphöjda ådror och något nedböjd kant; hängskäften bladiga; fröh. långt skaftade, meränd. finhåriga, med utdraget stift.  $\gamma$  6. Fig. Sv.B.511. Wg.Fl.L.t.18, f.2. Ands.Sal.Lapp.f.17; Mon.Sal.t.5.f.58. H.N.f.3, n:o 56; f.15, n:o 62.

- \* *myrtoides* Fr. fröh. och blad glatta. Fig. Ands.Sal.Lapp.f.18, a, b.  
Fjellv. (Lpl.—Jemll. VB. i Nilsmyran vid Björkfors; vid Selets bruk. — N. — \* Lpl. VB. Piteå. — N. Finnm. Kistrand.) Låg buske med 1—1½ tum långa, särdeles under småludna blad. Anses af Ands. vara hybrid af föreg. och *S. Lapponum*, samt alldeles icke beslägtad med följ. — *S. fusca* Fr. Mant. 1.
- 23 *S. nigricans* Sm. bladen aflånga—ägggrunda eller omv. ägggrunda, vågbräddadt sågade, under upphöjdt ådriga och slutl. isgrå; fröh. med skaft af hängesfjällens längd, äggformiga, smalspetsiga, med utdraget stift. ½ 5. — *α protea* Ands. hängen oskaftade, knappt bladiga. — *β borealis* Fr. hängeskäften utdragna, bladiga. Fig. Wg.Fl.L.t.17. Fl.D.2553. Ands.Sal.Lapp.f.15; Mon.t.7,f.69. H.N.f.5, n:o 62; f.8, n:o 62. *β* H.N.f.7, n:o 63.
- \* *latifolia* Forb. bladen tjocka, tät gråludna; fröh. smala, med kort stift.  
Skogsäng. a., *β* fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. — \* Lpl. och ÖG. enl. Ands.) Buske, som var. i högsta grad, med glatta, småhåriga och ulliga fröh., glatta och ludna blad o. s. v., stipl. halft hjertlika. Ar alla äldre författares *S. phyticifolia*, sedan Linnés tid. En medelform mell. *β* och *S. myrsiniles*, ell. enl. Ands. en hybriditet, är enl. nämnde förf. *S. punctata* Wg. ell. *S. Wahlbergii* Ands., som äfven innefattar *S. myrsiniloides* Fr. H.N.f.16, n:o 62. — \* latif. åter anses af Ands. för hybrid af *S. nigric.* och *caprea*.
- b — Bladen glatta, under isgrå, icke svartnande.
- 24 *S. phyticifolia* L. bladen lancettlika—ovala naggsågade; fröh. tydligt skafade, finhåriga, stundom glatta, med något utdraget stift. ½ 5, 6. — *β majalis*: mer hög-växt; bladen ovala; hängen n. bladlösa; fröh. glatta. — *γ subglauca*: fröhus med kortare skaft; bladen undertill ludna, omärkl. sågade, slutligen gulnande. Fig. Wg.Fl.L.t.16,f.2. Ands.Sal.Lapp.f.9; Mon.t.7,f.70. H.N.f.3, n:o 54; f.8, n:o 61 [*S. tenuifolia* Fr.]. *γ* Ands.Sal.Lapp.f.10.
- Stränd. etc. i fjelltr. (Lpl. och VB.—Ångml. Dal. Verml. Tåsängarne i nor. Finn-skoga sn. Vestml. Odensvi sn; Skinnskatteberg. Södm. flerest. — N. — *β* och *γ* i fjelltr.) 3—8 fot hög buske. Stipler finnas sällan; de, som förf. sett, dro mycket små, aflånga tandade. — *S. bicolor* Koch. Syn. — *β S. majalis* Wg.Fl.L. — *γ S. Wichura* Ands.Mon.Sal. trol. hybrid af *phyticifol.* och *glauca*.
- × *S. laurina* Sm. bladen bredt aflånga eller ovala, glest naggsågade; fröh. n. lancettlika, silkesludna, med skaft n. af fjellens, stift af märkenas längd. ½ 4, 5. Fig. Ands. Mon.Sal.t.8,f.87. H.N.f.8, n:o 60.
- Skogsäng. och odl. st. r. (Smål. Femsjö; Boarp i Barkeryd; Scheutz. Torn. Lpm. VB. Öfver-Kalix (?); R. Fr. — N. enl. Fr.) Bladen endast yngre något småludna, sedan glatta; stipl. halft hjertlika; hängena ett par tum långa, slutl. med ½ tum långa småbladiga skaft. Förklarar af Ands. på det säkraste vara hybrid af föreg. och *S. caprea*. — *Salix silesiaca* Fr. i Mant. 1 anses i S.V.Sc. vara en skuggform, med tunnare blad och längre skafade fröhus, af *S. laurina*; Ands.f.13.
- 25 *S. hastata* L. bladen ovala—aflånga, naggsågade, under nåldådriga; fröh. aflånga glatta, med skaft och stift som hos föreg. ½ 5, 6. — *β subreticulata*: bl. tunna rundade, under gulådriga. Fig. Sv.B.719. Fl.D.1238. Wg.Fl.L.t.16,f.5. Ands.Sal. Lapp.f.11; Mon.t.9,f.102. H.N.f.3, n:o 53. —
- Fjelltr. etc. (Lpl.—Dal. Verml. bergsl. vid Hornkullen i Kroppa sn. Uppl. Film sn, nära Filmjön. Sällsynt i södra prov. ända till Skåne. — N. — *β* Lpl.) 1—3 al-nar hög buske, med blad, som variera från lancettlik till äggrund och hjertlik form; fasta till byggnaden, med platta kanter; stipl. vanl. mycket stora, halft hjertlika, men hos smärre fjellformer små, ofta felande; hängeskäften bladiga. Formen hyperborea Ed.9 skall enl. Ands. vara hell och hållet tillfällig. — *S. malifolia* Sm. [den stora bredbladiga formen]. *β S. reticuloides* Ands. i DC. Prodr.? (*S. arbuscula*.)

+++ Mycket lågväxta (sällan mer än fotsböga) arter, med hängfjäll som afd. ++; honingsglandl. vanl. 2: *Chamelix* Fr. [äfven innefatt. *S. glauca*].

\* Bladen vanl. ovala—aflånga.

- 26 *S. myrsiniles* L. bladen ovala ell. omv. ägggrunda, sågade, nåldådriga, yngre lång-Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).

- håriga, slutl. *glatta*, på båda sidor gröna och glänsande; fröh. n. *oskaftade ludna*, med *utdraget* stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *procumbens*: 3—6 tum hög, nedtryckt; stiftet kortare. —  $\gamma$  *subglauca*: hängen i toppen och på sidorna; fröh. tjockt hvitludna. Fig. L.Fl.L.t.7,f.6. Ands.Sal.Lapp.f.22. Fl.D.1054. H.N.f.5, n:o 66.
- Fjelltrakt. (Lpl.—Herjed. — N. —  $\gamma$  Pit. Lpm. Löfmokk: Ands. — N. Finnm. Tsatsa enl. ex. af Læst.) 3—12 tum, stundom alnshög buske, med tumslånga tjocka uppråla hängen, mest i quistarnes topp, bladen tjocka. —  $\beta$  S. myrsin. var. *subpolaris* Læst. mskr., S. Sommerfelli Ands.?, med hvilket sednare namn betecknas en hybrid af S. myrsin. och herbacea. —  $\gamma$  S. Normani Ands., trol. hybrid af myrs. och glauca.
- 27 S. *arbuscula* L. bladen aflånga—lancettlika, på midten vidgade och naggsågade, *glatta* glänsande, under grågröna; fröh. kort skaftade, småludna, med något utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *vacciniifolia*: bl. elliptiska; fröh. slutl. n. *glatta*. Fig. L.Fl.L.t.8,f.m. Ands.Sal.Lapp.f.23; Mont.t.7,f.80. H.N.f.5, n:o 61.
- Fjelltrakt. r. (Torn.—Pit. Lpm. Jemil. Herjed. på alla fjell i nordvestra delen; Hamra och Skarffjellet. — N. Alten; Dovre; Gudbrandsdalen, Jøndalen etc.) Vanl. 6—12 tum hög, men stundom äfven ett par fot; bladen  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa, ofvan glänsande, under opaca; hängen smala, med kort, bladigt skaft. — S. *arbusc.*  $\beta$  L. Fl.Sw. ed.2.
- 28 S. *ovata* Ser. bladen *ovala* spetsiga, glest och grundt sågnaggade, slutl. *glatta*, med kanterna och nerverna under finludna; fröh. n. *oskaftade*, äggformiga ludna, med *utdraget* stift.  $\frac{1}{2}$  6. Fig. Ser. Monogr.t.2. Fl.D.suppl.t.39. Ands.Sal.Lapp.f.24. H. N.f.7, n:o 64.
- Fjellv. r. (Lul. Lpm. mellan Rissajokk och Alkajaure; Wallibacken och Snjarak m. fl. st. i Qvikkjokk enl. Ands. Pit. Lpm. Tjiddjakk ymn., samt på Rebnits; Gaissats; Sartajokk; H. Widm. Um. Lpm. Stuaaware. Jemil. Sylfjellen; Åreskutan; Drommen. Herjed. Helags- och Rutfjellen. — N. Finnm. — Dovre ofvan Fogstuen; Joradalen. Filefjeld, vid foten af Suletind. Voss på Graasiden.) 5—10 tum hög buske, med omkr. tumslånga blad; hängena korta. Förmodas af Ands. vara hybrid af ant. S. *arbusc.* ell. S. *phyllicif.* med S. *glauca* (Bot.Not.1867,p.114), ell. ock af S. *glauca* och herbacea (D.C.Prodr.XVI,p.288). — S. *pyrenaica* \* norveg. Fr.; den Pyrenaiska arten är dock mycket afvikande. S. *alpestris* Ands.
- 29 S. *sarmentacea* Fr. bladen åggrundt aflånga—elliptiska, merändels trubbiga, naggsågade, parallelt ådriga, yngre håriga; fröh. skaftade, aflångt äggformiga, slutl. *glatta*, med *utdraget* stift.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Ands.Sal.Lapp.f.20.
- Fjellv. r. (Lul. Lpm. samt Jemil. Åreskutan enl. Ands. Herjed. på södra Skarffjellet och Sänfjellet. — N. Finnm. och Nordl. enl. Ands. Hecksjell, på gränsen mell. Åseralds och Fjotland sockn. vid Knabereisen; nära Ouse i Oustads sn m. fl. st. i Christianssands st.) 3—6 tum hög. Bladen variera mellan bredt aflånga trubbiga och omv. åggrunda, mer spetsiga. Stånd. ofta 3-ne, icke sällan med samväxta strängar. Anses af Ands. för en hybrid af S. *hastata* och herbacea. — S. *retusa* \* sarm. Fr. Mant. 1.
- \*\* Bladen oftast rundade, ända till cirkelrunda.
- 30 S. *polaris* Wg. bladen runda eller ovata, helbräddade *glatta* och släta; fröh. n. *oskaftade* åggrunda ulliga eller mjukhåriga, med *utdraget* stift.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B. 493. Fl.D.suppl.110. Ands.Sal.Lapp.f.28. H.N.f.5, n:o 68.
- Fjellv. r. (Vid Tornio träsk. Lul. Lpm. Qvikkjokk, Kerkeware m. fl. st. Pit. Lpm. Tjiddjakk. Jemil. på Snasahögen etc. Herjed. Helags- och Skarffj. — N. Finnm. Hammerfest etc. — Dovre, Finnhöe, Jerkind, Knuds- och Blåhöe, Joradalen etc.) Endast quistarnes blad- och blombärande toppar visa sig öfver marken; bladen mer släta, icke så skrynkligt ådriga som hos följ., till hvilken dock öfvergångar icke saknas; äro stundom urnupna. — S. *herbacea* A: Lilj. ed.2.
- 31 S. *herbacea* L. bladen vanl. n. cirkelrunda trubbiga eller urnupna, *glatta* naggade nätdriga ojemna; fröh. n. *oskaftade*, meränd. *glatta*, med kort stift.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. L.Fl.L.t.7,f.3, 4. Sv.B.367. Ands.Sal.Lapp.f.27. Fl.D.117. H.N.f.5, n:o 67; f.8, n:o 64, var.
- Fjellv., a. (Lpl.—Dal. Idre; Städjan och Löfåsen. — N.) Växtsättet som hos föreg.,

hvilken jemte *S. herbacea* troligen äro de minsta buskväxter i världen. *Var. betydligt större: var. fruticosa Fr. H.N.f.8, samt med småludna frö.*

- 32 *S. reticulata L.* bladen n. *cirkelrunda* eller bredt elliptiska, med hela, *tillbakaböjda* kanter, under hvithåriga eller isgrå, gropiga mellan de *upphöjda* nättlika ådrorna; fröb. *oskaftade, ludna, n. utan stift.* 56. Fig. L.F.L.t.7.f.1, 2. Sv.B.529. F.L.D. 212. Ands.Sal.Lapp.f.25. H.N.f.9, n:o 62.

Fjellv. (*Lpl.—Herjed. — N.*) Växtsätt nästan som hos de föreg. med grof stam och grenar, till större delen under jorden, bladen tjocka, vanl. 1 tum i längd och bredd, stundom något aflånga, alltid rundadt trubbiga.  
(*S. repens.*)

- 79 Fam. BETULINEÆ Rich. Sambyggare. ♂hängen af sammansatta sköldlika fjäll, hysande 1—3 blr; ♀hängenas fjäll utan hylle. Fruktämne 2rummigt, med ett frö i hvarje rum; frukten vingfrukt ell. nöt. Fröhvite 0.

### 393. BÉTULA Lin. Björk.

† Träd med verklig kronstam; frukthängen slaka, hängande: *B. alba L.*

- 1 *B. verrucosa Ehrh.* årsskotten *glatta* och *kådprickiga*; bladen *deltoidiska* ell. *rutformiga*, med smal utdragen spets, dubbelsågade, alltid *glatta*; frukthängena aflängt cylindriska, med fjällens sidoflikar rigtade *horizontalt ut-* ell. *något nedåt från mellanfiken*; frögömmet *smalare* och *mycket kortare* än den omgifvande vingkanten. 55. — *β lobata*: bladen flikade i äggrunda spetsiga flikar. — *γ dalecarlica L.* bladen n. *pardelade* i lancettlika långspetsade flikar. — *δ arbuscula*: med nagelstora rundtrubbiga blad, mer breda än långa. Fig. Sv.B.80. F.L.D.2549. H.N.f.2, n:o 53. 6 H.N.f.9, n:o 59. *γ* Vet.Ac.H.1786,t.6. H.N.f.15, n:o 60. *δ* H.N.f.11, n:o 57.

Skog. och torra äng. a. (*Sk.—VB. Kengis. Pit. Lpm.* Glommersliden. *Jemll. Storsjötrakten. Dal. — N. — β Verm.* Christinehamn m. fl. st. *Stockh.* Varnö på Ornön. — *γ Dal.* Lilla Ornäs. *Smål.* Adelöfs sn, vid Södrholm; Björknäs i Vireda sn: Scheutz. *ÖG.* Sillsjö i Skedevi sn; Orrnäs i Ödesbög enl. Kindb. Ex. från Smål. och *ÖG.* visa en medelform till *β. — δ Uppl.* Frötuna nära Uppsala. *ÖG.* Skedevi sn, nära Tisenhult; Skackebo i Nykil enl. Kindb.) *Högt träd med hvit, men oftare sprickfull och ojemn, öfverhud ell. näfver, ofta med smala hängande qvistar: var. pendula. Rotleiningarnes blad glatta. — B. odorata Reich. γ B. hybrida Blom i V.Ac.H. B. verrucosa γ laciniata Ed.9.*

- 2 *B. odorata Bechst.* årsskotten *småludna, icke kådprickiga*; bladen *äggrunda—något hjertlika* spetsiga olikformigt sågade, yngre *småludna*; hängen som föreg. med fjällens sidoflikar rigtade *mer framåt*; frög. *smalare* men *föga kortare* än sin vingkant. 55. — *β oxyacanthifolia*: bladen trubbigt flikade. — *γ microphylla*: bladen nagelstora, bredt äggrunda spetsiga. Fig. F.L.D.1467. H.N.f.2, n:o 54.

\* *pubescens Ehrh.* stor buske med brun bark, småludna qvistar, bladskäft och hängen. Skog. och fukt. st. a. (*Lpl.—Sk. — N. — β Smål.* Näsbyholm. *Verm.* vid Liljendal i bergslagen. — *γ Um. Lpm.* *Dal.* vid Dalfors bruk; Fahlun. *Ner.* vid Kils Ramsbytt. *VG.* Göteborg. *Helsl.* Loos sn: Wistr. *Stockh.* i Färentuna. *Södm.* Blacksta prestg.: C. Ind. *Smål.* Stenbrohult; Korsberga sn.) *Träd som föreg. med slätare, hvil näfver, mer äggrunda och mindre spetsade blad; ofta med hängande qvistar [v. pendula]. Telningsarnes blad ludna. γ vanl. lika stort träd, med blad icke större än hos föreg:s δ. \* pub. torde vara en egen art, som förekommer på fuktig mark. — B. alba Lin. Herb. och F.L.D., med hvilket namn Linné omfattar både denna och föreg. art. — B. glutinosa Wallr. och Fr. B. carpatia W.*

†† Buskar, stund. små träd, med uppräta frukthängen; frög. icke bredare än sina vingkanter.

- 3 *B. intermedia Thom.* bladen rundadt äggr.—ovala, stund. med hjertlik bas, olikformigt dubbelsågade, med spetsade sågtänder, nättådriga; frukthäng. ovalt aflånga, kort skaftade; fjällens flikar n. likformiga, smala, rigtade framåt, nerviga; frög. af vingkantens längd och bredd. 56. Fig. Reich.f.1283. Lindeb.Nov.t.2.f.1.

**Fjellstr.** (Torn. Lpm. och VB.—*Herjed. Verm.* i bergslagen och Elfdalen flerst. *Upl. Dannemora*; *Simtuna* enl. Leffl. *Smål. Gråne* i Järeda och Ramseryd i Forssarum enl. Scheutz. — *N. Finnm.*—Goustafjell i söd. N.) *Omkring 3 alnar hög buske, stund. ett litet träd. Frög. ofta smalare än vingkanterna. Mycket närbesläktad med en del former af föreg. och ännu mer med följ. art, från hvilken den hufvudsakl. skiljes med de tydligare spetsiga och mer hvass-sågade bladen, samt de bredare vingkant. Bägge hafva hångeff:s flikar häriga. — B. subalpina och B. oycowiensis Larsson.*

+++ Buskar, oftast lågväxta, med häng. som föreg. afd.; frög. vanl. mycket bredare än sina vingkanter.

4 *B. alpestris* Fr. bladen *runda*—*n. vigglika* trubbiga, enkelt, men något olikformigt sågade, under jemna; frukthäng. som hos föreg.; fjällens flikar *n. likformiga* äggrunda, *rigtade* framåt; frög. vanl. *bredare* än vingkanten. ♀ 6. Fig. Fl.D.suppl.t.37. H. N.f.5, n:o 60.

**Fjelldalar, r.** (*Lpl.*—*Herjed.* — *N. Ost-Finnm.* Tana och Varanger. Vest-Finnm. Magerö: Th. Fr. Trondhj. Goustafjell; Dovre; Tind; Johnsknuden etc.) 2—3 alnar hög buske, med blad som *B. nana*, ehuru ofta en tum breda. Symes jemte föreg. vara hybrid af *B. odorata* och *nana*, med hvilka den sparsamt förekommer blandad. — *B. humilis* Ed.4. *B. alba* d. Wg. *B. pallescens* Larsson enl. Lindeb.

5 *B. humilis* Schrank. bladen *äggrunda*, olikformigt sågade, under nätdruga bleka; frukthäng. som hos föreg.; fjällens flikar *n. likformiga* jembreda, sidoflikarne utstående; frög. dubb. *bredare* än vingkanten. ♀ 5, 6. Fig. Reich.f.1279, 1281. H.N. f.13, n:o 72.

**Skog. r.** (*Smål. Forssarum* sn, vid torpet Arken på Ramseryds egor: Kyrkoh. Montelin enl. Scheutz.) *Älshög buske med upprät växt, utmärkt af sina smala, n. glatta, men kådprickiga grenar, tunna äggrunda, vid basen ofta hjertlika blad, samt hängfjällens mycket och likformigt utdragna flikar. — B. fruticosa Willd. och Reich.D.Fl. [f.1279].*

6 *B. nana* L. bladen *n. cirkelrunda* naggsågade, med trubbiga tänder, under upphöjdt nätdruga; frukthäng. som hos föreg.; fjällens flikar *n. likformiga*, *jembredt* aflånga, något utstående; frög. dubb. *ell. flere gånger* bredare än vingkanterna. ♀ 5, 6. Fig. Sv.B.379. Fl.D.91. H.N.f.2, n:o 55.

**Kärr, i synnerhet i fjelltr.** (*Lpl.*—*Gestr. Vestml. Ner. och Verm.* ÖG. Brunneby sn, nära Husbyfjöl; Sund sn, Bulsjö skog m. fl. st.: Kindb. *Smål. flerst.*, sydligast i Skatelöfs sn, Taglamyren, vid Aramo i Urshult och i Ljuder enl. Scheutz. VG. Dalsl. Boh. Hall. — *N.*) 1—2½ fot hög buske, med *håriga* grenar, *nagelstora* blad; hängfjällens flikar *lika stora*, *tvärhuggna* och *föga utstående*.

### 394. ALNUS Gärttn. Al.

1 *A. glutinosa* W. bladen *rundade* eller omvänt äggrunda, i spetsen *tvärtrubbiga* eller *intryckta*, dubbelsågade [hos β djupt flikade], på undre sidan i nerv-vinklarne ludna, för öfrigt *glatta* och *något klubbiga*, på båda sidor *gröna*. ♀ 3, 4. — β *laciniata*: bladen parklufvet flikiga. Fig. Sv.B.128. Fl.D.2301. β Thunb. Diss. de Betula t.1.f.1.

**Skog.** vid vatt. a. (*Sk.*—*Ängml. Dal.* och *Verm.* Boh. Öl. Gottl. på Fårö; Sandö: Eis. och Sturzb. — *N. till Romsdalen.* — β *Verm.* Löfnäs bruk vid sjön Yngen.) *Högt träd, stundom buske, med tidiga blr på bar qvist: Al. — Betula Alnus L. β B. laciniata Thunb.*

2 *A. pubescens* Tausch: bl. *rundade* ell. *bredt ovala*, *trubbiga* eller med *omärklig* spets, grundt dubbelsågade, med *låta* och *hvassa* sågtänder, under *håriga* eller *småladna*, på båda sidor *gröna*. ♀ 4, 5. Fig. Reich.f.1292. H.N.f.11, n:o 58.

**Fukt. st. helst i fjelltr.** (*Lpl.*—*Geste.* — *N. Ost-Finnm.*—Dovre; Lomsfjellen.) *Lågt träd eller buske, skild från föregående med bladen, som äro smärre och finsågade, mindre trubbiga, samt under håriga; från följande med vida trubbigare och mer finsågade blad. — A. barbata Mey. och Fries. A. hybrida Al.Br.*

3 *A. incana* W. bl. *äggrunda* ell. *ovala*, *spetsiga*, *groft* dubbelsågade, under *gråhudna*. ♀ 3, 4. — β *pinnatifida*: bladen *n. pardelade*. Fig. Sv.B.595. Fl.D.2302. β V.Ac. H.1790,t.5 Reich.f.1294. H.N.f.13, n:o 70.



**Fukt. st. (Lpl.—Uppl. Tierp** en vid Fors. *Rosl. Börstel. Vestml. Ner. Verm. ÖG. Smål. norra delen* ned till Vrånghult i Nottebäck af Kronob. län; Vestervik. *Sk. s.ö. del. vid säteriet Smedstorp: Eug. Hemb. VG. på och omkring Billingen; Kinna sn; Mösseberg, Grimstorp m. fl. st. Boh. Hall. Vessige. — N. — β Verm. Lesjöfors.) Lågt träd eller buske, med hvitare och slätare bark än *A. glut.*, icke kläbbiga blad: *Alder. Blr på bar qvist, tidigare än både Alen och Hasseln. Var. med mer och mindre tätt ludna blad. — Betula Alnus β incana L. β B. pinnata Lundm. i Vet.Ac.H.**

**80 Fam. MYRICÆ Rich.** Hängen af enkla fjäll. Fukt i kottelik samling, af små enfröiga stenfrukter, omslutta af de köttigt uppsvållda blomfjällen.

### 395. MYRICA Lin. Pors.

**1 M. Gale L.** bladen viggformigt lancettlika, i spetsen sågade; häng. med kortspetsade fjäll. ‡ 4, 5. Fig. Sv.B.76. Fl.D.327. H.N.f.16, n:o 60.

**Kärr, stränd. (Sk.—VB. och Jemil. Boh. Öl. Gottl. — N. till söd. Finn. Ibbestad: Norm.) Alnshög buske med blr på bar qvist i bruna upprätta hängen. Är någongång sambyggare.**

**81 Fam. CONIFERÆ Juss.** Hanblommor i hängen eller gyttningar utan hylle. Honblommor gyttade eller ensamma, slutligen bildande en fjällig eller bärlik kotte, innehållande ensamma nakna frön. — Barrträd.

### 396. PINUS Lin. Furu, Tall (1), Gran (2), Lärkträd (4).

† Barren qvarsittande öfver vintern.

\* Barren parvisa.

**1 P. silvestris L.** barren styfva, plattadt halfrinda, af kottens längd; denne äggformigt kägellik, skaftad, böjd nedåt; fjällen mot spetsen tjocka. ‡ 5. Fig. Sv.B.91.

**Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Börselv i Porsanger: Norm.; och Ost-Finn. Syd-Väranger.) Högt träd, med de yngre grenarne i krans. — En i Lpl. förekommande form, med kortare och bredare barr i åtskilda kransar, är var. lapponica Fr. S.V.Sc.**

\*\* Barren enstaka: *Abies Don.*

**2 P. Abies L.** barren spridda, något åkantiga, uddspetsiga, enfärgadt gröna; kotten cylindriskt kägellik, hängande; fjällen platta, rutformiga med tvär, ojemt tandad spets. ‡ 5. — *β viminalis:* med långa, n. enkla, nedhängande qvistar. n. trinda af de rundt om spridda långa barren. Fig. Sv.B.217. Fl.D.193. *β V.Ac.H.1777.t.8, 9.*

**Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Bejersfjord i Nordl. — β sällsynt, något enda träd här och der från Smål. och Hall. upp till Helsl. och Jemil. — N. Gudbrandsdalen, i Ringeboe: Scheutz.) Högt träd med på undre sidan plattade qvistar. Hos β hänga de yttre qvistarne rakt ned som pisksnärtar, mera trinda af de öfverallt spridda, tumslånga barren. — *Abies excelsa DC. och Fries. Pinus Picea Parl. i DC. Prodr.***

**\*3 P. obovata Ant.** barren som hos föreg.; kotten äggformigt aflång, upprät; fjällen omv. ågrunda, med helbräddad spets. ‡ 7? Fig. Ledeb. Ic. pl. rar. Fl.Ross.t.499.

**Skog. r. (N. Ost-Finn. »i en tallskog på vest. sidan af sjön Colmejavre, vid pass ‡ mil n.n.v. från Svanvik«.) Högt träd, till utseende likt föreg., men af spensligare växt. — P. orientalis Ed.9.**

†† Barren årligen affallande: *Larix Endl.*

**†4 P. Larix L.** barren i början knippevisa, platta; kotten äggformig, upprät; fjällen med platt, trubbig spets. ‡ 5. Fig. Reich.D.Fl.1137.

**Parker. (Sk.—Medelp. Planterad och någon gång sjelfsådd.) Högt träd, med knippen**

af talrika barr, hvilka knippen till en del stull. utväxa i qvistar med enstaka, strödda och långa barr. — *Larix europæa* DC.

397. JUNIPERUS Lin. En.

- 1 *J. communis* L. barren 3:ne i krans, jemnbredt syl-lik spetsiga, längre än frukterna.  $\frac{1}{2}$  6. —  $\beta$  *nana*: bladen bredare, n. lancettlika, inböjda ell. tegellagda, föga längre än frukten. Fig. Sv.B.289. Fl.D.1119;  $\beta$  2739.

Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  i fjellen.) Buske, sällan lågt träd med blå bärlika torra frukter: Enbär.  $\beta$  har bladen mer aflånga och tilltryckta, mycket olik  $\alpha$ , i hvilken den dock i fjellarne tydligen öfvergår: *J. nana* Willd. *J. comm. v. alpina* Gaud.

398. TAXUS Lin. Idgran.

- 1 *T. baccata* L. qvistarne platta af de 2sidigt fästade jemnbreda platta barren; blrna oskaftade, i bladvecken; hanhänget klotrundt.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B.265. Fl.D.1240.  
Skog. r. (Sk.—Södml. Utön m. fl. öar; Mörkö sn; Trosa. Uppl. Vätö sn, på Skabbholmen vid Blidö; Hollnäs och Vesslands sockn.; Elfskarleby. Gestr. nära Grinduga och Kubbo. Ner. Verml. Dalsl. VG. Boh. Hall. Öt. Götll. — N. Christiania; Porsgrund; Mandal; Bergen etc.) Af en mindre Grans höjd, ehuru mer buskaktig; får dock sällan hinna denna storlek. Har röda bärlika frukter.

## 12 KLASSEN

# NUDIFLORÆ.

82 Fam. **CALLITRICHINEÆ** Link. Stånd 1. Stift 2. Frukttämne 4knöligt, 4rummigt, slutl. 4, enfröiga smånötter.

399. **CALLITRICHE** Lin. Lonke.

† De öfversta bladen vanl. bredare, n. rosetlikkt ordnade; blrna inom 2 hvita inböjda skärmblad: *C. verna* L.

1 *C. stagnalis* Scop. alla bladen, äfven de nedre, *spadlika* med utdragen, smal skaftlik bas, elliptiskt rundad 3- eller *flernervig* skifva; skärmbl. *svagt* krökta; frukten med *vingade* kanter och *quarsittande*, *nedböjda* stift af fruktens längd. ☉ 6—9. Fig. Fl.D.129 och 1741. Lönnr. i Bot. Not. 1867, f.a. Reich.f.1184—1186. H.N.f.15, n:o 63.

\* *platycarpa* Kütz. dubbelt mindre, bladen omv. äggrunda, de nedersta grenbladen n. jemnbreda. Fig. Reich.f.1187—1199.

Vatten. (Sk. *Blek*. Lyckeby, Ramdala. *Smål.* mest i vest. delen. — *Uppl. Vestml.* Ner. mell. och söd. del. *VG.* Hunneberg, vid Karten; Sandhems sn enl. G. v. Ced.; Göteborg. *Boh.* Inland, midtför Svanesund; Foss sn, nära Munkedal: Lem. *Hall. Gottl.*) *Större än de följ. stundom ej olik Peplis; bladskifvan ett par lin. lång och n. lika bred; stånd. 2 lin. långa.*

2 *C. verna* Kütz. bl. aflångt *spadlika* med smal bas, *ell. jemnbreda*, de förre 3-, de sednare *1nerviga*; skärmbl. *som hos föreg.*; frukten med *föga* vingade kanter, *upprätta*, försvinnande stift af fruktens längd ell. kortare. ☉ 5—9. Fig. Lönnr.f.b. Reich.f.1179—83.

Vatten. (Sk.—Lpl.? — N. Nordl. och Finnm. mångenst.: Norm.) *Utbredningen i Sv. osäker, emedan följ. art och denna varit sammanblandade. Bladen variera, trol. hos alla arter i afd., efter vattnets djup och beskaffenhet från spadlika till aflånga och jemnbreda; stj. i vatten flytande, på uttorkade ställen krypande.*

3 *C. polymorpha* Lönnr. bladen som hos föreg.; skärmbl. *starkare* krökta, quarsittande ovissnade; frukt. med *trubbiga*, fullkomligt ovingade kanter och *quarsittande*, *upprätta*, slutl. *utsperrade* stift *flere* gånger längre än frukten. ☉ 5—9. Fig. Lönnr.f.c. Vatt. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Är troligen, såsom Lönnr. uppgifvit, mycket allmänare än föreg. (i Ner. förekomma bägge), högst varierande i storlek och växtsätt. Förmodades i föreg. ed. vara identisk med den der uppförda C. verna var. intermedia, hvaraf äldre ex. i förf:s herb. noga öfverensstämd med beskrifn. på polymorpha. Stiftens varaktighet synes hos bägge formerna något föränderlig.*

4 *C. hamulata* Kütz. bladen som hos föreg.; skärmbl. *halfcirkelformigt* krökta, *korsande* hvarandra, vid fruktmogn. vissnade; frukten med *hvasa*, *föga* vingade kanter, *quarsittande*, *utsperrade*, slutl. *rakt* *nedböjda* stift. ☉ 7, 8? Fig. Lönnr.f.d. Reich.f.1200—1220. H.N.f.15, n:o 64.

Vatten. (Sk. Kullaberg, i Vikenaryds mosse; Gladsaxhallar enl. F. Aresch. *Blek* Vämö: J. Ankarcr.; Djupadal enl. G. v. Ced. *Uppl. Tibble* och Åland snr: G. v. Ced

*Vestml.* Vesterås; Köping. *VG.* Tidan i Sandhem sn enl. G. v. Ced. *Boh.* Klöfverön; Uddevalla, i Risån. *Hall.* Nissaån. *Gottl.* Väskinde sn: G. v. Ced.) *C. tenuifolia* *Fr. Nov.* *C. autumnalis* *Kütz.*

†† Alla bladen likformiga, jemnbreda; blrna utan skärblad.

- 5 *C. autumnalis* *L.* alla bladen åtskiljda jemnbreda tvärhuggna eller urnupna, ennerviga; frukten med tunna vinglika kanter, och stift som hos föreg. ☉ 7, 8. *Fig.* *Fl.D.* 2120. *Lönnr.f.e.* *H.N.f.4*, n:o 83.

*Vatten.* (Sk.—söd. *Lpm.* — *N.* till Ost-Finnm.: *Norm.*) *Växer upprät och grenad ända nedifrån, alltid under vattnet, likväl sättande långt ned på grenarne rikligt med frukter, dubbelt större än hos någon af de föreg. Ståndarknapp. n. utan sträng.* — *C. virens* *Goldb.*

- 83 Fam. **CERATOPHYLLEÆ** *DC.* Ståndarknapp. 12—16, 2rummiga, utan strängar, inom ett mångbladigt svepe. Stift 1. Frukttämne enfröigt, slutl. nöt. Fröhvite 0.

400. **CERATOPHYLLUM** *Lin.* Hornserf.

- 1 *C. demersum* *L.* bladen kransvisa, klynnedelade i styfva trådlika, glest tandade fikar; nötterna elliptiska sprötspetsade och vid basen taggiga, för öfr. släta. 2 7, 8. *Fig.* *Fl.D.* 2000. *H.N.f.9*, n:o 63.

*Vattenpölar*, grunda sjöar, damm. (Sk.—*Uppl.* *Helsl.* Hudiksvall. *Medelp.* Ångm. Bjerträ sn, Strinnefjärden. *Ner.* *Dalsl.* — *N.* Borrevand i Jarlbergs amt.) *Växten trind af de hvarandra något täckande bladen.* — *C. oxyacanthum* *Cham. enl. Lange.*

- 2 *C. submersum* *L.* bladen som hos föreg., med finare och talrikare, svagare tandade fikar; nöt. äggformiga, övåpnade, beströdda med vårtlika knölar. 2 7, 8. *Fig.* *Fl.D.* 510. *H.N.f.9*, n:o 64.

*Vattenpöl. r.* (Sk. vid Dalköpinge; Landskrona i fästningsgrafen; Lund och Vemmenhögsån etc. *ÖG.* i hafsvik. mell. Gryts prestg. och Åbäcksnäs: *Kindb.* — *N.* Hærsön mell. EidswoId och Ullensager.) *C. muticum* *Cham.*

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

### 13 KLASSEN

### FRUCTIFLORÆ.

**84 Fam. ORCHIDEÆ Juss.** Blomkalken kronlik oregelbunden, med en läppformigflik. Stånd. 1, säll. 2, samväxta med pistillen. Fruktämne under kalken, enrummigt, 3-skalligt, med fröfasten på vägarne.

**1 Flocken Ophrydeæ.** Ståndarknappen 1, orörligt hopväxt med pistillen. [Växter med stjelknölar.]

#### 401. ORCHIS Lin. Nyckelblomster

† Stjelknölarne odelade.

\* De 5 öfre kalkbladen spetsiga.

**1 O. militaris L.** skärmb. äggrunda, flere gånger kortare än fruktämnet; läppen 3-delad, sidoflik. mycket smala, mellanfliken utdragen, mot spetsen vidgad till 2, vinglika flikar med en mellanliggande udd, helbräddad; de öfriga kalkbladen *hjelmlikt hopslutna*; sporren *mycket kortare* än fruktämnet. 24 6. Fig. Sv.B.340. Fl.D.1277. H.N.f.10, n:o 61.

Lund. äng. (Sk. mellan Cimbritshamn och Blek. gränsen, t. ex. mell. Andrarum och Brösarp; Årup; Beckaskog; Lillö etc. *Blek.* Sölvitsborg vid Ynde. *Smål.* Kalmar, Skansängen [nu utgången enl. Sjöstr.]. *Öl. Gottl.*) *Blrna stora, med röd läpp, utvänd. askgrå kalkblad. Örtbladen lancettlikt aflånga, ofta öfver en tum breda; stjelknöl. äggformiga.* — *O. Rivini* Gouan och Reich. *fl. Orch. eur.*

**2 O. mascula L.** skärmb. lancettlika, af fruktämnets längd; läppen 3klufven i söga olikstora flikar, mellanflik. urnupen och naggad, utan mellanligg. tand; kalkens 2 yttre sidoblad *tillbakaböjda*; sporren n. af främnet längd, uppåtrigtad. 24 5, 6, purp. blr. Fig. Sv.B.220. Fl.D.457.

Lund. äng. (Sk. *Blek.* *Smål.* Urshult sn, vid Ekekulla, Vesterbo torp och Rörvik; Algutsboda och Elmeboda snr; Scheutz. *Dalsl.* Skårdsdalen vid Heden i Dalskog; Ryr och Benebo i Skållerud. *Hall.* allm. i söd. del.: Theor. *Öl. Gottl.* — N. söd. och vest. del. upp till Lofoden.) *Äxel utdraget, mångblommigt; örtbl. lancettlikt aflånga; stjelknölarne elliptiska. Var. med hvita blr.*

\*\* De 5 öfre kalkbladen trubbiga.

**3 O. ustulata L.** skärmb. lancettlika, något kortare än främnet; läppen 3klufven, mellanfliken djupt 2flikig; de öfr. kalkbl. *hjelmlikt hopslutna*; sporren krökt framåt, *mycket kortare* än fruktämnet. 24 6, 7. Fig. Sv.B.351. Fl.D.103. H.N.f.15, n:o 65.

Äng. (Sk. Blek. Tornby ängar, och Berntorp i Ramdala sn. Öl. Gottl.) *Azet trubbigt, i toppen brunt af de outslagna blrna; dessa smärre än hos de öfriga, brunröda, med hvit, purpurprickad läpp; bladen smalt lancettlikt aflånga; stj.knölarna n. klotrunda.* — *O. antropophora* Fl.D.

- 4 *O. Morio* L. skärmb. lancettlika, af främnets längd; läppen grundt 3flikig, med n. likstora, breda trubbiga likar; de öfr. kalkbladen som hos föreg.; sporren af främnets längd. 2½ 5, 6. Fig. Sv.B.233. Fl.D.253. H.N.f.1, n:o 66.

Äng. (Sk. Blek. Lyckeby, Sturkö m. fl. st. i öst. delen. Öl. Gottl. — N. Christiansands st. vid Christians., Mandal, Stavanger etc.) *Vanl. quartershög, med kort, mer såblommigt ax af stora, purpurröda, säll. hvita blr; örtbl. lancettlikt aflånga; stj.elknöl. klotrunda.*

- 5 *O. laxiflora* Lam. skärmb. vanl. längre än främnet; läpp. 3flikig. mellanfl. urnupen helbräddad; de 2 yttre kalkbl. tillbakaböjda; sporren kortare än främnet, tillbakariktad. 2½ 7, purp. blr. Fig. Vet.Ac.H.1800,t.3,f.A. Reich.fil.Orch.t.40,41,f.1. H.N.f.6, n:o 58.

Kärräng. r. (Gottl. Skälsö; Fleringe sn, Grindhammarträsk; vid Fardumegård i Rute sn; Tänglingsmyr i Etelhem; på stranden af en djup myr vid Vike i Boge sn; Eista etc.) *Spädare, men högre än de föreg. med stora och glesa blr; örtbl. jemnbreda; stj.elknöl. rundade ell. äggformiga. Var. med läppens mellanflik något kortare än sidoflikarne, eller väl så lång som dessa: O. palustris Jacq.*

†† Stjelknölarna aflånga, endast klufna i spetsen.

- 6 *O. sambucina* L. skärmb. hinnaktiga mångnerviga, mycket längre än främnet; läppen rundad, grundt 3flikad och naggad; de 2 yttre kalkbladen utstående; sporren af främnets längd. 2½ 5, 6. — *β incarnata*: med purpurröda blr. Fig. Sv.B.362. Fl.D.1232; *β* 2737. H.N.f.14, n:o 65.

Ängsback. (Sk.—Rosl. Vestml. Engsö och på Kälholmen. VG. Öl. Gottl.) *Blrna var. gula och blåaktigt ljusröda, med skärm af samma färg; örtbl. aflånga, de nedre mot spetsen bredare, trubbiga. — β O. incarnata L. [dock icke Herb., der under detta namn förvaras O. angustifolia Wimm.]*

††† Stjelknöl. handlikt delade.

\* Stjelen ihålig, fåbladig; bladen bredast vid eller nedom midten,

- 7 *O. latifolia* L. bladen ovala, vid midten bredast, spetsade; de nedre skärmb. längre än blrna; läppen grundt 3flikig; sporren kortare än fruktämnet; de 2 yttre kalkbladen tillbakaböjda. 2½ 5, 6, r. blr. Fig. Hall.Hist.t.31. Reich.t.50,51,f.1. H.N.f.7, n:o 67.

\* *elata* Hn.: 1—2 fot hög, med bredt lancettlika blad, starkt tillbakaböjda sidokalkblad. Fig. Reich.t.44,f.2.

Fukt. äng. r. (Sk. Broby; F. Ar. ÖG. V. Ny sn enl. Kindb. Rosl. Vahlö sn. Hall. Onsala, vid Staregården. Gottl. mell. Rute kyrka och Kopparfve. — N. söd. del. och längs vestkusten ända till Lofoden. — \* Sk. Ramstorp. Gottl.) *Hufvudformen 1—1 fot hög; bladen 1—1½ tum breda, 3—4 t. långa vanl. brunfläckiga. Näppe-ligen skiljd från följ. såsom utmärkt endast af de breda bladen. — O. latifol. L. enl. Hallers cit. figur. O. majalis Reich. pl. crit.*

- 8 *O. angustifolia* Wimm. bladen lancettlika, vid ell. nedom midten bredast, något kö-lade och upprätta; alla skärmb. längre än blrna; läppen grundt ell. otydligt 3flikad; yttre kalkbl. i början utböjda; för öfr. som föreg. 2½ 6, 7, r. säll. hv. blr. — *β extensa*: bladen n. jemnbredt lancettlika; skärmen mycket längre än blrna. Fig. Fl.D.266 och 2476. H.N.f.7, n:o 65, 66; *β* Reich.t.46,f.2.

\* *cruenta* Müll. bladen något äggrundt lancettlika, mycket brunfläckiga; blrna mörkröda. Fig. Fl.D.876. Reich.t.43,f.1.

Fukt. äng. (Sk.—VB. nor. del, Björkfors. Lul. Lpm.: H. Widm. — N. till Nordl. — *β* Gottl. i Vänge-myrr. — \* *cruenta*: Jemtl. Frösön; samt på spridda st. i hela prov. Herjed. Funnesdalen. Ängml. Långsele sn, Ledinge. Medelp. Hässjö, på holmar vid Indalselvsn utl.: Arn. Helsl. Loos, v. om Kyrktjärn. Wistr. — N. Finn. Kaa-fjord; Tromsö. Levangernæset. Rörås; Stuedalen; Börsvolden på Toten; Dovre etc.) *Af Linné icke skiljd från föreg. utan säkerligen hans, så väl som alla äldre Sv. författare, i Sverige här och der, äfven vid Uppsala, ymniga O. latifolia [under*

hvilket namn så väl som under namnet *incarn.* den förvaras i Linnés herb.]. — *O. latif.* Reich. Ic. *O. incarnata* Fr. S.V.Sc. och Reich.Orch.eur.

- 9 *O. Traunsteineri* Sawt. bladen lancettlikt jemnbreda—smalt aflånga, vid midten bredast; de nedre skärmb. längre än blrna; läppen rundad, grundt 3flikig, naggad; yttre kalkbl. tillbakaböjda. 2½—7, r. blr. Fig. Reich.t.42. H.N.f.7, n:o 68.

\* *lapponica* Lest. bl. aflånga; blrna något smärre och tätare. Fig. Reich.t.53.f.1,2.

Fukt. äng. r. (Sk. Hall. Onsala, vid Stare- och Karsegården. Boh. Sörbygd. VG. Verm. Marboånger mell. Gustafsforss och Liljendal. Smål. Lannaskede; Dalhem, Emtöholm; Applerum i Thorsås enl. Ekstr. ÖG. Dagsmosse. Öl. Högbj vid Borgaträsk. Götll. Storugns i Lärbro sn; Hågur i Bunge; ängen Ryglossan mell. Rute k:a och Fardume; Åkebäcks myr nära Roma; Tänglingsmyr etc. — N. Christiania; Bærum nära sjön Dæhlivand; vid foten af Græsenås. — \* *Lpl.* Karesuando etc. — N.) 6—10 t. hög, med större och glesare blr, smalare blad, omkr. ¼ t. breda. Torde dock sammanflyta med föreg. — *O. angustifol.* Reich. *O. incarnata* Handb. ed.2 och Fr. Mant.2. *O. macul. β majalis* Sæve Fl. Götll.

\*\* Stj. tät, mångbladig; bladen vanl. bredast ofvan midten.

- 10 *O. maculata* L. bladen aflånga—tunglika; de nedre skärmen af blrnas längd, de öfre kortare; läppen 3flikig; sporren n. af främnets längd; yttre kalkbl. utböjda. 2½ 6, 7. — *β angustifolia*: bladen jemnbredt lancettlika; läppen djupt 3klufven. Fig. Sv.B. 413. FLD.933.

Fukt. äng. (Sk.—*Lpl.* — N. till Ost-Finnm.) Blrna gredelina ell. hvita, med violetta teckningar; bladen meränd. brunfläckiga, hos *β* oftare rent gröna.

#### 402. ANACAMPTIS Rich. Salepsrot.

- 1 *A. pyramidalis* Rich. stjelknö. odelade, klotrunda; bladen jemnbredt lancettlika; blomkalkens läpp 3klufven och helbräddad, med 2 upphöjda tänder vid basen; sporren trådlik, längre än fruktämnet. 2½ 7, r. blr. Fig. Sv.B.584. FLD.2113. H.N.f.6, n:o 57.

Äng. r. (Öl. Thorslunda i Skogsbytrakten; Vesterstad i Kastlösa; Runsten; Köpinge vid Lungegård; Böda vid Humderum etc. Götll. Lummelunds bruk; Hangvar; Bunge; Fläringe; Klinte skansholme m. fl. st.) *Axet rundadt, tätblommigt.* — *Orchis* L.

#### 403. GYMNADENIA R. Br. Brudsporre.

† Blrna vanl. röda; sporren smal, längre ell. föga kortare än fruktämnet.

- 1 *G. conopsea* Br. stjelknö. handklufna; bladen jemnbreda—lancettlika; kalkens läpp likformigt 3flikig; sporren trådlik, mycket längre än fruktämnet. 2½ 6, 7, r. stund. hv. blr. — *β densiflora*: bladen lancettlika; blomaxet långt, tätblommigt. Fig. FLD. 224. Reich.t.70, 71. H.N.f.9, n:o 66, 67; *β* 68; Reich.t.72.

Äng. (Sk.—*Lpl.* — N. till Ost-Finnm. Varanger. — *β* Hall. Knävelstorp nära Halmstad. Öl. Götll. — N.) Var. på Dovre med längre och kortare sporre. En form från Jemtl. har n. dubbelt mindre blr; en annan, var. *lapponica*, med sporren kortare än främnet, finnes enl. Prof. Zellerstedt i Umeå Lpm. och torde vara skild. — *Orchis* L. *Satyrium* Wg.

- 2 *G. odoratissima* Br. bladen smala jemnbreda; sporren syl-lik, något kortare än fruktämnet; för öfr. som föreg. 2½ 7, r. blr. Fig. Sv.B.542. H.N.f.6, n:o 59.

Skogsäng. r. (ÖG. Omberg i Höje äng, vid Charlottenborg och Djurkälla: Kindb. VG. Kinnekulle, på Österplana vall nära Stenåsen enl. Leml. Götll. mell. Rute kyrka och Kopparfve; mell. Vike gård i Boge och Gothemsån; Storugns i Lärbro m. fl. st.) *Orchis* L. *Satyrium* Wg.

†† Blrna gulhvita; sporren n. punglik, flere gånger kortare än främnet.

- 3 *G. albidia* Rich. stjelknö. djupt handdelade; bladen aflånga, de nedre mot spetsen bredare; läppens mellanflik något större än sidoflikarne. 2½ 7. Fig. Sv.B.507.f.1. FLD.115. H.N.f.14, n:o 66.

Torra äng. r. (Sk. Blek. Hall. Boh. Thorskogs bruk. Smål. vestra del; Vexjö och Herråkra; ostligast i Elghult. Dalsl. Bäckefors nära Mon. VG. i bergstrakterna. Herjed. Torkelstöt; Hamrafjell; Axhögen m. fl. st. Jemtl. Åreskutan och Snasahögen;

Följinge sn, Stakafjellet; Frostviken. *Pit. Lpm.* Tjiddjakk. *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Unna Tokiware. — *N.* Christiansand; Hecksfjell. Arendal vid Näs jernverk; Tind; Romsdalen; Dovre etc. upp till Ost-Finmm.) *Azet tåll af små blr.* — *Satyrium L. Orchis Sw. Habenaria Br. Coeloglossum Ed.4.*

404. COELOGLOSSUM *Hn.* Grönkulla.

- 1 *C. viride Hn.* stjelknöl. handklufna; bladen ovala—afånga; de inre kalkbl. mycket smalare än de yttre; läppen i spetsen 3tåndad, mellantanden kortare. 24 6, 7. Fig. Sv.B.507, f.2. Fl.D.77. Reich.t.82. H.N.f.15, n:o 66.  
Skogsång. (*Sk.—Lpl. Öl.* — *N.* till Ost-Finmm.) *Blrna gulgröna, kortare än skärmen; på Unna Toki i Lul. Lpm. funna rödbruna.* — *Satyrium L. Orchis Sw. Habenaria Br. Peristylis Lindl. Platanthera Reich. fl.*

405. PLATANTHERA *Rich.* Skogsviol, Nosseröt.

† Sporren trådläk, ätm. dubbelt längre än fruktämnet.

- 1 *P. bifolia Rich.* stjelen nedtill 2bladig; bladen n. ovala—lancettlika; sporren n. jemntjock; ståndarknappens rum parallela. 24 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *grandiflora:* blrna glesa, dubbelt större. Fig. Sv.B.314. Fl.D.235 och 2360—61 [varr.]. H.N.f.6, n:o 60.  
Skogsång. (*Sk.—Um. Lpm. Jeml. Boh. Öl. Goutl.* — *N.* till Foldensfjorden. Finmm. Tromsøe.) *Stjelknöl. odelade; blrna starkt vålluktande, vanl. i rikare och längre, mindre tvärt avslutadt ax än hos följ.* — *Orchis L. Satyrium Wg. P. solstitialis Bönn.* — Anm. *P. brachyglossa Reich. anses som en var. med tvärhuggen knapp.*  
2 *P. chlorantha Cust.* stj. som hos föreg.; bladen bredare, n. elliptiska; sporren nedom midten vidgad och något plattad; knappens rum vid basen vidt åtskild, upptill närmade hvarandra. 24 6, 7. Fig. Fl.D.2362. H.N.f.6, n:o 61.  
Skogsång. skog. (*Sk.—Uppl. Söderfors. Rosl. Gräsön etc. Helsl. Norrbo sn, Sandåkers tomt. Vestml. Köping; Barkarö m. fl. st. Ner. Dalsl. Steneby sn. Boh. Uddevalla; Christinedal. Öl. Goutl.* — *N.* allm. i Aggerhus, Christianss, och Bergens st.) *Vanl. större än föreg.; blrna n. dubbelt så stora, något grönaktigt hvita och luktande; kalkbladen samsittande, och knapprummen bildande en vinkel mot hvarandra.* — *P. montana Reich. fl. Orchis bifolia E.B.*

†† Sporren kägellik, kortare än fruktämnet.

- \*3 *P. obtusata Lindl.* stjelen nedtill enbladig; bladet afångt omv. äggrundt; axet glest; sporren krökt framåt. 24 7, 8, hvitakt. blr. Fig. Reich.t.75, f.1, 2. H.N.f.16, n:o 63.  
Fjelltr. r. (*N.* Finmm. Kaasfjorden på det yttre Strömsnåset, nedanför och på fjellet Sakkabani, upptäckt af Blyt 1842, återfunnen 1864 af Th. Fr. och E. Henschen.) Omkr. 4 tum hög, med ett tumslångt ax af 4—7, små blr, flyktigt besedda mer lika dem hos *Goodyera* ell. *Spiranthes* än de föreg. Stjelen nedtill klädd af en tumslång hinnaktig slida, från hvars mynning det n. afånga bladet utgår. — *Orchis Pursh.*

406. NIGRITELLA *Rich.* Brunkulla.

- 1 *N. angustifolia Rich.* bladen jemnbreda; kalkens läpp hel äggrundt spetsad; honingsgömmet punglikt, flere gånger kortare än fruktämnet. 24 6, 7. Fig. Sv.B.500. Fl.D. 998. Reich.t.4. H.N.f.11, n:o 67.  
Äng. (*Jeml. ymnig. Herjed.* i öfre Ljusnedalen ofvanf. Bruksvallarne. Sälls. i Ängml. och Medelp. Helsl. Ljusdal, nära Backa; H. Gahn. — *N.* Snaasen; Vär-dalen; Dovre vid Drivstuen; Gudbrandsd. Ringebøe; Toten; Östra Torpen, samt Hedemarken.) *Quartershög med handlika stjelknölar, rundadt, tätblommigt, svart-rött ax.* — *N. nigra Reich. Orch. Satyrium nigrum L. Orchis nigra Sw.*

407. OPHRYS *Lin.* Flugblomma.

- 1 *O. myodes L.* stjelnbl. afånga—lancettlika; de 2 inre kalkbladen trådmala; läppen 3-klufven med smala sidofilkar, mellanfilken utdragen vidgad och i spetsen 2flikad. 24 6, 7. Fig. Sv.B.293. Fl.D.1398. Fl.N.2, t.5. H.N.f.15, n:o 67.  
Fukt. äng. r. (*Sk. Smål. Trästad i Blackstad sn. ÖG. Uppl. Egbyholm; Rosersberg; Vaddö sn, vid Boda; Börstel i Lugnemosse; Elfkarleby. Gestr. Kubbo. Jeml.*



Sunne och Frösöa; Oviken, Brunflo m. fl. snr. Ner. Asker, Sköllersta och Lerbäck snr. VG. Öl. Gottl. — N. Langöen vid Holmestrand; Brevig; Bl.; Langesund; Snaasen; Bergåsen etc.) *Stjelkknöl. klotrunda; axet gles, med blr, som på afstånd likna flugor; de inre kalkbl. bruna, de yttre gröna, läppen sammetsbrun, någongång funnen hvit.* — O. *muscifera* Huds.

## 408. CHAMEORCHIS Rich. Ripört.

- 1 *C. alpina* Rich. bladen från rothalsen, jemnbreda, af omkring stjelkens längd; läppen äggrund. 2 7, 8. Fig. Sv.B.683. FLD.452. H.N.f.11, n:o 65.  
Fjellv. r. (Torn.—Pit. Lpm. i de högre fjellen. Jeml. Snasahögen; Smällhögarne; Tälgstensberget etc. Herjed. Helagsfj.; Åxhögen och Midtåkläpparne. — N. Ost-Finnm. — Lomsfjellen och Gudbrandsdalen.) 2—3 t. hög, med hela elliptiska stjelkknölar, små, gulgröna, hjelmlikt slutna blr. — *Ophrys L. Herminium* Sw.

## 409. HERMINIUM Lin. Honungsblomma.

- 1 *H. Monorchis* Br. stj. nedtill med 2—3, lancettlika blad; inre kalkbladen längre än de yttre, vid midten tvärt afsmalnande i en jemnbred spets; läppen med n. rakt utstående sidoflikar. 2 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.700. FLD.102. H.N.f.11, n:o 66.  
Sidländta ångar. (Sk.—Gefte, på Limöarne. VB. Umeå. Dal. Vestml. Lospånga i Dingtuna. Ner. Asker sn. Verm. Tabergs grufvor; Elfdalen och Fryksdalen. Boh. Kosteröarne; Lamö och Otterö. Hall. Onsala. Öl. Gottl. — N. öarne i Christiania-fjorden; mell. Kongsvinger och Elverum vid Konglebæk; Tind; Gudbrandsd. m. fl. st.) 3—7 tum hög; stjelkknölen klotrund, vid blomn. alltid ensam. — *Ophrys L. Fl. Su. ed.2.*

- 2 Flokken **Neottia**. Knappen ensam, fri; pollenmassorna af mjöl- ell. skiflika, elastiska gryn. [Växter med rotstock.]

## 410. GOODYERA R. Br. Knäört.

- 1 *G. repens* Br. bladen äggrunda, slutl. nätådriga; axet ensidigt; kalkbladen lancettlika, de yttre småludna. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.N.2,t.6. FLD.812. Reich.t.130. H.N.f.13, n:o 73.  
Skogsmark på mossar. (Sk. nor. del.—Lpl. Öl. Rälla. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) Rotstocken trådlikt krypande i mossagret, utan att nå jorden; axet smalt, af små blr. — *Satyrium L. Neottia* Sw.

## 411. CEPHALANTHERA Rich. Syssla.

- 1 *C. rubra* Rich. bladen lancett- ell. svärdlika, spetsade; skärmb. längre än det småludna fruktämnet; kalkläppen spetsad, af de inre kalkbladens längd. 2 7, r. blr. Fig. FLD.345. Reich.Orch.t.117. H.N.f.8, n:o 66.  
Skog. etc. r. (ÖG. Ringarum nära Fängebosåg och mell. Lilla Gusum och Svinbo; Eriksberg i Qvillinge, samt Högboða i Björsätter enl. Kindb. Stockh. vid Skrubba; Häggesta i Botkyrka sn; Vermdön; nära Kroka på Utön. Dalsl. vid Lilla Bräcke i Änimskog. Gottl. vid Vestgård i Hall; Fardume i Rute; på ön Furilen; nära Got-hemsåns utlopp; Hallbros i Vesterhejde m. fl. st.; Sandön enl. Eis. och Sturb. — N. Eger.) Bladen ganska nerviga; blrna få, men stora, 1 tum vida. — *Serapias L. Epipactis* Wg.
- 2 *C. ensifolia* Rich. bladen som hos föreg.; skärmb. kortare än det glatta främnet; läppen trubbig, kortare än de inre kalkbl. 2 6, 7. Fig. FLD.506. Reich.t.118. H.N.f.14, n:o 69.  
Skogsäng. r. (Sk. Hafgård i Gustafs sn, samt i Röddingedalen. Stockh. i Skuruparken; Necka i skogen vid badstället. Rosl. i Östhammars skärg. Öl. Gottl. — N. Christiansand i Fiskåsskogen.) Blrna teml. stora hvita, säll. röda. — *C. Xiphophyllum* Reich. fl. Ser. grandiflora L. Mant. 2. S. Helleborine β L.Fl.Su. ed.2. S. ensifolia Wg. *Epipactis* Sw.
- 3 *C. pallens* Rich. bladen bredt lancettlika—aflånga, föga spetsiga; skärmb. mycket längre än det glatta främnet, de nedre bladlika; läppen trubbig, n. af de inre kalkbls längd. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.465. FLD.1400. Reich.t.119.  
Skogsäng., skugg. st. r. (Gottl. Stånga sn, på vallarne af en gammal ruin, kallad Slottet.) Blrna stora som hos *C. rubra*, med alla kalkbl. trubbiga; rotstocken hos alla ar-

terna med talrika, hopknippade birötter. — *C. Lonchophyllum* Reich. fl. Ser. grandiflora Scop. *Epipactis* Sw.

#### 412. EPIPACTIS Crantz. Knipprot, Zymbel.

† Utan grenskott; blomkalkens läpp spetsig: *E. Helleborine* Cr.

- 1 *E. latifolia* Sw. bladen äggrunda ell. bredt ovala, de öfre spetsade; läppen hjertlik tillbakarullad, kortare än de öfr. kalkbladen; fruktämnet glatt. 2 7, 8. Fig. Reich. Orch.t.136. H.N.f.14, n:o 67.

Skogsback. r. (Sk.—Gestr. Jemtl. Marieby sn; Ås sn, vid Sörbyn och Sem. Dal. Vestml. Vesterås; Sala. Ner. Verml. i Fryksdalen. Dalsl. VG. Boh. Lindö enl. Lefm. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) Stor växt, med före blomn. lutande ax; grönhvita ell. brunaktiga blr. Rotstocken hos denna och de 2 följ. täll omgifven af talrika knippsa birötter. — *Serapias Helleborine* L.Fl.Su. *S. latifolia* L. Mant.2. *E. Helleborine* var. *viridans* Reich. fl.

- 2 *E. microphylla* Sw. bladen äggrundt lancettlika, spetsade, glatta; läppen som hos föreg., tvärt sammandragen till spets; fruktämnet glatt. 2 7, 8. Fig. Fl.D.811. Reich.t.132,f.1, 2.

Skugg. st. r. (Öl. mellan Ekerum och Halltorp.) Mycket spädare än föreg., med glesblommigt ax; rödaktigt gröna blommor med slutna kalkblad; frömn. på Öl. ex. glatt enl. Sjöstr., men småludet på alla utl. ex., utg. sett. — *E. Hellebor.* var. *microphylla* Reich. *Serapias latifolia* Fl.D.

- 3 *E. atrorubens* Hoffm. de nedersta bladen som hos föreg., de öfre lancettlika; läppen uddspetsig, af de öfr. kalkbladens längd; fruktämnet småludet. 2 7, 8. Fig. Fl.D. 1938. Fl.N.2,t.5. Reich.t.133. H.N.f.8, n:o 65.

Skogslund. särd. på kalkbotten, r. (Smål.—Södml. Stockh. Eriksö vid Vaxholm enl. Lefm. Jemtl. Odensala i Brunflo; Ås sn. Dal. Styggforsen. Ner. Hesselkulla; P. J. Hellb.; Skåleklint; Mårsäter. Verml. Ullerud; Långbanshyttan etc. Dalsl. Öl. Gottl. — N. Christiania; Trondhj. Gävingåsen; Snaasen; Salten.) Till alla delar mindre än *E. latif.*; blrna mer och mindre mörkröda, grönaktiga ell. hvita. Skiljes ej i Blytts Norges Fl. från *E. latif.* — *E. latifolia* β *atorub.* Hoffm. *E. media* Fr. *E. rubiginosa* Gaud. & Koch. *E. Hellebor.* var. *rubiginosa* Reich.

†† Med grenskott från rotstocken; kalkens läpp rundadt trubbig.

- 4 *E. palustris* Cr. bladen lancettlika, de nedre stund. n. ovala; läppen hjertlik, krusig, af de öfr. kalkbladens längd; främnet småludet. 2 7, 8. Fig. Sv.B.449. Fl.D. 267. H.N.f.14, n:o 68.

Fukt. äng. r. (Sk.—Gestr. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. från sydl. delen till Snaasen.) De yttre kalkbl. gröna, invändigt rödaktiga, de inre hv. ell. rödl. Rotstocken krypande, med få, äfven kryp. birötter. — *E. longifolia* Reich. fl. Ser. *longifolia* L. Mant.2.

#### 413. LISTERA R. Br. Tväblad.

- 1 *L. ovata* Br. stjelen småluden, med 2, n. motsatta, bredt ovala blad; kalkläppen klufven i 2, jemnbreda trubbiga flikar. 2 6, 7, gröng. blr. Fig. Fl.D.137. Reich. Orch.t.127.

Skogsäng. (Sk.—Ängml. Hernön; Nätra sn. och Jemtl. Boh. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm. Reisenvand. Norm.) 1—2 fot hög, med krypande rotstock och talrika birötter, långt smalt ax. — *Neottia latifol.* Rich. *Ophrys* L. *Epipactis* Sw.

- 2 *L. cordata* Br. stjelen glatt, med 2, n. motsatta, n. hjertlika blad; läppen klufven i 2 småspetsiga flikar, samt 2 små sidoflikar vid basen. 2 6, 7, brung. blr. Fig. Sv.B.472. Fl.D.1278. Fl.N.t.3,f.6—8.

Skog. på mossar. (Lpl.—Sk. nor. del. och Hall. söd. del. Öl. Gottl. och på Sandön. — N. till Ost-Finm.) 5—7 tum hög, späd, med i mossan kryp. rötter, tumslångt ax. — Synon. som föreg.

#### 414. NEOTTIA Lin. Näst-rot.

- 1 *N. Nidus avis* Rich. stängeln bladlös fjällig; kalkläppen klufven i 2, utböjda flikar. 2 6, 7. Fig. Fl.D.181. Reich.Orch.t.121.

Skogsmark, bland ruttna löf etc. r. (Sk.—Gefle. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. VG.

Billingen. *Boh.* Skredsvik sn. *Öl. Götll.* — *N.* Christiania på ön Malmö; Laurvig, samt Christiansand enl. Bl.; Snaasen.) 6—12 tum hög, till färgen brungul afvensom blrna; rotstocken omgifven af talrika, tjocka birötter, hopknippade n. som ett fogelbo. — *Neottia L.F.Su.ed.1; Ophrys ed.2. Epipactis Sw.*

## 415. EPIPOGIUM Gmel. Skogsfrublomma.

- 1 *E. aphyllum Sw.* rotstocken korallgrenig; stängeln bar, omgifven af bladlösa slidor. 2 7, 8. Fig. Sv.B.512. Fl.D.1233, 1399. H.N.f.15, n:o 68.

Skog. r. (Sk. nära Böringesjön; Bokenäset vid Karlsholmssjön. *Smål.* Tvärbäck nära Femsjö-fälla vid Färgens strand [numera utgången]. *ÖG.* Kolmården, nära Marmorbruket; nära Rejmyra enl. *Leffl.* *Södm.* Dunker sn, Bråtön nära Stålboga bruk. *Gestr.* Limön: Stud. C. Juhlin. *Helsl.* Bjuråker sn, nära Alsjö fåbodar; Bergsjö, nära Elfåsen: Wistr.; Loos sn, Tenberget. *Medelp.* Borgsjö sn, Ånge allmänning. *Ängml.* Hernön enl. Arn.; Bjerträ i Rammeldalen. *Lul. Lpm.* Jokkmokk. *Jeml.* Sunne sn på Andersön; Näskotts sn, vid Vaplan; Stugu sn, vid Strånäset. *Dal.* Orsa, Jocksälls fåbod, vid Skatungen. *Vestml.* Frösåker. *Ner.* Ullaviklint: A. af Geijerstam. *Verm.* Gustafsström. — *N.* Christiania på Bokstadsås. Vid vestra ändan af Sælsvandet i Vaage.) 4—8 tum hög af blek gulbrun färg, med 2—6 stora blekgula blr och rödaktig sporre. — *Satyrium Epipog. L. E. Gmelini Rich.*

- 3 Flocken **Vandæ.** Knappen ensam, fri. Pollenmassorna [4, skiffformiga] vxartade, medelst en celllös förlängning fästade på märket.

## 416. CALYPSO Salisb. Toffelblomma.

- 1 *C. borealis Sal.* örtbladet från stjelkens lökformigt uppsvällda bas, ensamt, äggrundt; läppens bräm n. äggrundt, nående framom sporrén. 2 5, 6. Fig. Sv.B.518. Fl.D. suppl.99. H.N.f.9, n:o 65.

Fukt. lundar, r. (*Lul. Lpm.* vid Niommelsaska: H. Widm.; Jokkmokk, Kajtum-selet; ½ mil sydost fr. Jokkm. kyrka, vid en bäck fr. berget Kuotsakåwe m. fl. st.; ¼ mil vest. om Sarkaware. *Um. Lpm.* nära Stensele kyrka. *VB.* Råbäck i Öfver-Luleå: Hj. Holmgr.; Pit. sn, vid Långviken och Alters bruk enl. G. v. Ced.; Skellefteå, mell. Falkbergets norra sida och Falkträsket, samt på Hömyrsberget nära Warutråsk.) *Stj.* 3—6 tum hög, slidad, med en stor blomma i toppen, hvars läpp är brunfläckig, de öfre kalkbladen ljusröda. — *Cypripedium bulbosum L. Orchidium arcticum Sw. Norna Wg.*

- 4 Flocken **Malaxidæ.** Knappen ensam, fri. Pollenmassorna [klotrunda ell. aflånga] vxartade, omedelbart lagda på märket.

## 417. STURMIA Reich. Myggblomsten.

- 1 *S. Loeselii Reich.* stjelken 3kantig; bladen 2, lancettlika; kalkläppen äggrundt aflång, trubbad. 2 6, 7, blekg. blr. Fig. Fl.D.877. V.Ac.H.1800,t.3. Reich.Orch.t.140. H.N.f.6, n:o 63.

Kärr, r. (Sk. Christianstad, vid Lefrasjön och Veilesjön; Kettils mossen i Stångby sn; kärr mell. Örtosta och Lackalänge; Christineberg nära Malmö. *ÖG.* Hagebyhöga sn, vid Rangeltorp; Vinnerstad sn vid Boren. *Uppl.* i tufviga kärr vid Norvidsjön nära Björklinge kyrka: Linné i herb. *Gestr.* Kubbo, vid en mindre skogssjö. *Öl.* mell. Borge och Vedborns träsk. *Götll.* Storholmen i Fardume träsk; i Martebomyr åt Lummelundssidan; Djulfves vid Hoborgen m. fl. st. enl. G. v. Ced. — *N.* Christiania på Næsoe.) 3—6 tum hög med gles ax af 2—6, 3—4 lin. vida blr; bladen utgående från stjelkens lökformiga bas. — *Ophrys L. O. paludosa Fl.D. Malaxis Sw.*

## 418. MALAXIS Sw. Myggblomster.

- 1 *M. monophyllos Sw.* stjelken 3kantig; blad ett, säll. 2, ovala; skärmb. kortare än fruktämnet; kalkläppen rundad med lång jemnbred spets. 2 6, 7, blekg. blr. Fig. Sv.B.663. V.Ac.H.1800,t.3. Fl.D.1525. H.N.f.6, n:o 62.

Kärr, r. (*ÖG.* Spånghagen, Slaka sn; Kärna i Värö mosse; Omberg; Vinnerstad etc. *Södm.* Rydby. *Uppl.* Järlåsa sn, vid torpet Granslätt; Elfkarleby, Ytterboda. *Gestr.* Kubbo i Ormkärsmuren; Edskön i Verkfjärden. *Medelp.* Alnön; Hammar i Torp sn; Hässjö sn enl. *Leffl.* *Ängml.* Bjerträ vid Öster-Strinns fåbod. *Jeml.* Sunne, Frösön och Lith; Rödö m. fl. snr. *Dal.* Boda kapell. *Vestml.* Linde sn, Håkans-

boda; Sättra brunn; Sala. VG. Kinnekulle. *Gottl.* Fardume träsk; Sproge. — *N. Christiania*, vid Lysager kjærn, Gjellebäck m. fl. st. Glommen vid Konglebak; Totten; Klacken på Ringerige; Gudbrandsdalen, nära Jettasfjell. 5—8 tum hög, med 1—2, högst sällan 3 blad från stjelkens lökformiga bas, långt och smalt ax af talrika blr, föga mer än en lin. i diam. — *Ophrys L. Microstylis Lindl.* Den 2bladiga var. torde vara Linnés *Ophrys latifolia Fl.Su.* och *Gunners O. lilifolia från Nordl.*

- 2 *M. paludosa Sw.* stjelken flerkantig; bladen 2, 3, omv. äggrunda; skärmb. af fruktkämnets längd; läppen äggrund, spetsig. 2 7, 8, grön. blr. Fig. Sv.B.662. V. Ac.H.1789,t.6,f.2. Fl.D.1234. H.N.f.14, n:o 71.

Kärr, r. (Sk.—Ångml. Själevad; Botheå sn, Gålsjö m. fl. st.: Arn. VB. nor. del, Björkfors. Um. Lpm. Betsele. Dal. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Pilgården i Näsing. *Gottl.* — *N. Aggerhus*, Christiansands och Bergens st.) 2—5 t. hög, med smalt ax af talrika, något större blr än hos föreg.; stjelkens bas lökformig. — *Ophrys L.*

#### 419. CORALLORHIZA Hall. Korallrot.

- 1 *C. innata Br.* axet fåblommigt, med spetsiga kalkblad; läppen aflång. 2 6, g. blr. Fig. Sv.B.554. Fl.D.451 och 2364. Fl.N.2,t.6. H.N.f.13, n:o 74.

Fukt. skog. (Torn. Lpm. Vittangi. Lul. Lpm. VB. nor. del. — Sk. Boh. Öl. nära Thorslunda. *Gottl.* Askängen i Hejde sn. — *N.* Icke sällsynt, till Ost-Finm. Varanger.) Stängeln 6—10 tum hög, med bladlösa stidor och korallgrenig rotstock. — *C. nemoralis Sw. C. virescens Drej. Ophrys Corallorh. L.*

#### 5 Flocken *Cypripedium*. Knappar 2.

#### 420. CYPRIPEDIUM Lin. Gucku-skor.

- 1 *C. Calceolus L.* stjelken flerbladig, med ovala spetsade blad; kalkens uppblåsta läpp något nedplattad, kortare än de öfriga kalkbladen. 2 6. Fig. Sv.B.524. Fl.D.999. H.N.f.4, n:o 85.

Fukt. st. i skogar, r. (ÖG. Ner. och VG. Dalsl. Kårud i Bräcke sn: Stud. Thorsten-son. Verml. bergslag. Vestml. Dal. Uppl. Gestr. och Helsl. Nordligast i Um. Lpm. Stensele. Öl. Mörbylånga och Högrum sockn. *Gottl.* — *N.* till Gudbrandsdalen, Ringeboe och Salten; Gildeskaal: Norm.) Har de största blrna af Skand. arter i denna fam.; läppen stor som ett litet päron, gul; de öfriga, 2 tum långa kalkbladen bruna; stjelken vanl. en-, säll. 2-ell. 3blommig; rotstocken krypande. Har egenl. 3 ståndare, hvaraf den mellersta är steril och fri, bladlik.

- 85 Fam. IRIDEÆ Juss. Blomkalk kronlik, regelbunden med 3 ståndare. Fruktämne 3rummigt, mångfröigt.

#### 421. IRIS Lin. Svärdlilja.

- 1 *I. Pseudacorus L.* bladen platta svärdlika; blomkalkensflikar glatta, de inre jemnbreda, smalare och kortare än märkena. 2 6, 7, g. blr. —  $\beta$  citrina: bladen smalare; blrna mer än hälften mindre. Fig. Sv.B.110. Fl.D.494.

Stränd. (Sk.—VB. Dal. Boh. Öl. *Gottl.* — *N.* till Helgeland. —  $\beta$  *Gottl.* Vänge-my, vid Staplarne.) Stora praktfulla blr; bladen tumsbreda, af omkr. stjelkens längd. Bladen hos  $\beta$  äro öfver 5 quart. långa och en god half tum breda; blrna enl. Fr. brandgula.

- †2 *I. sibirica L.* bladen smalt jemnbreda, kortare än stjelken; kalkensflikar glatta, de yttre omv. äggrunda med kort klo, de inre aflånga, större än märkena; fröhuset 3kantigt. 2 6, blå blr. Fig. Reich.D.Fl.f.768. H.N.f.12, n:o 69.

Kärr, r. (VG. Larf sn vid Slättås. Vestml. Nora sn, Fåsjöbyttan. *Gottl.* Kräcklings i Kräcklingbo sn; Lummelund; Vänge-my; Klinte. Enl. Vestö skola växtst. på *Gottl.* vara osäkra. Trol. öfverallt förvildad.) Lärer sällan, om någonsin blomma på *Gottl.* En del af de sterila ex. från denna ö hafva dubbelt bredare blad [3 lin.] än de Vestgötska och synas osäkra.

422. *CROCUS* *Lin.* Safran.

- †1 *C. vernus* *All.* lökens yttre hinna nervig, upplösande sig i hårfina trådar; kalkflikarne ovala konkava. något inböjda, n. dubbelt längre än det 3klufna krusiga märket. 24 4, 5. Fig. Fl.D.2022. Reich.f.786.

Förvildad i trädg. r. (*Stockh.* på gräsplanerna vid Ulriksdal. *Uppl.* Löfsta bruk. — *N. Bergen*, i ångar vid Årstadmark.) *Blr och blad från löken; de förra blå ell. hvita.*

- 86 Fam. *NARCISSINEÆ* *Juss.* Blomkalk kronlik, regelbunden med 6deladt bräm. Stånd. 6. Fruktämne som hos föreg. fam.

423. *NARCISSUS* *Lin.* Narciss, Påsklilja.

- †1 *N. Pseudonarcissus* *L.* bladen rännformiga; bikronan klocklik, af kalkflikarnes längd, i kanten vågig och naggad. 24 4, 5, g. blr. Fig. Fl.D.2170. Reich.D.Fl.f.816.

Ång. odl. st. r. (*Sk.* vest. Göinge vid Sandby; Röstånga sn vid Blinkarp etc. Förr äfven funnen i Blek. och Smål. *Gottl.* Vesterheide i en ång söder om Lund vid Halfvars. För öfr. förvildad i gamla trädgårdar.) *Stängeln hos båda arterna enblommig.*

- †2 *N. poeticus* *L.* blad som hos föreg.; bikronan skål-lik, med röd naggad kant, mycket kortare än de ovala kalkflikarne. 24 4, 5, hv. blr. Fig. Reich.f.808.

Förvild. r. (*Från Sk.* till *Helsl.* här och der sparsamt förekommande i ell. omkring gamla trädgårdar.)

424. *LEUCOJUM* *Lin.* Snökllocka.

- †1 *L. vernum* *L.* stängeln enblommig; stiftet klubblikt. 24 3, 4. Fig. Reich.f.804.

Förvild. r. (*ÖG.* Vadstena klosterträdg.; Klosterorlunda i Hof enl. Kindb. *Stockh.* Dufnäs i Brännkyrka sn. *Gefle.* Källmur i en skogsäng; hvarken der eller annorstädes i *Gestr.* veterligen planterad.) *Blomman lutande, hvit, med en grön fläck i fikarnes spets.*

425. *GALANTHUS* *Lin.* Snödroppe.

- †1 *G. nivalis* *L.* stängeln enblommig; bladen 2:ne kölade. 24 3, 4, hv. blr. Fig. Fl.D. 1641. Reich.f.807.

Förvildad, r. (*Sk.* omkr. Lund; på ångar vid Öst. Torp; Dalköpinge, vest. Karaby m. fl. st. *Hall.* Hasslöf etc. Upp till *Södm.* t. ex. Åkers sn i parken vid Berga. *Öl.* — *N. Bergen.*) *Fingerhög, med hängande blomma.*

- 87 Fam. *HYDROCHARIDEÆ* *Juss.* Blr skiljd-könade, med 3 kronlika och 3 foderlika kalkblad. Frukt flerrummig, med fröfasten på väggarne.

426. *STRATIOTES* *Lin.* Dyborre.

- 1 *S. aloides* *L.* bladen jemnbreda, kölade, i kanten taggiga. 24 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D. 337. Reich.D.Fl.f.111.

Stillast. vatt. (*Sk.* Smål. vid Vettern; samt Melby i Ukna: Scheutz.—*Helsl.* Vestml. Ner. Verml. — *N.* i Ofoten: Gunn. enl. Bl.) *Bladen från rotstocken, i en krets, från hvars midt ell. sida blomstängeln uppskjuter; hela växten före och efter blomn. nedsänkt under vattnet.*

427. *HYDROCHARIS* *Lin.* Dyblad.

- 1 *H. Morsus ranae* *L.* bladen runda med hjertlik bas. ☉ 7, hv. blr. Fig. Sv.B.598. Fl.D.878.

Stillast. vatt. (*Sk.*—*Helsl.* Vestml. Ner. Verml. Boh.) *Örten flytande; bladen tumsbreda, med form af Näckblad; honblr mer sällsynta. Sätter knappt mogen frukt i Sv., utan förökas genom knoppar. som affalla och öfvervintra i dyn, hvarifrån de följ. år flyta upp och utvecklas till nya plantor.*

- 88 Fam. **NAJADEÆ** Link. Blr skiljdekönade. Kalk enkel flasklik, tätt omslutande befruktningsdelarne. Stånd. 1, med 4rumm. knapp. Fruktämne enrummigt, slutl. bildande en af kalken beklädd nöt.

428. **NAJAS** Lin. Nateserf.

- 1 *N. marina* L. bladen *motsatta*, ell. vid grenarne 3 i *krans*, jemnbreda, skiftevis och något bugtigt *tandade*; frukten aflångt äggformig. ☉7—9. — *β muricata*: stjelken taggig med röda leder. Fig. V.Ac.H.1837,t.8. Fl.D.2121. H.N.f.4, n:o 84.  
Hafsvik. r. (Sk.—*Gestr.* Hall. Halmstad: Theor. Gottl. Fardume träsk; Pavik i Vester-garn enl. G. v. Ced. — N. Christiansand; Hvalöarne, på Kirköe.) *Växer och blom-mar under vattnet; hanväxten sällsyntare. Ståndarknappen vanl. uppbristande oordentligt och utan sträng; men, upplages växten ur vattnet, ser man den stundom få en kort sträng och öppna sig i 4, tillbakarullade flikar.* — *N. major* Roth.
- 2 *N. flexilis* Roslk. bladen 5—6 i *krans*, jemnbreda, *mot spetsen* småtandade; frukten som hos föreg. ☉7—9. Fig. Willd.Act.Ac.Ber.1798,p.89,t.1,f.1. H.N.f.14, n:o 77.  
Insjöar, r. (Uppl. i sjön Hederviken nära Braheberg i Närtuna sn.) *Växelsätt och frukt likasom hos föreg.; hela växten mycket spädare, med bladen nedtill helbräddade, endast mot spetsen omärkligt småtandade.* — *Caulinia* Willd.

## 14 KLASSEN

### LILIIFLORÆ.

89 Fam. **LILLACEÆ Juss.** Kalk kronlik. Ståndarknappar öppnande sig inåt. Stift 1, ell. 0. Fruktämne 3rumm., 3skaligt, med centrala, mångfröiga fröfästen. [Afvikande slägte: *Paris*.]

1 Flocken **Tulipesæ.** Kalk 6bladig. Frukt: fröhus med platta frön, staplade tätt på hvarandra. [Lökväxter.]

#### 429. TULIPA Lín. Tulpan.

†1 *T. silvestris* L. bladen lancettlika; blomman ensam, lutande; ståndarsträngarne vid basen ludna; pist:s märke tvärhugget. 2 5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.202. Fl.D.375. Od. st. r. (*Sk. Blek. ÖG. Hall. Gottl.*; samt flerstädes i gamla trädgårdar förvildad, upp till *Uppl.*) Märket hos de odl. arterna har 3 tillbakarullade flökar.

#### 430. FRITILLARIA Lín. Kronlilja.

1 *F. Meleagris* L. alla bladen skiftevisa jemnbreda rännformiga; 1-, sällan 2blommig. 2 5, 6. Fig. Sv.B.376. Fl.D.972. H.N.f.13, n:o 75. Fukt. äng. r. (*ÖG. Adelsnäs; Norrköp., samt Spellinge i v. Harg sn. Södm. Strengnäs vid Olivehäll; Tista slott och Nyköping enl. Leffl. Stockh. flerstädes. Uppl. Svartsjölandet på Kalfudden; Norrtelje vid Lovisedal, ymnig; Uppsala-trakten på alla ångar; Söderfors, Untra mosse enl. Leffl. Gefle, nära Sockerbruket. Vestm. i Säterbo vid Reutersberg. Gottl. Klintebys i Klinte sn. — N. Christiania och Drammen; Bergen: Bl.) Blrna stora hängande, damspelsrutiga, bruna, stund. hvita.*

#### 431. LILIUM Lín. Lilja.

†1 *L. bulbiferum* L. bladen strödda, jemnbredt lancettlika; blrna upprätta, klocklika, invändigt stråfprickiga. 2 6, 7, brandg. blr. Fig. Sv.B.398. Äng. och odl. st. r. (*Smål. Fryeled vid Näsbyholm; Björneberg nära Jönköping; Vimmerby: Dr Lund. ÖG. mångenstädes enl. Kindb. Södm. Aspön, Vedhörna-ängen enl. Linné; i en äng mell. Öfver-Selö kyrka och Landshäls; Ytter-Selö, i Målsåkers äng. Uppl. Bro sn, på en holme i Lejondalssjön. Rosl. i Norrteljetrakten; i närheten af Björnö. Vestm. vid Ängsö färja, och på Björnön. Verm. Hornkullen i Kroppa sn; Långbanshyttan. VG. Billingen; Kinnekulle. — N. Tönsberg, i parken vid Berg.) Har bruna knopplökar i bladvecken.*

†2 *L. Martagon* L. bladen kranssillande, äggrundt lancettlika; blrna i klase, nedböjda, med tillbakarullade, vid honingsfållen häriga kalkblad. 2 7. Fig. Sv.B.381. Förvild. r. (*Sk.—Helsl. i gamla parker och trädg.) Blrna röda, brunfläckiga.*

- 2 Flocken **Asphodeleæ**. Kalk af 6, fria eller samväxta blad. Frukt fröhus, med tjocka, runda ell. kantiga frön. [Lökväxter utom *Anthericum*.]

## 432. ALLIUM Lin. Lök.

† Hvarannan ståndarsträng 3gafflad, med knappen på mellanfliken: *Porrum Tourn.*

- 1 *A. Scorodoprasum* L. bladen *platta* med *2eggade* slidor; blomflocken med knopplökar; kalkbladens köl *småknöttrig*; ståndarsträng *icke* utskjutande. 2 7, viol. blr. —  $\beta$  minus: stjelk och blad hälften smälare; bladslidorna mindre plattade. Fig. Fl.D. 1455;  $\beta$  290. Reich.D.Fl.f.1073;  $\beta$  1074.  
Lund. r. (Sk.—Uppl. Vestml. flerstädes. VG. Boh. Öl. Gottl. — N. Svenneröer vid Fredriksvärn. —  $\beta$  sandäkrar: Sk. Falsterbo etc. Öl. i Sandby. Gottl. Lumme-lund vid Kinner's gästg.) Bladen 2—4 lin. breda. —  $\beta$  *A. arenarium* Lin. herb. och Sm.  
2 *A. arenarium* L. bladen n. *trådlika*, jemte slidorna *trinda*; blomfl. med knopplökar; kalkbladens köl *slät*; ståndarsträngarnes sidoflikar långa trådlika *utskjutande*. 2 7, viol. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.691. Fl.D.2227. H.N.f.8, n:o 69.  
Back. sand. st. r. (Sk.—Stockh. Rosl. Söderön. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. och vest. del till Trondhjem.) Utmärkt af de *trinda* bladen; blrna små, vanl. *utskjutande i toppen af knopplöksamlingen*. — *A. vineale* L.Sp.Pl.

†† Alla sträng. enkla syl-rika.

\* Blomflock med knopplökar.

- 3 *A. carinatum* L. bladen jemnbreda, *plattade*, *släta*; blomhölsterbladen med lång 3-kantig udd; stånd. *dubbelt längre* än de *tvärhuggna* ell. *intryckta* kalkbladen. 2 7, r. blr. Fig. Fl.D.2109. Reich.f.1057. H.N.f.6, n:o 64.  
Buskväxta äng. r. (Sk. vest. Vram, omkr.  $\frac{1}{2}$  mil närmare Christianstad, bland småskog vid vägen; Lund, Fogelsång på norra sidan etc. — N. vid ett landtställe nära Christiania.) *Lik följ., men skild med de långa ståndarne och platta bladen*.  
4 *A. oleraceum* L. bladen vanl. *halftrinda*, något sträfvä, under *kantigt nerviga*; hölsterbl. som hos föreg.; stånd. af de trubbiga, *kort uddspetsiga kalkbl.: längd.* 2 7, 8, r. ell. brung. blr. Fig. Fl.D.1456. Reich.f.1067.  
Äng. berg. a. (Sk.—Ängml. och Jeml. Brunflo. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) Var. med *plattade blad: complanatum*, samt med *rännformiga: canaliculat.*, hvilken *sednare form* vanligen varit *ansedd såsom Linnés A. carinatum*.

\*\* Blomflock utan knopplökar.

- 5 *A. Schœnoprasum* L. stjelk. *trind*; bladen vanl. *trinda*, *ihåliga*; blomflock. n. *klotrund*; stånd. *kortare* än kalken, syl-rika med bredare, otandad bas. 2 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.89. Fl.D.971. H.N.f.7, n:o 70.  
\* *sibiricum* L. större och gröfre; bladen ofvanpå *plattade*. Fig. H.N.f.7, n:o 69. Reich. f.1086.  
Klipp. helst på hafskust. (Blek.—Uppl. Boh. Öl. Gottl. — \* Jeml. Bergs sn, Vigge by nära Hofverberget. — N. Finnm. t. ex. Senjen, Skjervö, Alten, Porsanger m. fl. st.: Norm.) Prof. Fries anser *A. sibir.* som *hufvudart och a* som *underart med namnet schœnoprasoides*.  
6 *A. montanum* Schmidt: stj. *upptill kantig*; bladen *platta*, *jemnbreda*; blomfl. *konvex*; ståndarne *betydl. längre* än kalken. 2 7, ljusr. blr. Fig. Reich.f.1094. H.N. f.5, n:o 70.  
Stenback. torra st. r. (Sk. Åhus i Espet vid Helgeåns utlopp. Dalsl. allmän genom Ed sn; samt Rölunda, Gesäter och Lerdal snr vid Bohusgränsen.) Löken *fästad vid en krypande rotstock; bladen ej bredare än stjelken; hölsterbladen korta*. — *Allium fallax* R. & S. *A. angulosum* Lin. herb.  
7 *A. ursinum* L. stjelken *kantig*; bladen skaftade, *platta lancettlika*; blomflock. *få-blommig*, *jemnhög*; stånd. *kortare* än kalken. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.236. Fl.D. 757. H.N.f.2, n:o 61.



Lund. r. (Sk.—Rosl. VG. Kinnekulle etc.; Göteborg. Dalsl. Öl. Gottl. — N. söd. och vest. delar upp till Molde.) *Bladen tumsbreda*.

433. *ANTHERICUM* Lin. Sandlilja.

1 *A. Liliago* L. stängeln enkel bladlös; rotbladen jemnbreda; blrna platta, n. i klase; stiftet *nedböjdt, kortare* än kalken. 2½ 6, hv. blr. Fig. Sv.B.403. Fl.D.616. H.N.f.10, n:o 62.

Torra st. r. (Sk. östra del, mell. vest. Vram, Maltesholm och Vidtsköffe; Degeberga; Rafunda; Kivik; mell. Rörum och Viks fiskläge etc. *Blek.* vid norra Hoka. Öl. vid Gösseunda i Hukerstads sn.) *Gröfre, med längre rotblad, större [tumslånga] kalkblad än följ.; rot af ett knippe trådar.*

2 *A. ramosum* L. stäng. från midten *grenad*; rotbl. jemnbreda; blrna platta, i flere klasar; stiftet *upprätt, längre* än kalken. 2½ 7, hv. blr. Fig. Sv.B.671. Fl.D.1157. H.N.f.6, n:o 65.

Torra st. r. (Sk. öst. del: Brösarp; Vidtsköffe; Lillö; Åhus; Årup etc. Öl. Gottl. — N. Kongsberg på Johnsknuden; Christiania, på Egeberget: Bl.; i sednare tider icke funnen.) *Rot som hos föreg.*

434. *ORNITHOGALUM* Lin. Stjernlök.

†1 *O. nutans* L. bladen jemnbredt lancettlika; blfrna i *ensidig klase*, hängande, med skaft *kortare* än skärmbleden. 2½ 5. Fig. Fl.D.912. Reich.D.Fl.f.1031.

Skugg. st. r. (Sk. Lund; Ljungby; Araslöf; Maltesholm. *Blek.* Asarums prestg.: Gosselm. *Smål.* Kalmar, och Hosmo vid Binga. ÖG. Sturefors m. fl. st.: Kindb., förvildad; äfvensom vid *Stockholm* i Carlbergs park. *Vestml.* på Fullerön. *Hall.* Dömmestorp; Skottorp: Theor.) *Lökväxt med perlhvita blr, 2 tum vida. — Albuca Reich.*

†2 *O. umbellatum* L. bladen jemnbreda rännformiga, med en hvit rand efter midten; blrna i n. jemnhög *qvast*, med skaft *längre* än skärmbled. 2½ 5, 6. Fig. Sv.B.388. Fl.D.1266.

Odl. st. r. (Sk. Lund; Skabersjö; Malmö etc. *Blek.* Carlskrona, Ronneby, Carlshamn etc.: Goss. ÖG. Gusum m. fl. st. *Hall.* Öl. Algutrum, och kring Thorslunda kyrka. *Gottl.* enl. Reuterm.; samt flerestades förvildad. — N. Christiansand.) *Blrna tumsvida, snöhvita, utvänd. grönskliga.*

435. *GAGEA Salisb.* Vårlok.

† Med 3, sammanhängande knöl-lika lökar.

1 *G. stenopetala* Reich. bladet från löken, vanl. ensamt, jemnbredt; blomskafsen enkla glatta; kalkbladen n. jemnbreda, spetsiga, sjelfva spetsen trubbad. 2½ 4, 5, g. blr. — *β pratensis* Koch: högre växt; det nedre skärmbledet med basen omslutande blomskafsen; kalkbl. trubbiga. Fig. Fl.D.2225. Reich.D.Fl.f.1033—37; *β* 38. H.N.f.2, n:o 62; *β* 63.

Odl. st. äkr. *β* äng. fukt. st. r. (Sk. isynnerh. i vest. del. *Blek.* Carlskrona, Boråkra, Carlshamn etc. enl. Goss. *Smål.* Kalmar; Vestervik; Vimmerby: Dr Lund; Vexjö, Kampen. ÖG. Linköping, vid Hunnebergstull. *Stockh.* Bergsjö; Ulriksdal; Blecktornet. — *β* Sk. Uppåkra. *Blek.* Lyckeby flerst.; Carlskrona, på Verkö; Spändeltorp; Afvelsgårde och Marielund.) *Örtbladen ett par linier breda; kalkbladen n. tumslånga. — Ornithogalum Fr. Nov. Gagea polymorpha Schultz.*

†† Med en enda, enkel, ell. inuti sammansatt lök.

\* Ört-[rot]-blad från löken ett enda.

2 *G. lutea* Ker: örtbladet *lancettlikt* jemnbredt; blomflocken *oskaftad* med enkla, glatta blomskafst; kalkbladen rundadt *trubbiga*. 2½ 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.634. Fl.D.378. H.N.f.14, n:o 72.

Odl. st. a. (Sk.—Helsl. Ner. *Verm.* söd. delen. *Hall.* Öl. *Gottl.* — N. till Lofoden.) — *Ornith. L.*

3 *G. minima* Schult. örtbladet *smalt* jemnbredt; flöcken *skaftad*, fåblomm.; kalkbl. *smalspetsade*. 2½ 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.494, f.1. Fl.D.1331. H.N.f.12, n:o 71.

Odl. st. a. (Sk.—Helsl. *Ängml.* Säbrå; Ytter-Lännäs: Arn. *Dal. Verm.* Sjöstad i

Ölme härad. *Hall. Öl. Gottl.* — *N.* mycket sälls. funnen vid Bergen; äfven uppgifven för Trondhj.) *Mindre än de föreg.; örtbl. ofta en god linie bredt; hos de unga sterila lökarne n. tagelsmall.* — *Ornith. L.*

\*\* Rotblad 2 ell. flere.

- 4 *G. arvensis* *Schult.* örtbl. n. trådsmla, krökta; flocken skaftad, mångblommig, med *långt småludna* blomskäft, och 2 stora och breda skärblad vid flockskäftets bas; kalkbladen *spetsiga*, utvänd. *småludna*. 2 4, 5, g. blr. Fig. Fl.D.1869. Reich.f. 1049, 1050.

Åkr. och odl. st. r. (*Sk.* åkr. nära Trelleborg. *Blek.* Carlskrona, i parken enl. Gossehm.) *Ofta lågväxt, med teml. små, men talrika (5—10) blr.* — *Ornith. Pers. G. villosa* *Dub.*

- 5 *G. spathacea* *Schult.* örtbl. som hos föreg., raka; flocken skaftad, fåblommig, med *glatta* blomskäft och ett *ensamt*, bredt skärblad; kalkbl. *trubbiga, glatta*. 2 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.494.f.2. Fl.D.612. H.N.f.1, n:o 67.

Fukt. lund. r. (*Sk.* Rosten; Roslätt; Ramlösa och Gyhytt, etc. i bokskogarne. *Blek.* Verkö, m. fl. st. omkring Carlskrona. *Smål.* Jönköping vid Rosenlund, samt Husqvarna. *Dalst.* Backa och vid sjön Kälungen i Gunnarsnäs sn. *VG.* Göteborg flerstädes. *Boh.* Uddevalla, Marieberg.) *Har sällan mer än 3 blr, lika smärre former af G. lutea.* — *Ornith. minimum* *β* *Wg.*

#### 436. MUSCARI *Mill.* Perldrufva.

- †1 *M. botryoides* *Mill.* bladen upprätta jemnbreda rännformiga, mot basen smalare; blrna n. klotrunda, de nedre i klasen något glesare. 2 5, b. blr. Fig. Reich.D.Fl.998.

Äng. och gamla parker, r. (*Smål.* Vexjö i åkrar vid Kampen. *ÖG.* flerst. i Stångådalen, samt vest. om denna enl. Kindb. *Stockh.* Djurgården nära Fiskarbro-backen; Lidingön, Ekholmsnäs m. fl. st. *Uppl.* Forsmark i Klockarhagen; Löfsta bruk. *Gefle*, i Printzens vret. *VG.* Kinnekulle. *Hall. Öl.* Tveta gårde.) *Hyacinthus* *L.*

- 3 Flocken **Asparagess.** Kalk af 6, sällan 4 eller 8, merändels samväxta blad. Frukten bär. [Växter med rotstock.] — *Undant. Paris* med kalk af 8, n. fria blad.

#### 437. ASPARAGUS *Lin.* Sparris.

- 1 *A. officinalis* *L.* stjelken upprätt, trind; bladen knippvisa trådsmla glatta; ståndarsträngarne lika långa som de aflånga knapparne. 2 7, 8, gröng. blr. Fig. Sv.B.213. Fl.D.805.

Grus. st., hafsstr. r. (*Sk.* Malmö; L. Hammar; Ystad; Sandhammar. *Blek.* Nettraby. *Smål.* Kalmar. *ÖG.* Vallerstad; Vinnerstad etc. *Stockh.* på Tallholmen och Edsholm i Värtan; Lidingön. *Hall.* Gåsevad; Balgö. *Boh.* Vinga ö, ymnig. *Öl.* Husvalla; Rälla. *Gottl.* Lummelund. — *N.* Christiania i Dragonskoven och på stranden vid stora Bäckelaget etc.) *Blrna mest parvisa i bladveckan; bären röda.*

#### 438. CONVALLARIA *Lin.* Konvalje.

† Blrna klocklika, i klase.

- 1 *C. majalis* *L.* stängeln bladlös; rotbladen ovalt lancettlika; klasen ensidig. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.9. Fl.D.854.

Skogsback. a. (*Sk.—Pit. Lpm.* och *VB.* till Öfver-Kalix. — *N.* till Nordl.s gräns.) *Blrna vålluktande; bären gulröda.*

†† Blrna rörformiga, i bladveckan: *Polygonatum* *Tourn.*

- 2 *C. verticillata* *L.* stjelken *kantig*; bladen *kranssittande*, jemnbredt lancettlika. 2 6. Fig. Fl.D.86. Reich.D.Fl.f.966.

Bergstr. r. (*Sk.* *Hall. Smål.* vest. del. af Jönk. län, samt flerst. i mell. delen: Scheutz. — *Jeml.* i de vest. prov. *Um. Lpm.* på en holme i ån nära Stensele. *Ängml.* — *N.* till Ost-Finnm.) *Blrna hvita, med grönakt., invändigt håriga stikar; bären gulröda.*

- 3 *C. Polygonatum* *L.* stjelken *kantig*; bladen *skiftevisa*, ovala—bredt lancettlika; blomskäften 1—3blommiga; kalkens stikar och ståndarsträng. *glatta*. 2 5, 6. Fig. Sv.B. 41. Fl.D.377.

Back. (Sk.—VB. och Jeml. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj. och Snaasen: Bl.) Blomskafren mest enblommiga, blrna hvita med grönakt. flikar; bären svartblå. — *Polygonatum officinale* All.

4 *C. multiflora* L. stjelen trind; bladen som hos föreg.; blomskaf. sterblommiga; kalkflik. invändigt jemte ständerstr. småhåriga. 2 5, 6. —  $\beta$  *bracteata*: det gemens. blomskafet utdraget till en liten gren, med skärm vid blrna. Fig. Sv.B.392. Fl.D. 152.  $\beta$  Reich.f.963.

Lund. r. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Götll.? — N. söd. del af Aggerhus och Christianss. st. —  $\beta$  Uppl. Roslagsbro i en äng vid Lundaude. Södm. Tosterön, Stenby äng. VG. Kinnekulle, Hellekis munkäng.) *Dubbelt större än föreg., hvars sterblommiga varr. ofta tagas för denna, ehuru lätt skiljda på stjelen, som hos C. multifl. saknar alla kanter; blr smalare; bär som hos föreg. —  $\beta$  C. bracteata* Thom.

## 439. SMILACINA Desf.

\*1 *S. stellata* Desf. bladen aflånga—lancettlika, skiftevisa, glatta; blrna i tät klase, i stjelen topp.  $\odot$  6, hv. blr. Fig. H.N.f.15, n:o 70.

Bergstr. r. (N. på nordvestra sidan af Gräfsenås, omkr. 1 mil norr om Christiania.)  $\frac{1}{2}$ —1 f. hög, till stiel och blad något lik de begge sista arterna i föreg. slägte, men har alla blrna i toppen; bären svarta. — *Convallaria* L. *Majanthemum* Link.

## 440. MAJANTHEMUM Web. Ekorrbär.

1 *M. bifolium* DC. bladen oftast 2, skiftevisa, skaftade, hjertlika, på öfre sidan glatta; blrna i klase. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.454. Fl.D.291. H.N.f.16, n:o 64.

Fukt. skogsmark, a. (Sk.—Lpl. Öl. Götll. — N. till Nordl.: Norm.) *Bären gula, fläckiga, stull. röda. — Convall. L. Smilacina* Desf. *Maj. Convallaria* Web.

## 441. PARIS Lin. Ormbär.

1 *P. quadrifolia* L. bladen meränd. 4 i krans [säll. 3, 5 ell. 6], bredt omv. äggrunda, spetsade, glatta; blomma ensam. 2 5, 6. Fig. Sv.B.6, Fl.D.139.

Lund. a. (Sk.—VB. nor. del och Torn. Lpm. Boh. Öl. Götll. — N. till Ost-Finnm.) *Stjelen enkel, med en grön blomma i toppen; bäret svartblått.*

90 Fam. COLCHICACEÆ DC. Kalk kronlik med 6deladt bräm. Stånd. 6, med utåt bristande knappar. Stift 3. Fröhus af 3, helt och hållet, eller endast vid basen hopväxta småfrukter med centrala fröfästen.

## 442. COLCHICUM Lin. Tidlösa.

+1 *C. autumnale* L. löken 1—3blommig, vid blomningen bladlös, sedan uppskjutande lancettlika uppräta blad; kalkens flikar aflånga trubbiga. 2 9, 10. Fig. Fl.D.1642. Reich.D.Fl.f.949, 950.

Äng. r. (Stockholm, Ulriksdal; Agnesberg; Experimentalfältet: G. v. Ced. Uppt. Steininge nära Sigtuna, ymnig. Fordom äfven i Sk. vid Oppmanna prestg.; och i Smål. på Plåtängen mell. Grenna och Röttle.) *Blrna lika dem hos Crocus, men större, rödaktigt bleklå, med quarterslång pip, nående n. till löken. Blommar om hösten utan blad, hvilka jemte frukten utbildas våren efter.*

## 443. VERATRUM Lin. Pruströt.

\*1 *V. album*  $\beta$  *Lobelianum* Bernh. bladen omslidande stjelen, ovala spetsade; blomklasarne i tät samling; kalkflikarne utstående naggtandade. 2 8. Fig. Fl.D.1120. Fl.N.2,t.1. Reich.D.Fl.f.938.

Fukt. st. i fjelltr. r. (N. Ost-Finnm. Kjöllefjord, samt vid Lille- och Store-Lerpollen i Tanen: Norm.; mell. Hopseidet och Varangerfjorden.) *2—3 fot hög med stora blad, äfven invändigt blekgröna blr; den eg. V. album L. har dem utanpå gröna, inuti hvita.*

- 91 Fam. **ALISMACEÆ** Juss. Kalk af 6 blad, de 3 yttre oftast foderlika. Småfrukter talrika fria, ell. 3—6 mer och mindre hopväxta, men slutl. fallande från hvarandra. Stift ell. oskaftade märken lika många som småfrukt. Fröhvite 0.

- 1 Flocken **Butomeæ**. Alla kalkbladen färgade. Småfrukt. fröhuslika, endast vid basen förenade, öppnande sig på insidan.

444. **BUTOMUS** Lin. Blom-vass.

- 1 **B. umbellatus** L. stängeln trind; bladen jemnbreda, nedtill 3kantiga; blrna i flock, långt skaftade. 2 7, hv. rödl. blr. Fig. Sv.B.296. Fl.D.604.

Vatten. (Sk.—Medelp. Njurunda och Tuna sn. VB. Piteå enl. Leml.; Luleå och i Sangis elf. Jemtl. Håsjö sn. Dal. Verml. Christinehamn, Väsehärad och Arvika. Boh. Uddevalla, i Risån. Hall. Öl. Götll.) 3—4 fot hög med stor, skön blomflock.

- 2 Flocken **Alismææ**. Yttre kalkbladen gröna, de 3 inre kronlika. Småfrukter [talrika] nötlika, affall. öppnade.

445. **ALISMA** Lin. Svalting.

- 1 **A. Plantago** L. bladen äggrunda, stund. vid basen något hjertlika [mer säll. lancettl. —jemnbr.], spetsiga; blrna i långt skaftade, kransevis öfver hvarandra sittande knippen; fruktgytt. kranlika, nedplattade, af rundadt trubbiga småfrukter. 2 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.440. Fl.D.561.

Vatt. a. (Sk.—VB. nor. del och Um. Lpm. — N. till Trondhj.) Var. stundom med mer hjertlika blad: v. *cordifolium* Fr. dock utan all gräns mot den vanl. formen, samt i vatten af växlande djup och starkare ström med flytande, lancettlika, ända till smalt jemnbreda, utdragna blad.

- 2 **A. ranunculoides** L. bladen smalt lancettlika eller jemnbreda spetsade; blrna i ensam och enkel flock; fruktgytt. klotrunda, af utstående spetsiga småfrukter. 2 7, 8, hv. rödl. blr. Fig. Fl.D.122. Reich.D.Fl.f.97. H.N.f.4, n:o 87.

Vatt. torfmossar etc. r. (Sk. Trelleborg; Ystad; mellan Baldringe och Söfvesta; Roslätt; Kullaberg; mellan Rå och Engelholm etc. Smål. Gårdserum; Hannås vid sjön Vindomen; vid Gräfsjön i Tryserum; Ekstr. Hall. nära Halmstad; Vallda sn. flerst. Öl. från söd. delen till Löth sn. Götll. Vibble kalkugn; Vall; Roma; Boge m. fl. st.) Mindre än föregående med något större blr. Var. på Öl. och Götll., trol. i följd af djupare vatten, med långa jemnbreda och flytande blad: var. *zosterifolium*.

446. **SAGITTARIA** Lin. Skäkta.

- 1 **S. sagittifolia** L. stängeln enkel; bladen pil-lika med utdragna spetsadeflikar, säll. aflånga, med korta ell. inga flikar; blrna kransevisa, 3 i hvarje kran, tillhoppa bildande en klase, med de längre skaftade ♀blrna nedtill, ♂blrna upptill. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.164. Fl.D.172.

Vatt. a. (Sk. allm. Blek. och Smål. inre del. sälls. — VB. och Jemtl. — N. till Steen på Ringerige, sälls.) Första rotbl. äro jemnbreda och gräslika, lika *Vallisneria*, för hvilken de i Sv. blifvit misstagna; de följande bladen äro aflånga och flytande, med korta, knappt utstående flikar vid basen; först blommande får växten de pil-lika bladen. Var. någongång, t. ex. i Strinnefjärden i Angmt., med 3—4 tum långa fingerbredda, alldeles hela blad.

- 3 Flocken **Juncagineæ**. Alla kalkbladen n. foderlika [gröna eller gulakt.]. Småfrukter helt och hållet eller vid basen samväxta.

447. **SCHEUCHZERIA** Lin. Kallgräs.

- 1 **S. palustris** L. bladen syl-liket jemnbreda halfrinda, något rännformiga; blrna i gles klase. 2 6. Fig. Lin.Fl.L.t.10.f.1. Fl.D.76. H.N.f.15, n:o 71.

Sanka kärr. (Lpl.—Sk. söd. Hall.: Theor. och Blek. Öl. Borgaträsk. — N.) Blrna små gulaktiga med stora hängande ståndarknappar; småfrukter af ärters storlek, snedt äggformiga.

448. *TRIGLOCHIN* Lin. Sålting.

1 *T. maritimum* L. märken 6; fröhusen [de samväxta småfrukt.] *Grummiga äggformiga*, färade. 2½ 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.112. Fl.D.306.

Hälsstr. a.; vid sjöstr. r. (Sk.—VB. Mälaren på Munsön; Strengnäs i Gersinge storsång; Thorshälla; Vesterås. Uppl. vid Bjelkesta i Giresta sn; Uppsala kungsäng. Boh. Öl. Götll. — N. till Finnsm.) *Blrna i smal klase; bladen groft trådlika*.

2 *T. palustre* L. märken 3; fröh. *3rummiga, small klubblika*. 2½ 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.111. Fl.D.490.

Kärräng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnsm.) *Spädare än föreg.*

92 Fam. *NARTHECIAEÆ* Fr. Kalk kronlik 6bladig. Stånd. 6. Småfrukter helt och hållet samväxta till ett 3rumm. fröhus, ell. i toppen åtskilda, med fröfästen på skalens kanter.

449. *TOFIELDIA* Huds. Björnbrödd.

1 *T. calyculata* Wg. blomskäften vid basen försedda med ett *lancelllikt* skärmbblad, samt *till under kalken* med ett 3klufvet, foderlikt svepe; fruktens stift *syl-lika*. 2½ 6, g. blr. Fig. Sv.B.482.f.2. Fl.D.suppl.t.13. H.N.f.4, n:o 86.

Sump. mark, r. (Götll.) *Dubbelt gröfre än följ. Kalken med svepet liknar en krona med sitt foder. Bladen hos båda arterna smala, gräs- ell. svärdlika, 2—3 tum långa, plattadt 2sidiga. — Anthericum L. T. palustris DC.*

2 *T. borealis* Wg. blomsk. *utan* skärmbblad, i stället *vid basen* omgifna af det *från kalken aflägsnade*, 3klufna svepet; stift *en ganska korta*. 2½ 6, 7, hväg. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.10.f.3. Sv.B.482.f.1. Fl.D.36. H.N.f.3, n:o 57.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. fram till Oresjön. Verm. bergsl., mell. Gustafsors och Liljendahl Ängml. Vidbyggerå; Nätra och Arnäs snr; Tåsjö. Helsl. n.v. del ned till Arbrå och Ofvånåker. — N.) *3—6 tum hög med kortare ax än föreg. — Anther. calyc. β L. T. alpina Sternb. T. palustris Huds.*

450. *NARTHECIUM* Möhr. Strandlilja.

1 *N. ossifragum* Huds. bladen smalt gräs- ell. svärdlika; blrna i klase. 2½ 7, g. blr. Fig. Sv.B.489. Fl.D.42. H.N.f.14, n:o 73.

Fukt. äng. kärr. (Sk.—Jemtl. i de vest. provinserna. Ner. Askersunds sn. Smål. vest. delen till Lenhofda och Elghult; Madesjö sn i Kalmar län. Blek. mell. Eringsboda och Svarthöfdaryd; Scheutz. — N. vest. del. fr. Christianss. st. till Finnsm.) *¼—1 fot hög; hela växten, utom ståndarsträngarne, glatt. — Anthericum L.*

93 Fam. *JUNCOEÆ* DC. Kalk foder- ell. fjäll-lik, 6bladig. Stånd. 6, ell. 3. Stift 1, med 3 märken. Fröh. 3rummigt, mångfröigt ell. enrummigt och 3fröigt.

451. *JUNCUS* Lin. Tåg.

† Blomsaml. (skenbart sidositande) vid basen af ett ensamt, långt och trindt skärm, liknande en fortsättning af det bladdlösa strået; fröen ovingade.

\* Slidorna vid stråets bas ljusbruna, glanslösa; stånd. 3.

1 *J. conglomeratus* L. strået *finstrimmigt*; blrna ganska talrika, gytttrade i ett *rundadt hufvud* ell. *kortgrenigt knippe*; kalkbl. spetsiga; mogna fröhuset något *intryckt* i spetsen, med en *vårta* för stiftet. 2½ 7. Fig. Sv.B.479.f.2. Fl.D.1094.

Våta st. a. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verm. Öl. Götll. — N. till Lofoden.) *Stråets topp (skärmblandet) 4—6 tum långt ofvan den bruna blomgyttningen.*

- 2 *J. effusus* L. strået slätt; blrna talrika i dubbelt sammansatt, *utbredt knippe*; kalkbl. spetsiga; fröh. *som hos föreg., utan* vårta. 2 7. —  $\beta$  *subuliflorus* Drej. blrna n. dubbelt smärre; fröhuset trubbigt, icke intryckt. Fig. Sv.B.479.f.1. Fl.D.1096.  $\beta$  H.N.f.9, n:o 70.

Väta st. a. (Sk.—Helsl. Dal. och Verml. Um. Lpm. Öl. — N. till Bergen st. —  $\beta$  VG. Degeberg; Göteborg. Leml. Södm. Landsort. Blek. Saltö. Sk. Dahlby.) *Knippen vanl. grönt, 1—2 tum långt, ungefär lika långt ned som hos föreg. Strået hos växten i lefv. tillstånd slätt, hos pressade ex. finstrimligt.*

\*\* Slid. vid stråets bas glänsande; stånd. 6.

a — Strået strimligt ell. färadt, med svartbruna slidor.

- 3 *J. diffusus* Hop. strået *finstrimligt, grönt*; blrna som hos föreg.; kalkbl. sylspetsiga, *betydl. längre än fröh.*; detta omv. äggformigt, *trubbigt med udd.* 2 7. Fig. Reich. f.921.

Fukt. st. r. (Sk. Markie; Stenbyhällar enl. F. Aresch.; äfven erhållen bland *J. glaucus*, antingen från Ramlösa ell. Fogelsång. Smål. Stenbrohult.) *Lik föreg. med stort knippe, men smärre blr; skiljd från följ. med det finstrimliga strået; förmodad hybrid af begge.*

- 4 *J. glaucus* Ehrh. strået *djupt färadt, blågrönt*; blrna som hos föreg.; kalkbl. sylspets., *längre än fröh.*; detta aflängt ovalt, *spetsigt.* 2 7. Fig. Fl.D.1159. Reich.f.922. H.N.f.1, n:o 69.

Fukt. st. r. (Sk. vest. och söd. del. t. ex. Benestad; Lund vid Getinge, Dalby, Fogelsång etc.; Ramlösa; Svenstorp i Odarslöf sn. m. fl. st. Öl. vid lilla Dahlby och Vesterstad i Kastlösa sn. Gottl. Fårön i flygsanden vid Sudergårda.) *Strået 2—3 fot högt, styft, ehuru small, med små blr. — J. inflexus* Retz.

b — Strået slätt; med bruna slidor.

- 5 *J. ballicus* Willd. blrna i knippe af 3—4, oliklånga mångblommiga skaft; kalkbl. ägrundt lancettl., spetsade, *de inre med udd*; fröh. elliptiskt, *trubbigt med udd.* 2 7. —  $\beta$  *inundatus*: strået lägre och dubbelt spädare med fåblommigt knippe. Fig. Sv.B.479.f.3. H.N.f.1, n:o 68.  $\beta$  Fl.D.2287. Reich.f.916.

Hafsstr. och fjellmyrar. (Sk. ÖG.—VB. Haparanda. Lul. Lpm. Qvikkjokk; Rovejaure; H. Widm. Pit. Arjeploug; Wallåiwe; Kåbrenoiwe. Jeml. Frösön. Hall. Gottl. Fårön; Sandön: Eis. och Stuxb. — N. från Christianss. st. till Ost-Finnm. —  $\beta$  Sk. Ystad. — N. Lofoden.) *Strået grönt och teml. styft, knappt märkligt strimmadt, blr och fröh. bruna, mycket större än hos de föreg. Fröh. hos Östersjöformerna väl så långa som kalken, hos de Lappska kortare, för öfr. icke skiljda. — J. glaucus* Wg.Fl.L. *J. glauc.*  $\beta$  *litoralis* Wg.Fl.Su.

- 6 *J. arcticus* Willd. blrna 5—12, gytttrade n. *utan skaft* på sidan nära toppen; kalkbl. ägrunda, de yttre spetsiga, *de inre trubbiga*; fröh. ovalt, *mycket trubbigt med udd.* 2 7, 8. Fig. Sv.B.479.f.5. Fl.D.1095. H.N.f.3, n:o 58.

Fjelltr. (Torn. Lpm. fjellryggen vester om Torn. träsk. Lul. Lpm. fjellen kring Wirthaure; Rovejaure och Rapawagge; H. Widm. Pit. Lpm. flerst. Herjed. i Ljusnadalén och vid Midtälven; Funnesdalen. — N. Finnm.—Gudbrandsdalen.) *Strået fotshögt med något stora bruna blr och fröh. i hufvud 1—2 tum nedom stråets topp, långt krypande rostlock. — J. conglomeratus*  $\beta$  L. *J. effusus*  $\beta$  Fl.D.

- 7 *J. filiformis* L. blrna i glest n. enkelt knippe, n. *midt* på det trädlika veka strået; kalkbl. lancettlika, *spetsiga*, vanl. kortare än fröh.; detta n. *klotrundt.* 2 6, 7. Fig. Sv.B.479.f.4. Fl.D.1207.

Fukt. st. a. (Lpl.—Sk. Öl. Gottl. — N.) *Blr och fröh. gröna, ell. mycket ljusbruna, fästade långt ned på strået. Dettas slidor förlängas stundom till ett kort bladämne.*

†† Blomknippe inom flere skärm, af hvilka det yttre långt, upprätt, trindt, liknande en fortsättning af strået; fröen vid ändarne vingkantade.

- 8 *J. maritimus* Lam. stjelen nedtill med slidor bärande trinda oledade blad; kalkbladen lancettlika, de yttre spetsiga, de inre trubbiga med udd, af det sprötspetsade fröhs längd, 2 7, 8. Fig. Fl.D.1689. Reich.D.Fl.895. H.N.f.9, n:o 69.

Kärrakt. hafsstr. r. (Blek. på Rörskärfvet och holmen St. Helena utanför Sölvisborg

enl. Gosseim.; Sälög, 1 mil öst. om Carlskrona. *Smål.* vid Horsö, Värnanäs, Björnö m. fl. st. nära Kalmars.) *Knippet af gylltrade blir, på oliklånga skaft, skenbart från sidan af strået, hvilket synes fortsatt af det ena långa skärmlbladet.*

+++ Blomknippe i det bladiga stråets topp, med korta skärm; fröen ovingade.

\* Bladen knutigt ledade\*).

a — Alla kalkbladen likformiga.

- 9 *J. obtusiflorus* Ehrh. strået upprätt, styft, 1—2bladigt; bladen trinda; blomknippet med *utsperrade* grenar och *tillbakaböjda* blomhufvud-skaft; *alla* kalkbladen *trubbiga*, n. af det spetsiga fröhusets längd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.615. Fl.D.1872. H.N. f.1, n:o 70.

Kärr, r. (Sk. vid Köpings-å, Öja, Högsta, Benesta, Baldringe, Ramsåsa etc. *Gottl.* Visby, mell. St. Görans och Snäckgårdet; Lummelund; Hau; Fardume; Bähl; Löjsta; Klinte etc.) *Strået 1—3 fot högt, med jemförelsevis litet, grönt ell. blekbrunt knippe, 2 knappt 3 tum i diam. — Rotstocken hos denna och de 3 följ. krypande.*

- 10 *J. silvaticus* L. strået upprätt, vanl. *flerbladigt*; bladen n. trinda; knippet 2—3 gånger sammansatt, med *utstående* grenar; *alla* kalkbladen *kort utspetsiga*, kortare än det kort sprötspetsiga fröhuset. 2 6, 7. Fig. Reich.f.906—908. Fl.D.2112. H. N.f.16, n:o 65.

Stränd. särd. hafskust. (Sk.—*Helsl. Vestml. Verml. och Dalsl. Hall. Öl. Gottl.* — N. till Trondhj. st.) 1—2 fot hög, ofta med mycket sammansatt knippe. — *J. articulatus* β *silv.* *J. acutiflorus* Ehrh.

b — De yttre kalkbl. spetsiga ell. utspetsiga, de inre trubbiga.

- 11 *J. articulatus* L. strået *uppsliggande*, ell. *nedliggande*, *flerbladigt*; bladen *sammanstryckta*, tydl. ledade; knippet sammansatt, med *utstående* grenar; *alla* kalkbladen lika långa, de *yttre utspetsiga*, de inre trubbade, kortare än det sprötspetsade fröhuset. 2 6, 7. — β *aquaticus*: med nedligg. ell. flytande, rotsläande strå. Fig. Fl. D.1097. Reich.f.902—904. H.N.f.5, n:o 71.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. med *lägre strå och mindre sammansatt knippe än föreg.*; fröh. n. *svarta och glänsande*. — *J. lamprocarpus* Ehrh.

- 12 *J. alpinus* Vill. strået *upprätt*, 2—3bladigt; bladen *trinda*, otydl. ledade; knippe föga sammansatt med n. *upprätta* grenar; *alla* kalkbladen lika långa, de yttre trubbiga med en kort udd i ell. tätt under spetsen, de inre trubbiga, kortare än det spetsiga fröhuset. 2 6, 7. — β *rariflorus*: knippet glest, med 2—5blommiga ljusbruna blomhufvud. — γ *uniceps*: ett par tum hög, med 1—2, små blomhufv. i toppen. Fig. Fl.D.2171. Reich.f.896—900. H.N.f.6, n:o 66; β f.7, n:o 72 [en lägre form].

Fukt. st. (Sk.—Lpl. — N. till Finnsm.: Norm. — γ Lpl.) *Strået ½—1 fot högt, spensligt, i fjellen med mångblommiga svarta blomhufvuden: J. alpestris* ed.1. — *J. nodulosus* Wg. *J. ustulatus* Hoppe. *J. atratus* från *Gottl. Fr.Mantl.*3: en form med något mindre blir och kortare fröh.

- 13 *J. supinus* Mönch. strået spensligt, lökformigt vidgadt vid roten, *flerbladigt*; bladen trådsnåla, *mycket otydl.* ledade med en fåra ofvanpå; blomknippet enkelt ell. sammansatt, af 1—6, dels skaftade, dels oskaftade blomhufv.; kalkbl. lika långa, de yttre spetsiga, de inre trubbade, n. af det trubbiga fröhusets längd. 2 6, 7. — β *repens*: strået nedligg. ell. flytande, rotsläande; blir i bladvecken. — γ *nigritellus* Koch: spädare, med smärre, svartbruna blomhufvud, något intryckt fröh. Fig. Fl.D.1099. Reich.f.882—886. H.N.f.2, n:o 64; γ f.5, n:o 72.

Fukt. st. (Sk.—Lpl. — N. — γ mer sällsynt.) 3—6 tum hög med *ljust grönbruna blomhufvud; sländ. har förf. funnit vara 3 hos den vanliga, men alltid 6 hos γ. Varierar med bladiga bl.hufvud: J. subverticillatus* Wulf. — β kryper ofta hela alnen omkring i grundt vallen. — *J. uliginosus* Roth.

\*) Lederna härröra af tvärvägg, som kännas, då bladen dragas mellan fingrarna, och äfven ofta synas, särdeles i torrt tillstånd.

## \*\* Bladen oledade.

- 14 *J. squarrosus* L. strået vanl. vid basen 1—2bladigt, derofvan bart; rotbladen talrika trådlika rännformiga styfva utböjda; kalkbl. något spetsade, af fröhusets längd. 2/7. Fig. Fl.D.430. Reich.f.893. H.N.f.15, n:o 72.

Kärräng. (Sk. Blek. Smål. i vest. och mell. delen; äfven vid Jönköping: Scheutz. Hall. Boh. Oroust, nära Svanesund; Uddevalla. VG. Ner. Porla; Lassåna. Jemtl. fjell. Lpl.: Linné. Öl. — N. allm. i vest. del. till Örlandet i Trondhj. st.; sälls. i Aggerhus st.) Stel och seg, vid roten tufvad och bladig växt.

- 15 *J. compressus* Jacq. strået vid midten enbladigt; bladen trådsmla rännformiga; kalkbl. rundtrubbiga, kortare än det n. klotrunda fröhuset. 2/7. Fig. Fl.D.431. Reich.f.890—92. H.N.f.9, n:o 71.

\* *Gerardi* Lois. fröh. något mer 3kantigt och spetsigt. Fig. Wg.Fl.L.15. Fl.D.2411. Reich.f.888. H.N.f.10, n:o 63.

Sand. och fukt. st. a. (Sk.—VB. nor. del. Jemtl. — N. — \* Hafsstr. Sk.—VB. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) Var. från 3—15 tum hög, med krypande rot, som är tydligare och mindre tufvad hos *J. Gerardi*, hvars blr äro brunare och något större än hos a; för öfrigt äro de af Koch och fl. gifna karakt. icke beständiga: *J. bottnicus* Wg.Fl.L. — a *J. bulbosus* L.

- 16 *J. bufonius* L. strået klynnedeladt, ell. enkelt, 1—flerbladigt; bladen som hos föreg.; blrna vanl. ensamma. n. oskaftade längs grenarnes sidor och i deras spets; kalkbl. spetsade, längre än det aflånga, trubbiga fröh. ☉7. —  $\beta$  *fasciculatus*: blrna 2—4 tillsammans. Fig. Fl.D.1098. Reich.f.872—76;  $\beta$  877—81. H.N.f.7, n:o 73.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 1—6 tum hög, med trådig rot; var. ett par tum hög, enkel, med längre fröh. —  $\beta$  *J. insularis* Reich.?

++++ Blrna samlade i 1—2, säll. 3, hufvudlika gyttningar i stråets topp.

\* Strået bladlöst, vid basen omgifvet af rotblad.

- 17 *J. capitatus* Weig. strået ensamt, enkelt; rotbladen borslika rännformiga; blomhufv. 3—öblommiga, med korta skärm; alla kalkbladen syl-spetsade, n. lika stora, längre än det ovala trubbiga fröhuset; fröen ovingade. ☉7. Fig. Fl.D.1690. Reich.f.862. H.N.f.1, n:o 71.

Fukt. sandstr. r. (Hall. Falkenberg; Halmstad; Eldsberga. Sk. hela kusten. Blek. Torsö i Mellby sn; Christianopel; Djupafors och Brantafors etc. Öl. Grankulla. Gottl. Spröge på en åker nära Tjengdarve; Gröttlinge sn, vid Slis och Hallinge; samt Öja sn, vid Stockviken.) 2—5 tum hög, med blomhufvud vanl. kortare än det ena upprättstående skärmbadet. — Anm. *J. pygmaeus* Thuill., ännu mindre, med flere blomhufv. och spetsadt fröh. fanns fordom i Sk. mell. Klagstorp och Hvellinge.

- 18 *J. trifidus* L. stråen flere från samma rotstock, enkla; rotbl. som hos föreg.; blomhufv. 1—3blommiga, mellan 2—3, mycket långa, trådsmla skärm; de yttre kalkbl. spetsade, de inre trubbiga med udd, n. kortare än det aflånga, sprötspetsade fröh.; fröen smalt vingkantade. 2/7. Fig. Sv.B.727. Fl.D.107 och 1691. H.N.f.10, n:o 64.

Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N.) Strå och blad trådlika, det förra vid basen omgifvet af slidor, som bära korta syl-lika bladämnen; dock är stundom i samma tufva öfrsta slidarne bladämne utveckadt till ett 2—3 tum långt blad, så att denna karakt. är otillräcklig att skilja *J. Hostii* Tausch.

\*\* Strået bladigt; fröen vid ändarne vingkantade.

a — Blomhufv. mångblommiga; alla kalkbl. spetsiga.

- 19 *J. castaneus* Sm. strået styft, nedtill flerbladigt; bladen rännformiga; blomb. 1—2, vanl. med ett utdraget, upprätt skärmbadet; fröhuset äggformigt aflångt, spetsigt, längre än kalkbladen. 2/7. Fig. Fl.D.1332. Reich.f.868. H.N.f.3, n:o 59.

Fjelltr. r. (Jemtl. Frostvikens sn flerst.; Snasahögen; Sylfjellen; Åreskutan; Alsens gästg. Herjed. Midtåkläppen; Malmagen; Skarffjellet m. fl. st. — N. Hardanger och Tellemarken till Nordl. Ost-Finnm. vid Persfjorden enl. Th. Fr.) Blomhufv. svartbruna, meränd. kortare än det ena skärmbadet; fröh. stora och svartbruna.



b — Blomhufv. fåblommiga; alla, ell. de inre kalkbl. trubbiga.

- 20 *J. stygius* L. strå och blad *trådmala*; de sednare vanl. 2, *ell. ofvan* stråets *midt*, det andra nära basen; blomh. *ensamt* ell. 2—3, något långt åtskiljda, 2—3blommiga; de *yttre* kalkbl. *spetsiga*, de inre trubb., kortare än det *spetsiga* fröb. 24 6, 7. Fig. Sv.B.497.f.1. Fl.D.suppl.t.11. H.N.f.3, n:o 60.
- Kärr, r. (Lpl.—ÖG. vest. Ny sn: Kärna mosse och Gusum: Kindb. Ner. Verm. VG. Höfröd i Grolanda, och Ramunde mosse i Sköfvened: J. Hult. Vestra Småll. Hall. — N. Nordl. Österdalen; Tellemarken; Christiania etc.) *Stundom* *fotohög*, ehuru blommande vanl. *hälften lägre*, *alltid spdd*, med *ljusbr.* ell. *gulakt. blomhufv.*, korta, *syl-ika* skärm, stora *ljusbruna* fröh.
- 21 *J. triglumis* L. strået *nedtill* bladigt, med *syl-ika* blad; blomhufv. *ensamt*, 2—4 blomm. inom ett kort skärm; alla kalkbl. trubbiga, kortare än det upprätta, *något trubbiga*, med en kort udd försedda fröb. 24 6. Fig. Sv.B.497.f.3. Fl.D.132. H. N.f.3, n:o 61.
- Fjelltr. a. (Lpl.—Herjed. — N.) *Fingerhög*; *mycket sällan* med 2 blomhufvud; korta, sällan *öfver* de gula blrna *nående* skärm; *rödbruna* fröh.
- 22 *J. biglumis* L. strået *som hos föreg.*; blomh. *ensamt*, 1—2blomm., inom ett skärm *längre* än blrna; kalkbl. *som hos föreg.*, kortare än det aflånga, i spetsen *intryckta* fröb. 24 7. Fig. Sv.B.497.f.2. Fl.D.129. H.N.f.3, n:o 62.
- Högre fjelltr. (Lpl.—Herjed. — N.) *Lik föreg.*, men med blrna *något trängda* åt *sidan* af det upprätta skärmbadet, som *meränd. när* ett stycke *öfver* dem; fröh. n. klubblika, bruna, med gula kanter.

452. LÖZULA DC. Bladtåg, Fryle.

† Knippe af greniga blomskaft, med *ensamma*, ell. blott få blr i hvarje gyttning.

\* Bladen långhåriga; blomknippets grenar n. raka, utsperrade.

- \*1 *L. maxima* Desv. bladen bredt jemnbreda ell. n. svärdlika, i kanten håriga; knippets grenar oliklånga, flere gånger delade, med 2—5 hopgyttade blr; kalkbladen *borst-spetsade*, af det *spöspetsiga* fröhusets längd. 24 5, 6. Fig. Fl.D.441. Reich.D.Fl. 861. H.N.f.14, n:o 74.
- Skog. r. (N. söd. och vest. delar, från Arendal och Christiansand till Otteröden i Nummedalen. Lofoden och Reinebring.) *Fotshög* och *mera*, med stort blomrikt knippe och *stundom* *fingerbreda* rotblad. — *L. silvatica* Gaud.
- 2 *L. pilosa* W. bladen lancettlikt jemnbreda, håriga; knippets grenar dels enkla enblommiga, dels 2—3blommiga; kalkbl. *spetsiga*, kortare än det *trubbade* uddspets. fröb. 24 4, 5. Fig. Sv.B.444. Fl.D.2533.
- Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Mindre* och med *enklare knippe* än föreg. — *Juncus* L. *L. vernalis* DC.

\*\* Bladen glatta; blomknippets grenar båglikt utböjda.

- 3 *L. parviflora* Desv. strået bladigt *ända upp* till blomsaml.; bladen lancettlika; knippet med mångblommiga grenar och skaftade *ensamma*, ell. 2—3, gyttade blr; skärmfjällen *sargade*, *hårlösa*. 24 7. Fig. Fl.D.1929. Reich.f.859. H.N.f.3, n:o 63.
- Fjellv. r. (Torn. och Lul. Lpm. Pil. Lpm. nedanför Krappesware och på Käkasa; Sartajokk: H. Widm. Herjed. på Rutstöten. — N. Ost-Finnm.—Dovre; Vaage; Filefjell.) *Blrna* *mycket små*, n. *alla* med *längre* ell. kortare skaft; *stjelen* 1—2 fot hög, ofta med  $\frac{1}{2}$  tum breda blad.
- \*4 *L. glabrata* Hop. blomknippet vanl. med *mer upprätta* grenar; skärmfjällen *hårkantade*, *knappt* sargade; för öfr. *som föreg.* 24 7? Fig. Fl.D.suppl.t.12. Reich. f.858.
- Fjellv. r. (N. Lomseggen i Gudbrandsdalen: Norman enl. Bl.) *Något mindre* och *mer smaltbladig* än föreg., *som* den *eljest* till växten *liknar*, men till de *större* och *mörkare* blrna *lik följ.* Bladen 3—4 lin. breda.
- 5 *L. Wahlenbergii* Rupr. strået *ofvan midten* *bladlöst*, ell. med ett smalt blad närmare blomsaml.; bladen smalt lancettlika, stund. vid slidöppningen *glost* håriga; knippet och blrna *som hos föreg.*; skärmfjällen *sargade* och *hårkantade*. 24 7, 8. Fig. H.N.f.8, n:o 70.

Fjellv. (*Lpl.*—*Jeml.* — *N.* Finnm. Nordl.; Valders, och fjellet Bitihodn i söd. delen.) Vanl.  $\frac{1}{2}$  fot, säll. fotshög, med ännu smalare, och endast nedtill på strået sittande blad. Blrna stora som hos föreg., svartbruna. Den ullaändska *L. spadicea* DC., med hvilken denna förr varit förväxlad, skiljer sig med tydligare hårtofs i slidmynningen och längre ståndarknappar i jemf. med strängarne. — *L. parviflora*  $\beta$  *WG.Fl.Su.* *L. glabrata* och *borealis* *Fr.S.V.Sc.p.219.*

†† Knippe af mångblommiga täta hufvudlika ax; eller ock ett ensamt ax.

6 *L. campestris* DC. bladen *platta*, mycket *håriga*; blomknippet med vanl. *talrika*, mer och mindre utdragna, *raka* skaft, *äggformiga* ax; skärmfj. *sargade*, *n. glatta*; kalkbladen uddspetsade, *längre* än det *n. klotrunda* fröhuset. 24—6. Fig. Fl.D.1333. Reich.f.831—37. H.N.f.12, n:o 73.

\* *multiflora* Lej. kalkbl. mer sylspetsade; ståndarnes sträng slutl. af omkr. knappens längd. —  $\beta$  *congesta*: axen kort skaftade, *n. hufvudlikt* hopgytrade. —  $\gamma$  *nigricans*: bladen blott vid basen ell. slidöppningen *håriga*; axen skaftade, svartbruna. —  $\delta$  *pallescens*: axen smärre, på mer utstående skaft, till färgen ljust brunaktiga. Fig. Reich.f.838.  $\gamma$  Fl.D.1692. H.N.f.15, n:o 73.  $\delta$  Lin.Fl.L.t.10.f.2. Reich.f.839. H.N.f.6, n:o 67.

Ängsback. skog. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* — \* *Sk.*—*Lpl.* — *N.*) Hufvudarten har de utblommade ståndarknapparne flere g:r längre än strängen. — *Juncus L.*

7 *L. arcuata* Wg. bladen *smala rännformiga*, *n. glatta*; blomknippet med vanl. 3—5, *n. hårfina*, *båglikt utböjda* skaft, *rundade* ax; skärmfjällen mot spetsen *långhåriga*; kalkbl. och fröh. som hos föreg. 24 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.t.4. Reich.f.840. H.N.f.7, n:o 74.

\* *confusa* Lindeb. örtbl. och slid. mer *håriga*; axen 1—4, på mindre böjda skaft; kalkbl. af fröhusets längd. Fig. Reich.f.841, 842.

Fjellv. (*Lpl.*—*Herjed.* — *N.* Finnm. till Valders. — \* *Lpl.*—*Jeml.* Snasahögen. — *N.* Ost-Finnm. till Hardanger och öfre Tellemarken.) Mycket spädare och med smärre blr än föreg.; bladen stundom med några få hår i kanten. Den i *Jeml.* växande formen, som något liknar *L. Wahlenb.*, är ännu spädare med flere, mer glesblommiga ax: var. *subspadicea* Beurl. — \* *Juncus arcuata*.  $\beta$  *Wg.Fl.L.*, som af Blytt anses vara den rätta *L. hyperborea* Br., är en medelform till följ. art.

8 *L. hyperborea* Br. bladen *platta*, *glatta*; axet *ensamt*, klot- ell. äggformigt, *säll.* 2—3 på *upprätta* skaft; skärmfj. *n. bladlika*, *glatta*; kalkbl. spetsiga af det *n. klotrunda* fröhus längd. 24 7, 8. Fig. H.N.f.10, n:o 65.

Hög fjellv. r. (*Lul.* *Lpm.* på fjellet Jägnäso. — *N.* Finnm. Dovre, på de högsta topparne, t. ex. Finnshöe vid Drivstuen, Knudshöe, Storböe etc.) *Quartershöj och styf*, mest utmärkt från föreg. genom sin *glathet* och de breda, icke rännformiga, bladen, hvari den något liknar smärre former af *L. camp.*, för hvars *sjellform*:  $\beta$  *nivalis*, den anses af Læst. och Wg. — *L. nivalis* Beurl. *L. arctica* Bl.

9 *L. spicata* DC. bladen *rännformiga*, *gleshåriga*; blrna gytrade i ett *grenigt lutande* ax; skärmfj. *sargade*, vanl. *håriga*; kalkbladen *hinnspetsade* med en *nål-lik udd*, *längre* än fröhuset. 24 7. Fig. L.Fl.L.t.10.f.4. Reich.f.844, 845. H.N.f.3, n:o 64.

Fjellv. a. (*Lpl.*—*Herjed.* *Dal.* Idre sn, på Stadjan. — *N.*) *Axet tumslängt*, *slakt*; bladen *smala*. Var. med kort, hopträngdt och upprätt ax: *L. conglomerata* Mielichh. — *Juncus L.*

## 15 KLASSEN

### SPADICIFLORÆ.

94 Fam. **AROIDEÆ** Juss. Blr gytttrade utan skaft, på en köttig kolf, med ell. utan hölster; hos 3:dje flocken insänkta inom den bladlika stammens kant. Frukt: fröhus ell. bär, affallande öppnade.

1 Flocken **Aroidesæ** versæ. Blomkolfven inom hölster; kalk 0; frukt bär.

453. **ARUM** Lin. Munkmössa.

1 *A. maculatum* L. bladen pil-lika; blomkolfven rak klubblik, omkr. hälften så lång som det strutlikt hopvikna hölstret. 2 5, 6. Fig. Fl.D.505. Reich.f.8.

Skugg. st. r. (Sk. på ön Lybeck i Krageholmssjön; Lund; Borlunda sn; Ellinge i v. Sallerup; Engelholm. Hall. Halmstad.) *Hölstret grönt; kolfvens öfre, klubblika del utan blr, svartröd; bären röda; bladen rent gröna ell. brunfläckiga.*

454. **CALLA** Lin. Missne.

1 *C. palustris* L. bladen hjertlika; blomkolfven cylindrisk, inom ett platt hölster. 2 6. Fig. Sv.B.39. Fl.D.422.

Kärr. (Sk.—VB. och Lpm. Boh. — N. Aggerhus och Christianss. st. Nordl. enl. Gunn.) *Hölstret på insidan hvitt; bären röda.*

2 Flocken **Acoroidesæ** Endl. Blomhölster 0; kalkblad 6; frukt bärlik.

455. **ACORUS** Lin. Kalmus.

1 *A. Calamus* L. stängeln ofvan blomkolfven bladlik, ganska lång; bladen svärdlika. 2 7, 8, gröng. blr. Fig. Sv.B.100. Fl.D.1158.

Stränd. (Sk.—Uppl. Dal. Norr- och Söderbärke. Vestml. Ner. Verml. Boh. Oroust, Henån. Hall. — N. Christianss. och Aggerhus st., nordligast i Hedemarken.) *Kolfven fingerlång. Hela örten, särdr. rotstocken, med skarp kryddsmak.*

3 Flocken **Lemnesæ**. Blr inom den på vattnet flytande bladlika stammens [stambladens] kant, med enbladig kalk.

456. **LEMNA** Lin. Andmat.

† Stambladen rundade, mer och mindre tjocka.

1 *L. polyrrhiza* L. rotträdarne *knippevisa*; stambladen på båda sidor *platta*, ofvan *mörkgröna*, under *röda*. ☉. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1589.

Vatten. (Sk.—Uppl. Helsl. Delsbo i Långsbo-ån. Angml. Bjerträ sn, Kungsgården. Vestml. Ner. Verml. Hall. Öl. — N. södra delen.) *Dubb. större än de 2 följ.; mycket sällsynt i Sv. med blr. — Spirodela Schleid.*

2 *L. gibba* L. rottråden *ensam*; stambladen ofvanpå *platta*, *ljusgröna*, under *skålförmigt uppsvållda*, *blekare*. ☉ 6—8. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1588.

Vatt. (Sk. Smål. vid Kalmar enl. Sjöstr. ÖG.—Uppl. Vestml. Kungsör. Ner. Hall. Öl. Strandskogen. Gottl. Visby: Vestö; Roma myr: G. v. Ced. — N. sydl. delen.) *Telmatophace Schleid.*

3 L. *minor* L. rottråd. ensam; stambladen på båda sidor *platta* och *ljusgröna*. ☉  
6—8. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1587.

Vatt. a. (Sk.—Ångml. VB. nära Sangiselfvens utlopp. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. st.) *Har oftare blr än de öfriga.*

†† Stambladen aflångt lancettlika, tunna: *Staurogeton Schleid.*

4 L. *trisulca* L. rottråd. ensam; stambladen skaftade, vanl. 3, korsvis förenade. 2 6, 7.  
Fig. Sv.B.324. Fl.D.1586.

Vatt. (Sk.—Um. Lpm. VB. med föreg. Öl. Gottl. — N. till Hedemarken.) *Ligger större delen af året under vattnet.*

95 Fam. **POTAMOGETONEÆ** Fr. Blr i ax ell. på en platt kolf: hos *Zannich.* ensamma i bladveckan. Stånd. 1—4. Fruktämn. 3—6, säll. 1, hvarje med sitt märke; slutl. nöt- ell. stenfruktlika.

1 Flocken **Potameæ.** Fruktämnen flere.

457. **POTAMOGÉTON.** Lin. Nate.

† Bladen lancettlika ell. bredare [3 lin.—2 tum; största bredden ungefär på midten].

\* Alla bladen tydligt skaftade, de öfre flytande.

a — Bladen utdraget skaftade; de flyt. läderartade.

1 P. *natans* L. de nedre bladen snart utan skifva, med kvarlemnande af de långa skaften; de öfre ovala ell. elliptiska, säll. lancettlika; axskaften *jemntjocka*; nötterna med *trubbig* rygg\*). 2 7. Fig. Fl.D.1025. H.N.f.5, n:o 73.

\* *sparganifolius* Læst. öfre bl. smalt lancettlika; de nedres flere fot långa skaft jemnbreda, hinnaktiga [fyllodier]. Fig. H.N.f.14, n:o 75.

Stillast. vatt. a. \* i rinn. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. Tromsøe. — \* Torn. och Lul. Lpm. i elfvarne. VB. flerst. i Pite-elf enl. G. v. Ced. — N. Dovre.) *De nedre, snart bortrutnade bladen smalare, men n. lika fasta som de öfre, ej så tunna som hos följ. Saknar på uttorkade ställen n. all stjelk: var. acaulis Fr. — \*, ansedd för egen art af Læst., blommor sällan, och är aldrig funnen med mogen frukt; hvarför den sannolikt endast är en af lokalen i fjellvattnen beroende form, analog med den smalblad. formen af Alisma Plant. och nordl. former af Sagittaria.*

2 P. *fluitans* Roth: alla bladen lancettlika, åt båda ändar spetsade, de nedre hinnaktiga, *quarsittande*; axskaften *upptill tjockare*; nött. med *något hvass* rygg. 2 7. Fig. Fl.D.2105. Reich.D.Fl.f.87, 88. H.N.f.9, n:o 72.

Rinn. vatt. r. (Sk. Helgeå vid Nymylla i Emitslöf sn enl. F. Aresch.; förr äfven i Rönnå. Uppl. Svartsjölandet. Väntholmen i ett floddike vester om Norrskog. Gottl. Avanäs på Färö: Vestö enl. G. v. Ced.) *Lik föreg., men med längre och tunnare blad; de öfversta dock stundom ovala. — P. natans β Wg.*

3 P. *polygonifolius* Pourr. de nedre bladen lancettlika, *quarsittande*; de öfre *aflånga* ell. något åggrunda; axskaften *jemntjocka*; nött. med *trubbig* rygg. 2 7. Fig. Reich.f.79—81. H.N.f.5, n:o 74, 75.

Bäck., diken etc. r. (Sk.—ÖG. och VG. Hall. Boh. Dalsl. Verml. Carlstad i Sandbäcken. Dal. Grangårde sn, Räfåla. — N. sydl. del. af Aggerhus st., samt Christians.

\*) Näml. innan de hunnit torka, hvilket alltid förstås, så ofta de icke beskrifvas torra, i hvilket tillstånd de stundom äfven gifva karakterer.

st. till Stavanger.) *Var. mycket; stundom med kort, krypande stielk, då blott de öfre, bredare bladen återstå. Närmar sig stundom nog mycket till följ. — P. oblongus Viv.*

b — Bladen kort skaftade, alla tunna, genomskinliga.

- 4 *P. coloratus* Fahl. de nedre bladen n. elliptiska, de öfre bredt äggrunda, allas skifva längre än skaftet; axskaften n. jemntjocka; nött. med trubbig rygg. 2½ 7. Fig. Fl.D. 1449. Reich. 82—85. H.N.f.13, n:o 77.

Stillastående vatt. r. (Sk. i Arrie torfmosse. Blek. vid Ekeberg, 1 mil från Carlshamn. Gottl. vid Erikskällan och Sjötebrunn i Båhl sn; Etelhem sn, i en bäck till Tenglingsmyr; Klintehamn; Fleringe sn, Lunderhage m. fl. st.) Skiljd från föreg. med föga annat än de korta bladskaften. — *P. plantagineus* Ducroz.  
(*P. rufescens* β; *lucens*.)

\*\* De öfre flytande bladen skaftade, vanl. läderartade; de nedre oskaftade, hinnaktiga.

a — Axskaften jemntjocka.

- 5 *P. salicifolius* Wolsf. de nedre bladen omfattande, bredt och långt lancettlika spetsiga, de flytande ovala med afrundad bas; nött. plattade, med trubbig rygg. 2½ 7, 8. — β *lanceolatus*: flyt. bladen 0; axskaften långa. Fig. Reich.f.55 [β].

Vatt. r. (VB. Tornioelf vid Kengis. — β *Torn. Lpm.* Karesuando och Muonioniska. Pit. Lpm. Arjeplog. Jeml. Åre sn. i Jäfsjön. Angml. — N. söd. del. af Aggerh. st.) De flyt. bladen, som sällan utbildas, likna dem hos *P. natans*, ehuru mycket tunnare; de nedre hinnaktiga fingerbredda och 3—8 tum långa, liknande *P. praelongi*. — *P. gramin.* var. *lanceolatum* Lest. *P. lanceolatus* Reich.

- 6 *P. rufescens* Schrad. de nedre bladen från smal bas utdraget lancettlika, trubblade, de flyt. aflånga, trubblade, med afsmalnande bas; nötterna plattade med hvass rygg. 2½ 7. — β *spathulatus*: alla bladen skaftade och flytande. — γ *minor*: till alla delar hälften mindre; de flyt. bladen smalt lancettlika. Fig. H.N.f.5, n:o 76. Fl.D.1450 och 1635. Reich.f.56; β f.86. γ E.B.1985.

\* *nigrescens* Fr. alla bladen hinnaktiga, de öfre något bredare. H.N.f.16, n:o 66.

Sjöar och rinn. vatt. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl. — β i bäckar. — γ i fjellr. Lpl. Jeml. — \* *Torn. Lpm.* Karesuando. Pit. Lpm. Arjeplog. Äfven uppgifven för Smål. i Hosmo-å; samt Hall. Harplinge.) Bladen ½ till ¾ tum breda och 3—6 tum långa, snart rodnande, särdeles de öfre, hos \* snarare svartnande. — *P. stultans* Sm. β *P. spathul.* Reich. γ *P. lanceolatus* Sm., enl. fig. i E.B. \* *P. nigrescens* Fr. anses af Prof. Fries vara Smiths *P. lanceol.* och är måhända icke skiljd från γ.

b — Axskaften uppåt tjockare.

- 7 *P. gramineus* L. de nedre bladen från smal bas smalt lancettlika spetsiga; de flyt. läderaktiga, äggrundt ovala, med trubbig bas; nött. med trubbig rygg. 2½ 7. Fig. Fl.D.222 och 1263. Reich.f.71—80. H.N.f.5, n:o 77 och f.9, n:o 73.

Diken och grundare vatt. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Stundom saknas de flyt. bladen; stundom återstå på uttorkade ställen endast dessa; då båda slagen finnas, är det *P. heterophyllus* Schreb. [H.N.f.12, n:o 75]. — Anm. Finnes icke i Linnés Herb., der under detta namn *P. zosterifol.* och *mucronat.* ligga.

- 8 *P. nitens* Web. de nedre bladen från bred, halft omfattande bas lancettlika spetsiga, meränd. rännformiga och bågliket tillbakaböjda; de flyt. åt båda ändar spetsade; nött. med något hvass rygg. 2½ 7. Fig. Fl.D.1807. Reich.f.60—62. H.N.f.8, n:o 67.

Sjöar och rinn. vatt. (Sk. Smål. n. del.: Scheutz.—Um. Lpm. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. och Närden. Finnm. Thronenäs: Norm.) Stull. mycket grenig, mörkgrön; vanl. mer bredbladig än föreg.; de flyt. bladen, som ofta saknas, längre och smälare än hos denna. — *P. gramineum* Wg.Fl.Su. *P. curvifolius* Hn. Ed.4.

\*\*\* Alla bladen hinnaktiga, öskaftade ell. nästan oskaftade.

a — Axskaften uppåt tjockare.

- 9 *P. lucens* L. bladen kort skaftade, från smal bas bredt lancettlika, uddspetsiga, i Hartman, Skandinavien Flora (10:de uppl.).

kanten mycket *fin* *uddsågade*; nött. trubbigt kölade. 24 7, 8. Fig. Fl.D.195 och 1384. Reich.f.64 och 69.

\* *Zizii* MK. öfre bl. mycket smärre, skaftade, flytande. Fig. Reich.f.66.

Djupare sjöar. (Sk.—Uppl. Medelp. Torp sn i Torpsjön. Dal. Vestml. Ner. Dalsl. Hall. — N. till Söndmör. — \* Stockh. i Mälaren, kring ön Fläsklösan och trol. flerstäd.) *Bladen från 1—1½ tum breda, stundom trubbiga med en liten udd, eller ullöper medelnerven till en kortare ell. längre, syl-lik udd; stundom finnes på höstgrenarne bladskfivan så litet utvecklad, att föga mer än nerven bildar bladet.*

- 10 *P. decipiens* Nolte: bladen *oskaftade*, från n. *afrundad* bas ovala ell. bredt aflånga *trubbiga* med omärklig udd, *helbräddade*; nött. trubbigt kölade. 24 7. Fig. Reich. f.63. H.N.f.14, n:o 76.

Sjöar, r. (Stockh. i Brunnsviken, och i Trehörningen i Brännkyrka sn. Uppsala i Fyrisån.) *Lik, men något mindre än föreg. med tunnare och mindre glänsande blad, som sitta nästan omedelbart vid stjelken, dock utan att omfatta den.*

#### b — Axskäften jemntjocka.

- 11 *P. prælongus* Wulf. bladen *stjelkomsfatt.*, något lancettlikt jemnbreda [de yngre höstgrenarnes aflånga] *trubbiga* platta *helbräddade*; nötterna halft cirkelrunda, n. till hopstående med den raka insidan, *hvasst kölade*, med kort spröt. 24 7, 8. Fig. Fl.D.1687. Reich.f.59. H.N.f.9, n:o 74.

Djupare sjöar. (Sk.—Lpl. Verm. Dalsl. Hall. — N. Christiania, i Asker: Ax. Bl.; Nordl. Fiskevaagvandet i Salten. Ost-Finnm. Jarfjorden: E. Hensch. enl. Th. Fr.) *Stor med ofta tumsbreda, 6—10 tum långa blad, vanligen i spetsen huftlikt hopdragna, rundadt trubbiga; axskäft långa; ax och nötter stora. — P. gramineus var. borealis* Læst. synes vara en smalbladig form häraf.

- 12 *P. perfoliatus* L. bladen med *hjerlik* bas *stjelkomsfattande*, äggrunda—lancettlika *helbräddade* platta; nött. äggrunda plattade med *trubbig* rygg och kort spröt. 24 7. Fig. Sv.B.580. Fl.D.196. Reich.f.53, 54.

Sjöar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Bladen vanl. äggrundt aflånga, stund. n. runda: v. rotundifolius, ell. i rinnande vatten lancettlika, alltid med hjertlik bas.*

- 13 *P. crispus* L. bladen *halft omfattande*, aflångt jemnbreda *vågiga finsågade*; nött. med ett långt hornlikt spröt. 24 7. Fig. Fl.D.927. Reich.f.50, 51. H.N.f.8, n:o 68.

Sjöar, r. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Dalsl. i sjön Kälungen. Boh. Kongelfs fästning. Hall. — N. vid Stavanger.) *Axen korta och såblommiga; bladen tydligt sågade. Var. med tät sittande blad, mellan hvilka stjelken är något zig-zag-böjd: v. sinuatus.*

(*P. coloratus, salicifol., ruf. \* nigr., gramin., nilens.*)

†† Bladen ganska smala, utdraget jemnbreda—hårfin.<sup>1</sup>

\* Bladen fästade utan slida vid stjelken, fria från ledstiplerna.

a — Stjelken platt, bladlik; bladen strimmadt mångnerviga.

- 14 *P. zosterifolius* Schum. bladen smalt jemnbreda, spetsiga; axskäften jemntjocka, *dubb.* — *flere gånger längre än axen; dessa (vid fruktmogn.) cylindriska, mång-*(10—12) *blommiga; nötternas inre kant jemn.* 24 7. Fig. Fl.D.1865 och 2046. Reich.f.45. H.N.f.5, n:o 78.

Sjöar. (Sk.—Medelp. Vestml. Ner. Örebro; Löcknasjön i Lerbäck etc. Boh. — N. Christiania.) *Stjelken föga smalare än bladen; dessa en god linie breda, 4—7 t. långa, med 3—5 gröfre, och talrika finare, mellanligg. nerver; axen tumslånga. — P. laticaulis* Wg. *P. compressus* Fr.

- 15 *P. acutifolius* Link: bladen som hos föreg.; axskäften jemntjocka, *icke längre än axen; dessa äggformiga, så-(4—6)-blommiga; nötternas inre kant med en hög knöl nedtill.* 24 7. Fig. Fl.D.1747. Reich.f.44. H.N.f.5, n:o 79.

Sjöar, damm., vattengrav. r. (Sk. flerst. ÖG. mångenstäd. enl. Kindb. Stockh. i Klara sjö; Hillersjö. Uppl. sjön Hederviken. Ner. Örebro, flerst. norr och öst. om staden ymn. VG. Göteborg. Hall. Hasslöf. — N. vid Skien.) *Till blad och stjelk*

ej olik föreg., men något spådare och med knappt  $\frac{1}{2}$  tum långa ax och axskäft. Nötterna med längre och mera krökt spröl.

b — Stjelken obetydligt plattad, ell. trind; bladen få- (högst 5-) nerviga.

a — Axskäften uppåt tjockare.

- 16 *P. mucronatus* Schrad. stjelen något plattad; bladen smalt jemnbreda, trubbiga med kort udd, 5nerviga; axskäften något plattade, slutl. mycket längre än de cylindriska, glesst få-(4-6-)blommiga axen; nött. släta. 2 7. Fig. Fl.D.203. Reich.f.42.

Vatten. (Sk. allm. Blek. Ronneby enl. Gosselm. ÖG.—Gestr. sjön Tröskan; Gefle. Vestml. Vesteråstrakten. — N.?) Till örten lik följ. med ännu plattare stjelk; axen alltid smala,  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa, vid blomn. n. af skäftens längd, sedan vanl. hälften kortare. — *P. pusillus*  $\beta$  major Fr. *P. Friesii* Rupr. *P. Oederi* Mey. och Beurl. *P. compressus* Ed.9, ett namn som väl måste bortläggas, då det aldrig torde kunna säkert utredas, hvilken art Linné afsett med detsamma.

$\beta$  — Axskäften jemntjocka.

- 17 *P. obtusifolius* MK. stjelen något plattadt trind; bladen smalt jemnbreda, trubbiga, 3—5nerviga; axskäften något plattade, slutl. icke längre än de n. ovala, tät 6—flerblomm. axen; nött. på ytan ojemna. 2 7. Fig. Fl.D.2107. H.N.f.5, n:o 80, 81.

Sjöar, damm. (Sk.—Uppl. Uppsala; Ramsjön i Tibble enl. Leml. Ängml. Bjertrå, i Strinnefjärden. Dal. Vestml. vid Ranskär i Mälaren. Ner. Verm. Boh. — N. Drammen; i Romerige; i Asker: Ax. Bl.) Bladen nära en lin. breda, 5nerviga, de 2 nerverna närmast kanten ofta knappt märkbara. — *P. gramineus* Sm. *P. compressus* Wg.

- 18 *P. pusillus* L. stjelen trådläk, n. trind; bladen mycket smalt jemnbreda—n. tråd-smala, uddspetsiga, 3—1nerviga; axskäften n. trinda, slutl. dubb.—flere gånger längre än de rundade ell. ovala, tät 4—8blomm. axen; nött. släta. Fig. Fl.D.1451. Reich.f.38. H.N.f.12, n:o 76.

Vattenpöl. diken. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Lul. Lpm. nära Qvikkjokks kyrka: And. Boh. Öl. Götll. — N. till Ost-Finmm.) Mycket spådare än de föreg.; bladen högst  $\frac{1}{2}$  lin. breda, stjelen n. tagelsmal; axen små, yngre mer aflånga men täta, vid fruktigmogn. knappt större än arter. — Anm. *P. gracilis* Fr. med trind stjelk och trådsmla, en-nerviga blad, funnen af gammalt sällsynt i Sk., vid Stockh. och i Gestr., har på alla dessa ställen åter försvunnit.

- 19 *P. rutilus* Wolfg. stjelen styf, halftrind; bladen styfva, n. upprätta, trådsmalt syl- lika, 3nerviga; axskäften dubb. längre än de cylindriska, glesst 6—7blommiga axen; nött. släta. 2 7. Fig. Reich.f.40, 41. H.N.f.15, n:o 74.

Vatt. r. (ÖG. Linköping, vid Hunnebergstullen. Uppl. Fasterna sn, i Metsjön vid Lenelunds garfveri.) Fin som föreg., men med mycket styfware och mer tättsitt. blad, hvilka 2 sidonerver äro märkbart gröfre och vanl. belägna längre från kanten än hos pusill.; nött. små med rundad rygg och smal, n. spetsig bas.

\*\* Bladen med en stipebärande slida omfattande stjelen. [Axen med mycket långa skäft och långt åtskilda blomkransar.]

- 20 *P. zosteraceus* Fr. bladen jemnbreda ända till den i en kort udd sammandragna spetsen, 5nerviga; de öfre och yngre mycket smalare och spetsade, 3- ell. en-nerviga; axen vanl. långt uppskjutande öfver bladen. 2 7, 8. Fig. Reich.f.33.

Hafvet, r. (Blek. Brömseback, nära utloppet: Gosselm. Smål. i Lofta skärgård; Gellerskulla i Vesterum. Södm. i sunden mell. Utön och närliggande öar; Stäket m. fl. st. Rosl. Norrtelge skärgård; Singön etc. Ängml. Hernösand: Arn.; vid Grönsvik och Eden i Nora sn. Götll. Kyllgärdssåns utlopp vid Storugns i Lärbro.) Bladen en linie breda, med 3 gröfre nerver. Är sannolikt en form med årgamla blad af följ., som ofta får de gamla bladen lika breda; de yngre grenarnes äro alldeles lika dennes.

- 21 *P. pectinatus* L. bladen jemnbreda—tagelsmla, spetsade, meränd. en-nerviga; axen vanl. föga uppskjut. öfver bladen; nötterna släta, med rundadt trubbig. i torrt tillstånd kölad rygg. 2 7. —  $\beta$  setaceus: bladen n. hårfinna. Fig. Fl.D.186 och 1746. Reich.f.30, 31. H.N.f.5, n:o 82.

Sjöar, dik. helst i salt vatt. (Sk.—Helsl. Ångml. Hernösand: Arn.; Nora och Själevad snr. Jemtl. Kallsjön i Åre sn; Sundsjön i Refsunds sn, m. fl. st. Vestml. i Engsö-sund. VG. Barnesjön vid Vartofta, samt Aspösjön nära Sköfde: Nordst. Boh. Öl. Gotl. — N. till Salten.) *Äldre bladen ofta nog breda, 3nerviga; nött. mogna stora som mindre arter. Blommar ofvan vattnet.* —  $\beta$  var. *scoparius* Wallr.

- 22 *P. marinus* L. bladen tagelsmala spetsiga, *en-nerviga*; axen vanl. mycket långt uppskjut. öfver bl.; nötterna som hos föreg., *hälften smärre, torra rynkiga*. 24 7. Fig. F.I.D.2106. Reich.f.27—29. H.N.f.3, n:o 65.

Renare vatt. sår. i hafvet. (Sk.—Helsl. Ångml. Nora och Själevad m. fl. snr. VB. Neder-Kalix skärg.: Reuterm. Boh. Otterö. Öl. Gotl. Inuti landet i ÖG. Vetern och Motala ström. — N. till Ost-Finnm. Fjellsjöar på Dovre.) *Kan svårigen med karakterer skiljas från föreg., ehuru till utseende och växtsätt alldeles olik denna. Är lika fin som dennes  $\beta$ , med nötter mindre än hamfrön, i vattnet släta, torra rynkiga. Blommar alltid under vattnet, så att den aldrig når ytan.*

#### 458. RUPIA Lin. Härnate.

- 1 *R. spiralis* L. herb. ståndarknappar *aflånga*; allm. fruktskaftet mycket långt, vanl. *spiralformigt* hoprulladt; de enskilda skaften *många gånger* längre än de äggformiga, *föga sneda* nötterna. 24 7, 8. Fig. Sv.B.650, n:o 2. F.I.D.364. Reich.D.Fl.f.26. H.N.f.12, n:o 77.

Hafvet. (Sk.—Boh. Blek. Carlskrona-skären. Smål. Kalmar. ÖG. Djurö kanal; Jonsberg; samt mell. Engelholm och Vindbåtsön enl. Kindh. Södm. Hummelsvik nära Nyköping; Dalarön; Ornöen etc.: Thed. Öl. Gotl. — N.) *Bladen hos alla arterna borstlika, slidomfallande. I djupare vatten förlänger sig det allmänna fruktskaftet till ytan, men drager sig vid fruktmogningen spiralformigt tillsammans.* — *R. maritima* Ed.6, samt de flesta förf.

- 2 *R. rostellata* Koch: knapp. n. *runda*; allm. fruktskaftet knappt längre än de enskilda, *icke spiralformigt*; de enskilda fruktsk. *som hos föreg.*; nötterna vid basen bukiga, tvärt sammandragna i en vanl. *mycket sned* spets. 24 7, 8. Fig. Sv.B.650, n:o 3. Reich.f.25. H.N.f.6, n:o 68.

Hafsvik. (Sk.—Geste. Helsl. Hudiksvall, vid Gackerön. Hall. vid Särövik. VG. Göteborg. Boh. Uddevalla, i Byfjorden; Lysekil; Grebbestad; kring Strömstad. Öl. Gotl. — N. till Trondhj.) *Något mindre än föreg.; nött. smalare.* — *R. maritima* L. herb.

- 3 *R. brachypus* Gay: knapp. elliptiskt *rundade*; allm. fruktskaftet *mycket kort*, *icke spiralform.*; de enskilda *inga* ell. *korta* [högst 4 gr nötnas längd]: nött. äggformiga, *något sneda*. 24 7, 8. Fig. Sv.B.650, n:o 1. H.N.f.15, n:o 75.

Grunda hafsvik. r. (Sk. Malmö; Lomma; Landskrona enl. F. Aresch. Hall. Halmstad; Särö etc. Boh. söd. del. t. ex. Tjörn och Torö. VG. Göteborg. Blek. Kungshall, Sjuhallaviken etc. enl. Gossell. ÖG. Axelsö i Gryt sn. Gotl.) *Nötterna, större och med vida hårdare skal än hos föreg., äro vanl. längre än deras skaft.*

#### 459. ZANNICHELLIA Lin. Härserf.

- 1 *Z. major* Bönn. nötterna *oskaftade* ell. *kort skaftade*, med *ojemn rygg*; stiftet n. *af nötns längd*. ☉ 7. Fig. Sv.B.630, f.a. och f. F.I.D.67. Reich.D.Fl.f.24. H.N.f.15, n:o 76.

Vattengrop. (Sk. allm. vid både öst. och vest. kusten enl. F. Aresch. Blek. enl. Gossell. Smål. Kalmar, i Malmfjärden; Lindö i Vesterum sn; Bjursund i Loftahammar enl. Scheutz. Hall. Halmstad. Öl. allm. Gotl. Kapellhamnviken; Slite hamn; Ljugarns hamn.) *Dubb. gröfre än följ. Bladen hos alla arterna smalt jemnbreda—trådmala, kranssittande, 3 i hvarje krans.* — *Z. palustris* L., trol. öfven innefattande följ.

- 2 *Z. polycarpa* Nolte: nött. *oskaftade*, med mer och mindre *tandad rygg*; stiftet *korlare än halfva* nöten. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.630, f.i. F.I.D.2609. Reich.f.20, 23. H.N.f.6, n:o 69, och f.10, n:o 66.

Grundt vatt. vanl. i ell. nära hafvet. (Sk.—Ångml. Hernösand och Nora sn. VB. Neder-Kalix skärg. Hall. Öl. Gotl. I sött vatten: VG. i Mellby sn. Vestml. Kungsör. Södm. Thorshälla-trakten. Uppl. vid Uppsala och Vassunda. — N. Porgrund; Fredriksstad; Christiania; Bærum. Ost-Finnm. Elvenæs: Norm. och Th. Fr.)



Dubbelt finare än föreg. med smärre nöttor, kortare stift, stund. ej utgörande  $\frac{1}{2}$  af nöten. Var. krypande och rotslående; äfven nöttornas antal och landning varierar. — Anm. *Z. Rosenii* Wallm. fr. Gottl. torde blott vara en tillfällig form af denna ell. föreg., då den på de sista 30 åren icke synes hafva af någon blifvit återfunnen på de angifna lokalerna.

- 3 *Z. pedicellata* Fr. nött. i kort skaftad flock, sjelfva med tydliga skaft, hinnaktigt landad rygg; stiftet n. af nöten längd.  $\odot$  6, 7. Fig. Fl.D.2610. Reich.f.21. H. N.f.3, n:o 66.

Hafvet. (Blek.—Ångm. Hernösand: Arn.; Eden i Nora sn. Öl. Ottenby. Gottl. Visby och Kapellhamnsviken; Klintehamn. — N. Christiania.) Nött. större än hos föreg., utmärkt af sina teml. långa skaft och stift. — *Z. pedunculata* Reich. *Z. palustris*  $\beta$  *pedic.* Wg.

- 2 Flocken **Zosterææ**. Blir på platt kolf, inom hölster, bildadt af bladet. Fruktämne 1. Blomkalk 0.

#### 460. ZOSTERA Lin. Bändling.

- 1 *Z. marina* L. bladen tydligt fternerviga, lika breda som det jemnbreda blomhölstret; dettas båda klaffar upptill tvärhuggna; nöttorna tydl. strimmiga.  $\frac{1}{2}$  7. Fig. Sv.B. 186. Fl.D.15. Reich.D.Fl.f.4. H.N.f.15, n:o 83.

Hafvet, a. (Sk.—Södml. och Stockh.-skären. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) Bladen långa gräslika, omkr. 2 lin. breda.

- 2 *Z. angustifolia* Horn. bladen med otydl. sidonerver; slidklaffarne upptill rundade; för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  7. Fig. Fl.D.1501. Reich.f.3. H.N.f.6, n:o 70.

Hafvet. (Sk. Blek. Verkö. Smål. Kalmar m. fl. st. ÖG. Fredriksnäs i Gryt sn. Södml. Nyköpingsskären: C. Ind. Stockh.-skären. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. Christiania; Trondhj.; Lofoden; Ost-Finnm. Varanger; trol. uteser hela kusten.) Mindre och med n. hälften smalare blad än föreg. — *Z. marina*  $\beta$  Fl.D.

- 3 *Z. minor* Nolte: bladen en-nerviga; hölstret slutl. bredare än bladet, n. lancettligt; nött. n. släta.  $\frac{1}{2}$  7. Fig. Fl.D.2041. Reich.f.2. H.N.f.11, n:o 69.

Grundt hafsvatt. r. (Boh. vid Torön och andra holmar i söd. delen. Hall. Kongsbackaviken vid Tjölöholm enl. Lem.) Bladen säll. mer än fingerlånga,  $\frac{1}{2}$  linie breda. — *Z. nana* Roth enl. Koch, hvilket motsäges af Reich. *Z. Noltei* Horn. i Fl.D.

- 96 Fam. **TYPHACEÆ** Juss. Blir i cylindriskt ell. klotrundt ax. Kalk af flere fjäll ell. borst. Frukt nött, med hängande frö.

#### 461. TYPHA Lin. Kafveldun.

- 1 *T. latifolia* L. bladen bredt svärdlika, af stråets längd; han- och honaxet till närmade.  $\frac{1}{2}$  7. Fig. Sv.B.520. Fl.D.645.

Vatten. (Sk.—Helsl. Söderhamn, Stugsundet. VB. Neder-Kalix, i Småträsk. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Christianiafjorden; Lier; Langesund etc.) 4—5 fot hög med tumsbreda platta blad; axen dubb. tjockare än hos följande.

- 2 *T. angustifolia* L. bladen smalt svärdlika, något rännformiga, af stråets längd; axen åtskild.  $\frac{1}{2}$  7. Fig. Sv.B.234. Fl.D.815.

Vatt. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. Lokrumemyr enl. G. v. Ced. — Södra N.) Hög som föreg.; bladen 2—3 lin. breda; afståndet mell. axen 1—2 tum, säll. mindre.

#### 462. SPARGANIUM Lin. Igelknopp.

† Bladen mot basen 3sidiga: *S. erectum* L.

- 1 *S. ramosum* Huds. bladen mot basen 3eggade; axfästet grenigt; grenarne med

oskaftade honax nedtill och talrika hanax i toppen. 24 7. Fig. Sv.B.464. Fl.D.1282. H.N.f.15, n:o 77, 78.

Vattengräfvar. (Sk.—Ångml. Bjertrå. Dal. Verm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Stördalen i Trondhj. st.) Gröfre än de följ. — *S. erectum* a L.

- 2 *S. simplex* Huds. bladen mot basen 3kantiga; axfästet enkelt, med ensamma skaftade honax nedtill, och 3—6 hanax i toppen; frukterna tvärt sammandragna till ett långt spröt. 24 7. —  $\beta$  *longissimum* Fr. bladen långt utdragna, flytande. Fig. Sv.B.342. Fl.D.932. H.N.f.15, n:o 79.

Vatt. (Sk.—Ångml. VB. Kalix; Kengis. Pil. Lpm. i Svärdfven. Jemtl. Oviken. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. st. —  $\beta$  i djupare, strömmande vatten.) *S. erectum*  $\beta$  L. *S. erectum* Wg. —  $\beta$ , som i sin mest utvecklade form mycket erinrar om *S. natans*, är tydligen en af lokalen beroende form, samt öfvergår enl. ex. fr. Vimmerby, meddelade af Dr Lund, utan gräns till hufvudformen.

- 3 *S. fluitans* Fr. bladen som hos föreg.; axfästet enkelt, nedtill med 1 ell. 2 skaftade, derofvan flere tattsittande oskaftade honax, och vanl. ett enda hanax i toppen; frukt. jemnt afsmalnande till ett kort spröt. 24 7. Fig. Bot.Not.1852,t.1,f.3. H.N. f.15, n:r 80.

Skogskärr. (Um. Lpm. Betsele. och VB. Skellefteå.—Smål. — N. nära Elstad i Gudbrandsdalen.) Icke upprätt som de föreg., utan uppstigande, med stadig stjelk, breda, efter olika lokal, upprätta eller slaka och flytande blad. — *S. glomeratum* Læst.

†† Bladen ända till basen platta: *S. natans* L.

\* Frukt. vanl. tydligt, ehuru kort skaftade, med utdraget syl-lik spröt.

- 4 *S. natans* L. bladen långt utdragna, gräslika flytande; axfästet vanl. något grenigt; honaxen åtskiljda oskaftade [utom de 1—2 nedersta]; hanaxen i toppen, talrika [4—12]; frukt. nervlösa, kortare än sprötet. 24 7. Fig. Bot.Not.1852,t.1,f.1,A. H.N. f.13, n:o 76; f.16, n:o 67, var.

Sjöar och djupa kärr. (Sk. sjöar i nor. del. Blek. vid Fuhrs gästgg.; Elmtasjön: Goss. —Hels. Ångml. Skog sn. Storsjön etc. Ner. Verm. Dalsl. Hall. — N. till Ost-Finnm.) Bladen i djupare vatten ofta flere fot långa, 1—2 lin. breda. — Var. [H.N.f.16] med enkelt axfäste och misslages då ofta för följ. — *S. natans* Lin. Fl. Lapp. och Herb. samt Fr. S.V.Sc. *S. longifolium* Turcz. enl. Fr. *S. Friesii* Beurl.

- 5 *S. affine* Schnitzl. bladen utdragna flytande; axfästet enkelt; honaxen 2—4, åtskiljda, de 1 ell. 2 nedersta skaftade, de öfre oskaftade; hanax vanl. ensamt; frukt. starkt nerviga, kortare än sprötet. 24 7. Fig. Bot.Not.1852,t.1,f.1,B. Reich.f.925. H.N. f.14, n:o 78.

Sjöar och rinn. vatt. (Torn. Lpm.—Smål. Verm. Dalsl. Boh. Oroust. Hall. Knäred: Theor. — N. till Ost-Finnm.) Lägre växt än föreg., med något kortare och bredare blad. Har enl. Læst. stundom talrika hanax. — *S. boreale* Læst.?

- 6 *S. oligocarpon* Ångstr. rotbl. utdragna, vanl. flytande; stjelkbl. korta, med bredare, hinnkantad bas; axfästet enkelt; honaxen som hos föreg.; hanax 1—2; frukt. mer och mindre nerviga, längre än sprötet. 24 7. Fig. H.N.f.15, n:o 81.

\* *vaginatum* Larss.: bladslid. långa; frukt. tydligare nerviga och skaftade.

Sanka st. r. (Um. Lpm. Lycksele; Betsele. Jemtl. mell. gästgg. Grimnäs och Bräcke, vid Refsundssjön. VB. Piteå sn enl. G. v. Ced. Ångml. Hernösand. Hels. Hemstanäs, vid Hemsjön: Wistr. Uppl. mell. Elfkarleby och Vessland. Vestml. Nora sn, Skärmafvet. Verm. Finnskoga, nära Långflon. Wg. Djursåtra i Vårsås sn. — N. Ost-Finnm.—Bergens st. och Gudbrandsdalen. Christiania, i Nordmarken: Ax. Bl. — \* Um. Lpm. bland a. Verm. Liljendal i bergsl.) 1—2 qv. hög, spenslig, med en mängd felsläende frukter i hvarje ax.

\*\* Frukt. oskaftade, utan ell. med kort spröt.

- 7 *S. minimum* Fr. bladen dels kortare upprätta, dels längre och flyt.; axfästet enkelt, med de 2—3 nedre honaxen skaftade, de öfre åtskiljda oskaftade, hanax ensamt i toppen; frukt. trubbiga, med kort ell. intet spröt. 24 7, 8. Fig. Bot.N.1852,t.1,f.2. Fl.D.260. Reich.f.749. H.N.f.12, n:o 78.

Sjöstränd. grundt vatt. a. (Sk.—Pil. Lpm. och VB. Pajala sn. Boh. Strömstad. Öl. Götll. Klinte. — N. till Bergen st.) Ligger jemte n:o 4 under namnet *S. natans* i Linnés Herb.

8 *S. hyperboreum* Last. bladen som hos föreg.; axfästet enkelt; nedersta honaxet vanl. långt skaftadt, de öfre 2—3 oskaftade, *idissittande*; hanaxet ensamt; frukt. *trubbigt 3kantiga, trubbiga* med omärkl. spröt. 2/7. Fig. H.N.f.15, n:o 82.

Vattengöpp. och kärr i fjelltr. (Torn. Lpm. Karesuando, Jukkasjärvi etc. — Herjed. och Angml. Helsl. nära Kårböle i Färila. — N. Ost-Finnm. kring Varangerfjorden; Tanasfjord: Norm. Vest-Finnm. Maasöe och Mageröe enl. Th. Fr.; Alten: Norm. Nordl. Salten i Junkersdalen. Dovre flerstädes.) Späd och spenslig, men var. *likasom föreg. efter lokalens beskaffenhet med smalare och längre eller kortare och breda blad.* — *S. natans*  $\beta$  *submuticum* Hn. ed.5. *S. angustifolium* Michx. enl. Fr.

97 Fam. CYPERACEÆ Juss. Blir i ax af ensamma tegellagda skärmfjäll. Pistill bar, ell. omgifven af inre fjäll, borst, hår ell. dyl. Frukt nöt, med upprätt frö.

1 Flocken **Cyperææ**. Blir 2könade. Skärmfjäll 2sidigt tegellagda.

463. CYPÉRUS Lin. Cypergräs.

1 *C. fuscus* L. strået 3sidigt; svepet mest 3bladigt, längre än axsamlingen; axen gytrade i ett 3—6grenigt knippe, lancettlika, af spetsiga fjäll. ☉ 6. Fig. Fl.D.179. Reich. D.Fl.f.667. Anderss.Cyp.t.1.f.2. H.N.f.12, n:o 79.

Kärr, r. (Sk. Krageholm; Roslätt; Balsberg vid Råbelöfssjön. Götll. Vamlingbo i Thorsbrya, vid vägen mell. Bonsarfve och Roffins; af gammalt äfven funnen vid vägen från kyrkan till Svalstade.) *Fingerhögt halfgräs med svartbruna ax.*

464. SCHOENUS Lin. Knapp-agh.

1 *S. nigricans* L. axet *aggformigt*, af 5—10 småax; kalkborst 0, ell. någon enda kort och otydlig. 2/6, 7. Fig. Sv.B.515. Fl.D.2281. Ands.Cyp.t.1.f.4. H.N.f.4, n:o 89.

Kärr, r. (Öl. Högby sn flerstädes; i en bäck mell. byarne Ekelunda och Fröslunda. Götll. i Aghkärren. — N. mellan Svinesund och Sponvigen.) *Bladen 1—2, nående öfver halva strået; axet tjockt, n. svart.* — *Strebliidia* Beurl.

2 *S. ferrugineus* L. axet *aflångt*, af 2—5 småax; kalkborst *flere, längre än nöten*. 2/6, 7. Fig. Sv.B.569. Fl.D.1503. Ands.t.1.f.3. H.N.f.1, n:o 72.

Kärräng. r. (VB. och Jemll.—Smål. Vimmerby: Scheutz. Sk. Hall. söd. del.: Theor. Götll. Öl. — N. Drammen; Börsvolden och Bilil på Toten; Kimerud på Modum.) *Bladen mycket kortare än strået; axet svartbrunt.* — *Strebliidia* Link. *Chaetospora* Reich.

2 Flocken **Scirpææ**. Blir 2könade. Skärmfjäll på alla sidor tegellagda.

465. CLADIUM Patr. Br. Agh.

1 *C. Mariscus* R. Br. bladen kölade, i kanten och på ryggkolen taggiga; knippet dubbelt sammansatt af gytrade ax. 2/7, 8. Fig. Sv.B.275. Fl.D.1202. Ands.Cyp.t.1, f.5. H.N.f.4, n:o 88.

Kärr, r. (Sk. vid Lefrasjön; Vejlesjön enl. F. Aresch.; Skartofta; Arrie. Blek. Asarum, i Aborragöl nära Ekeberg; Bastasjö. Smål. Pauliström i Karlstorps sn; Göteborg i Linderås sn. ÖG. Omberg, Dagsmossen; Svanhals sn, Kramphemmet: Kindb.; Vinnerstad sn, vid Staffantorpssjön; Bersbo grufva i Värna sn enl. Scheutz. VG. Uricehamn, samt i sjöar nedom Billingen. Boh. Oroust, vid Krokvattnet i Tegneby. Öl. norra delen. Götll. ymnig.) *C. germanicum* Schrad. *Schoenus* Mar. L.

466. RHYNCHOSPORA M. Vahl. Myr-agh.

1 *R. alba* Vahl: bladen smala kölade; axknippet föga kortare än svepet; kalkborst. åt-

*minstone 9, af nödens längd, sträfvä af nedåt vända taggar. 24 6. Fig. Fl.D.320. Ands.Cyp.t.1,f.6.*

Kärr. (Sk.—Um. Lpm. Boh. Öl. Götll. — N. till söd. del. af Trondhj. st.) *Axen yngre hvita, föräldrade något brunaktiga. — Schoenus L.*

2 *R. fusca* RS. bladen smala rännformiga; knippet mycket kortare än svepet; kalkborst. högst 5—6, n. dubbelt längre än nöten, sträfvä af uppåt vända taggar. 24 6. Fig. Fl.D.1562. Ands.t.1,f.7. H.N.f.14, n:o 80.

Kärr, r. (Sk.—Gestr. Osläufors. Helsl. Forssa och Rogsta snr: Wistr. Dal. Boh. i Foss sn; Uddevalla; Kynnefjell. Hall. Götll. — N. Christiansand; Arendal; Laurvig; Rennisöe etc. upp till Nordfjord.) *Axen bruna. — Schoenus L. R. alba* β Vahl.

#### 467. SCIRPUS Lín. Säf.

† Strået enkelt, med flere gytttrade ax.

\* Axen bildande ett sammansatt, 2sidigt ax: *Blysmus* Panz.

1 *S. compressus* Pers. bladen *platta*, något kölade; småaxen 8, eller flere, *mångblommiga*; kalkborsten sträfvä af *nedvända* taggar, *längre* än nöterna; dessa plattade, bredt ovala, med sprötlík spets. 24 6. Fig. Fl.D.1622. Ands.Cyp.t.1,f.9.

Fukt. gräsväxta st. (Sk.—Gestr. och Dal. Boh. Öl. Götll. — N. högst sälls., Näsön vid Christiania.) *Axen ljusbruna. — S. Caricis* Retz. *Schoenus compressus* och *Carex uliginosa* L. [Jemf. *Carex chordorrh.*]

2 *S. rufus* Schrad. bladen *trinda*, ofvanpå kölade; småax. 3—8, fåblomm.; borst *uppåt* sträfvä, *kortare* än nött., stund. felande; nött. aflånga spetsade. 24 6, 7. Fig. Fl.D. 1504. Ands.t.1,f.8. H.N.f.12, n:o 80 [v. *balticus* Fr.].

Hafsstr. r. (Sk.—Uppl. Ångskär i Hollnäs sn. Boh. söd. Koster; Henån och Svane-sund på Oroust m. fl. st. Hall. nor. Brandshult i Släp sn. Öl. Götll. — N. hela kusten till Ost-Finnm.) *Axet rödbrunt. — Schoenus Huds.*

\*\* Axen talrika, knippvis gytttrade.

a — Strået ända nedifrån 3kantigt, bladigt.

3 *S. silvaticus* L. strået upprätt, *trubbigt* 3kantigt; knippet mycket sammansatt, af ax gytttrade i skaftade hufvud; axfjällen *trubbiga*, n. utan udd. 24 7. Fig. Fl.D.307. Reich.f.731. Ands.t.1,f.10.

Våta äng. diken. (Sk.—Ångml. VB. Umeå sn. Dal. Verml. Boh. — N. till Trondhj; Værdalsören.) *Alnshög*, med stort, utbredt blomknippe; bladen n. fingerbredda. — *Nemocharis* Beurl.

4 *S. maritimus* L. strået 3sidigt, *hvasskantigt*; axen äggformiga i gytttringar, än med, än utan gemensamma skaft; axfjällen *3uddiga*. 24 7. Fig. Sv.B.240. Fl.D.937 och 2702, var. Ands.t.1,f.11. H.N.f.16, n:o 68.

Hafsstr. i vattnet. (Sk.—Medelp. Sundsvall. Boh. Öl. Götll. — N. till Stördalen i Trondhj:s stift.) *Alnshög*, med krypande, meränd. knölig rotstock. Var. enl. Nordst. i Sk. på uttorkade st. vid Malmö hamn med ett enda ax: *monostachys* Lge.

b — Strået ätm. nedtill trindt, med ofullkoml. bladämnen vid basen.

5 *S. carinatus* Sm. strået nedtill trindt, upptill *trubbigt* 3kantigt; axen i gytttringar, med och utan skaft; axfjällen urnupna med *trubbade*flikar och udd af ryggnerven. 24 7, 8. Fig. Fl.D.1743. Reich.f.724. Ands.t.1,f.14.

Stränd. r. (Götll. Visby, vid gamla hamnen.) *Strået 2—4 fot högt med 2 kullriga och en platt sida från dess midt uppåt; märken 2. — S. Duvalii* Hop.

6 *S. lacustris* L. strået *öfverallt trindt*; axen som hos föreg.; axfjällen urnupna med *spetsiga* flikar och ryggnerven utlöpande i en udd. 24 7. — β *glaucus*: spådere och af mer blågrön färg, oftare med 2 märken. Fig. Sv.B.150. Fl.D.1142; β 1922. Ands.t.1,f.12, 13. H.N.f.2, n:o 65.

Sjöstr. i vatt. a., β helst i hafsvatt. (Sk.—Lpl. — N. till söd. delen af Trondhj:s stift.) 4—6 fot hög ell. högre; β vanl. mindre, med smärre axgytttringar, af mörkare färg: *S. glaucus* Sm. *S. Tabernamontani* Gmel.

\*\*\* Axen få, högst 3, med i spetsen hela fjäll: *Isolepis* Br.

7 *S. selaceus* L. strået tagelsmalt, trindt, med slidor och outvecklade blad vid basen; axen 1—3, gytttrade utan skaft, tätt under stråets topp; nötterna på längden strimmiga. ♂ 6. 7. Fig. Fl.D.311. Reich.f.711, 712. Andst.1.f.17. H.N.f.1, n:o 73.

Stränd. r. (Sk. Hall. VG. Göteborg; Kinna sn, mell. Salgutsered och Berg. Boh. Kallfö, Oroust m. fl. Gar. Blek. vid Hörby. Smål. Jönköping, vid Husqvarna-åns utlopp samt Munk- ell. Lillsjön. ÖG. vid Motalaan, mellan Boren och Dufvedal. — N. nära Stavanger.) 1—4 tum hög, med linjelånga ax, som rigtas åt sidan af strået, hvars fortsättning ofvan axen egenl. är ett af skärmladen. *S. supinus* i Swartz' Sum.Veg.Sc. lärar väl vara en större form häraf.

†† Strået grenigt, med ensamt ax i grenarnes topp: *Heleogiton* Link.

8 *S. fluitans* L. strået slakt, nedliggande eller flytande, bladigt; axen 3—7 blommiga; märken 2. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1082. Reich.f.705. Andst.1.f.18. H.N.f.2, n:o 70.

Vatten, i åar etc. r. (Hall. Vessige vid Lia och Hukared. Smål. Femsjö, Unnaryd m. fl. socknar i Vestbo härad; Götheryd i ån vid kyrkan. ÖG. Grebo sn. Verm. Långseruds sn.)

††† Strået enkelt, med ett enkelt ax i toppen: *Limnochloa* Reich.

9 *S. pauciflorus* Lightf. strået ogenomskinligt bart, med tydlig, tvärhuggen och bladlös slida vid basen; axet äggformigt, med de yttre fjällen större, nående öfver halfva axen; märken 3. 2 6, 7. Fig. Sv.B.563, f.2. Fl.D.1862. Andst.1.f.21. H.N.f.2, n:o 66.

Fukt. st. stränd. (Sk.—Ångml. och Jeml. VB. nor. del. vid Seivitz gästgg. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) 2—6 tum hög. — *S. Boethryon* Ehrh.

\*10 *S. parvulus* Röm. strået något genomskinligt, visande längdnervor och tvärväggar; slidan mycket tunn och otidlig; axet aflångt äggformigt, med de yttre fjällen kortare än halfva axen; märken 3. 2. Fig. Fl.D.2161. Reich.f.706. Andst.1.f.20. H.N.f.10, n:o 68.

Fukt. st. stränd. r. (N. Holmestrand, på stranden af en liten sjö. — Fordom äfven funnen i Sv. i Verm. vid Sundbro i Fryksdalen.) 1—1½ tum hög, tufvad af talrika strån, med och utan ax; strået något groft i jemf. med storleken och det linjelånga, 3—5blommiga axen. — *S. nanus* Wallr.

#### 468. HELEOCHARIS R. Br. Knapp-säf.

† Märken 2; nöten linsformigt plattad.

1 *H. palustris* Br. rotstocken lång krypande; strået vanl. trindt; axet aflångt, af ägg-rundt lancettlika fjäll, de nedersta 1—2 kortare och könlösa; nöten bihang äggformigt. 2 5, 6. — *β gracilis* Fr. strået smalt, plattadt, blågrått. Fig. Sv.B.257. Fl.D.273. Andst.2.f.22. H.N.f.2, n:o 68.

\* *uniglumis* Link: nedersta axfjället tomt, omfattande hela axets bas. Fig. Andst.2, f.23. H.N.f.2, n:o 69.

Väta st. stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.. — \* Sk.—Ångml. Verm. Gottl. — N. till Ost-Finm.) Var. från ½—2 fot hög; a har vanl. de 2 nedersta axfjällen motsatta och i förenig omfattande axets bas. \* vanl. mindre och med svartbrunt ax. — *Scirpus* L.

†† Märken 3; nöten 3kantig ell. trind.

2 *H. multicaulis* Lindl. roten tufvad, trådig; rotstocken kort; strået trindt; axet aflångt, med nedersta fjället tomt; nöten 3sidig med bihangets bas nedplattad öfver nöten topp. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1923. Andst.2.f.24. H.N.f.2, n:o 67.

Sjöstr. r. (Sk. vid Ousby-sjön. Hall. vid Tommareds sjö i Knäred: Theor.; Lia, samt i ån ned mot Vessige; Gunnarp sn enl. Scheutz. Boh. vid Rammsjön norr om Jonsered. Blek. Niklastorps göl enl. Gosselm. Smål. vid Bastesjön i Femsjö sn; Sand-sjö i Konga här. ymn.; Vilstad, vid Arnäsholm; Vexjö. Uppl. Rinkeby i Sponga sn.) Något lik föreg.; stråen i valtnet uppräta, men på det torra bågliket uppböjda, bildande fasta tufvor. — *Scirpus* Sm.

3 *H. acicularis* Br. rotstocken lång krypande; strået nålfint, kantigt; axet äggformigt

ell. aflångt, med de nedre fjällen större; nöten *n. trind* med *upphöjda* ränder och *äggformigt* bihang. ☉ 5—8. Fig. Fl.D.287. Andst.2,f.26. H.N.f.15, n:o 90.  
Stränd. a. (Sk.—VB. nor. del. och Um. Lpm. — N. till Trondhj. st. Ost-Finnm.)  
1—3 *tum hög, n. härfin*.

#### 469. TRICHOPHORUM Pers. Mossatof, Ramme (1).

- 1 *T. caespitosum* Hn. strået *trindt, slätt*; axet äggformigt; kalkborsten längre än nöten, men kortare än axet. 2 6, 7. Fig. Sv.B.563,f.1. Fl.D.1861. Ands.Cyp.t.1,f.19. H.N.f.15, n:o 89.  
Kärr. (Lpl.—Sk. och Hall. söd. del. Gtll. Mest i de vestra prov. — N. från Ost-Finnm.—sydl. N.) Axet yngre *n. aflångt, moget ofta klotrundt*. — *Scirpus L. Limnochloa Reich.* — Anm. En form ell. art, som synes beslägtad dels med föreg., dels med *Sc. pauciflorus*, är af Norm. i ofullständ. ex. funnen i Finnm. vid Børslevens ulopp och af honom benämnd *T. emergens*.
- 2 *T. alpinum* Pers. strået *3kantigt, strävt*; axet aflångt; kalkborsten hårlig, *skull. flere* gånger längre än axet. 2 6, 7. Fig. Sv.B.426,f.2. Fl.D.620. Andst.2,f.33.  
Kärräng. (Lpl.—Sk. och Hall. mell. del. Öl. i Borgaträsk. Gtll. i Fardumeträsk; Thorsborgen etc. — N. Ost-Finnm.—sydl. N.) Axet med *fullväxta håren* tillhoppa *n. tumslångt, liknande ett spådt Eriophorum*, till hvilket slägte denna art föres af Linné och andra förf. — *Limnochloa Dreg.*

#### 470. ERIOPHORUM Lin. Ängsull.

† Axen flere.

- 1 *E. angustifolium* Roth: bladen *jernnbreda kölade*, meränd. *längre än* stråets mellanleder; axskaften *glatta*. 2 5, 6. —  $\beta$  *triquetrum*: bladen korta, *n. till basen 3kantiga*. Fig. Sv.B.490,f.1. Fl.D.1442. Ands.Cyp.t.2,f.27.  
Kärräng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Var. med *smalare och bredare blad, flere och färre, ända till ett ax.*  $\beta$  mycket lik *E. gracile*, men skiljbar af de *brunfjälliga axen på alldes glatta skaft. Är ofta tvåbyggare.* — *E. polystachion a L.Fl.Su. E. polyst. Wg. En storväxt form är  $\gamma$  E. latifol. Sm.*
- 2 *E. latifolium* Hop. bladen *plattade, smalt lancettlika, de öfre kortare än* stråets mellanleder; axskaften *sträfvä*. 2 6. Fig. Sv.B.180. Fl.D.1381. Andst.2,f.28.  
Kärräng. (Sk.—Jemll. och Ängml. Öl. Gtll. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) Högre och mera rent grön växt, med kortare och bredare blad än föreg. — *E. polyst.  $\beta$  L. E. polyst. Sv.B. E. pubescens Sm.*
- 3 *E. gracile* Koch: bladen *3kantiga, kortare än* stråets mellanleder; axskaften *något sträfvä*. 2 6. Fig. Sv.B.490,f.2. Fl.D.1441. Andst.2,f.29. H.N.f.14, n:o 79.  
Kärr. (Sk. Blek. Valjö: Vesterl.; Dannemark: Goss.—Lpl. — N. sällsynt; Christiania-trakten; Stördalen vid Kirkeby.) Mycket spädare än de föreg. med smärre och mer grönaktiga ax. — *E. triquetrum Hoppe.*

†† Axet alltid ensamt.

\* Roten trådig; stråen tufvade.

- 4 *E. vaginatum* L. stråets öfre slidor *upplåsta*; axet äggformigt, af hinnaktigt *genomskinliga sylspetsade*, *n. likformiga fjäll*; ståndarknapparne *jernnbreda*; ullen *hvit*. 2 4, 5. Fig. Sv.B.781. Fl.D.236. Andst.2,f.30.  
Skogskärr, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Axet *vanl. tumslångt af svartgrå fjäll; endast slidorna vid stråets bas bära blad.*
- 5 *E. callitrix* Cham. slidorna *knappt upplåsta*; axet rundadt, af *ogenomskinliga trubblade n. likformiga fjäll*; knapp. *jernnbreda*; ullen *svagt rödaktig*. 2 5, 6. Fig. H.N.f.15, n:o 87.  
Kärr i fjelltr. (Lul. Lpm. Namnats vid Qvikkjokk; flerst. på sluttn. af Walli: Andst. Pil. Lpm. nedanför fjellet Walliwe, vid Laiselven. Jemll. vid Tännforsen. Herjed. Midtskogen och vid Funnedalsjön enl. G. v. Ced. VB. Kengis; Edefors vid Lul. elf. Ängml. Fjellsjö och Helgum snr enl. Leml.; Långsele sn, vid Ledinge gästgg. — N. Ost-Finnm.,  $\frac{1}{4}$  mil n. om Mortensnæs. Vest-Finnm. Tromsö: Th. Fr.; Maak-elven, flerst. vid Istinderne: Norm.) Axet mycket mindre än hos föreg., med

svartaktiga fjäll och qvaslikt vidgad, tvärhuggen ull; strån vanl. färre tillsammans än hos föreg. — *E. vaginatum* \* *opacum* Björnstr.

\*\* Krypande rotstock, med spridda strån och nyskott.

- 6 *E. russeolum* Fr. slid. icke uppblåsta; axet *af långt*, af endast i kanten *genomskinnl.*, kortspetsade fjäll; knapp. jemnbreda; ullen vanl. *rödaktig*. 24 5, 6. Fig. Fl.D. suppl. t. 8. Ands. t. 2, f. 32.

Kärr i fjelltr. (Torn. Lpm. Karesuando, Kedkesuando; Muonioniska, Wittangi. Terra-koski etc. Lul. Lpm. mell. sjön Puolaure och Kerkeware; Kaissats vid Wirihauure. VB. Kengis. — N. Finn. mest i de inre delarne: Norm.; äfven vid Alten, i Eiby-dalen.) Axet likt *E. vaginati*, men mindre, mer *af långt* och med *rödaktig* ell. *brandgul* ull, i hvilket *sednare* fall det är *E. rufescens* Ands. Var. i Finn. äfven med *snövit* ull enl. Th. Fr., och där var. *candidum* Norm. — *E. Chamissonis* Mey.

- 7 *E. Scheuchzeri* Hop. slid. som hos föreg.; axet *n. klotrundt*, med *ogenomskinnl.*, *spetsade* fjäll, de nedersta 1—3 *mycket större* skärmlika; knapp. *af långa*; ullen vanl. *hvit*. 24 5, 6. Fig. Sv.B. 426. f. 1. Fl.D. 1502. Andst. 2, f. 31. H.N.f. 3, n:o 68.
- Fjelltr. (Lpl.—Dal. Ängml. Fjellsjö och Ledinge snr enl. Leml.; Liden: Arn.; Tåsjö-berget; Ramsele sn. Helsl. Arbrå sn. Verm. vid Klarelfvens öfre lopp. — N. Ost-Finn. — nor. del af Christiansands st.) Axet *ynge något äggformigt, svartbrunt*; ull *hvit*, ell. *svagt rödaktig*: *E. medium* Ands. — *E. capitatum* Host. (*E. angustifol.*)

### 3 Flocken **Cariceæ**. Blr skiljddönade.

471. CAREX Lin. Starr.

I. **Heterostachyæ**: Axen flere, enkönade: hanax i toppen, honax nedom dessa \*).

† Märken 3 [undant. *C. palud.* och *saxat.*]: **Tristigmaticæ**.

\* Hanaxen meränd. flere än ett; fruktgömmen glatta.

a — Fruktg. uppräta ell. utstående, äggformiga ell. ovala.

- 1 *C. riparia* Curt. strået 3sidigt; bladen kölade; skärmen breda, bladlika; honaxen *skafade* cylindriska; axfjällen sylspetsade, *meränd. längre* än det *äggformiga* kortspetsade *tåtnerviga* fruktgömmet; dettas mynning gaffel-lik. 24 6. Fig. Fl.D. 1118. Ands. Cyp. t. 8, f. 110. H.N.f. 9, n:o 78.

\* *gracilescens* Hn. bladen *n. hälften smalare* [2 lin.]; fruktg. smalt äggrunda, spetsade till ett smalt spröt med djupt 2spetsad mynning, längre än fjällen.

Stränd. r. (Sk.—Gestr. Kubbo, i Råfmuren. Vestml. Björkskog sn. Ner. Boh. Öl. — N. Christiania, Östensöe och Brändsrudskjærn. — \* Vestml. Kungsåra sn, i en mosse tillhörig Kihlsta under Ängsö.) *Gröfst af alla nordens starrarter. C. nutans* Fr. Mant. 1 är en form med korta, men tjocka ax. — *C. crassa* Ehrh.

- 2 *C. paludosa* Good. strået *skarpt* 3sidigt; bladen och skärm. som hos föreg.; honax cylindr., de nedre kort skafade; axfjällen sylspetsade, *n. kortare* än det *ovala*, kort sprötspetsiga, *grofnerviga* fruktg.; mynn. 2tandad. 24 6. — *β spadicea*: axfjällen långt och stråft borstuddiga; märken oftare 2. Fig. Fl.D. 1767. Ands. t. 8, f. 109. H. N.f. 9, n:o 77. *β* Reich.f. 651.

Våta st. r. (Sk.—Uppl. och Vestml. Medelp. Torp sn, vid Glipsjön. Ner. Bränds-bäcken i Hardemo; O. G. Blomb. VG. Boh. Hall. Askim. Öl. Goull. Fleringe. — N. Christiania, Östensöe etc. Kläcken på Ringerige.) 3—4 fot hög, *blågrön*, lik en stor *C. acuta*; *bladslidorna upprispa* i *spindelväfslika trådar*, då de dragas från strået. — *C. acutiformis* Ehrh. *β C. Kochiana* Sturm. *C. spadicea* Roth.

- 3 *C. vesicaria* L. strået, bl. och skärm. som hos föreg.; honax. cylindr., de nedre skafade; axfjällen *spetsiga*, *kortare* än det *uppblåst* äggformiga, *småningom* till ett kort

\*) Hos några, i synnerhet afd. \*\*\*\*\*, får topp- ell. hanaxet honblr och sedan fruktgömmen i toppen; hos andra kunna honaxen variera med hanblr i spetsen.

spröt *afsmalnande glesnerviga* fruktgömmet; mynn. 2spetsad. 2 6. Fig. Sv.B.216. Fl.D.647. Andst.8.f.107. H.N.f.14, n:o 81.

\* *lacustris* Th. Fr. strået högre och spensligare; bl. platta; honaxen n. oskaftade, upprätta; fruktg. med längre och smalt spröt.

Våta st. a. (Sk.—Lpl. — N. — \* N. Ost-Finnm. i sjön C'olmejavre. Christiania, Bogstadvand.) Stort bredbladigt starrgräs; fruktgömmena gröna, slutt. ljusbruna, i fjelltr. ännu mörkare. *C. stenolepis* Less. är en form med smalare, svartbruna fjäll. *C. Friesii* Bl. Norg. Fl., ell. *C. ves.* \* *distenta* H.N.f.15, n:o 84, synes svårt kunna skiljas från \* *lacustr.*

b — Fruktg. utsperrade, n. klotrunda, alltid starkt uppblåsta.

4 *C. lævirostris* Fr. strået upptill stråkantigt; bladen kölade; skärm. och honax. som hos föreg.; axfjällen lancetlika; fruktgömm. tvärt hopdragna till ett utdraget spröt med djupt gaffel-lik mynning, nerviga. 2 6. Fig. Fl.D.suppl.t.36. Andst.8.f.108. H.N.f.6, n:o 74.

Våta st. stränd. r. (*Lul. Lpm.* Storbacken: C. Ind. VB. Hedenfors: Ned. Luleå sn, på Sävastön i Lul. elf. 1½ mil från Luleå, samt vid Storsand; Skellefteå, på Brännängen enl. Leff. — N. Dovre, vid Kallvillån; Christiania vid bäcken i Mærradalen m. fl. st.; Asker; Holmestrand; Laurvig.) Bland de största starrgräs, med ½ tum breda, n. platta blad, tjocka honax; fruktgömm. stora och tunna, blåslika, n. döljande de smala fjällen, som ofta hafva ett par fina börst i spetsen. — *C. ampull.* v. *robusta* Weinm. *C. bullata* v. *lævirostris* Fr. Mant. 2. *C. rhyncho-physa* Mey.

5 *C. ampullacea* Good. strået trubbkantigt, slätt; bladen rännformiga; skärm. och honaxen som hos föreg.; axfjällen syl-lika [hos γ och \* bredare]; fruktg. tvärt hopdragna till spröt med gaffel-lik mynn., nerviga. 2 6. — β *obesa*: axen mycket stora; fruktg. större, mer uppblåsta, med kort spröt. — γ *borealis*: axen aflånga, oskaftade; fjäll n. ågrunda, kortare än det kortsprötade fruktg. Fig. Fl.D.2248. Andst.8.f.106. H.N.f.10, n:o 73.

\* *rotundata* Wg. skärmen smala; axen oskaft. aflånga, upprätta; fjällen breda trubbiga, kortare än det n. klotrundt uppblåsta kortspetsade fruktg. Fig. Sv.B.755. Andst.8, f.105. H.N.f.3, n:o 76.

Stränd. \* fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. — β Verml. — γ Lpl.—Gestr. — \* Lpl.—Herjed. — N.) Skiljd från *C. vesic.* med det släta strået, de rännformiga bladen och det till spröt tvärt hopdragna fruktgömmet; närmare slägt med föreg., hvartill β är en öfvergång. — γ *C. rotund.* v. *inferalpina* Beurl. — \* är till alla delar spädare än hufvudf. och habituellt olik denna, men sammanflyter dermed utan all gräns genom γ.

6 *C. saxatilis* L. strået 3sidigt, stråft; bladen platta kölade; skärmen bladlika; hanaxet meränd. ensamt; honaxen äggformiga—aflånga, upprätta, det nedersta skaftadt; fruktg. kortspetsade, otydligt nerviga, oftast med 2 märken. 2 6, 7. — β *Grahami*: fruktg. mer aflånga, med djupare klufven mynning. Fig. Andst.8.f.104. H.N.f.3, n:o 74 och f.11, n:o 76.

\* Fjelltr. på fukt. st. (*Lpl.—Herjed.* — N. — β *Lul. Lpm.*) Skiljd från föreg:s \* med de platta och bredare bladen. Var. högst sällan med långskaftade honax. — *C. saxatilis* Lin. herb. *C. pulla* Good. *C. fusca* Schk. *C. vesicaria* v. *alpigena* Fr. i H.N.f.8, n:o 71, tillhör tydligt denna art, hvilken Prof. Andersson anser som en fjellform af *C. vesicaria*.

\*\* Hanaxen flere; fruktgömmen småludna.

a — Honaxen upprätta; skärmen n. utan slidor.

7 *C. evoluta* Hn. strået kvasst 3kantigt; bladen platta kölade; skärmen platta bladlika; honaxen något lancetlikt cylindriska; fruktgömmen äggformiga spetsade, med gaffel-lik mynning, småludna. 2 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.t.30. Andst.8.f.102. H.N.f.6, n:o 75. Sanka sjöstr. r. (Smål. vid Gräfsjön i Tryserum. ÖG. Gusum. Stockholm vid Brännkyrkesjön; Flaten, Ösby och Ekebyträsk; ford. vid Gångsätra på Lidingön. Vestml. i samma mosse som *C. riparia* \*. Fordom äfven i Sk.) Mycket gröfre än följ. med ett par linier breda blad.



- 8 *C. filiformis* L. strået *n. trindt*; bladen och skärmen *rännformiga*, trådlika; fruktg. *tätt ludna*; för öfr. som föreg. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1344. Andst.8,f.103. H.N.f.9, n:o 79.

Stränd. kärräng. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. Varanger.) *Alnshögt, trådmall, tuffadt starrgräs, med mer än tumelånga bruna ax. — C. lasiocarpa Ehrh.*

b — Honaxen uppräta; de nedre skärmen med långa slidor.

- 9 *C. hirta* L. strået trubbkantigt; bladen och skärmen platta, kölade; honaxen lancetl. cylindriska, *långt åtskiljda*, skaftade; fruktg. äggformiga spetsade, med *djupt* klufven 2spetsad mynning. *öfverallt* håriga. 2 6. —  $\beta$  *hirtiformis*: blad och bladslidor glatta, endast fruktgömmena håriga. Fig. Fl.D.425. Andst.8,f.101. H.N.f.13, n:o 81.  $\beta$  Fl.D.1711.

Ler- och sandjord. (Sk.—Hels. Vestml. Ner. Verml. Bårön i Venern. Boh. Öl. Gottl. — N. i Christianss. och Aggerhus st. —  $\beta$  Sk. Malmö etc. Blek. Lyckeby slott. ÖG. Berest. enl. Kindb. Gottl. Fleringe sn, Lunderhage; Visborgs kungsladug.: G. v. Ced.) Var. från  $\frac{1}{2}$  fot hög, med långt kryppande rotstock och ofta håriga blad, särdeles slidan.

- \*10 *C. orthostachya* Mey. strået, bl. och skärm. som hos föreg.; honaxen som hos föreg., *nårmade*; fruktg. äggform., 3kantiga, nerviga spetsade med *gaffel-lik* mynning, *längs* nerverna *glest* finhåriga. 2 6, 7. Fig. H.N.f.13, n:o 80.

Fjelltr. r. (Norge, enl. Fr., funnen och meddelad utan angifvet växtställe af N. Lund, som enl. Blytt möjl. funnit den i trakten af Drammen.) Något lik föreg., men *gröfre, med omärkligt håriga fruktgömmen, och glatta blad med ludna slidor, långa skärm.*

c — Honaxen lutande, slutl. hängande.

- 11 *C. glauca* Scop. strået trubbkantigt; bladen platta; skärmen bladlika, det nedersta stundom med lång slida; honaxen cylindriska skaftade; fruktg. omv. äggformiga trubbiga med hel mynning, i kanten, särd. upptill, kort styfhåriga. 2 6. Fig. Fl.D.1051. Andst.7,f.79. H.N.f.9, n:o 76.

Fukt. äng. (Sk.—Gestr. Ängml. Nyland enl. Leffl. Um. Lpm. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) *Fotshögt, ljus blågrönt, något bredbladigt starrgräs; med slutl. svartbruna, 1—2 tum långa ax, som stundom blifva greniga. — C. flacca Schreb. C. recurva Fl.D.*

\*\*\* Hanaxet ensamt, af blott hanbl. [undant. *C. fulig.*]; honaxen slutl. lutande ell. hängande; skärm med gröna slidor. [Fruktg. glatta.]

a — Skärmen bladlika, öfvernående axen, med mycket korta slidor.

- 12 *C. pseudocyperus* L. honaxen *tätsittande*, cylindriska tätblommiga, hängande; axfjällen syl-lika; fruktg. *usperrade ell. nedböjda*, äggformiga, *starkt nerviga* och *långspröjade*, med 2spetsad mynning. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1117. Andst.8,f.111. H.N.f.11, n:o 75.

Stränd. kärr. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Boh. Öl. Hornsviken. Gottl. — N. i Christianiatrakten.) *Stort, bredbladigt starrgräs, ofta med 2 tum långa gröna ax, taggiga af de usperrade fruktg:s spröt. Har någongång honbl. i hanaxets topp: v. acrogyna.*

- 13 *C. pallescens* L. honaxen *åtskiljda*, afånga, tätblommiga, slutl. *lutande*; axfjällen spetsiga; fruktg. uppräta, omv. äggformiga, *nervlösa*, *trubbiga* med hel mynning. 2 6. Fig. Fl.D.1050. Andst.7,f.78. H.N.f.12, n:o 84 [var. *undul.*].

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm. Lul. Lpm. Njuonjes enl. Ands. — N. till Ost-Finnm.) *Fotshög; bladen finhåriga; axen gröna, slutl. brunaktiga. C. undulata Kunze, med skärmens nedre del på tvären vågig, är en vanlig, helt och hållet tillfällig form.*

b — Skärmen bladlika, icke öfvernående axen, med långa slidor.

- 14 *C. silvatica* Huds. honaxen långt skaftade och åtskiljda, jemnbreda, *glest* mångblommiga, lutande; axfjällen *spetsade*, af fruktg:s längd; dessa 3kantiga, ovala nervlösa,

- med långt spröt och 2spetsad mynning. 2 6. Fig. Fl.D.404. Andst.8,f.100. H.N. f.7, n:o 81.
- Löfskog. (Sk.—ÖG. Ner. flerst. i Tysslinge sn. VG. Boh. Christinedal. Hall. Hallandsås: Theor. ÖL. Gottl. — N. Aggerh., Christianss. och Bergens st.) *Fotshög och deröfver; honaxen mer än tumslånga, med 12—dubb. så många blr, gröna, med tunna hvitaktiga fjäll.* — C. Drymeja Ehrh.
- 15 C. *capillaris* L. honaxen som hos föreg., glest 6—10blommiga; axfjällen trubbiga, kortare än fruktig.; dessa otydligt 3kantiga, ovala nervlösa, med syl-lik spets, otydligt 2flikig mynning. 2 6. Fig. Fl.D.168 och 2374. Andst.7,f.77.
- Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. fr. nor. del. af Christianss. st. till Ost-Finnm.) *Yngre en half fot högt, spensligt starrgräs, med ½ tum långa gröna ax och hvitaktiga fjäll.*
- 16 C. *laxa* Wg. honaxen som hos föreg., n. lancettlika, tätblommiga; axfjällen trubbiga, af fruktig:s längd; dessa aflånga, svagt nerviga, trubbiga med framstående, n. hel mynning. 2 6,7. Fig. Sv.B.718. Fl.D.suppl.t.107. Wg.Fl.L.t.15,f.1. Andst.6,f.69. H.N.f.3, n:o 73.
- Sanka kärr i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Karesuando; Wittangi; Jukkasjärvi. Lul. Lpm. Jokkmokk. Jemll. Oviken och Berg. Herjed. Sveg sn, nedanför gästg. Nilsvallen. — N. Finnm. Sjuosjovre: Norm.) ½—1 fot högt och spensligt starrgräs, med mycket smala blad; nära slägt med C. limosa, men utmärkt af de ½ tum långa skärmglidorna och det bågliket nedböjda strået.

c — Skärmen korta, syl-lika, med långa slidor.

- 17 C. *ustulata* Wg. skärmen säll. längre än sina slidor; honaxen närsittande, n. ovala, tätblommiga, hängande; axfj. spetsiga, af fruktig:s längd; dessa aflånga spetsiga plattade, med urnupen mynning. 2 7. Fig. Sv.B.717. Fl.D.1590. Andst.6,f.68. H.N.f.5, n:o 88.
- Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Axen ½ tum långa; fjällen och fruktig. svartbruna, de sednare med ljusare kanter. Hanaxet säll. med honblr. — C. atrata Lin. Herb.*
- 18 C. *fuliginosa* Hop. skärmen och honaxen som hos föreg., de sednare mer lancettlika, det nedersta ofta långt fränskildt; axfjäll. trubbade, kortare än fruktig.; dessa n. lancettlika, 3kantiga, med lång sprölik, i kanten sträfsågad spets, 2tandad mynning; hanaxet med honblr i toppen. 2 7. Fig. Fl.D.2373. Andst.7,f.90. H.N.f.5, n:o 89.
- Fjellv. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka; Kaissepakte. — N. Finnm. Tsatsa; Tromsdelstind; Salangdalen, Sör-Reisen och Maalselv flerst.: Norm. Dovre, på Finnhöe, Knudshöe, Gjederyggen, Blåhöe etc.) *Något lik föreg., men med smalare och ljusare ax, af hvilka det öfversta n. alltid är sambyggare. Stråen hårdt tufvade, med utböjda blad, n. alla vid roten. — C. frigida Wg.Fl.Su. C. misandra Br.*
- \*\*\*\* Hanax ensamt af blott hanblr; honax slutl. hängande; skärm. med mycket korta, brun- ell. svartkantade slidor. [Fruktig. glatta.]
- 19 C. *limosa* L. strået 3sidigt, stråft; bladen gråaktigt gröna, smala och kölade, knappt dubb. bredare än strået; skärmen syl-lika, med mycket korta slidor; honaxen n. lancettlika tätblommiga; axfjällen något smalare än det ovala trubbiga plattade fruktigömmet. 2 6,7. Fig. Fl.D.646. Andst.7,f.73. H.N.f.10, n:o 71.
- Sanka kärr. (Sk.—Lpl. Gottl. — N.) Omkr. fotshög, med ½—¾ linie breda blad, bruna axfjäll med blåhvita fruktigömmen. Får icke sällan hanblr i spetsen af honaxen.
- 20 C. *irrigua* Sm. bladen rent gröna, platta, 2—3 gånger bredare än strået; skärmen bladlika, med slid. som hos föreg.; fruktig. mer konvexa, meränd. kortare än fjällens utdragna spets; för öfr. som föreg. 2 6. Fig. Wg.Fl.L.t.15. Fl.D.suppl.106. Andst.7,f.72. H.N.f.2, n:o 71.
- Kärr och våta äng. (Sk. Blek. nor. del.—Lpl. — N.) Vanl. mer lågväxt och stadig än föreg.; axfjällen vanl. mer svartbruna och längre än fruktig. Har ofta honblr i hanaxets spets.

- 21 *C. rariflora* Sm. strået trubbkantigt, glatt; bladen smala, platta; skärmen korta, n. syl-rika, med slidor 3 gånger så långa som vida; honaxen aflånga, gles fåblommiga; axfjällen trubbiga, stora, insvepande det ovala trubbiga fruktg. 2 6, 7. Fig. E.B. 2516. Andst. 6, f. 70. H.N. f. 7, n:o 80.

\* *stygia* Fr. honaxen mer tätblommiga; fjällen n. svarta.

Fjell-kärr och sump. hafsstr. (Torn. Lpm. Karesuando. Lul. Lpm. Wirihäure etc. Pil. Lpm. vid sjön Waimokjaure: H. Widm.; Tjiddjakk. Um. Lpm. Gitsfjellen. Jemtl. Snasahögen, och i Lisselofå-dalen. Herjed. Helagsfjellen; Axhögen; Ramansberget etc. — N. Finnm. Nordl. Trondhjem, Stuedal; Dovre; Lom; Åserald i Nedenås amt. — \* N. Finnm.) *Quartershög med smärre ax än föreg. vanl. af 6 blr med svartbruna, stund. brungula fjäll.* — *C. limosa* β Wg. \* *C. stygia* Fr. är mer än fotshög.

\*\*\*\*\* Hanax ensamt, af blott hanbl; honax uppräta; fruktgömmen glatta. [Skärmen med slidor.]

a — Fruktg:s mynning tydligt 2spetsad; honax [vanl. långt] åtskiljda.

α — Strået trubbkantigt, glatt; axfjällen med stråf, ofta borstlik udd.

- \*22 *C. binervis* Sm. honaxen cylindriska, de nedre med ur slidan *utskjutande* skaft; axfjällen *trubbade, med udd*; fruktgömmen äggformiga, afsmalnande mot mynningen, med 2 grofva nerver längs kanten. 2 6. Fig. Reich.f.621. Andst. 8, f. 98. H.N. f. 5, n:o 87.

Ljunghed. r. (N. från sydv. del. af Christianss. st. längs kusten genom Bergens st. teml. allm. upp till Molde.) 2—3 fot hög, med väl tumslånga mörkbruna ax; fruktg. lancellitlik afsmalnande, mörka, med 2 grönaktiga nerver nära kanten.

- 23 *C. punctata* Gaud. honaxen cylindr. aflånga, med något *utskjutande* skaft; axfjällen *afsmalnande i udd*; fruktg. ovala, med kort sprötl. glatt spets, *fnl punkterade, utan* tydliga nerver. 2 6. Fig. Fl.D.suppl.t.108. Andst. 8, f. 97. H.N. f. 7, n:o 77.

Ång. r. (Boh. Nordkoster, nära Lotsstugan, funnen 1861 af S. F. Ekman enl. Leffl. — N. Arendal, Sandvigen.) 7—10 tum hög, med tumslånga gröna ax, mycket glånsande fruktgömm., som knappt visa spår till nerver.

- 24 *C. distans* L. honaxen aflånga, med *inneslutna* ell. föga utskjutande skaft; axfjällen *trubbade med udd*; fruktg. bredt ovala, med kort stråft spröt, tydl. mångnerviga. 2 6. Fig. Fl.D.2434. Andst. 8, f. 96. H.N. f. 7, n:o 76.

Gräsväxta hafsstr. r. (Sk.—Uppl. Söderön vid Kafveröskate m. fl. st. Boh. Gottl. — N. södra del. af Aggerhus och Christianss. st.) *Axen långt skiljda, vanl. ända ned till stråets bas, med gröna fruktgömmen och ljusbruna fjäll, samt grön, i en stråf udd utlöpande ryggner, hvarmed denna art skiljes från de 2 följ.*

β — Strået 3sidigt, upptill vanl. stråft; axfjällen utan udd.

- 25 *C. Hornschuchiana* Hop. skärmen *smala*, det nedersta *icke* nående hanaxet; honaxen ovala—afånga, med *utskjut.* skaft; axfjällen *spetsiga* [utan udd]; fruktg. ovala och n. trinda, med rakt, stråft spröt, tydl. *nerviga*. 2 6. Fig. Fl.D.1049 och 2249. Andst. 8, f. 95. H.N. f. 6, n:o 73.

Fukt. ång. r. (Sk. Blek. Berntorp; Sissesjö: Goss.—Gestr. Jemtl. Frösön. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. vest. delen upp till Trondhj.) 1—2 fot hög, ofta med ett ax ned mot stråets midt, men inga vid basen; fruktg. gulgröna glånsande. — *C. speirostachya* Sm. *C. fulva* β Wg. Fl.Su. ed. 2.

- 26 *C. fulva* Good. skärmen *platta, breda*, det nedersta *nående* till ell. öfver hanaxet; honaxen åggrundt eller ovalt aflånga, med n. *inneslutna* skaft; för öfrigt som föreg. 2 6. Fig. Fl.D.1768 och 2435. Reich.f.620. Andst. 8, f. 94. H.N. f. 5, n:o 86.

Fukt. ång. r. (Sk.—Gestr. Jemtl. Östersund och Frösön, nära Storsjön. Ner. Vg. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) *Lik föreg., men tydl. skiljd med n. dubb. bredare blad och skärm, mindre åtskiljda, till toppen närmade ax och mer gulaktig färg. Fruktg. vanl. upplåsta och lätt hoptryckta, med felslående nöt, hvar för denna art torde böra anses som en abortierande form af föreg.*

b — Fruktg. som i afd. a—; honax. närsittande.

α — Skärmen mycket långa, bladlika.

- 27 *C. extensa* Good. bladen och skärmen *hoprulladt rännformiga*, de sednare med korta slidor; honaxen kort aflånga, med inneslutna skaft; *axfjällen trubbiga med kort udd*; fruktg. *ovala*, med sprötluk spets. 24 6. Fig. Fl.D.1709. Andst.7,f.91. H.N. f.3, n:o 72.

Hafsstr. r. (Sk. Valjö; Landskrona enl. F. Aresch. *Blek. Saxaviken.—Uppl. Ångskär i Hollnäs sn. Helsl. flerst.: C. O. Berg. Öl. Borgholm: G. v. Ced.; på ön Norman. Gottl.) 1—1½ fot högt, tufvadt starrgräs, med smala blad och skärm, som vanl. dro krökta och mycket längre än den korta äxsamlingen.*

- 28 *C. flava* L. bladen och skärmen *platta*, kölade; honaxen *ovala*, med inneslutna skaft; *axfjällen trubbiga*; fruktg. *omv. äggformiga*, med *syl-lik*, *nedböjd* spröt. 24 6. — β *lepidocarpa*: strået vanl. något stråft; honax och fruktg. *smärre*; hanaxet meränd. skaftadt. Fig. Fl.D.1047. H.N.f.13, n:o 82. Reich.f.654; β 653. Andst.7,f.93. H.N. f.10, n:o 69.

Kärräng. a. (Sk.—Lpl. Öl. — N. till Ost-Finnm.) *Gulgrönt starrgräs med vanl. fotshögt, stund. blott 3—4 tum högt strå, slull. n. gula ax, af hvilka hanaxet vanl. har intet ell. kort skaft, men hos β ½—1 tum långt, något som dock varierar. Så väl denna som följ. art har en var. acrogyna med honbl i hanaxets topp. — β C. lepidocarpa Tausch.*

- 29 *C. Oederi* Ehrh. bladen och skärmen *platta*, ell. med inhöjda kanter; honax. *rundad*—*aflånga*, med inneslutna skaft; *axfj. trubbiga*; fruktg. *utsperrade*, omv. *äggformiga*, med *kort sprötluk, rak spets*. 24 6. — β *oedocarpa* Ands. honaxen något åtskiljda; fruktg. med tydligare spröt; hanaxet långt skaftadt. Fig. Fl.D.371. Andst.7,f.92. H.N.f.5, n:o 85; β f.13, n:o 83.

Hafsstr. och kärr. (Sk.—VB. och Lul. Lpm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finn. — β Sk. Gladsaxhallar enl. Leml.; Söfvestad m. fl. st. enl. F. Ar. Hall. Knäred enl. Theor. Boh. Foss sn: Leml. Rosl. vid Rånäs. Öl. Kastlösa: G. v. Ced. Gottl. Blåse i Fleringe sn. — N. till Trondhj. st.) *Vanl. lågväxt, men stundom hög som föreg., ehuru med smärre ax, stund. föga större än en art, slull. n. gula; hanaxet meränd. utan märkligt skaft. — C. divisa Fl.D. C. flava var. Beurl.*

β — Skärmen mycket korta, syl-lika.

- 30 *C. pedata* Wg. bladen trådlika; skärmen n. utan slidor; honax. *kortskaftade, gles* 3—5blommiga; *axfjällen rundade, hinnkantade*; fruktg. n. *klotrunda* med spröt. 24 6.7. Fig. Sv.B.684. Wg.Fl.L.14. Andst.7,f.89. H.N.f.5, n:o 84.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. på fjellet Opisäwe. Lul. Lpm. Wirihare, Unna Toki, Kaisats etc. Pit. Lpm. Akarisfjell. Jeml. Tålgstensberget enl. Leml. Herjed. sydost om Helagsfjellen. — N. Finn. Salten. Trondhj. på Dalvolafjellet; Stuedalen på Kna-larne vid Lövöen.) 1—3 tum hög, med 2—3 lin. långa n. *jennbreda, uppräta ax af lätt affallande fjäll och fruktg. — Anm. C. pedata L. synes af beskr. i Sp.Pl. tillhöra C. globul., ehuru synonym. till en del antyder C. ornithopoda.*

c — Fruktgs mynning hel ell. snedt urnupen.

- 31 *C. panicea* L. strået trubbkantigt, *glatt*, jemte bladen *blågrönt*; skärmen *platta* och korta, med långa slidor; honaxen *åtskiljda, gles* mångblomm., med utskjutande skaft; fruktg. *upplåsta n. klotrunda* ell. något elliptiska, med *kort, utböjd*, *snedskuren*, men *hel spets*. 24 6. — β *sublivida*: blad och skärm dubb. smalare, de sednare 2—3 gr längre än axskaftet; ax och fruktg. hälften smärre. Fig. Fl.D.261. Andst.7,f.76. H.N.f.9, n:o 75.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N. — β Sk. vid Helgeå enl. F. Ar. Södm. Öst. Vingåker. Stockh. i Orhemsviken. — N. Christiania.) *Något blåaktigt, fotshögt starrgräs, med rundadt ell. elliptiskt äggformiga fruktgömmen, utan märklig spets. — β C. pelia O. F. Lang. C. Langii Steud. och Bl. Norg. Fl.*

- 32 *C. vaginata* Tausch. strået och bladen *rent gröna*; fruktg. *äggformiga*, otydligt 3kantiga, med något *uldraget och utböjd, snedt urnupet* spröt; i öfr. som föreg. 24 6. Fig. Fl.D.suppl.27. Andst.7,f.75. H.N.f.7, n:o 78; f.10, n:o 70; f.11, n:o 73 [var.].

Fukt. skogsmark. (Lpl.—Sk. nor. del. — N.) *Lik föreg., men med längre och spädare strå, något bredare och längre blad, mer spelsadt och kantigt fruktg., som*

stund. har ett teml. långt, utåt krökt spröt: *C. curvirostra* ed.3. — *C. sparsiflora* Fr. *C. panicea*  $\beta$  *sparsifl.* Wg.

- \*33 *C. stylosa* C. A. Mey. strået och bladen som hos föreg.; skärmen platta, det nedersta mycket långt, med mycket korta, bruna slidor; honaxen något närsitt., tätblommiga, aflånga, med utskjutande skaft; fruktg. n. skaftade, 3kantigt ovala, punkterade, med mycket kort och sned, n. hel spets. 2 1/2. Fig.

Hafsstr. r. (N. Nordl. vid Saltenford nedom Bodø kyrka.) Ungefär fotshög, habituell lik *C. glauca*, men skiljd med örlens färg, de kortare och upprätta axen på kortare skaft, glatta fruktg. — *C. nigritella* Drej.?

- 34 *C. livida* Wg. strået 3sidigt, upptill strått, jemte de smala bladen gröngrått; skärmen smala, med tydliga, stund. långa slidor; honaxen något närsitt., jemnbreda ell. aflånga, med utskjut. skaft; fruktg. aflånga, på båda sidor plattadt konvexa, trubbiga, med rundade släta kanter och hel mynning. 2 1/2, 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.34. Andst. 7, f. 74. H.N.f.7, n:o 79.

Dyga kärr, r. (Lpl.—Smål. Vexjö. — N. Christiania—Alten i Finn.) Skiljd från *C. panicea* med sin starkt ljusgrå färg, hvarmed den på långt håll urskiljes i kärren, de smala bladen och plattare, n. hvita fruktgömmena.  
(*C. Buxbaumii*.)

\*\*\*\*\* Hanax ensamt, af blott hanbl; fruktgömmen småludna.

$\alpha$  — Honaxen tjocka; skärmen n. utan slidor.

$\alpha$  — Skärmen [åtm. det nedersta] smalt bladlike [gröna].

- 35 *C. tomentosa* L. honaxen något närsittande, vanl. kort skaftade, cylindriskt aflånga; axfjällen spetsiga, kortare än fruktg.; dessa omv. äggformiga—n. klotrunda, trubbiga ulliga. 2 1/2. Fig. Fl.D.suppl.109. Andst. 7, f. 80. H.N.f.4, n:o 90.

Äng. r. (Smål. Hingetorp i Thorsås sn: Stud. P. Peterson enl. Ekstr. Öl. Gottl.) 1—1 1/2 fot högt, spensligt starrgräs; axen stund. n. cylindriska, vanligen kortare än skärmen; fruktg. kvitulliga.

- 36 *C. globularis* L. honaxen åtskiljda, oskaftade äggformiga; axfjällen trubbad, kortare än fruktg.; dessa äggformiga spetsiga ludna. 2 1/2. Fig. Fl.D.1404. Andst. 7, f. 81. H.N.f.3, n:o 71.

Fukt. och tuffvig skogsmark. (Lpl.—Gestr. Vestml. Ner. nor. och vest. del. Verml. Dalsl. Lästviksdyfven i Steneby sn; norra Onsön i Eds sn enl. Lemf. VG. Hofva sn: Reuterm. Smål. Skareda-moen i Lommaryd sn. — N. Ost-Finn. Molde, samt Gudbrandsdalen. Rommerige etc. ned till Christiania.) 1—1 1/2 fot högt, spensligt och mjukt starrgräs, strået vid basen högt upp klädt med rödbruna fjäll; bladen mycket smala; nedersta skärmladet alltid längre än sitt ax, vanligen flere gånger så långt, de öfre syl-rika, ofta hinnaktiga. — *C. tomentosa* Fl.D.

- 37 *C. pilulifera* L. honaxen något närsittande, oskaftade klotrunda; axfjällen uddspetsiga, icke kortare än fruktg.; dessa klotrunda med spröt, finludna. 2 1/2. Fig. Fl.D. 1048. Andst. 7, f. 82. H.N.f.12, n:o 83.

Stenbackar. (Sk.—Medelp. Jeml. Oviken. Herjed. Öl. Gottl. — N. till söd. Finn.: Norm.) Strået uppböjdt med teml. breda platta blad; de öfre skärmen vanl. mycket små syl-rika och hinnaktiga; honax af ärters storlek. — *C. Oederi* Retz. *C. filiformis* Fl.D.

$\beta$  — Alla skärmen hinnaktiga [färgade].

- 38 *C. montana* L. honaxen närsittande, äggformiga; skärmen syl-rika, med å ömse sidor vidgad, hinnaktig bas; axfj. trubbiga med udd, kortare än fruktg.; dessa från den smalare basen omv. äggformiga, spetsiga 3kantiga ludna. 2 1/2. Fig. Fl.D.1769. Andst. 7, f. 85. H.N.f.6, n:o 72.

Lundar, r. (Sk.—Uppl. och Vestml. Dal. vid Avestad; Garpenberg sn flerst. Verml. Rudsberget vid Carlstad. Boh. Gottl.) Quartermhögt, mjukt starrgräs, med svartbruna glänsande fjäll vid basen af strået; axen svart. — *C. collina* Willd.

- 39 *C. præcox* Jacq. honaxen något närsittande, kort skaftade aflånga; skärmen syl-rika, meränd. med korta slidor; axfjällen spetsiga, af det nästan klotrunda, något spetsiga ludna fruktgömmets längd. 2 1/2. Fig. Fl.D.1527. Andst. 7, f. 84. H.N.f.11, n:o 72.

Hartman, Skandnaviens Flora (10:de uppl.).

16

Backar. (Sk.—Gestr. *Holst.* Tuna sn: Wistr. *Herjed.* Dal. Boh. Strömstad. Hall. Öl. Götll. — N. i södra delen.) Skärmslid. och axfjällen grönaktigt ljusbruna.

- 40 *C. ericetorum* Poll. honaxen närsittande, oskaftade, aflångt rundade, med fjäll-likha eller något sylspetsade skärm, n. utan slidor; axfjällen rundadt trubbiga, hinnkantade, af det trinda, omv. äggformiga ludna fruktgömmets längd. 2 5. —  $\beta$  membranacea: mjukare gräs, med mer aflånga, mindre trubbiga, helbräddade axfjäll. Fig. Fl.D.1765. Andst.7.f.83. Reich.f.636;  $\beta$  637. H.N.f.7, n:o 75.

Back. a. (Sk.—*Holst.* Ångml. Junsele sn. och Jemtl. Näs sn. Öl. Götll. — N. till Trondhj. —  $\beta$  i fjelltrakter.) Mörkbruna ax, spåret n. klubblikt; skärmen med mycket korta, stund. omärkliga, svartröda slidor vid basen; axfjällen vanligen fint hårkantade. — *C. ciliata* Willd.  $\beta$  *C. membranacea* Hoppe.

b — Honaxen utdragna, mycket, smala; skärmen med tydl. slidor.

- 41 *C. pediformis* Mey. stråen från en krypande rotstock, vid basen bladiga; skärmslid. med ett syl-likt bladämne; honaxen 2—3, långt åtskiljda, jemnbreda mångblommiga, med skaft dubbelt längre än slidorna, det öfversta knappt öfverstående det långskaftade hanaxet; axfj. uddspetsiga, n. af fruktg:s längd; dessa omv. äggformiga med kort spröt, finludna. 2 5. Fig. Fl.D.suppl.35. Andst.7.f.86. H.N.f.6, n:o 71.

Bergstrakt. r. (Jemtl. Östersund, vid Björnmyran; Frösön och Åhs; Liths sn, ymn. — N. Christiania flerst. t. ex. Fröen, Ladugårdsöe, Mærradalen, Krogklevsen, Ringboe.) Potshög vid frömgöningen; nära slägt med följ., men tydl. skild af det nedtill bladiga strået, de mer åtskiljda honaxen och de mindre tvärhuggna axfjällen.

- 42 *C. digitata* L. stråen vid basen omgifna af bladlösa slidor; skärmslid. utan bladämne; honaxen något närsittande, jemnbreda, glest mångblommiga, med skaft längre än slidorna, öfverstående det oskaftade hanaxet; axfj. tvärhuggna, af fruktg:s längd; dessa omv. äggformiga 3kantiga spetsiga finhåriga. 2 6. —  $\beta$  pallens Frist. hela växten blekgrön; axen mer kortskaftade. Fig. Fl.D.1466. Andst.7.f.88. H.N.f.11, n:o 71;  $\beta$  f.16, n:o 69.

Skuggiga back. (Sk.—Um. Lpm. Boh. Öl. Götll. — N. till Nordl. —  $\beta$  Ångml. Gransjö gästg. Medelp. Selånger. Jemtl. Frösön, Oviken och Lith. *Herjed.* på Ulfberget.) Axen tumslånga mörka, 7—10blommiga; stråets bas klädd, med bruna bladslidor.

- 43 *C. ornithopoda* Willd. honaxen närsittande, med inneslutna skaft, fåblommiga; axfj. spetsade, kortare än fruktg.; för öfr. som föreg. 2 5. Fig. Fl.D.1405. Andst.7.f.87. H.N.f.3, n:o 70.

Fukt. äng. vid bergsödet. r. (Lpl. Ångml. Jemtl. *Herjed.* Dal. Osmundsberget. Verm. Ner. ÖG. Smål. Jönköping. Öl. Tveta och Högby. Götll. allm. — N. Nordl. ned till nor. del af Christianss. st.) Axen af ljus färg, en knapp half tum långa, 3—6blommiga; stråslidorna n. gröna, med ett kort, borslikt bladämne. — *C. digitata*  $\beta$  Wg. Götll. Fl. *C. pedata* All.

\*\*\*\*\* Hanaxet ensamt, meränd. med honblir i toppen.

- 44 *C. Buxbaumii* Wg. axen n. oskaftade, något åtskiljda, upprätta, aflånga—omv. äggformiga; axfjällen uddspetsiga, af fruktg:s längd; dessa 3kantigt ovala trubbiga nerviga, fint sträp prickiga. 2 6. —  $\beta$  heterostachya: toppaxet af blott hanblir, ell. med honblir vid basen. —  $\gamma$  macrostachya: axen cylindriska, tumslånga, det nedersta vanl. skaftadt; toppaxet af n. blott honblir. Fig. Fl.D.1406. Andst.6.f.65. H.N.f.8, n:o 79.

Våta äng. r. (Lpl.—Sk. Boh. Krokholmen. Öl. Götll. — N. Ost-Finnm.—Christiania. —  $\beta$  i fjelltr. —  $\gamma$  Blek. Berntorp. Boh. Sydoster. VG. Göteborgstrakten; Kinnekulle. Ner. Örebro; Hökerkulla etc. Södm. Vallby sn. Trol. den i hela söd. Sv. allmännare formen af *C. Buxb.*) 1—2 fot hög, med upptill vanl. strävt strå, smala blad, korta och tjocka ax. Det hos  $\gamma$  långa cylindr. toppaxet, som fullkoml. liknar sidoaxen, ger denna form ett från de nordligare betydl. afvikande utseende. — *C. canescens* Lin. herb. [trol. genom misstag].

- 45 *C. atrata* L. axen skaftade, närsittande, lancetlika, meränd. lutande; axfj. spetsiga, af fruktg:s längd; dessa ovala trubbiga med kort spets, nervlösa fint sträp-

- prickiga. 24.6.7. —  $\beta$  *aterrima*: strået mycket stråft; fruktgömm. till större delen svarta. Fig. Sv.B.754. Fl.D.158. Andst.6.f.67. H.N.f.3, n:o 75.  $\beta$  Reich.f.591.
- Fjellv. (Lpl.—Herjed.—N.) Föthögt bredbladigt starrgräs, med något stora i toppen sittande svartfjälliga ax, stull. af tyngden lufande. Var. med glatt ell. upptill stråft strå, samt med smalare strå och blad, upprätta ax, närmande sig till *C. Vahlil*: *C. atrata*  $\gamma$  *rectiuscula* Bd.4.
- 46 *C. nigra* All. axen med inga ell. korta skaft, gytttrade i toppen, ovala; axfj. kortare än fruktg.; dessa omv. äggformiga, rundadt trubbiga, med kort spröt; för öfr. som föreg. 24.6.7. Fig. Fl.D.suppl.104. Reich.f.590. Andst.2.f.39. H.N.f.14, n:o 83.
- Fjellv. r. (Lpl.: Läst. enl. Fr. Jemtl. Åreskutan.—N. Dovre.) *Det Jemtl. ex.*, som utg. eger, öfverensstämmer till alla delar fullkoml. med *Schweitz.* och *Tyrol. ex.*, samt är fingerhögt [andra enl. Beurl. mer än quartershöga], likt en förkrympt form af föreg., dock skiljbar af de upptill bredare, mycket mer trubbiga fruktg., som på nämnda *ex.* äro helt och hållet svarta; strået icke stråft som hos föreg.
- 47 *C. Vahlil* Schk. axen som hos föreg., klotrunda, ell. något aflånga; axfj. spetsade, mycket kortare än fruktg.; dessa ovala med spets, fint stråfprickiga, nervlösa. 24.6. Fig. Fl.D.403. Andst.6.f.66. H.N.f.3, n:o 78.
- Fjellv. (Lpl.—Dal. i Idre. Angml. Medelp.—N.) Strået  $\frac{1}{2}$ —1 fot högt, med 2—3, i toppen gytttrade ax, söga större än arter; fjällen svarta. — *C. alpina* Sw. (*C. fuliginosa*; varr. af *flava*, *Oederi* m. fl.)

†† Märken 2 [undantagsvis någongång 3]: *Distigmaticae*.

\* Honax med skaft af halfva axets längd eller längre (und. *C. sal. subspath.*); axfjällen 3nerviga.

a — Honaxen slutl. hängande.

- 48 *C. maritima* Müll. honaxen långskaftade cylindriska; axfjällen tvärt öfvergående i en stråf borst, flere gånger längre än själva fjällen och de omv. äggformiga, otydl. nerviga fruktgömmena; hanaxen 2 ell. flere. 24.6. Fig. Fl.D.703. H.N.f.6, n:o 76. Andst.6.f.64.
- Steniga hafsstr. r. (VB. Neder-Kalix skärg., på Börskar (ell. Vattungen). VG. Göteborg. Boh. nära Marstrand; Henån på Oroust; Uddevalla; Strömstad flerst. — N. utefter hela kusten från Boh. gränsen till Ost-Finom.) 1—1½ fot högt starrgräs, med bleka ax och snart aflållande fruktg., 2, 3 g:r kortare än fjällens borst.
- \*49 *C. cryptocarpa* C. A. Mey. honaxen cylindriska, de medre kortare än de långa och fina glatta skaften; axfjällen spetsiga, längre än de ovala ell. omv. äggformiga, otydl. nerviga trubbiga fruktgömmena; dessas mynn. kort utstående, hel; hanaxen 2 ell. flere. 24.6.7. Fig. Mey.Cyp.t.14. Andst.6.f.61. H.N.f.15, n:o 85.
- Hafsstr. r. (N. Finnm. Vadsöe. Trondhj. på Strand under Lexvigen mell. Axnæs och Storvig; Bergen och Christiania enl. Bl.) Strået nära 1½ fot högt, med 2 han- och 3, 4 honax, alla långt åtskiljda och öfver en tum långa, med skaft af 1—3 tum längd och bladlika skärm utan slidor, långa som strået; fjällen variera i längd. — *C. filipendula* Drej.

b — Honaxen upprätta \*).

- \*50 *C. halophila* Nyl. honaxen cylindriska, vanl. mot spetsen tjockare, åtskiljda, något längre än de n. glatta skaften; axfjällen lancettlika, långspetsade, dubb. längre än de omv. äggformiga fruktg.; dessas mynn. kort utstående hel; hanaxen 2 ell. flere. 24.7.8. Fig. Andst.5.f.51. H.N.f.12, n:o 86.
- Hafsstr. r. (N. Ost-Finm. nor. stranden af Varangerfjorden.) Nära almhög med glatt strå, platta breda blad och stora bladlika skärm af axsamlingens höjd, samt nära 2 t. långa smala ax, liknar denna mer *C. aquatilis* än följ., hvilken den dock genom karaktärer står närmast och med hvilken den anses identisk i Ledeb. Fl.Ross.

- \*51 *C. salina* Wg. honaxen lancettlikt cylindriska, af de glatta skaftens längd; axfjällen

\*) Alla arter i denna afd. anses af Blytt, trol. med rätta, för former af en enda art *salina* i vidastr. mening.

- ägrunda med lång syl-lik spets ell. trubbiga, ungefär af de aflängt ovala fruktgs längd; dessas mynn. urnupen; hanaxen som hos föreg. 24 7, 8. Fig. Sv.B.756. Andst. 5.f.50, b. H.N.f.16, n:o 71.
- \* *subspathacea* Wormskj. honax med korta, stund. inga skaft; fruktgs mynn. mer utdragen; hanax vanl. ensamt. —  $\beta$  *nardifolia*: lågväxt, med smala hoprullade blad. Fig. Andst. 5.f.49. Fl.D.1530. H.N.f.10, n:o 80.
- Hafsstr. (N. Ost-Finnm.—Trondhj.) Omkring  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  fot hög, med glatt strå, tumslånga ax och lika långa skaft. Skiljd från föreg. mera genom mindre storlek och utseende, än genom verkliga karaktärer. — *C. cuspidata* Wg. i Vet.Ac.H.1803 [formen med sylspetsade fjäll]. *C. salina*  $\alpha$  *cuspid.* och  $\beta$  *mulica* Wg. Fl.L. — \*, som i vissa former synes vida skiljd från sal., sammanflyter dock genom andra tydl. dermed.
- 52 *C. hematolepis* Drej. honaxen som hos föreg., längre än de glatta skaften; axfjällen med en kort syl-lik mycket sträff udd, ell. trubbiga, längre än de omv. äggformiga fruktg.; dessas mynn. kort utstående, hel. 24 6, 7. —  $\beta$  *mulica*: strået sträff; axfjällen trubbiga ell. med omärk. udd. Fig. Fl.D.2370. Andst. 2.f.37. H.N.f.14, n:o 82;  $\beta$  f.8, n:o 72. Andst. 5.f.50?
- Hafsstr. r. (Hall. vid Särö. Boh. mångenstädes, t. ex. på Hisingen, Instön etc.; Marstrand; Oroust, vid Henån; Gustafsberg; Strömstad, Holkedalskilen och söd. Koster. — N. Christiania; Bergen; Trondhjem; Finnm. Lyngen. —  $\beta$  N. Christiania.) Nära fotshög, med dels glatt, dels något sträff strå, samt mer än tumslånga ax af rödbruna fjäll och gulaktiga fruktg.; hanaxen ett, men med ämne till ett andra; axfjällen till en del utan den sträffa borsten i spetsen, likasom den vore afbruten. — *C. kallegatensis* Fr., som icke anser denna växt vara Drejers art. —  $\beta$  är *C. salinoides* Beurl. (*C. acuta* och *vulg.* varr.)
- \*\* Honax 3 till många gånger längre än skaftet, då sådant finnes; axfjäll oftast ennerviga.
- a — Bladen breda; skärmen långa, nående öfver ell. till hanaxen; dessa oftast flere, af blott hanblir.
- $\alpha$  — Strået trubbkantigt, glatt; fruktg. nervlösa.
- 53 *C. aquatilis* Wg. bladen rännformiga; skärmen bladlika, det nedersta med en mycket kort, ringformig slida; honaxen med inga ell. korta skaft, uppråta, cylindriska, vanl. mot spetsen tjockare; fruktg. rundadt ovala, plattade, med kort utstående, hel mynning, längre än axfjällen; hanaxen 2 ell. flere. 24 6. Fig. Fl.D.suppl.33. Andst. 5.f.54. H.N.f.3, n:o 77; f.16, n:o 70 [typisk].
- Stränd. (Lpl.—ÖG. och Verml. Smål. vid Vinäs i Eds sn enl. Ekstr. — N. från Ost-Finnm. till Christiania.) Alnshög, af blågrön färg, med 2—3 tum långa, meränd. något klubblika ax af bleka fruktg. och korta bruna fjäll. Fruktg. utan tydliga nerver, ell. med en gröfre, tätt vid kanten.
- 54 *C. borealis* Lang: bladen platta; skärmen som hos föreg.; honaxen cylindriska uppråta, de nedre skaftade; fruktg. aflängt ovala, trubbiga med kort framstående, n. hel mynning, något längre än axfjällen; hanax meränd. ensamt. 24 6. Fig. Andst. 4.f.45.
- Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando. Lul. Lpm. Puolaure; Siteluokte vid Wirehaure. Herjed. Grufvålen enl. G. v. Ced. VB. vid Seivitz gästg. Ängml. Hernön. — N. Ost-Finnm.) Fotshög, med mer än tumslånga smala ax, teml. lik föreg., för hvars afart den anses af Læstadius. — *C. epigejos* Læst. [icke Fr., hvars art af detta namn, H.N.f.12, n:o 87, är *C. discolor* Nyl.]. *C. arctophila* Nyl. enl. Th. Fr.
- $\beta$  — Strået hvasskantigt, sträff; fruktg. [mer ell. mindre tydligt] nerviga.
- 55 *C. vacillans* Drej. bladen platta; skärmen bladlika, föga bredare än strået, med skiljda bladöron; honax oskaftade uppråta, utdraget lancettlika; fruktg. bredt omv. ägrunda, med kort och hel mynn., plattade, prickade, ofydl. nerviga, mycket kortare än axfjällen; hanax. 1 ell. 2. 24 6. Fig. Andst. 2.f.36.
- Fukt. st. r. (Lpl. enl. ex. af Læst. Pit. Lpm. vid en bäck nära toppen af Tjådjakk,



samt i en myr nära Braksjokk. *Jeml.* Kellsjöns strand nedom Åreskutan — *N. Christiania*.) *Fotshög*, med mycket sträfft strå, korta blad och skärm, som icke nå öfver hanaxet; fjällen ågrundt lancetl., spetsiga ell. med en omärkl. udd, n. svarta med en smal gul rand efter midten. Märken 2—3.

- 56 *C. acuta* L. bladen platta; skärmen bladlika, vanl. långa och breda, med skiljda blad-  
öron; honaxen med inga ell. korta skaft lutande, cylindriska; fruktg. rundadt ovala,  
på båda sidor konvexa, otydl. nerviga, något spetsiga, af axfjällens längd; han-  
axen 2 ell. flere. 24 6. —  $\beta$  *fluvialis*: skärmen längre än axsamlingen; axfjällen  
kortare än fruktg. —  $\gamma$  *personata*: strået n. slätt; axen bleka smala, släkt lutande,  
2—4 tum långa och längre skaftade. Fig. Fl.D.2247. Andst.5,f.56, H.N.f.8, n:o 74.  
 $\beta$  Sv.B.408. H.N.f.9, n:o 80.  $\gamma$  H.N.f.8, n:o 75.

Stränd. a. (Sk.—Lpl. — *N.* till Trondhj.) Omkr. 2 fot högt, tufvad starrgräs, va-  
rierande i hög grad. Bladslid. låta ej upprispa sig i spindelväfslika trådar, så-  
som hos *C. stricta*, utan i sammanhängande hånor.

- 57 *C. proliza* Fr. bladen och skärmen som hos föreg., de sednare längre än axsaml.;  
honaxen som hos föreg., släkt lutande; fruktg. bredt ovala, plattade, med kort ut-  
stående hel mynn., tydl. nerviga, mycket kortare än de lancetl. långspetsade ax-  
fjällen; hanax. som hos föreg. 24 6. Fig. Andst.5,f.57. H.N.f.10, n:o 74.

Stränd. (Sk. flerst. enl. F. År. Sk. Fl. Blek. Lyckeby m. fl. st. enl. Goss. ÖG. i Lan-  
deryd och vid Söderköping. Södm. Thorshälla. Stockh. Danvikskrokar: G. v. Ced.  
Uppl. Ekolsund; Uppsala-trakten. Gestr. Kubbo. Helsl. Njutånger och Forssa snr:  
Wistr. Medelp. Hafverö sn, Östavall. Ångml. Törna-ån i Ulånger: Arn. Vestml.  
Kärrobo sn, Springsta äng; Hjelmare kanal. Ner. vid Svartån och Hjelmaren. Hall.  
Knäred, vid Lagaån enl. Theor. — *N. Christiania*.) Medelform mell. föreg. och *C.*  
*stricta*; lik den förra till bladen, den sedn. till frukten; vanl. gröfre än bägge,  
med stora och tjocka ax, svartröda fjäll. Var. med glesa och mer slaka ända  
till hängande honax: var. *protensa* Fr. — *C. acuta* L. herb.

- 58 *C. tricostata* Fr: bl. och skärm. som hos föreg., de sednare af axsamls längd; hon-  
axen n. oskaftade uppräta cylindriska; fruktg. bredt ovala trubbiga, upphöjdt 3-  
nerviga, längre än de trubbiga fjällen; hanax. som hos föreg. 24 6. Fig. Andst.5,  
f.55. H.N.f.10, n:o 75 [var.].

Stränd. r. (Smål. norra del. ÖG. Norrköp., vid Himmelstalund och Korshagen: Kindb.  
Stockh. Svartsjö och på Dälfvön; Gåsherget i Jerfälla. Uppl. Uppsala etc. Vestml.  
Molnebo bruk. — *N. Holsfjorden* i Ringerige.) Mer lik *C. stricta* än *acuta*, mel-  
lan hvilka öfven denna art synes vara en medelform.

b — Blad breda; hanax oftast ensamt, af blott hanbl.

- 59 *C. limula* Fr. strået hvasskantigt, mycket sträfft; skärmen smala, med skiljda blad-  
öron; honaxen uppräta, n. cylindriska, det nedersta vanl. med kort skaft; fruktg.  
aflånga spetsiga plattade, med omärkligt utstående, n. hel mynn., otydl. nerviga,  
n. af de trubbiga axfjällens längd. 24 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.105. Andst.5,f.53. H.  
N.f.16, n:o 72.

Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando etc. Lul. Lpm. Siteluokte vid Wirihau. VB.  
mell. Palajoki och Muonioniska; nära Parkajoensun; vid Muonio- och Tornio-elfvars  
förening. Herjed. Ljusnestöten enl. G. v. Ced. — *N. Ost-Finnm.* vid Klösterelfven.  
Vest-Finnm. Alten.) Fotshög med 1½ tum långa svartfjälliga ax; hanaxet ensamt;  
rotstocken krypande med grofva skott. — *C. acuta*  $\beta$  *ripensis* Læst, skriftl.

- 60 *C. hyperborea* Drej. strået hvasskantigt, glatt; skärmen som hos föreg.; honaxen  
närmade till hanaxet, n. oskaftade, uppräta, aflånga ell. lancetlika; fruktg. elliptiskt  
oval, plattade med mynn. som hos föreg., otydl. nerviga, kortare än de trubbad  
axfjällen. 24 6, 7. Fig. Andst.5,f.47. H.N.f.12, n:o 89.

Stränd. r. (Torn. Lpm. Kedkesuando. Herjed. på Grönfjället norr om Helagsån. —  
*N. Ost-Finnm.* Seidasfjellen. Vest-Finnm. Mageröe och Maasöe: Th. Fr. Alten, St.  
Rajpas. Dovre, nära Kongsvold. Söd. N. Gousta fjell.) Lik föreg., men med kort-  
are och tjockare ax, slätt strå. — *C. acuta*  $\beta$  *ripensis* Læst. [ett annat ex.] —  
Anm. Af *C. hyperb.* har Drejer 2 olika former, en mindre med smalare och  
skaftade ax, mest öfverensstämmande med hans beskrifning, och en större allde-  
les lik vår.

- 61 *C. elytroides* Fr. strået hvasskantigt, något stråft; skärmen breda, längre än axaml., med sammanflytande bladöron; honaxen som hos föreg.; fruktg. bredt ovala, n. nervlösa, tydl. prickade, med mynn. som hos föreg., af de trubbiga, ell. kort uddspetsiga axfjällens längd. 2 6, 7. Fig. Andst. 5, f. 48. H.N.f. 10, n:o 77?  
Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando. VB. vid Torn. Uppsala och Hall. enl. Fries.) Lik de föreg., men med bredare skärm och fruktg. samt fjäll, hvilkas ryggner ofta utlöper i en kort syl-lik udd. — *C. saxatilis* v. *flacciformis* Læst.
- 62 *C. rigida* Good. strået något trubbkantigt, mer och mindre stråft; skärmen smala och korta, med skilda bladöron; honaxen som hos föreg., ovala ell. klubblikt af-långa, det nedersta meränd. skaffadt; fruktg. ovala, på båda sidor upphöjdt konvexa, med något utböjd hel spets, nervlösa, längre än de trubade axfjällen. 2 6, 7. Fig. FLD. 159. Andst. 5, f. 46. H.N.f. 8, n:o 77.  
Fjelltr. a. (Lpl.—Sveg i Herjed. Dal. Idre och Särna. — N.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med stadigt strå, långa och breda blad i låta knippen från den krypande, af bladlemningar fjälliga rotstocken. Var. med honaxen mer och mindre närstillande, det nedersta stundom långt aflägsnadt från de öfriga. Fruktg. skadas ofta af en svart svamp och blifva då stora och klotrunda. — *C. saxatilis* Wg.F.L.L.  
(*C. saxatilis*, *vulgaris*  $\beta$ .)  
c — Blad smala [obetydl. bredare än strået], kölade ell. snart hoprullade; skärmen korta; hanaxen af blott hanbl. r.  
a — Fruktgömmen tydligt nerviga.
- 63 *C. stricta* Good. strået stråft; bladen platta, kölade; skärmen syl-lika, kortare än axaml., det nedersta bladlikt; honaxen n. oskaftade, uppräta, aflängt cylindriska; fruktg. ovala, plattade, med kort utstående, hel mynning. upphöjdt nerviga, något längre än axfjällen; hanaxen 2 ell. flere. 2 6. Fig. FLD. 2548. Andst. 7, f. 60. H. N.f. 8, n:o 73.  
Stränd. (Sk.—Hels. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. Laurvig; Christiania.) Alnshögt, i stora tusvor växande starrgräs med låta ax af plattade, i tydlig spiral ordnade fruktg., som tidigt affalla, och med slidor, som, då de dragas från strået, på insidan upprispa i ett nät, liknande spindelväf. Var. med  $\frac{1}{2}$ —2 tum långa ax.
- 64 *C. vulgaris* Fr. strået stråft; bladen vanl. rännformiga, n. utan köl; skärmen bladlika, vanl. kortare än axaml.; honaxen n. oskaftade, närstillande, uppräta, cylindriska; fruktg. ovala trubade konvexa, meränd. längre än de trub. axfjällen; hanax. 1 ell. 2. 2 5, 6. Fig. FLD. 1281 och 2478. Andst. 5, f. 52. H.N.f. 8, n:o 76; f. 9, n:o 81.  
Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl.  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med talrika former, som närma sig så väl till flere af de föreg. som till de följ.; ofta knappt skiljbar från smärre varr. af *C. acuta*. — *C. cæspitosa* Lin. herb. *C. Goodenowii* Gay. och Beurl. — Anm. *C. bolina* Lang. från Kongsvold på Dovre, med platta och breda, okölade blad, samt bladlika skärm af det mycket sträva stråets längd, men endast funnen med omogen frukt, har förgäfsvis blifvit eftersökt af Blytt och torde behöfva när-mare granskning.
- 65 *C. juncella* Fr. strået stråft; bladen slutl. trådlikt hoprullade; skärmen n. borstlika, kortare än axaml., det nedersta bladlikt; honaxen aflägsnade uppräta, smalt cylindriska; fruktg. aflängt ovala med kort, utböjd spets, längre än de trub. axfjällen; hanaxen 1 ell. 2. 2 5, 6. Fig. H.N.f. 10, n:o 76.  
Kärr. (Lpl.—Sk. nor. del. enl. F. Aresch. Hall. Öl. Kastlösa, Breddinge etc. — N. Finnm. till söd. N.) Växer i tusvor, och är utmärkt genom stråets, bladens och axens spenslighet. Är likasom följ. en medelform mell. *C. vulg.* och *cæspitosa*.  
 $\beta$  — Fruktgömm. nervlösa ell. n. nervlösa.
- 66 *C. turfosa* Fr. strået glatt ell. föga stråft; bladen kölade, med platta kanter; skärmen bladlika, vanl. kortare än axaml.; honaxen som hos föreg.; fruktg. ovala med spets af den framskjutande mynningen, otydl. nerviga, meränd. längre än de spetsiga axfjällen; hanaxen 1 ell. 2. 2 5, 6. Fig. Andst. 6, f. 58. H.N.f. 10, n:o 79.  
Kärr. (Ängml. Bjerträ, i Rammeldalen; Gransjö, vid Helgumssjön. Medelp. Torps prestg. Helsl. Bollnäs och Alta: Wistr. Gestr. Kubbotrakten flerst. Uppl. Läby kärr vid Uppsala m. fl. st.; Tibble och Giresta snr enl. Leffl. Stockh. Södm. År-

dala prestig.; Nyköping: C. Ind. etc. ÖG. Ryd i St. Lars; Kärna etc. Dal. Grycksbo Bruk. Ner. Boh. Hall. Onne torfmosse. — N. Christiania; Finden i Torpem, och i Lom.)  $1\frac{1}{2}$ —2 fot högt starrgräs, med smala blad och strån, dels växande i tufvor, dels mera spridd från rotskott.

- 67 *C. caespitosa* L. strået strävt; bladen kölade, med utvikna kanter; skärmen vanl. n. omärkliga, syl-lika; honaxen oskaftade, närsittande, vanl. upprätta aflånga; fruktg. ovala trubbiga med omärklig udd af den knappt framskjut. mynningen, nervlösa, föga längre än axfjällen; hanaxet ensamt.  $2\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. Sv.B.222. Fl.D.2547. Ands. t.6.f.59. H.N.f.8, n:o 78;  $\beta$  f.10, n:o 78.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N. Aggerhus och Christianss. st.) Bildar tufvorna på sidlända ängar och blommor tidigt ännu blott  $\frac{1}{2}$  fot hög, men blir sedan ända till alnshög, ehuru spenslig och smalbladig, med 3—4, i förhåll. till strået små [knappt tumslånga] ax i öfversta toppen, sällan 1 tum åtskiljda. — *C. pacifica* Drej. *C. Drejeri* Lang.

d — Hanaxet ensamt, med honblir i toppen.

- 68 *C. bicolor* All. strået längre än de korta bladen; skärmen kortare än axsaml.; axen närsittande, ovala, något skaftade; fruktg. från smal bas omv. äggformiga, mycket trubbiga, nervlösa, längre än de trubbiga axfjällen.  $2\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B.701. Fl.D. 2122. Ands.t.4.f.43. H.N.f.11, n:o 79.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. mell. Kerkeware och Tuodderats, vid sjön Puolaure, nedom berget Kerkeware. Herjed. vid Ljusneelf midtför Vallarne: J. Hult. enl. G. v. Ced.) 2—4 tum hög, med vid fruktmogn. båglikt böjdt ell. lutande strå; de 2—4 axen 2—3 lin. långa, med svartbruna fjäll och n. hvita fruktgömmen.

- 69 *C. rufoa* Drej. strået kortare än de långa bladen; nedersta skärmet längre än axsaml.; axen som hos föreg., n. aflånga; fruktg. omv. äggformiga, med kort spets, otydl. 3nerviga, af de omv. ägggrunda trubbiga axfjällens längd.  $2\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Ands.t.4.f.44. H.N.f.13, n:o 84.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. vid stränderna af Wirihure, nedanföör Stuvor-Toki. — N. Synishorn.) Liten som föreg. och nedliggande, lätt tufvad, med vanl. 4—5 ax; det öfversta var. med hanblir i toppen och vid basen, stundom består det af blott han- ell. honblir.

(*C. lagopina*, norvegica, glareosa, microstachya, helvola.)

## II. Homostachyæ: Axet ensamt, sammansatt af likformiga småax; märken 2.

† Småax med hanblir vid basen, ell. de nedre med blott honblir. [Undant. *C. tenella* och *Schreberi* \*.]

\* Fruktgömm. utan hinnkant, sträfvä i öfre kanterna.

a — Skärmen mycket långa, bladlika.

- 70 *C. remota* L. axet af flere, långt åtskiljda, enkla småax; fruktg. ovalt äggformiga med sträbbräddadt spröt, något längre än axfjällen.  $2\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. Fl.D.370. Ands. t.4.f.40. H.N.f.7, n:o 82.

Lund. r. (Sk.—Uppl. Ner. i Hardemo och Viby snr. Verml. i Östmark sn. Dalst. VG. Boh. Öl. — N. Christiania; Dröbak; Holmestrand; Arendal; Christiansand.) 1—2 fot högt, spensligt starrgräs med isynnerhet de nedre småaxen långt åtskiljda och försedda med 3—6 tum långa skärm. — Anm. *C. Bönninghausiana* Weih., skiljd med sammansatta nedre småax, fanns ford. i Sk. vid Stehag.

b — Skärmen små hinnaktiga, ofta omärkliga.

a — Småaxen klotrunda, med utsperrade fruktg.

- 71 *C. stielulata* Schreb. axet af 3—5, något åtskiljda småax; fruktg. äggformiga, med utdraget spröt, dubb. längre än fjällen.  $2\frac{1}{2}$  6. —  $\beta$  grypus: småaxen 3, större, och mer tättsittande med mindre utsperrade fruktg. Fig. Fl.D.284. Reich.f.560;  $\beta$  f.540 [mager form]. Ands.t.4.f.37. H.N.f.10, n:o 84.

Fukt. äng. kärr, a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. nor. del. — N. till Finnm. Skjervö: Norm. —  $\beta$  N. Vang i Valders på Grindfjell.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med småaxen taggiga af de utsperrade fruktg. —  $\beta$  har tycke af *C. lagopina*; fruktg:s spröt på insidan

*köladt likasom hopvirket på längden, ej platt som hos a, härigenom Jeggadt, med mycket sträfvä kanter. Strådet hos båda 3kantigt. — C. echinata Murr.*

$\beta$  — Småaxen mer långsträckt, med uppräta fruktg.

- 72 *C. microstachya* Ehrh. axet af 3—5, närsittande småax; det öfversta med hanbl. vid basen och 2—3 gånger längre än de aflånga honaxen; fruktg. äggformiga sprötspetsade, nerviga, längre än axfjällen. 24 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.28. Andst.3, f.11. H.N.f.6, n:o 77.

\* *Gaudiniana* Gutkn. strådet glatt; öfversta axet af mest ell. blott hanbl.

Kärr, r. (Torn. Lpm.—Hels. och Dal. Spridd i de sydligare prov. ända till Skåne. — N. Tellem. Grundsät i Elverum; Christiania; Fjærestrand; Skien. Lom vid Sollemssætern; Dovre, nedom Gjederyggen vid Jerkind. — \* N. Lomseggen, öfvan gården Hof i Bälverdalen.) *Folshögt, spensligt starrgräs med stråft strå, tumslångt ax, utan tyd. skärm; toppaxet slutt. klubblikt. — \*, hvaraf Bl. förmodar C. brevirostr. Cederstr. vara en forma depauperata, har fruktg:s spröt tydligare stråft än denna.*

- 73 *C. helvola* Blytt: axet af omkring 5 tallsittande, jemnbreda småax; det öfversta med hanbl. vid basen, af honaxens längd; fruktg. äggformigt aflånga, sprötspetsade, nervlösa, af axfjällens längd. 24 7. Fig. Fl.D.suppl.32. H.N.f.13, n:o 85.

Fjelltr. och kärr, r. (Um. Lpm. Gitsfjellen. VB. nor. del. i kärr mell. Sangis och Lappbäcken. Stockh. Isbladkärret. Södm. Tveta sn. Boh. Foss sn, mell. Saltkällan och Qvistrum. — N. Ost-Finnm. Havningberg; samt Vest-Finnm. Maasöe enl. Th. Fr.; Porsanger och Skjervö: Norm.; Havö sund. Dovre, nära Fogstuen; på Hundsjöfjellet; Romsdalen, på Langefeld, samt Lom, vid Sollemssætern; Valdres; Goustafjell; Christiania m. fl. st.) *Till storlek och utseende lik föreg.; men växer mer tuffvad, med bredare blad, korta hinnaktiga skärm. En del ex. närma sig dock öfven i ut. C. canescens.*

- 74 *C. elongata* L. axet af 6—12, något skiljda, aflånga småax; fruktg. aflånga spetsade, på båda sidor konvexa och starkt nerviga, något utböjda, längre än axfjällen. 24 7. Fig. Fl.D.1236. Andst.4,f.32. H.N.f.10, n:o 83.

Fukt. äng. (Sk.—VB. Umeå sn. och Jemtl. Oviken. Boh. Öl. Goutl. Martebo myr enl. Leffl. — N. Christianss. och Aggerh. st.; Stördalen: Bl.) *Växer i tuffvor med talrika, höga, slutt. lutande strån, med bruna fruktg. — C. multiculmis Ehrh.*

- 75 *C. Persoonii* Sieb. axet af 3—8, något åtskiljda, ovala småax; fruktg. tätt liggande, ovala med utstående spröt, fint nerviga, på utsidan från mynningen med en fin, icke genomträngande spricka [långdveck]; för öfr. konvexa med n. platt insida. 24 6, 7. Fig. Andst.4,f.38. H.N.f.7, n:o 85.

Fukt. st. i bergstrakt. (Lpl. och VB.—Verm. och Gestr. i Ugglebo sn vid Gnupberget. Smål. vid Lannaskede helsobrunn. Dalsl. i Hasselskog. Boh. vid Bullaren. — N. Finnm.—Aggerhus st.) *Lik följ., men med smärre småax, mogna med bruna fjäll, samt ofta försedda med ett  $\frac{1}{2}$ —1 tum långt skärmbblad; fruktg. med längre och mer utstående spets. — C. Gebhardi Hop. i Sturm. C. vitilis Fr. C. canesc.  $\beta$  alpicola Wg.*

- 76 *C. canescens* L. axet som hos föreg.; småaxen aflånga; fruktg. tätt liggande ovala spetsiga, med trubbiga, föga sträfvä kanter, utan spricka; för öfr. som föreg. 24 5, 6. —  $\beta$  sublobata: med smärre, mer åtskiljda och rundade småax; fruktg. med n. släta kanter. Fig. Fl.D.285. Andst.4,f.39. H.N.f.7, n:o 83 och f.11, n:o 80.

Fukt. st. stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. — N. Christiania: Bogstadås.) *Omkr. folshög i stora tuffvor; axet 1—2 tum långt, gul-ell. grågrönt, säll. mörkare ell. med skärm och då hell korta borslika. — Både denna och C. elongata förvaras i Lin. herb. under namnet C. brizoides. C. curta Good.  $\beta$  C. lapponica Lang, till hvilken, såsom Prof. Fries sjelf anmärkt, C. macilentia Fr. räddast torde höra.*

\*\* Fruktg. utan hinnkant, släta i kanterna.

a — Småaxen rundade, med trubbad fruktg.

- 7 *C. tenuiflora* Wg. axet af omkr. 3, tallsittande, 8—12blomm. småax; fruktg. föga

- längre än axfjällen, *aggr. aflånga*, trubbad, kvasskantiga, *svagt glesnerviga*. 2 6, 7. Fig. Andst. 4, f. 36. H.N.f. 3, n:o 80 och f. 7, n:o 84.
- Fukt. st. i fjelltr. r. (Lpl.—Herjed. Dal. mell. Vikarbyn och Garsås: R. Hn. Verml. Veststjå i öfra Ullerud sn. Ängml. Helgum sn. Helsl. Hogdal, Färila och Jerfö snr. — N. Haarsæt i Rendalen.) *Lik följ., men med större, tät till stråets topp samlade småax, bildande ett knappt  $\frac{1}{2}$  tum långt, n. äggformigt, alltid blekgrönt ax. Strået likasom hos de 2 följ. upprätt.*
- 78 *C. loliacea* L. axet af 3—5, åtskiljda, 5—12blommiga småax; fruktg. n. dubb. längre än axfjällen, *aggr. aflånga*, trubbiga och trubbkantade, slutl. utsperrade, *mångnerviga*. 2 6. Fig. Sv.B. 664. Fl.D. 1403. Andst. 4, f. 34. H.N.f. 3, n:o 79.
- Fukt. skogsäng. (Lpl.—Smål. Kalm. län; Alsheda och Barkeryd i Jönk. län enl. Scheutz. Dalsl. Backa i Gunnarsnäs enl. Lemm. Hall. — N. Ost-Finm.—söd. del af Aggerhus st.) *Spådt och smablådigt starrgräs, med axet afven moget, ljusgrönt.*
- 79 *C. tenella* Schk. axet af 3—6, åtskiljda, 2—3blommiga småax, med hanbl. ofvan fruktgömmena; dessa *längre* än fjällen, n. omv. *aggrunda* ell. elliptiska, rundadt *trubbiga* med kort udd, *trubbkantade, mångnerviga*. 2 6, 7. Fig. Andst. 4, f. 33. H.N.f. 10, n:o 85.
- Fukt. skogsäng. kärr, r. (Torn. och Lul. Lpm. samt VB.—Dal. Verml. och Gestr. — N. Christiania, vid Bokstadås, Vold m. fl. st.) *Lik föreg., men mycket spåddare, med trådmala blad och småax af 1—2 han- och n. lika få hanbl., stundom af en blomma af hvardera slaget. Då flere hanbl. finnas, sitta alltid hanbl. i midten, således i toppen af småaxet. Förf. har funnit blott 2 sländare. — C. gracilis Ehrh. C. disperma Dew. enl. Beurl.*
- b — Småaxen ovala—afånga, med n. sprötspetsade fruktg.
- 80 *C. norvegica* Willd. axet af 3—6, *något skiljda*, äggformigt *aflånga* eller ovala, mångblomm. småax, det öfversta *klubblikt*, med hanbl. vid basen, de nedre utan; fruktg. n. *halfklotformiga* med kort spets, *otydl. nerviga, af de breda trubbad axfjällens längd*. 2 6. Fig. Fl.D. suppl. 103. Wg.Fl.L. 15, f. 3. Andst. 4, f. 29. H.N. f. 4, n:o 92.
- Kärr nära hafsstr. r. (VB.—vid Kalix och Piteå. Ängml. Själeved och Arnäs snr; Säbrå sn m. fl. st.: Arn. Gefle. Stockh. Södm. Högholmen i Bålinge sn: C. Ind. ÖG. Lönö i Häradsbhammar; Djurö och Beteby i Dagsberg. Smål. Kalmar län, vid Påskallavik etc. Blek. Lyckeby slott; vid viken mell. Knösö och Ringö; Sölvisborg. Boh. på Lindholmen utanför Göteborg; söd. Koster. Öl. vid Runsten. — N. Finm. —Christianiafjorden.) *Strået  $\frac{1}{2}$ —1 fot högt, upprätt, trubbkantigt; axet 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långt, moget ljusbrunt.*
- 81 *C. lagopina* Wg. axet äggformigt ell. ovalt, af omkr. 3, *tättsittande, ovala* mångblomm. småax, de nedre af blott hanbl.; fruktg. *ovala spetsiga* trubbkantade, *otydl. nerviga, längre än de trubbiga axfjällen*. —  $\beta$  *gracilescens* Th. Fr. strået högre, spensligt, strått; småaxen 3, små och tät gytrade, alla med både han- och hanbl. 2 6, 7. Fig. Fl.D. 294. Andst. 4, f. 28. H.N.f. 3, n:o 83.
- Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. Finm.—Dovre. Filefjell, Norfjellet i Buskeruds amt. —  $\beta$  N. Finm. Kaveringtind vid Lyngenfjord. Ost-Finm. Rendö i Syd-Varanger.) *Omkr.  $\frac{1}{2}$  fot hög, med upprätt, hos hufvudf. ofta glatt strå, sällan mer än half-tumslångt, brunt ax. Fruktg. hos denna och de 2 följ. med ett långdreck på sprötets utsida.  $\beta$  är en utmärkt, men måhända af lokalen [fukt. st. i närheten af smödrifvorna] beroende form, i öfr. lik Grönländska ex. af var. plejostachya Dr., men skiljd med de färre och smärre småaxen. — C. leporina Fl.D. och L.Fl. Lapp. enl. dess Herb.*
- 82 *C. heleonastes* Ehrh. axet aflångt, af 3—5, *närsittande n. likformiga, ovala* småax; fruktg. *lancelllikt ovala, spetsiga* trubbkantade utstående, *nedtill fin-nerviga, något längre än de spetsade axfjällen*. 2 6. Fig. Fl.D. suppl. 31. Andst. 4, f. 30. H.N. f. 3, n:o 81.
- Kärr, r. (Lpl.—Uppl. Södm. öst. Vingåker, vid sjön Gölen. Dal. Vestml. Ner. Götunda: O. G. Blomb.; Leke bergslag: östra Mark. Verml. — N. i Aggerhus st. Finm. mell. Masi och Lappjavre: Norm.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med upprätt, strått strå, tumslångt, brunt ax.

- 83 *C. glareosa* Wg. axet äggformigt ell. aflångt, af omkr. 3, närsitt. ovala småax, det öfversta klubblikt, med hanblr vid basen, de nedre af blott honblr; fruktg. lancettlika smalspetsiga, upphöjdt mångnerviga, af de spetsade axfjällens längd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.645. Andst.4,f.31. H.N.f.3, n:o 82.

Grusiga hafsstr. r. (VB.—Rosl. Hargs bruk; Grisslehamn på Storkubben. — N. Ost-Finm.—Trondhjem.) Stråen  $\frac{1}{2}$  fot långa, spensliga, upphöjda, vid fruktmogn. nedtyngda af det sällan tumslånga bruna axet och slakt lutande.  
(*C. canescens* och *bicolor*.)

\*\*\* Fruktg. med breda hinnaktiga, långt ned sträfsågade kanter.

- 84 *C. leporina* L. stråen tätt tufvade; axet aflångt ell. ovalt, af 4—6, närsittande, ovala småax, alla med hanblr vid basen; fruktg. äggformiga, ända till basen bredt hinnkantade, af de smalspetsade axfjällens längd. 2 5, 6. —  $\beta$  *argyroglachin*: axet blekt, af n. hvita fjäll med grön ryggnerv. Fig. Fl.D.1115;  $\beta$  1710. Andst.4,f.26. H.N.f.8, n:o 80.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Lofoden. —  $\beta$  i skugga.) Folskög ell. mera med 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långt och något tjockt ax af ljusbruna fjäll med hvitakt. kanter. — *C. leporina* L.Fl.Su. *C. ovalis* Good.

- 85 *C. festiva* Desv. axet äggformigt, af 4—6, tätt gytttrade, äggrunda småax; fruktg. längre än de äggrunda, föga spetsiga axfjällen; för öfr. som föreg. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2367. Andst.4,f.27. H.N.f.8, n:o 82.

Fjelltr. (Torn.—Um. Lpm. — N. Finm. Tromsdaistind. Sogn på Leierdalsören. Romsdalen.) Mycket lik föreg. och knappt skild med annat än det dubbelt kortare, tätare och tjocka axet, mörkt af de svartbruna hinnkantade fjällen.

- 86 *C. Schreberi* Schrank: stråen spridda, från en kryp. rotstock; axet aflångt ell. äggformigt, af 3—6, aflånga, närsitt. småax; fruktg. äggformiga, med nedtill upphörande, sågad hinnkant, af de smalspetsade axfjällens längd. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1829. Andst.4,f.25. H.N.f.16, n:o 73.

\* *ligerica* Gay: småax med hanblr dels vid basen, dels annorstäd. i axet. Fig. Reich. f.550. H.N.f.4, n:o 91.

Sand. st. r. (Blek. Pukavik. Öl. Sandby sn vid Åby väderqvarnar; vester om Köpings kyrka; Thorslunda kyrka. — \* Öl. mell. nor. Möckleby och Runsten vid Loperstad.) Rotst. långt krypande, med ett ell. annat 4—8 tum högt, strå i de 1—2 tum aflågsnade lederna; axet vid blomn. knappt tumslångt, brunt. — \* är en tydlig medelform till *C. arenaria*.

†† Småax med hanblr i toppen, eller en del af blott hanblr.

\* Arter med krypande rotstock.

a — Axet långsträckt, med en del småax enkönade; fruktg. med ett långdveck.

- 87 *C. arenaria* L. axet aflångt, af n. enkla småax, de nedre till större delen af honblr, de öfversta af hanblr; fruktg. aflångt äggformiga långspetsade, med bred hinnkant från midten, upphöjdt mångnerviga, af de smalspetsade axfjällens längd. 2 5, 6. Fig. Sv.B.156. Fl.D.1766. Andst.3,f.16. H.N.f.13, n:o 86.

Sand. stränd., helst hafsstr. (Sk.—Rosl. Boh. Öl. Gottl. I det inre landet: Vid Vellern och Venern. Smål. Vilstads prestg., vid Nissa-ån. Verml. vid Klarellven. — N. till Söndmör.) Rotst. kryp. vidt omkring i sanden, uppskjutande n. enstaka, 6—10 tum höga strån från lederna; axet teml. tätt, 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långt, slutt. ljusbrunt.

- 88 *C. disticha* Huds. axet äggformigt aflångt—cylindriskt, af n. enkla småax, de nedersta och öfversta sambyggare ell. honax, de mellersta af endast hanblr; fruktg. med mycket smal hinnkant ofvan midten, något längre än de spetsiga axfjällen, för. öfr. som hos föreg. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1343. Andst.3,f.15. H.N.f.11, n:o 81.

Fukt. äng. vid diken etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. Hall. Öl. Gottl. — N. längs kusten till Trondhj. st., och inuti landet till Gudbrandsd.) 1—2 fot högt starrgräs med kort krypande rotstock, vanl. med nedtill glesare och lutande ax; var. dock med tätare och upprätt, från 1 $\frac{1}{2}$  till 3 tum långt; stundom äro alla öfre småaxen honax, mer sällan blifva alla sambyggare. — *C. intermedia* Good.

b — Axet kort, rundadt; alla småax sambyggare; fruktig. utan längdveck.

- 89 *C. incurva* Lightf. axet klot- ell. äggformigt, af tätt gyttir. småax; fruktig. äggrundt halfklotformiga med sprötläk, glatt spets, otydl. nerviga, längre än de trubbiga axfjällen. 2 6. —  $\beta$  *pratensis*: strået mer än quartershögt upprätt, jemte bladen blågrönt. Fig. Fl.D.432. Andst.3.f.12. H.N.f.14, n:o 85.

\* *arctica* Deimb. axet n. aflångt, af färre småax, och mer plattade fruktig. Fig. Andst.3.f.13. H.N.f.14, n:o 86.

Hafstr. och Sjelltr. r. (Hall. och Boh. — N. längs kusten från Christianiafjorden till Ost-Finnm. Dovre. Lomsfjellen. —  $\beta$  Sk. vid Båstad. Hall. Karup sn, vid Allarps by; Theor. — N. Trondhjem. Levanger. Nordl. Bodøe. Finm. till Varanger. — \* N. Finnm. Nordl. Saltdalen.) Rotstocken lång, krypande; strået 2—6 tum högt, trubbkantigt, hos hufvudf. krökt, med axel stort som en hasselnöt. — \* *C. arctica* Fr. *C. Deinboelliana* Gay.

- 90 *C. chordorhiza* Ehrh. axet äggformigt, af tätt gyttir. småax; fruktig. oväldt halfklotformiga, med kort, glatt spets, starkt nerviga, af de spetsade axfjällens längd. 2 6. —  $\beta$  *sphagnicola* Læst. låg och spenslig, med n. enkla fåblommiga ax. Fig. Fl.D.1408. Andst.3.f.14. H.N.f.9, n:o 85.

Dyiga kärr. (Sk.—Lpl. Gottl. — N. till Ost-Finnm. —  $\beta$  Torn. Lpm. — N. Ost-Finnm.) Utmärkt af den i dyn liggande rotstocken, som liknar greniga, ofta alnslånga strån, från hvilkas leder axbärande  $\frac{1}{2}$  fot höga grenar utgå. — *C. uliginosa* L. Herb., ehuru beskrifn. i Fl.Su. uppenbart tillhör *Scirpus compressus*, som saknas i detta verk.

(*C. teretiuscula*, *brevirostris*.)

\*\* Arter med tufvadt gräs och rot.

a — Axen yngre grönaaktiga, oftast med utsperrade fruktig.

- 91 *C. vulpina* L. axet cylindr. aflångt, dubb. sammansatt af rundade oskaftade småax-gyttir; fruktig. äggformiga spetsade, upphöjdt nerviga, med smal hinnkant, längre än de borstspetsade axfjällen. 2 6. —  $\beta$  *memorosa*: axgyttir. med långa borstlika skärm. Fig. Fl.D.308. Andst.3.f.17. H.N.f.9, n:o 83.  $\beta$  Reich.f.563.

Kärr, diken. (Sk.—Hels. Ängml. Mo sn. Dal. Verml. och Dald. Boh. Öl. Gottl. —  $\beta$  sälls. Sk. Lund; Malmö; Älnarp. Boh. Strömstad. Öl. och Gottl. — N. Fredriksværn, Kragerøe, Christianss. m. fl. st. i söd. del. Hufvudf. lär i N. saknas.) Alnshög grof slarr, med skarpt seggade strån, 2 tum långt, n. fingertjockt, skul. brunt ax, hvilket hos  $\beta$ , som af flere anses för egen art, behåller sin gröna färg.

- 92 *C. muricata* L. axet cyl. aflångt, af meränd. enkla rundade närsittande och oskaftade småax; fruktig. äggform. med kort spets, smala hinnkanter, utan tydl. nerver; för öfr. som föreg. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1526. Andst.3.f.19. H.N.f.9, n:o 84.

Torra äng. etc. a. (Sk.—Ängml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) Vanl. foltshög, med en god tum långt, n. alltid grönt ax; de nedre småaxen föga fränskiljda.

- 93 *C. divulsa* Good. axet utdraget cylindriskt, af rundade småax; de nedersta långt åtskiljda och meränd. sammansatta, stund. kort skaftade; fruktig. utdraget äggformiga, föga utsperrade; för öfr. som föreg. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1280. Andst.3.f.20.

Lundar, r. (Sk. vid Ringsjön; Krageholmssjön, etc. Blek. Ronneby. Smål. vid Eds kyrka. ÖG. Omberg; Stämna i Askeby och nära Stegeborg: Kindb. Södm. Strengnäs på Segersön. Vestml. Aggarön i Granfjärden, och vid Vickhus i Ryttern. Boh. Hjertö i Qville sn. Öl. Gottl. — N. Christiania: Skien; Porsgrund etc.) Lik föreg. med dubbelt så långt ax af de  $\frac{1}{2}$ —1 tum aflägsnade nedre småaxen, som ofta hafva ett utdraget, borslikt skärm. Synes genom medelformer öfvergå i föreg.; en sådan torde *C. virens* Andst.3.f.18. vara.

b — Axen brunaktiga, med uppräta ell. utstående fruktigömmen.

- 94 *C. paniculata* L. axet deladt i mer och mindre utdragna grenar af gyttirade småax; fruktig. äggformigt kägellika, med korta nerver vid den uppsvallda basen och ett längdveck upptill, för öfr. släta, af de spetsiga ell. något trubbad axfjällens längd. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1116. Andst.3.f.21. H.N.f.10, n:o 81; f.6, n:o 80 [en mager form].

Kärrakt. st. r. (Sk. Köpings-ådalen flerst.; mell. Skabersjö och Anderslöv; vid Lefra-sjön i Ivetofta etc. Smål. Landsjön i Skärstad sn enl. Scheutz. ÖG. Vinnerstad vid Staffanstorps-sjön m. fl. st. Stockh. vid Ryssviken och Brunnsviken. VG. vid Bil-lingen. Boh. Vinga södra inholme. Öl. Borgaträsket; Bredinge. — N. Christians-sand.) *Alnshög, ell. mer, med skarpkantigt strå, breda blad, fingerlångt ax, gre-nadt i  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa småaxgyttringar. De bladlösa, mer än tumslånga svarta fjällen vid stråets bas klyfva sig icke i trådar som hos C. paradoxa.*

- 95 *C. teretiuscula* Good. axet upprätt, cylindriskt ell. äggformigt, dubb. sammansatt af oskafade gytttrade närsittande småax; fruktg. äggformiga, n. nervlösa, med ett längdveck och uldraget spröt, n. längre än de trubbadade ell. uddspetsiga axfjällen. 2 5, 6. —  $\beta$  crassior: axet elliptiskt ell. äggformigt, mer sammansatt. Fig. F.I.D. 1886. Andst. 3, f. 22. H.N.f. 6, n:o 79.  $\beta$  Schk. t. T. f. 69.

Kärr. (Sk.—Pit. Lpm. och VB. nor. del. — N. till Ost-Finnm: Th. Fr.) 1—2 fot hög, med n. trubbkantigt strå och n. trådsmla blad; axet föga mer än tumslångt och tjockt som en gåspenna, hos  $\beta$  dubbelt tjockare; fjällen vid stråets bas som hos föreg. art. — *C. panicul.*  $\beta$  Wg. Fl. Su.  $\beta$  C. Ehrhartiana Hop. enl. Beurl.

- 96 *C. paradoxa* W. axet slakt, grenigt af utdragna småax-gytttringar; fruktg. ägg-formiga med uldraget spröt, på båda sidor till hela längden upphöjdt nerviga, n. kortare än de smalspetsade axfjällen. 2 6. Fig. F.I.D. 1887. Andst. 3, f. 23. H.N. f. 6, n:o 78.

Kärr. r. (Sk.—Gestr. Medelp. Torp sn: Reuterm. Jemtl. Frösön vid Ströms kyrka. Dal. Vestml. Ner. Öl. Göt. — N. till Helgeland; Ofoten: Norm.) Lik *C. pani-culata*, men till alla delar spädare, med strå och blad som föreg.; mest utmärkt af de nerviga fruktg., samt af fjällen vid stråets bas, som hos denna art upp-lösas i svarta, tagellika trådar.

(*C. tenella*, Schreberi \* *ligerica*.)

### III. Monostachyæ: Arter med ett enda, enkelt ax.

† Hanblir i axets topp, honblir nedtill; märken 3.

\* Fruktg. vid mogn. upprätta ell. utstående.

- 97 *C. obtusata* Liljebl. axet yngre aflångt, moget äggformigt; fruktg. utstående, ovala trinda, spetsiga, groft nerviga, mycket glänsande, längre än de hinnaktiga ax-fjällen. 2 5, 6. Fig. Sv. B. 533, f. 2. Fl. D. suppl. 100. Vet. Ac. H. 1793, t. 4. Andst. 3, f. 4. H.N.f. 4, n:o 93.

Sandfält, r. (Öl. Köping, Runsten. Borgholm etc.) Rotstocken horisontalt och långt krypande, med nästan enstaka 2—6 tum långa strån från lederna; fruktg. 3—5, af tjocka bruna skal, som lätt spricka för den stora nöten.

- 98 *C. rupestris* All. axet aflångt; fruktg. upprätta, aflångt omv. äggformiga, trinda, med kort spets, fint nerviga, kortare än de stora hinnkantade fjällen. 2 6, 7. Fig. Fl. D. 1401. Reich. f. 531. Andst. 3, f. 3. H.N.f. 3, n:o 84.

Högre fjell. (Lpl.—Herjed. — N.) Rotstocken krypande med fingerhöga strån; axet jernnbred, eller moget n. lancettlikt.

\*\* Fruktg. vid mogn. nedböjda.

- 99 *C. microglochin* Wg. axet 5—10blommigt; fruktg. lancettlikt syl-rika, inneslutande en genom mynnigen framskjutande, nål-lik borst. 2 6, 7. Fig. Sv. B. 539, B. Fl. D. 1402. Andst. 3, f. 1. H.N.f. 3, n:o 85.

Kärr. i fjelltr. r. (Torn. Lpm.—Herjed. — N. Finnm.—Dovre. Tronfjell. Gudbrands-dalen. Valdres etc.) Fingerhög och lik följ., men med långt flere fruktg. och en genom fruktg:s mynning bredvid märkena utskjut. strålik borst. — *Uncinia* Spreng.

- 100 *C. pauciflora* Lightf. axet 3—5blomm.; fruktg. som hos föreg., utan borst. 2 6. Fig. Sv. B. 539, A. Fl. D. 1279. Andst. 3, f. 2. H.N.f. 11, n:o 82.

Dyiga kärr. (Lpl.—Sk. Hall. söd. del: Theor. — N. Ost-Finnm.—Christiania.) 3—6 tum hög, med 2—4, nedböjda, gröngula fruktg., som hafva en spets af det tjocka utskjutande stiftet, hvilket ej bör misstagas för borsten hos föreg. — *C. leucoglochin* Ehrh.



†† Hanbl. i axets topp, honbl. nedtill; märken 2.

\* Fruktg. vid mognaden nedböjda.

- 101 *C. pulicaris* L. axet jemnbredt ell. lancettlikt; fruktg. slutt. utsperrade ell. nedböjda, glesl sittande, bredt lancettlika, spetsiga, nervlösa. 2 6, 7. Fig. Sv.B.533. Fl.D. 2546. Andst.3.f.7. H.N.f.13, n:o 87.

Fukt. äng. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. VG. Dalsl. Boh. söd. Långö; Koster. Hall. Öl. Gotl. — N. till Trondhj. Ost-Finnm. Vadsöe: Deinh.) Yngre fingerhög; äldre 6—8 tum, med tumslängt ax, bruna fruktg. och affallande axfjäll; bladen korta, borstlika. — *C. psyllophora* Ehrh.

\*\* Fruktg. vid mogn. uppräta ell. utstående.

- 102 *C. capitata* L. axet ägg- ell. klotrundt, af tätt liggande, äggrunda plattade nervlösa, glatta fruktgömmen; axfjällen korta trubbiga. 2 6. Fig. Fl.D.2060. Andst.3.f.6. H.N.f.6, n:o 82.

Fukt. äng. i fjelltr. (Lpl.—Dal. ned till Boda Kapell. Helsl. Loos sn, kring Kyrktjärn. — N. Ost-Finnm.—söd. Norges fjelltrakter.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med ax af en ärts storlek; bladen smala rännformiga.

- 103 *C. nardina* Fr. axet ovalt; fruktg. tätt ligg., ovala spetsade konvexa, på ryggen glesl nerviga, i kanten sträfvä; axfjällen trubbiga. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2365. Andst.3.f.5. H.N.f.9, n:o 86.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. Wirihauré på Kaissatsnuonje; Sirkasluokte; Puolaure. — N. Finnm. Tromsöe, på Ramsfjellet; Sör-Rejsen: Norm. Nordl. Salten på Båtsfjellet.) Omkr. 2 tum hög, med tätt tufvade strån och knippen af båglikt krökta blad, som endast vid basen äro rännformiga, sedan n. trinda, n. jemnhöga med strådet; axet 2—3 linier långt, döljande de få hanbl. i toppen.

- \*104 *C. brevisstris* Cederstr. axet jemnbredt ell. aflångt; fruktg. få, äggrundt lancettlika, på insidan platta, med kort spröt, glatta, n. insvepta i de rundadt trubbiga hinnkantade axfjällen. 2 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.102.

Hafsstr. r. (N. Trondhj. st. nära Ryssvik vid Foldensford, på den gräsbevuxna hafsstr. Nordl. vid Saltenelvs utlopp. Finnm. Mageröe, vid Skarsvaag: Th. Fr.) Mörkgrön, med 7—10 tum höga strån från krypande rotstock, vid basen rännformiga, upptät n. trinda blad, och 5—6 lin. långt ax, som än är enkelt, af blott hanbl. ell. af hanbl. i toppen och 2—4 honbl. vid basen, än nedtill något sammansatt. (*C. dioica* var.)

††† Tvåbyggare, med han- och honax på olika stånd.

- \*105 *C. scirpoidea* Michx. honaxet n. klubblikt, tätblommigt; axfjällen än spetsiga, än trubbiga, hårbräddade; fruktg. ovalt aflånga, stråftudna, sprötspetsade; märken 3. 2 7. Fig. Fl.D.1528. H.N.f.16, n:o 74.

Fjellv. r. (N. Saltalen, på den mot Junkersdalen belägna sidan af Solvaagtind 1854; »på den mot Solvaagvandet belägna sid. af Solvaagtind» 1859.) Tufvig, med krypande rotstock, och 4—8 tum, stund. mer än fotshöga, nedtill rikbladiga, sträfvä strån; honaxen  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa. — *C. Wormskjoldiana* Horn.

- 106 *C. parallela* Smft. honaxet jemnbredt, något glesblommigt; axfjällen spetsiga; fruktg. äggr. aflånga, uppräta, nerviga, glatta med släta kanter och något utstående spröt; märken 2. 2 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.29. Andst.3.f.9. H.N.f.7, n:o 86.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Lul. Lpm. på Kerkeware, Kappa. Toki etc. Pit. Lpm. Wallåiwe, Tjiddjakk. Um. Lpm. Lycksele vid Umenäs och Nydal. — N. Finnm. Salten; Stuedalen. Dovre på Gjederhyggen vid Jerkind; Kongsvold; Finnshöe etc. Gudbrandsdalen och Valdres.) 5—10 tum högt, glatt, ell. upptill något stråft, bågformigt uppböjdt strå; honaxet  $\frac{1}{2}$ —1 tum långt, smalt cylindriskt, mörkbrunt. — *C. dioica*  $\beta$  parallel. Läst.

- 107 *C. dioica* L. honaxet ovalt, tätblomm.; axfjällen trubbiga; fruktg. bredt äggrunda nerviga utböjda, glatta med sträfvä kanter och spröt; märken 2. 2 5, 6. —  $\beta$  *scabriuscula*: strå längre, mer tufvadt, stråft. —  $\gamma$  *isogyne*: n. halft axet af honbl. Fig. Sv.B.551. Fl.D.369. Andst.3.f.10. H.N.f.10, n:o 86;  $\gamma$  f.15, n:o 86.

Våta äng. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Sk. —  $\gamma$  Lul. och Um. Lpm. Verml. bergslag, vid

Saxån. Stockh. — *N. öm Senjen*: Norm.) Strå som hos föreg., men rakt och upprätt, n. alltid glatt; honaxet  $\frac{1}{2}$  tum långt, ljusbrunt. —  $\beta$  *C. Davalliana* Retz. Suppl.

472. *KOBRESIA* Willd. Säfstarr.

- 1 *K. caricina* W. strået 3kantigt; axgyttringen aflång, slutt. oval; axen sammansatta af honblommiga småax nedtill och hanblomm. i toppen. 24 7. Fig. Sv.B.527, f.2. Andst. 2, f.35. H.N.f.3, n:o 69.

Fjellv. r. (Jemt. Åreskutan; Snasahögen; Skäker- och Helagsfjellen. Herjed. Midtdalen; Skarffjellen etc. — *N. Fondfjället* i Merager; Källehögen vid Jemtiska gränsen; Dovre; Gudbrandsdalen etc.) 3—8 tum hög och tufvad; axen af 3—6, enkönade småax.

- 2 *K. scirpina* W. strået trindt; axet ensamt, jemnbredt; småaxen sammansatta af en han- och en derunder sillande honblomma. 24 7. Fig. Sv.B.527, f.1. Andst. 2, f.34. H.N.f.5, n:o 83.

Fjellv. (Torn. Lpm. fjellet Nuljalaki. Lul. Lpm. Pit. Lpm. Jemt. Getvalen och Helagsfjellen. Herjed. stora Midtåklappen; Axhögen. — *N. Finnm.*—Hardanger och Gudbrandsdalen.) Spådare, men ofta högre än föreg. — *Elyna spicata* Schrad. *Scirpus Bellardi* Wg.Fl.L.

## 16 KLASSEN

### GLUMIFLORÆ.

96 Fam. **GRAMINEÆ** Juss. Gräs. Blomning i småax med 2, sällan 1, skärmsjäll, inneslutande blwa, som bestå af 2 skiftevisa blomfjäll och 2 små, ofta otydliga kronfjäll närmast befruktningsdelarne. Stånd. vanl. 3, säll. 2. Pist. med 2 stift ell. märken, säll. 1. Frukt enförg hinnefrukt.

1 Afdeln. **EURYANTHÆ**. Blomman under blomningen öppen. Stift korta, med vid blomfjällens bas framskjutande märken.

1 Flocken **Hordeaceæ**. Gräs med ledadt ax, sammansatt af merändels oskafade, i axfästets leder skiftevis fästade ell. insänkta småax.

#### 473. **TRITICUM** Ltn. Vild-hvete.

† Öfre bladytans nerver starkt upphöjda, breda och tättsittande [med omärkliga mellanrum]; rotstock lång krypande.

\* Bladnerverna mjukhåriga [bladen sål. icke sträfvä].

1 *T. junceum* L. bladen rännformiga hoprullade; axfästet mycket bräckligt; skärmsf. längre än halfva småaxet, minst 9nerviga, omärkligt kölade, tvärhuggna; yttre blomfj. glatt, trubbigt, utan borst. 24 6, 7. Fig. Sv.B.269. Fl.D.916. Ands.Gram. t.1.f.1. H.N.f.6, n:o 91, 92.

Sand. hafsstr. r. (Sk. Hall. mell. Kärrby och Eldsberga. Boh. Vrångö; S. Koster; Styrso. Öl. Böda. Gottl. Lummelund; Sproge, Vestergarn och Eikelhem snr enl. G. v. Ced. — N. Hvalöarne; Mandal; Lister.) Axet hos pressade ex. ytterst bräckligt, glatt; småaxen hos den mest utvecklade formen: *megastachyum*, n. lums-långa och  $\frac{1}{2}$  t. breda, till färgen hvitgula. — *Agropyrum* P.B.

2 *T. strictum* Deth. bladen som hos föreg.; axfästet något bräckligt; skärmsf. längre än halfva småaxet, 5—9nerviga, starkt kölade, spetsiga; yttre blomfj. nedom midten inludat, spetsigt, med ämne till borst. 24 6, 7. Fig. Fl.D.2705. Reich.D.Fl. Gram.f.268. H.N.f.11, n:o 92.

Sand. hafsstr. r. (Sk. öst. kust. vid Åbus; mell. Cimbritshamn och Vik; Köpingsåns utlopp enl. F. Aresch.) Axet ej så bräckligt som hos föreg., med smala småax, tät tryckta till fästet. Lär enl. S. Almqv., som i Bot. Not. 1865 lemnat en upplysande utredning af detta slägtets svenska hafsstrandformer, likasom föreg. och de närmast följ. hafva både en storaxig och en småaxig form. — *T. hebestachyum*  $\beta$  *megastach.* ed.9. *Agropyrum* Reich.

\*\* Bladnerverna sträfsprickiga ell. borstbärande [bladen derigenom på öfre sidan sträfvä].

3 *T. acutum* DC. enl. Godr. strået uppstigande, jemte de i början platta, slutl. hoprullade bladen slakt; axfästet segt; skärmsf. längre än halfva småaxet, 7nerviga, spetsiga; yttre blomfj. spetsigt, n. utan borstämne. 24 6, 7. Fig. Reich.264. Ands. t.1.f.3. H.N.f.6, n:o 94.

- Sand. hafsstr. (Sk. ej sälls. *Hall.* Halmstad: Theor.; vid Storåns utlopp. *Boh.* *Blek.* Ronneby enl. *Almqv.* *Smål.* Kalmar. *Gottl.* Lummelund.) *Ljust blågrönt, ledadt och slakt gräs, i hög grad varierande efter lokalens beskaffenhet. Sannolikt är, såsom Almqv. visat, att Godrons art af detta namn innefattar flere former jemte vår, men, sålänge det ännu är oafgjordt om dessa former äro till arten skildja, kan man svårigen tvertmot Godrons på orig. ex. grundade åsigt om vår arts identitet med T. acutum DC. utbyta detta namn mot det visserligen mycket passande, men vida yngre namnet T. laxum Fr. — T. affine ed.7. Agropyrr. RS.*
- 4 *T. obtusiusculum* Lge. strået upprätt, jemte de i börj. platta, snart hoprullade bladen *styft*; axfästet något bräckligt; skärmfj. föga längre än halfva småaxet, 7nerviga, trubbad; yttre blomfj. trubbigt, vanl. med borstämne. 2 6, 7. Fig. Reich.f.266. Andst.1.f.2. H.N.f.6, n:o 93.
- \* *campestre* Godr.? gröfre; bladen mycket sträffa; småaxen talrikare, med 7—9nerv. skärmfj. af halfva småaxets längd.
- Sand. hafsstr. r. (Sk. söd. och öst. kust. enl. F. Aresch. och *Almqv.* *Hall.* Halmstad enl. *Almqv.* *Boh.* Koster; Strömstad etc. *Blek.* Ronneby samt *Gottl.* Lummelund enl. *Almqv.* — N. Christiania, och på öar i fjorden: Bl. — \* *Sk.* Malmö, vest. hamnbryggan enl. *Almqv.*) *Gråaktigt grön, hufvuds. med ensstaka, \* med något tufvade, 1—4 fot höga strån, alltid styfva och upprätta. — T. acutum Fr. S.V.Sc. T. hebestachyum Fr., Hn ed.9, ett något yngre namn. Agropyrr. RS.*
- 5 *T. pungens* Pers. strået och bladen som hos föreg., de sednare med lång stickande styf spets; axfästet segt; skärmfj. af halfva småaxets längd, 7nerviga, spetsiga; yttre blomfj. spetsigt, ofta med borst. 2 6, 7. Fig. FLD.2704.
- Hafsstr. r. (*Hall.* Varbergstrakten; samt *VG.* Göteborg: Prof. Fries enl. *Almqv.* — N. enl. Bl., men osäker såsom afvikande fr. utl. ex. och beskrifn.) *Grågrön, slutt. gulglänsande, med tufvade, 2—4 fot höga strån enl. Almqv. Svenska ex. osedda af utg. — Agropyrr. RS.*
- †† Bladens nerver föga upphöjda, smala, vanl. mjukhåriga, med mycket breda, sträpprickiga mellanrum [bladen derigenom sträffa].
- 6 *T. repens* L. rotstocken långt krypande, med spridda strån; bladen platta, slaka, vanl. med en enkel rad fina hår längs nerverna, mellan dessa på öfre sidan mycket sträffa; axfästet segt, med talrika, tätsittande småax; skärmfj. 5nerviga, vanl. borstspetsade; yttre blomfj. trubbadt ell. spetsigt, utan ell. med rak borst. 2 6, 7. — β *litorale*: mer lågväxt, blågrön, med korta och smala, slutt. hoprullade blad. Fig. Sv.B.38. FLD.748. Andst.1.f.4. β H.N.f.6, n:o 96.
- Odl. st. a., β hafsstr. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. — β *Sk.* *Hall.* *Boh.* ÖG. enl. *Kindb.* Södm. Nyköpingskären: C. Ind. *Gottl.* — N.) *Var. i högsta grad. — β mucronat. edd. 5—9 är enl. ett äldre ex. i förf:s herb. en till β närsittande form. — Agropyrr. PB.*
- 7 *T. violaceum* Horn. roten tufvad och trädig; rotstocken n. omärklig, med tufvade strån; bladen som hos föreg.; axet styft, med småax som hos föreg.; skärmfj. omkr. 5nerviga. n. tvärhuggna, med kort borst; yttre blomfj. spetsigt, med något långt borst. 2 6, 7. Fig. FLD.2044. Andst.1.f.6. H.N.f.5, n:o 99.
- Fjellstr. r. (Torn. Lpm. Nuljalaki; Karesuando. Lul. Lpm. enl. And. *Jemtl.* fjell vid Herjed. gränsen, t. ex. Syltopparne. Herjed. Axhögen. VB. Pajala. — N. Finn.; Nordl. Bejeren: Norm.; Dovre, Drivstuen och Vaarstien, samt omkring Kongsvold och Jerkind; Gudbrandsdalen. Vindhællen i Lejardal. Bergens st.) *Rotstocken icke ell. blott ett par tum krypande; dessutom skild från föreg. med sitt violetta ax och nedom borsten tvärhuggna, ej, såsom hos föreg., småningom till borsten afsmalnande skärmfj.*
- 8 *T. caninum* L. roten, rotstocken och stråen som hos föreg.; bladen som hos föreg., på båda sidor sträffa; axet slakt och meränd. lutande, med närsittande småax; skärmfj. 3—5nerviga borstspetsade; yttre blomfj. med lång sterbojd borst. 2 6. Fig. FLD.1447. Andst.1.f.5. H.N.f.6, n:o 97 och f.11, n:o 93.
- Lunder. (Sk.—Lpl. *Boh.* — N. till Ost-Finn.) *Högt tufvad, ljusgrönt gräs, meränd. med lutande strå och ax; blomfj:s borst oftast längre än hela småaxet. En mager form: v. biflorum, med 2blomm. småax, är lemnad i H.N.f.11, n:o 93. — Elymus L.Fl.su. och Herb. Agropyrum RS.*

474. *ÉLYMUS* Lin. Elm, Strandråg.

1 *E. arenarius* L. hela gräset blåaktigt; bladen rännformiga, snart hoprullade, styfspetsade, med glatta slidor; småaxen 3—4blommiga; skärmfj. smalt lancettlika uddspetsade; blomfj. trubbiga, borslösa. 2 7. Fig. Sv.B.60. Fl.D.847. Andst.1,1,7. H.N.f.4, n:o 99.

\* *geniculatus* Curt. axet glesare; skärmfj. smalare,  $\frac{1}{2}$  längre än småaxet. Fig. Linn. Fund.Agr.1,1,5. H.N.f.7, n:o 98.

Sand. stränd. särd. hafsstr. (Sk.—Um. Lpm. vid Vindelefven. VB. vid Luleå stad och skärg. upp till Haparanda; vid Sangis- och Kalix-elf. Hall. Boh. Öl. Gottl. I det inre landet: Smål. Lagans strand vid Ösle i Berga. Vettern vid Jönköping. Medhamra i ÖG. samt i trakten af Carlsborg i VG. Dalsl. Bäckerfors bruk: Stud. Thorstenson. — N. till Finnm. Gudbrandsdalen, vid Vaagevandet. — \* Halmstad bland a, endast ett par tuftor funna: Fr.) 2 alnar högt gräs med hvetelekt ax, som hos \* kan blifva n. 1 fot långt och ofta vid nedre småaxen tvärt omböjdt, liksom afbrutet.

2 *E. europæus* L. gräset grönt; bladen platta, med stråfhåriga slidor; småaxen 1—2blommiga; skärm- och blomfjällen med lång borst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1631. Andst.1,1,8. H.N.f.4, n:o 93.

Skogsback. r. (Sk. Rödninge. Smål. Eds sn, Djurnäs. Öl. Tveta och Halltorp. Gottl. Mickelsängen vid Vängemyr; Sjonhem och Viklou snr enl. G. v. Ced.) Liknar mer följ. slägte; småaxen mest enblommiga med ett borstlikt ämne till den andra blomman.

475. *HORDEUM* Lin. Slö-korn.

1 *H. murinum* L. bladen i kanten sträva, med glatta slidor; mellersta småaxet 2-könadt, med hårbräddade skärmfjäll; sidoaxen af hanblir, med ena skärmfjället hårigt, det andra sträft; alla blirna med borst. 6. Fig. Fl.D.629. Andst.1,1,9. H.N.f.16, n:o 75.

Jordvall. vid byar och städ. (Sk. Christianstad; Ystad enl. F. Aresch.; vest. kust. från Skanör till Hall. Laholm. Gottl. Visby: G. v. Ced.) Stråen bladiga ända upp mot axet.

2 *H. pratense* Huds. bladen öfverallt sträva, de nedre med håriga slidor; alla skärmfjällen borstlika sträva, utan hår; för öfr. som föreg. 2 6, 7. Fig. Fl.D.630. Andst.1,1,10. H.N.f.6, n:o 98.

Fukt. äng. r. (Sk. teml. allm. i sydv. del.; Öfvedskloster enl. F. Aresch.) Strået högre och spensligare än hos föreg., upptill utan blad; axen hälften smalare. — *H. murinum* β L.Fl.Su. *H. secalinum* Schreb. — Anm. *H. maritimum* Wih. lär. enl. de upplysn. utg. numera vunnit, vid Göteborg och i N. endast förekomma på ballastplatser (se Bih.).

476. *LEPTURUS* R. Br. Ormax.

1 *L. filiformis* Trin. axet trindt, udraget syl-lik; småaxen enblommiga med 2:ne skärmfjäll; blomfjäll söga kortare än skärmfj. 6, 7. Fig. Fl.D.938. Andst.1,1,12. H. N.f.11, n:o 94.

Hafsstr. r. (Sk. Hvellinge och lilla Hammar; Landskrona; Lomma enl. F. Ar.) 3—6 t. långt, uppböjdt strå med tråddlikt, vanl. båglikt böjdt ax, särd. då det torkat. Var. spädare, med n. rakt ax, hvilken form hos oss varit ansedd för *L. filif.*, hvaremot den gröfre med krökt ax tagits för *L. incurvatus* Trin. Lange har emellertid i sin Haandb. ed.3 bekräftat Kochs och feres åsigt, att *L. incurv.* är en blott sydeuropeisk och skild art, samt att båda de hos oss befinnliga formerna tillhöra *L. filif.* — *L. incurvatus* ed.9. Rottboellia L.

477. *LOLIUM* Lin. Repe.

† Utan rotstock och bladskott vid stråets bas.

1 *L. temulentum* L. skärmfjället af småaxens längd ell. längre; yttre blomfj. med utdragen, oftast ganska lång borst. 6, 7. — β arvense: borsten kortare än blomfjället. Fig. Sv.B.192. Fl.D.160. Andst.2,1,13.

Åkrar. (Sk.—Helsl. Dal. och Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. — β mer Hartman, Skandinavians Flora (10:de uppl.).

sällsynt.) 2—3 fot högt gräs med långt och gles ax; borsten vanl. 3—4 lin. lång. — *β L. arvense* With.

- 2 *L. Linicola* Sond. skärmfj. vanl. kortare än småaxen; ytt. blomfj. med mycket kort ell. ingen borst. ☉ 7. Fig. Sv.B.593. Fl.D.1864. Andst.2,f.14. H.N.f.2, n:o 78. Linäkrar. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Ströms sn. Boh. Öl. Gottl. Burs sn. — N. till Ranen i Helgeland.) *Spensligare än de öfriga arterna, men icke säll. lika högväxt som föreg.* — *L. arvense* Schrad.

†† Med krypande rotstock, och bladskott vid stråets bas.

- 3 *L. perenne* L. skärmfj. kortare än de aflånga—ovala småaxen; blomfj. utan borst. 2, 6, 7. Fig. Sv.B.71. Fl.D.747. Andst.2,f.15.

Torra st. åkerren. a. (Sk.—Um. Lym. och VB. Bondersbyn vid Kalix-elf. Hall. Öl. Gottl. — N. i sydl. del. af Aggerh., Christianss. och Bergens st.) *Åxet plattare än hos de öfriga, meränd. något vridet; småaxen ofta dubb. längre än skärmfjället. Var. mera späd, med småax. fåblomm., föga längre än skärmfj.*

- 4 *L. festucaceum* Link: skärmfj. flere gånger kortare än de jemnbreda småaxen; blomfj. utan borst. 2, 6, 7. Fig.

Fukt. st. r. (Sk. Helsingborg på hafsstranden; Björkä i Kropps sn enl. F. Ar.) *Sk. ex. hafva 1—1½ qv. långt ax och alla de tumslånga småaxen fullkomligt oskafade, utan spår till något inre skärmfjäll, således ett verkligt Lolium. Är sannolikt hybrid af L. perenne och Festuca elatior. Figg. och synon. i ed.9 torde rättast böra hänföras till den mycket liknande Glyc. loliacea, hvilken af de flesta förf. ansetts vara identisk med ell. ätm. afven innefattat närv. form. — Festuca loliacea Huds. och Brachypodium loliaceum Fr. (till en del).*

#### 478. BRACHYPODIUM Pal. B. Axlostä.

- 1 *B. pinnatum* PB. bladen korta, håriga och mycket sträfvä, med n. glatta slidor; åxet styft, af föga åtskiljda småax; blom borsten kortare än sitt fjäll. 2, 6. — *β rupestre*: småaxen fullkomligt glatta. Fig. Sv.B.739. Fl.D.2525. Andst.2,f.18. H.N.f.12, n:o 93.

Torra äng. (Sk. Smål. öst. och mell. del.: Scheutz. — Uppl. Vestml. Verml. VG. Öl. Gottl. — N. till Froen i Gudbrandsdal. — *β* N. Christiania, och Valders ofvan gården Rejen.) *Småaxen ½—1 tum långa, vanl. småhåriga. — Bromus L. Festuca Schrad. Triticum Mönch.*

- 2 *B. gracile* PB. bladen långa, håriga och föga sträfvä, med håriga slidor; åxet slakt, af mer gles sittande småax; blom borsten längre än sitt fjäll. 2, 6, 7. Fig. Fl.D. 164. Andst.2,f.17. H.N.f.12, n:o 94.

Lundar. (Sk. Smål. öst. del., och Grenna: Scheutz.—Uppl. särdeles i skärgården. VG. Öl. Gottl. — N. Aggerhus, Christiansands och Bergens st.) *Högre, mera slak och hårig än föreg. — Brom. silvaticus Sm. B. pinnatus Fl.D. Brach. pinnat. β Wg. B. silvaticum RS.*

- 2 Flocken **Festucaceæ**. Småax skaftade [i vippa]. Skärmfjällen kortare än blomfjällen.

#### 479. CYNOSURUS Lin. Kamm-äxing.

- 1 *C. cristatus* L. vippan tät, axlik, n. cylindrisk, upprät och styf, ensidig; småaxen utan märklig borst. 2, 7. Fig. Sv.B.66. Fl.D.238. Andst.2,f.19.

Ängsvall. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall, vid Marieberg. Ängml. Själevad sn. Ner. Dalsl. VG. Boh. Öl. Gottl. — N. till nor. del af Bergens st.; inuti landet till Dröbak.) *Bladen smalt jemnbreda.*

#### 480. DACTYLIS Lin. Hund-äxing.

- 1 *D. glomerata* L. vippan ensidig, med ensidigt gytttrade småax på ensamma, nedtill bara vippgrenar. 2, 6, 7. — *β lævigata*: bladen glatta. — *γ lobata* Dref. småaxen gytttr. i vippgrens spets, vanl. 3blomm. Fig. Sv.B.32. Fl.D.743. Andst.2,f.20.

Od. st. a. (Sk.—Ängml. och Jemtl. — N. till Finn. — *β* Sk. Båstad, Persbög. Hall. Varberg. VG. Kinnekulle, vid Mörkeklef. Dalsl. Lundby i Töftedals sn enl. Lem. ÖG. Stockh. Helsl. Söderhamns skärg. enl. Wistr. Öl. Ottenby. Gottl. —

*N. Levanger* och *Trondhj. flerstädes*. —  $\gamma$  *Sk.* i *Alnarps skog*. *Blek. Tubbaryd enl. Goss.*) *Stort och vanl. stråbladigt, ofta blåaktigt gräs*. —  $\gamma$ , *ehuru afvikande till uts., är väl knappt annat än en spåhare skuggform.*

## 481. FESTUCA Lin. Svingel.

† Alla bladen likformiga platta, med odeladt snärp.

\* Blomfjället mycket kortare än sin borst.

- 1 *F. gigantea* Vill. bladen mycket breda, glatta, stråsprickiga, med kort snärp; vippan af långa slaka grenar; blomfj. med hårfina borst. 2 6. —  $\beta$  *triflora*: bladen dubb. smälare; axen 3—4blommiga. Fig. Sv.B.120. Fl.D.1630;  $\beta$  440. Andst.2,f.21. Lundar. r. (Sk.—Uppl. Vestm. Ner. VG. Dald. Boh. Öl. Gottl. — N. Christiania; Asker etc. —  $\beta$  VG. Halleberg. Gottl. i Vänge.; — N. Christiania; Ullerud.) *Här vanl. 4—6 lin. breda blad, utbredd, slak och gles vippa af 5—9blommiga småax.* — *Bromus L.*

\*\* Blomfj. med mycket kort ell. ingen borst.

- 2 *F. silvatica* Vill. strået vid basen omgivet af ljusa, *bladlösa sidor*; bladen *som hos föreg.*, med *uldraget* snärp; vippan mycket grenig *upprät* ell. *ensidigt lutande*; småaxen aflånga 3—5blommiga; blomfj. utan borst. 2 6. Fig. Fl.D.1145. Andst.2,f.22. H.N.f.9, n:o 95.

Bergstr. i skugga. r. (Boh. Christinedal. Bratneröd och Lindesnäs nära Gustafsberg. VG. Halleberg, ofvan Stora Lindås; Hunneberg midt emot Bursle gästg.; Kinnekulle flerstädes. Ner. Gropdalen nära Kroksjön i Lerbäck; Hamrarne i Götunda. ÖG. Omberg, Oxbåset: J. E. Zett. Helsl. Elfåsen i Hassela enl. Wistr. Blek. Carlshamn, i Tubbaryds äng. Sk. Öfvedskloster, på Fruali. — N. Laurvig, i Jordfalldalen. Christiansands st. Arendal vid Pusnäs; Tjos; Glomsdal söder om Åseralds k:a etc.; Christiania, i Nordmarken och Asker: Ax. Bl.) *Strået 3—4 fot högt; bladen 3—5 lin. breda, med långt afsmaln. spets.*

- 3 *F. arundinacea* Schreb. bladen *småa*, jemnbreda, stråfva, med *n. omärkligt* snärp; vippan *utbredd lutande*; småaxen bredt lancettlika, 3—7blommiga; blomfj. med *mycket kort* ell. omärkl. borst. 2 7. —  $\beta$  *pauciflora*: spåhare; småaxen 3blomm., med tydligare borst. Fig. Fl.D.2463. E.B.1593. Andst.2,f.23. H.N.f.9, n:o 94.

Hälsstr. (Sk.—Gestr. Medelp. Sundsvall. Hall. Boh. Lysekil. VG. Göteborg. Öl. Gottl. — N. Christiania, Dröbak, Porsgrund, etc.) *4—5 fot hög, med större vippa och de brunglöna småaxen bredare än hos följ.  $\beta$  har såblommiga och glesa småax med en linie långa borst.* — *F. elatior* E.B. [på grund af Lin. herb.]. *F. litorea* Wg.

- 4 *F. elatior* L. bladen *som hos föreg.*, föga stråfva; vippan yngre sammändragen, vid blomn. *utstående, lutande*; småaxen jemnbreda 6—10blomm., utan borst. 2 6. —  $\beta$  *subuloticea*: vippan ax- ell. klaselik, med *n. ensamma*, skiftvisa och föga ell. icke skafade småax. Fig. Sv.B.54. Fl.D.1323. Andst.2,f.24.

Äng. a. (Sk.—VB. Haparanda. Jemtl. — N. till Bodöe.) *Småaxen hälften smälare än hos föreg. n. allid gröna, hos  $\beta$ , som mycket liknar ett Lolium, oftare brunell. grågröna.* — *F. pratensis* Huds.

†† Alla bladen eller rotbl. borstlika ell. trådsmla, med 26radt snärp.

- 5 *F. rubra* L. stråen jemte *nedliggande* grenskott från en *krypande* rotstock, något enstaka, de förra *trinda*; rotbl. hoprullade trådsmla, de öfre bladen bredare, *platta*; vippans grenar *upprätta* ell. *utstående*, med lancettlika 5—9blomm. småax; blomborsten hälften kortare än sitt fjäll, stundom omärkelig. 2 6. Fig. Reich.f.321. Andst.3,f.25,a. H.N.f.12, n:o 92 [var.].

Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Bl.) *Stråen mer enstaka än hos de följ. med bredare och plattare blad. Var. i fjelltr. med sammetsludna småax, hvilkas blr n. sakna borst: var. alpestris ed.9. En form med ludna småax, som växer på sandiga lokaler, är F. arenaria Osb.*

- 6 *F. duriuscula* Fr. stråen och grenskotten från en *trådig rot*, *upprätta, tufvade*, de förra *trinda*; bladen *trådsmla, ränsformiga*, ell. *platta* och snart hoprullade, de öfre något bredare; vippan *ensidig*, med lancettlika, 3—5blomm. småax; för öfr. som

föreg. 24 6, 7. — *β cæsia*: blad korta blåaktiga, båglikr krökta. — *γ glauca*: bl. utdragna blåaktiga, något styfva. — *δ fusca*: vippan smal och n. enkel, mörkt violett. Fig. Fl.D.1628. Reich.f.302—311[varr.]. Andst.3.f.26. H.N.f.8, n:o 94; *β* f.5, n:o 98. \* *dumetorum* L. högväxt, med hoptufvade strån och bladskott; rotbladen långa trådlika. Fig. H.N.f.5, n:o 97.

Torra st. varr. på sand. (Sk.—Uppl. Helsl. Bollnäs prestg. enl. Wistr. Vestml. Verml. och Dalsl. i Venerstrakten. Hall. Öl. — N. till Ost-Finnm. enl. Bl. — \* på steniga hafsstr. Sk.—Helsl. Ångml. Boh. — N. från Christiania till Finn. Lyngseidet.) Skiljd från föreg. med sin tätt tufvade växt, utan märkligt krypande rotskott; från följ. med större och slakare vippa, större småax och bredare, strax de utslå, platta stråblad. *F. dumet.* är en medelform till föregående och troligen samma form som *F. nemorum* Leys. och *F. heterophylla* Hænke.

7 *F. ovina* L. stråen och grenskotten som hos föreg., de förra upptill kantiga; alla bladen likformiga borstlika; vippan smal ensidig upprät, med aflånga, 4—6blomm. glesa småax; blomfjällen meränd. med kort borst. 24 6. — *β tenuifolia*: blrna n. borstlösa; bladen tagelsmala. — *γ vivipara*: bl. något rännformiga; blrna borstlösa, axgroende. — *δ vaginata*: strået högt upp beklädt med bladlösa halmgula slidor från fjolåret. Fig. Sv.B.78. Fl.D.2462. Andst.3.f.27. H.N.f.8, n:o 93. *γ* Fl.D.2043. H.N.f.5, n:o 96 [ena ex.].

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. — *β* Sk. — *γ* i fjellen. — *δ Öland*, på Alfvaren.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med smal, endast under blomn. öppen vippa af 2 lin. långa småax, som vanl. äro gröna ell. gråaktiga, i fjelltrakter ofta violetta: *F. violacea* Gaud. — *δ F. glauca* Fr.

#### 482. VULPIA Gmel.

1 *V. sciuroides* Gm. stråen från en trädig rot, tufvade; alla bladen borstlika; vippan ensidig, upprät, axlikt sammandragen, med omkr. 6blommiga, plattade småax på upptå vidgade skäft; blomfj. med lång borst. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.1445. Andst.3.f.28. H.N.f.13, n:o 93.

Torra st. r. (Sk. öst. kusten vid Stenshufvud, i branterna mot hafvet; Alnarp; Dybeck enl. Leffl. Blek. på strandklipp. vid Mörrum.) Nära fotshög med gles och kort [ $\frac{1}{2}$ —1 t. lång] vippa af nära halftumslånga gröna småax. — *V. myuros* v. *bromoides* Parlal. *Festuca* Roth. *F. bromoides* ed.9.

#### 483. SCHEDONORUS PB. Fr. Svingellosta.

+ Blomborsten kortare än sitt fjäll, stund. n. ingen.

+1 *S. inermis* RS. bladen flere gånger bredare än strået, i kanten stråfva, eljest glatta, med glatta slidor; vippan upprät; småaxen jemnbredt lancettlika, 5—9blommiga; blomfj:s borst omärkelig ell. 5—6 gång. kortare än fjället. 24 6, 7. Fig. Fl.D.1805. Andst.3.f.29. H.N.f.7, n:o 94; f.11, n:o 90.

Äng. r. (Uppl. Uppsala, Marielund; Vallox-Säby; Rosersberg.) Stort gräs, med tums-långa småax. — *Bromus* L. *Festuca* DC.

2 *S. erectus* Fr. bladen fåga bredare än strået, hårbräddade, de nedre med håriga, de öfre med glatta slidor; vippan och småaxen som hos föreg.; blomfj:s borst rak, omkr. hälften kortare än sitt fjäll. 24 6, 7. — *β laxus*: bladen ofvanpå håriga, bredare än strået; småaxen n. dubbelt större, 8—11blomm. Fig. Fl.D.1383. Andst.3.f.31. Reich.f.360; *β* 359. H.N.f.9, n:o 96.

Torra äng. åkerren. etc. r. (ÖG. Marmorbruket; Karstorp i Slaka: Kindb. Stockh. Gröndals park. Uppl. Vestml. Ryd i Granhammars äng; Kaggeholm på Lillön i Mälaren; Frötuna. Boh. Gullmarsfjorden. Gotl. Visby i Snäckgårdet. Fordom äfven i Sk. vid Rörum. — N. Frydenberg nära Christiania. — *β* Sk. enl. ex. ford. lemnadt af Fries. Rosl. Gotl.) Utmärkt af de knappt  $\frac{1}{2}$  lin. breda, långa och håriga rotbladen, något smal och sammandragen vippa. *β*, som är *Bromus sub-erectus* Fr., är bestämd efter Reich., som anser den vara en skuggform af *a.* — *Bromus* Huds. *Festuca* Wallr.

3 *S. asper* Fr. bladen flere gånger bredare än strået, stråfva och håriga, ätm. de nedre med stråfhåriga slidor; vippan utbredd, ensidigt lutande; småaxen som hos föreg.; blomfj:s borst något kortare än sitt fjäll. 24 6, 7. Fig. Sv.B.473? Fl.D.1382. Andst.3.f.30. H.N.f.4, n:o 97.



\* *serotinus* (Ben.). alla bladslid. håriga; småaxen större, med inre skärmsfj. glatt; yttre blomfj. mot spetsen glatt.

Lundar, r. (Sk. Smål. vid Husqvarna. ÖG. Omberg; Klesberget: Kindb. Stockh. Svartsjö slott; Vermdön; Viksberg. Rosl. Norrtelge, Sessö. VG. Kinnekulle; Halle- och Hunneberg. Boh. Christinedal. Öl. Götll. — N. Langesund på hafsklipporna. Åserald i Christiansands st. Findöe vid Stavanger. — \* Sk. vid Rönneå enl. A. Falck; Stenbyhallar enl. Leffl. Öl. Borgholm enl. A. Falck. Götll. Klinte enl. Leffl.) *Stort gräs med slak vippa och ofta nära ½ tum breda blad; de öfres slidor hos S. asp. dels finludna, dels glatta; ytt. blomfj. vanl. hårbraddadt ända upp, men stund. öfven i spetsen glatt, såsom S. serot. beskrifves, hvars karaktärer ej synas nog konstanta. — Bromus Murr. Festuca Mert. Br. erectus Sv.B. en tvetydig ell. dålig figur.*

†† Borst af blomfjällets längd ell. längre.

4 *S. sterilis* Fr. bladen *finludna*; vippan med lutande topp och *långa åt alla sidor utsperrade* slaka grenar, 1—3 tillhopa; småaxen jemnbredt lancettlika, slutl. platta och mot spetsen bredare; borsten *längre än sitt fjäll*. ☉ 6,7. Fig. Sv.B.467. Fl.D. 1325. Andst.3.f.32. H.N.f.1, n:o 80.

Torra st. r. (Sk. Lund; Helsingborg; Landskrona etc. Hall. Stockh. Götll. Visby: G. v. Ced.; Lilla Carlson. — N. Christianiafjorden, på Sandöe en gång.) *Alnshög och mera, med gles, men yfvig vippa af 1½—2 tum långa småax. — Bromus L.*

5 *S. tectorum* Fr. bladen *mjukkhåriga*; vippan med *åt en sida lutande* grenar, 5—7 tillhopa; småax. som hos föreg.; borsten *af fjällets längd*. ☉ 6,7. Fig. Fl.D.1806. Andst.3.f.33. H.N.f.11, n:o 91.

Torra st. (Sk.—Uppl. Vestml. Köping. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Götll. — N. Bergens st. Lerdal och Leganger; sällsynt.) *Sällan öfver fotshögt gräs, med smalare och mer ensidig vippa än föreg.; småaxen vanl. smäludna, säll. glatta. — Bromus L.*

#### 484. BROMUS Lin. \*) Losta.

† Inre och yttre blomfjället lika långa.

1 *B. secalinus* L. sträet och bladslid. *glatta*; bladen *håriga*; vippan slutl. *lutande*, med *talrika utdragna* grenar i samma led; småaxen *dggrundt aflånga* meränd. *glatta*; blrna vid mognaden *åtskiljda*, med *inga* ell. något *krokiga* borst, *kortare än det strax nedom midten* bredare, yttre fjället. ☉ 6,7. Fig. Sv.B.204. Fl.D.293 och 1446. Andst.3.f.35.

Åkr. a. (Sk.—Lpl. — N. till Trondhj. st.) *Högt gräs med tjocka, gröna ax, af tyngden stull. lutande. Var. med stora, mer än tumslånga, mångblomm. småax: v. grossus, och den allmänna med smärre ax.*

2 *B. arvensis* L. stråen *glatta*; slid. och bladen *håriga*; vippan *utbredd*, slutl. *lutande*, med 3—8, *utdragna* grenar tillhopa; småaxen *jemnbredt lancettlika* plattade *glatta*; blrna *tätliggande* med *rak* borst, *längre än det ofvan midten* bredare yttre fjället. ☉ 6. — *β oliganthus*: småaxen flere g:r mindre, 5—6blommiga. Fig. Fl.D.2527. Reich.f.343. H.N.f.6, n:o 88.

\* *patulus* MK. vippan *lutande*; småaxen med mer utstående blr och borst. Fig. Reich. f.344. H.N.f.15, n:o 95.

Od. st. åkerren. (Sk.—söd. Lpl. och VB. nor. del. — N. Christiania; Tvedestrand; Mandal. Finn. Telvig. — *β* Uppl. Löfsta bruk; Lennartsnäs i Näs sn. — \* Sk. Lund; Malmö; samt Hven enl. F. Åresch.) *Vippan vanl. stor, utbredd; småaxen smala, tumslånga, meränd. bruna; ståndarknapp. guldgula. \* B. pat. har lika stora småax som α, men blrna något mer skilda och utstående med spetsen, samt med mer och mindre utböjd borst.*

†† Inre blomfj. märkbart kortare än det yttre.

3 *B. commutatus* Schrad. bladen och slid. *mjukhåriga*; vippan *lutande*, med 2—7 gre-

\*) Babington äfvensom Godr. & Gren. hafva efter Parlatore antagit namnet *Serrafalcus* för detta släkte, med bibehållande af namnet *Bromus* för *Schedonorus*.

nar tillhoppa, de flesta kortare än småaxen; dessa *udraget lancettlika*, 9—11blomm., omärkligt sträfvä; blrna tätt tegellagda, med yttre fjället *ofvan* midten bredare; borsten n. af fjällets längd.  $\gamma$  6, 7. —  $\beta$  *simplex*: vipp. upprät enkel, med uppräta, finludna småax. Fig. Fl.D.2526. Reich.f.347. Ands.t.4,f.37. H.N.f.6, n:o 89.

Åker- och ängsren. r. (Sk.—*Boh.* och *VG.* ÖG. Gistads prestg. *Uppl.* Uppsala. Öl. Borgholm; Näsby i Åhs sn. enl. Leml. *Gottl.* i ången vid Kams gästgg.) *Yppiga former likna mest B. secal.*, men hafva tätare vippa af ofta helt korta grenar, endast en ell. annan längre utdragen; magra former, med n. *klaselik vippa*, dro knappt skiljbara från följ. — *B. pratensis* Ehrh. enl. Fries.

4 *B. racemosus* L. vippan upprät, n. *klaselik*, gles, med korta, ensamma ell. *parvisa* grenar; småaxen lancettlika 7—9blomm.; det yttre blomfjället bredast vid midten; för öfr. som föreg.  $\gamma$  6. Fig. Fl.D.2644. Reich.f.348. Ands.t.4,f.36. H.N.f.6, n:o 90.

Fukt. äng. r. (Sk. *Hall.* vid Karup; i nor. del., vid Ålgussered. *Boh.* upp till Uddevalla. *VG.* Rackeby sn. Degeberg; Göteborg. *Blek.* Ronneby. *Smål.?*) *Småaxen oftast helt kort skafade gröna, lika föreg.s; men, då yttre blomfjället hos denna har kanten vidgad till en trubbig, ehuru rundad vinkel, har den hos B. racem. en jemn böjning.* — *B. pratensis* Ehrh. enl. Koch.

5 *B. mollis* L. vipp. aflängt äggrund, *tät*, upprät, med 2—4 mycket korta grenar tillhoppa; småaxen *äggrundt aflånga*, vanl. *mjukhåriga*; blrna tätt tegellagda, med yttre fjället bredast ofvan midten; för öfr. som föreg.  $\gamma$  6, 7. —  $\beta$  *glabratus*: ax glatta, n. utan glans. Fig. Sv.B.456. Fl.D.1324. Ands.t.4,f.38. H.N.f.7, n:o 96;  $\beta$  f.8, n:o 95.

\* *hordeaceus* Wg. lågväxt och mer tuffad, med tätare vippa af glatta glänsande ax. Fig. Ands.t.4,f.39. H.N.f.7, n:o 97.

Odl. st. back. (Sk.—*Ängml.* och *Dal.* Öl. *Gottl.* — N. till Trondhj. st.)  $\alpha$ , med *mjukhåriga ax*, var. från *alshög* med rik vippa, till *fingerhög* med 1—2 småax: *B. nanus* Weig.

#### 485. BRIZA Lin. Darrgräs.

1 *B. media* L. vippan upprät, med utsperrade grenar; småaxen hängande, slutl. hjertlika, 7—11blommiga; skärmsfjällen kortare än de nedre blomfjällen.  $\gamma$  6, 7. Fig. Sv.B.300. Fl.D.258. Ands.t.5,f.52.

Äng. a. (Sk.—*VB.* och *Jeml.* — N. till Trondhj. st. Ost-Finnm.: Deinb. enl. Bl.) Var. till storlek och blrnas antal i småaxel, samt dettas färg.

#### 486. POA Lin. Ängsgröe.

† Rotstocken med vidlyftigt krypande skott.

1 *P. pratensis* L. strået och slidorna *trinda, glatta*; bladen på strået vanl. korta, något breda, med kort, tvärhugget snärp; vippan *utbredd*, med 3—6, utstående grenar tillhoppa; småaxen äggrunda 3—5blommiga, med ludd mell. blrna.  $\gamma$  6, 7. —  $\beta$  *humilis*: lågväxt och mjuk, med 3—4blomm., violetta småax. —  $\gamma$  *rigens*: något styft gräs; bladen korta; vippan af utsperrade grenar, med ett litet antal silkesludna småax. —  $\delta$  *costata*: vipp. smal af korta grenar; småax af 3, upphöjdt nerviga blr. —  $\epsilon$  *angustifolia*: högväxt, med långa trådsmla rot- och rotskottsblad. Fig. Sv.B. 88,f.1. Fl.D.1444. Ands.t.4,f.40. H.N.f.9, n:o 93 [varr.].  $\delta$  Fl.D.2402.

Äng. etc. a. (Sk.—*Lpl.* — N. —  $\gamma$  i fjelltr.) Vanl. högt, blatt och rikblommigt gräs. Blir i fjelltrakter stundom späd och smalbladig med hälften mindre småax: var. *alpestris* Fr. H.N.f.9, n:o 93, A. —  $\gamma$  närmar sig mycket följ. art, likasom  $\delta$  till *P. compressa*. — *P. angustifol.* L. herb.

2 *P. cenisia* All. strået och slid. n. *trinda, glatta*; bladen på strået 2—3, smala, med något utdraget snärp; vipp. *utbredd*, af ensamma ell. *parvisa, glatta* grenar, med 1—3, ovala, 2—5blomm. småax och lancettlika blr med ludd.  $\gamma$  6, 7. —  $\beta$  *flexuosa*: n. fotshög; vippan liten, upprät, gles, med slutl. horizontala grenar, de nedersta längst. —  $\gamma$  *abbreviata*: lågväxt, strå och slidor något plattade; vippan äggrund. Fig. Sv.B.704. Ands.t.4,f.41. H.N.f.6, n:o 84;  $\beta$  f.3, n:o 94;  $\gamma$  f.7, n:o 93.

Fjelltr. (Torn. och *Lul.* Lpm. — N. Ost-Finnm.: Dovre; Goustaft, etc.) *Fotshög, spensligt, men teml. styft gräs med smala blad och gles axfattig, vanl. violett-brun vippa.  $\gamma$  3—6 tum hög, skiljd från P. laxa med föga annat än något krypande rotskott och mer utbredd vippa: P. arctica Bl. — Anm. P. distiflora*

*RS.*, *hoartill Blytt i Norg. Fl.* med ? förer en af honom funnen blekare form, *torde åften, om man kan döma af de sinsemellan nog stridiga beskrifningarne, höra hit.*

- 3 *P. compressa* L. det styfva strået och slidorna *plattade*; bladen *smala*, med kort snärp; vippan *vanl. smal och upprät, ensidig*, med 2 *ell. flere* stråfva grenar tillhopa; småaxen 3—9blommiga, *utan ludd* mell. blrna. 24 6. —  $\beta$  *Langeana*: mer grön, alnshög; vippan stor och slak. Fig. Fl.D.742. Reich.D.Fl.f.401,  $\beta$  f. 402. Andst.4, f.42. H.N.f.13, n:o 92.

Torra st. mur. (Sk.—Hels. och Dal. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. och vestra del.; nordligast vid Trondhj. och Stördalen. —  $\beta$  N. Christiania flerst.; Toten.) *Blåaktigt, smalbladigt gräs med platt strå, knappt tumsbred vippa, vanl. smala mångblomm. småax.* —  $\beta$ , som af *Blytt* upplages som egen art, är väl icke annat än en *luzurierande lokalform.*

(*P. sudetica*.)

†† Rotstocken utan längre kryp. skott [stråen tufvade]; skärmfj. n. liklånga.

\* Vippan med 3 ell. flere grenar i de nedre lederna.

a — Bladskotten och slid. mer ell. mindre [alltid tydligt] *plattade*.

- 4 *P. sudetica Hænke*: bladskott. och slid. *plattadt Zeggade*, stråfva; bladen *flere* gånger bredare än strået, med *kort, trubbigt* snärp; vippan *öppen ell. utbredd*, mer och mindre slak; småaxen ovala 3blommiga, *utan ludd* mell. de nerviga blrna. 24 6, 7. Fig. Sv.B.614. Fl.D.1924. Andst.4, f.43. H.N.f.7, n:o 91.

Fukt. lund. särdeles i bergstr. r. (*Lpl.—Gestr. och Verml. Uppl.* vid Mellsjön i Tibble, och i Ålands sn enl. Leffl. *Vestml.* Sättra brunn. *Ner.* Hamrarne i Götunda. *ÖG.* Kinda, vid Borgberget. *Smål.* Husvarna: Zett.; Gårdsrum sn: Scheutz. *Blek.* mell. Mörrum och Elleholm. *Sk.* Gudmundtorp i Pinelierna. — N. Från Ranen i Trondhj. st. på spridda st. ned till Christiania och Laurvig.) 2—4 fot högt, *mjukt och bredbladigt gräs.*

- 5 *P. trivialis* L. bladskott. och slid. *något plattade*, stråfva; bladen *knappt dubb.* bredare än strået, med *utdraget, spetsigt* snärp; vipp. *utbredd* och *något* slak; småaxen *som hos föreg., med ett fint ludd* mell. de nerviga blrna. 24 6, 7. Fig. Sv.B.88, f.2. Fl.D.1685. Andst.4, f.44. H.N.f.7, n:o 92.

Ång. fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.) *Strået vanl. stråft, dock stund. glatt, vippan meränd. grön, stundom mer färgad.*

b — Bladskotten och slidorna trinda.

- 6 *P. serotina* Ehrh. strået *utan* lökformiga sidoskott nedtill; bladen *smala*, med *utdraget* snärp; vippan *yfvigt utbredd* med stråfva grenar; småaxen ågggrundt lancettlika, 2—6blomm., *tvärfärgade*; blrna *med ludd*. 24 7, 8. Fig. Sv.B.502. Fl.D.2166. Andst.4, f.45. H.N.f.6, n:o 83.

Fukt. st. stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) *Växer mest i tufvor af tatrika strån, hvilkas leder vanl. äro täckta af bladslidorna. Vippan rikblommig, yngre sammandragen; småaxens blr gröna med brun ell. gul spets.* — *P. angustifolia* Wg. *P. fertilis* Host.

- 7 *P. nemoralis* L. strået *som hos föreg.*; bladen *smala*, med *omärkligt* snärp; vipp. *smal* slak, med stråfva grenar; småax. lancettlika, 2—5blomm.; blrna *utan ludd*. 24 6, 7. —  $\beta$  *micrantha*: med små, knappt en lin. långa, 2blommiga småax. —  $\gamma$  *glaucaantha*: blåaktig; vippan tät gråbrun, med stora 4—5blomm. småax. Fig. Fl. D.749 och 750. Andst.4, f.46.

Lund. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  i fjelltr.) *Spädt, men ofta högt gräs, hvars svarta ell. bruna leder sällan täckas af bladslidorna.*

- 8 *P. bulbosa* L. strået med lökformiga sidoskott vid basen; bladen korta och mycket smala, med *utdraget* snärp; vipp. *upprät*, jemnt spridd, *n. alltid axgroende*; småaxen aflånga 5—7blomm.; blrna lancettlika, tätt liggande, *med ludd*. 24 5, 6. Fig. Fl.D.2606. Andst.5, f.50. H.N.f.2, n:o 77.

Torra st. r. (Sk. Brösarps gästg.; Käseberga enl. F. Aresch. — Stockh. Endast i de öst.

prov. Öl. Gotl.) 1—1½ qv. hög, med liten, men blomrik gråaktig vippa; de icke groende småaxen lika dem hos *P. compressa*. — *P. alpina* var. *Wg.* (*P. cæsia*.)

\*\* Vippan med mest parvisa grenar [1—3].

- 9 *P. alpina* L. strået och de korta, breda bladen glatta; de öfre bladens snärp utdraget, spetsigt; vippan upprätt, styft äggrund tättblommig, med utsperade grenar; småaxen bredt äggrund, 3—6blommiga, med ludd mell. de äggrunda blrna. 2½ 6, 7. — *β nodosa*: strået lågt, vid roten knöl-lik tufvadt; småaxen 3—4blomm. Fig. Sv.B.757. Fl.D.807. Andst.5.f.49. *β* Reich.f.390. H.N.f.4, n:o 96.
- Fjelltr. a. (*Lpl.*—*Helsl.* *Uppl.* Godtsunda. *Stockh.* Danviksbergen: G. v. Ced. *Dal.* Boh. Hamnholmen vid s. Koster. Öl. Resmo; Thorslunda etc. — *N. Finnm.*—söd. delen. — *β Jeml.* Frösön. *VG.* Mösseberg. *Smål.* Kråkerum i Mönsterås sn enl. Ekstr. *Gotl.* Öl. — *N.*) *Här vippa af stora rödlätta, stundom ägroende småax; bladen vanl. 1—2, säll. 3 tum långa. β är omkring quartershög, med hårdt gytttrade bladlemningar vid roten, dock icke lökformiga som hos föreg.; är P. badensis Gmel.*

- 10 *P. cæsia* Sm. strået styft, vanl. stråft; bladen styfva, korta och smala, med något utdraget, tvärhuggat snärp; vippan vanl. utbredd, med stråfva grenar; småaxen aflånga, omkr. 3blommiga, med lancetl. blr, n. utan ludd. 2½ 6, 7. Fig. Andst.4, f.47. H.N.f.3, n:o 95.

\* *Balfourii* Parn. grön; strået slätt; vippan mer utbredd; blrnas ludd tydligare.

\* *glauca* Vahl: bl. och strå blågrå; snärpet kortare; vipp. smal, af fåaxiga grenar. — *β firma*: blr smärre. Fig. Fl.D.964.

Fjelltr. (*Lpl.*—*Dal.* — *N. Finnm.*—*Christiania.* — \* *Balf.* *N. Valders, Dovre* och *Lomsfj.* enl. Bl. — \* *glauca: Lpl.*—*Jeml.* — *N. Ost-Finnm.*—*Christianss. st.* enl. Bl. — *β Lul. Lpm.* *Qvikkjokk.* Boh. Strömstad enl. Beurl. — *N. Salten.*) *Strået omkr. fotshögt, vanl. med ett par skarpa linier, jemte bladen blågrönt; vippan efter blomn. hopdragen, grågrön ell. violett. Var. i hög grad. — P. aspera Gaud.* — Anm. *P. conferta* Bl. från Kongsvold, som Blytt sjelf anser möjl. vara en form af *P. Balfourii*, är för utg. bekant endast af beskr. i *Norg. Fl.*

- 11 *P. laxa* Hænke: strået och de utdragna, smala bladen mjuka och glatta; snärpet utdraget; vippan liten, meränd. smal kleselik, med lutande topp, glatta grenar; småaxen äggrund 3—4blomm. med ludd. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.2342. Andst.5.f.48. H.N.f.6, n:o 85.

\* *stricta* Lindeb. med korta rotskott, inrullade blad och oftast ägroende vippa, smala, 2—3blomm. småax. Fig. Fl.D.suppl.65. H.N.f.15, n:o 94.

Fjellklipp. (*Lpl.*—*Herjed.* på Helagsfj. — *N. från Finnm.* till Goustafjell i *Christianss. st.* — \* *Jeml.* Åreskutan. — *N. Merager; Dovre, på Knuds- och Nystuehue.*) *Mjukt, tufvadt, quartershögt gräs, med smal, rödviolett, säll. grön vippa. \* är en medelform till P. cæsia.*

+++ Utan rotstock, enårig; skärmsf. mycket olikstora.

- 12 *P. annua* L. strået något plattadt, jemte de n. dubbelvikna bladen mjukt; de öfre bladens snärp utdraget; vippan vidt utbredd, med vanl. parvisa grenar; småaxen äggrundt aflånga, 3—7blommiga med föga ludd. ☉ 4—9. Fig. Sv.B.126. Fl.D. 1686. Andst.5.f.51.

Allmän. (*Sk.*—*Lpl.* — *N. till Ost-Finnm.*) *Quartershögt mjukt gräs, mest med grön vippa; i fjelltr. mycket lägre, med smal, mera färgad vippa.*

#### 487. ARCTOPHILA Rupr.

- 1 *A. pendulina* Ands. strået nedtill rotsläande; bladen något styfva, glatta, med utdraget snärp; vippans grenar glatta, n. hårfinna och slakt hängande; småaxen aflånga, 3—6blommiga. 2½ 7. Fig. Fl.D.2343. Andst.5.f.59. H.N.f.9, n:o 92.

Stränd. r. (*VB.* vid Tornioelf från Hietaniemi till Turtula; Tornio; hafsstr. vid Salminanti och Selvitz gästg.) *Älnshögt, teml. groft, glatt gräs; blomfj. hinnaktiga med grön medelner, inga ell. mycket otydl. sidonerver. — Glyceria Læst. och ed.9. A. Læstadii Rupr. A. fulva \* pendul. Ands. Gram.*

## 488. GLYCERIA R. Br. Vatten-Gröe.

† Yttre blomfjället 7nervigt: *Hydrochloa* Hn.\* Strået nedtill kull-liggande; vipp. med n. glatta grenar och stora [mer än  $\frac{1}{2}$  tum långa] småax.

- 1 *G. plicata* Fr. bladen dubb. bredare än strået, med kort snärp; vippan något ensidig, gles; de nedre grenarne 4—5 tillhoppa; småaxen jemnbreda, n. cylindriska, 8—13-blommiga; yttre blomfj. äggrundt aflånga, *rundadt trubbiga*. 2 7. Fig. Fl.D.2465. Andst.5,f.55. H.N.f.5, n:o 91.

Vattengrop. dik. (Sk. allm. *Blek*. Sissebäck: Goss. *Smål*. Kalmar; Jönköping. *ÖG*. VG. Kinnekulle; Hunneberg, vid Bursle. *Verm.* Venerstrakten. *Hall*. Boh. *Gottl.*) Mycket lik följ., med kortare, ehuru bredare och trubbigare blr, med högre nerver.

- 2 *G. fusilans* Br. bladen föga bredare än strået, med utdraget snärp; vippan ensidig, gles; grenarne 1—3 tillhoppa; småax som hos föreg.; yttre blomfj. lancettl., *trubbiga med kort spets*. 2 6, 7. Fig. Sv.B.102. Fl.D.2403. Andst.5,f.54. H.N.f.5, n:o 92 och 93 [var.].

Stränd. dik. a. (Sk.—VB. — N. till Senjen.) Vanl. alnshögt gräs, med gles, stund. *klaselik vippa af tumsånga smala, alltid gröna småax.* — *Festuca* L.

- × *G. loliacea* Godr. bladen som hos föreg., med kort snärp; vippan smal axlik, af enstaka, oskaftade, ell. [de nedre] kort skaftade småax, *en del stund sammansatta*; skärmfj. mycket olikstora, det yttre långt, smalt och spetsigt; blomfj. med hinnaktig spets. 2 6, 7. Fig. Reich.f.236. Andst.2,f.16. H.N.f.8, n:o 96.

Fukt. st. r. (Sk. Christianstad och Lund enl. F. Aresch.) Omkr. 2 fot hög, med utseende på en gång af föreg. och *Lolium perenne*, af hvilka den säkertigen är hybrid. Med sina, ätm. hos några småax, 2 skärmfj. skild från *Lol. festucae*, med hvilken den ofast plågat förenas. — *Festuca* Huds. *Brachypodium* Fr. (till en del).

\*\* Strået upprätt; vippan med stråfva grenar och talrika, små [2—3 lin. långa] småax.

- 3 *G. spectabilis* MK. bladen styfva, breda, med kort snärp; vipp. stor, jemnt utbredd, med 5 ell. flere grenar tillhoppa; småaxen aflånga, 5—9blomm.; blomfj. upphöjdt nerviga trubbase. 2 7, 8. Fig. Sv.B.30. Fl.D.920. Andst.5,f.56. H.N.f.9, n:o 91.

Vatten, r. (Sk.—Uppl. Norrtelge, Björnö, Os, Mellingsholm; Håttuna sn, i kanalen vid Nyborg. Medelp. Sundsvall. Dal. Grycksbo. Vestml. Stora Ekeby. Ner. Hjelmarsnäs; Villingsberg etc. *Verm.* och *Dalsl.* i Venerstrakten allm. m. fl. st. *Hall*. Hasslöv: Theor. — N. Porsgrund; på Krageröe vid Fredrikstad; Christiania; Romegr.) Stort gräs med rik vippa, n. fingerbreda blad. — *Poa aquatica* L. *Gl. aquat.* Wahlb. *Molinia maxima* Hn ed.4

- 4 *G. remota* Fr. bladen mjuka, breda, med kort snärp; vippan gles, något lutande, med 3—5 grenar tillhoppa; småaxen aflångt jemnbreda, 4—6blommiga; blomfj. upphöjdt nerviga, *sargadt trubbiga*. 2 7. Fig. Fl.D.suppl.4. Fors.Lin.Inst.Skr. Andst.1.5,f.57. H.N.f.6, n:o 86.

Fukt. st. r. (Ängml. Bjerträ, norr om Öster-Strinns vid Svartbäckens utlopp i Stormyren. Medelp. Sättna, nära Näsavattnet. — N. Asker vid Stockerelv, mellan Vöjen och Bjerke; Lillehammer vid Mesneelv; Maridalen; Ringebu på Örsanden vid Laugen; Österdalen i Åmødt.) 3—4 fot högt, men spådt gräs; blrna starkt nerviga och vanl. mer färgade än hos föreg. — *G. norvegica* Somfl. *Poa* af Fors.

†† Yttre blomfjället 5nervigt: *Heleochoa* Fr.

- 5 *G. maritima* Wahlb. stråen uppstigande ell. upprätta; vippans nedre grenar parvisa, något ensidigt utstående, föga stråfva; småaxen aflånga, 5—8blommiga; blomfj. lancettlika med snedskuren, något spetsig topp. 2 7. Fig. Andst.6,f.60. H.N.f.5, n:o 94.

\* *festuiformis* Heynh. bladen trådsmla; vippan smal, af få och korta grenar. Fig. H.N.f.5, n:o 95.

Hafsstr. (Sk. *Blek*. *Smål*. Kalmar; Vestervik. *ÖG*. Ekö i Norrköp. skärg. m. fl. st. enl. Kindb. *Hall*. Boh. *Öl*. Borgholm. — N. Christiania; Krageröe; Langöen; Årendal etc.; till Ost-Finnm. enl. Bl. — \* *Hall*. Varberg. Boh. Koön. *Öl*. Ouenby och Näsby i Ås sn.) Vippans grenar mindre utsperrade än hos *G. distans*, vid

mogn. meränd. hopdragna, dock stund. en eller annan nedböjd; småaxen dubb. större, violetta, hos \* [som är en föga utmärkt form] blekgröna. — *Poa Huds. Puccinellia* [jemte de öfr. i afd.] Parlat.

- 6 *G. conferta* Fr. stråen tulfade, uppstigande; den jemnt spridda, täta vippans nedre grenar omkr. 5 tillhopa korta uppstående och mycket sträfvä; småaxen jemnbreda, af 4—8, aflängt jemnbreda, otydl. 3flikiga blr. 24. Fig. Bot.Not.1851, n:o 6. Ands. Gram.t.6, f.61.

Fet dyjord, r. (Vid vestra kusten enl. Fr. Fordom i Sk. nära Ingelstorp i Broby sn, på ruten tång.) En medelform mell. föreg. och följ. Vippan äggrund. med trind, icke vid lederna platt ell. färad blomspindel [rachis]; småax smärre än hos föreg. — *Sclerochloa Borreri* Bab. År, enl. Beurl., blott en lokalform af föreg.

- 7 *G. distans* Wg. stråen som hos föreg.; vippans nedre grenar utdragna, 3—5 tillhopa, slutt. nedböjda, något sträfvä; småaxen aflånga, 2—7blommiga; blomfj. äggr. aflånga med trubbig ell. n. tvärhuggen spets. 24. 6, 7. —  $\beta$  *pulvinata*: 1—3 tum hög, med korta parvisa, föga utstående grenar. Fig. Fl.D.251 och 2222. Ands.t.6, f.62. H.N.f.6, n:o 87;  $\beta$  f.5, n:o 90.

Stränd. rännsten. etc. (Sk.—Ängml. VB. nor. delen. Vestml. Verml. Boh. Öl. Gotth. — N. till Trondhj.) Var. i hög grad; vippan än tät och hopdragen, än gles med ut- och nedsperrade grenar, 2- till 7blommiga, gröna ell. bruna småax o. s. v. — *Poa distans* L. *P. salina* Poll. *P. arenaria* Retz.

#### 489. CATABROSA PB. Narvgräs.

- 1 *C. aquatica* PB. strået nedtill kryp. och rotsläende; bladen platta, med kort snärp; vippans grenar 4—7 tillhopa, jemnt spridda och utstående, n. glatta; småaxen 1—3 blommiga, med sargadt trubbiga, upphöjdt nerviga blomfj. 24. 6, 8. Fig. Sv.B.587. Fl.D.381. Ands.t.6, f.64. H.N.f.9, n:o 89.

Väta st. (Sk. Smål. i Kalm. län, och vid Jönköp. — Uppl. Ängml. Dal. Ner. Vg. Göteborg. Boh. Grebbestad, och Nordkoster: Leffl. Hall. Öl. Gotth. — N. till Ost-Finnm.) Mjukt, bredbladigt, ofta flytande gräs. — *Aira L. Molinia* Wib. *Glyceria Presl.*

- 2 *C. algida* Fr. strået uppstig.—upprätt; bladen som hos föreg.; vippan tät, oftast axlikt hopdragen, grenarne 1—5 tillhopa, upprätta ell. utstående, glatta; småaxen enblommiga, med mycket små, ofta felsläende skärmfjäll; blomfj. otydl. nerviga. 24. 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.t.1. Sv.B.545. Fl.D.1505. Ands.Bot.Not.1849, n:o 3; Gram.t.6, f.65. H.N.f.9, n:o 90.

Fjellbäck. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka. Lul. Lpm. vid Wassajokk; mell. Walle och Kaskaiwo vid Qvikjokk etc. Pit. Lpm. Um. Lpm. Skeblefjell. — N. Ost-Finnm. — Hardanger, på alla högre fjell.) 1—2 tum högt gräs med 1 lin. breda platta blad, mycket små småax, lätt gytt. i en enkel axlik ell. grenig vipa. — *Agrostis* Wg. *Phippsia* Br. *Glyceria* Hn. ed.5.

#### 490. COLPODIUM Trin. Finn-tåtel.

- \*1 *C. latifolium* Br. strået n. upprätt; bladen smalt lancettlika, med utdraget hinnaktigt snärp; vippan smal, hopdragen. 24. 7, 8. Fig. Fl.D.2341. Ands.t.6, f.63. H.N.f.11, n:o 89.

Fjelltr. r. (N. Ost-Finnm. i Birkelierna mell. Wadsöe och Nyborg flerst.; Seidafjellen; Lebesbyfjellen vid Lago.) Ej olit Mol. *cærulea*, med hvilken detta gräs är närmast beslägtadt, men med bredare blad, 2—3ledadt, alnshögt strå. Småaxen vanl. med en enda blomma af n. lika bildade, gröna, oftare brunviolettera trubbiga fjäll; varierar dock i samma vipa med 2 blr. — *Catabrosa* Fr. *Cinna Brownii* Rupr.

#### 491. MOLINIA Schrank. Senegräs.

- 1 *M. cærulea* Mönch: strået upprätt, styft, utan flere leder än en ned vid basen; vippan meränd. hopdragen, med 2—3blomm. borstlösa småax. 24. 7, 8. Fig. Sv.B.401. Fl.D.239. Ands.t.5, f.53.

Fukt. skogsläng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 1—3 fot hög med blå vipa af vanl. korta grenar, men stundom flere tum långa. — *Melica* L. *Enodium* Gaud.

3 Flocken **Avenaceæ**. Småax skaftade [i vippa]. Skärmsfjällen stora som blomfjällen ell. större.

492. FLUMINIA Fr. Kase.

- 1 *F. arundinacea* Fr. strået upprätt, i nedre lederna rotsläende; vippan stor, med utstående grenar; småaxen 3—5blommiga; blomfj. i spetsen uddtandade. 2 7, 8. Fig. Sv.B.370. Ands.t.6,f.66. H.N.f.3, n:o 93.

Åkr. r. (ÖG. omkr. sjöarne Roxen, Dälfvern och Glan, från Kungsbro i Vreta sn till Johannisborg vid Norrköping enl. Kindb.) *Strået manshögt, likt vanlig Vass, men blekare och med smalare blad.* — *Festuca arund. Liljebl. F. donacina Wg. F. borealis MK. Scolochloa festuacea Lk.*

493. TRIODIA R. Br. Knägräs.

- 1 *T. decumbens* PB. strået uppstigande; vippan n. enkel, sammandragen klaselik, af 4—8, 3—4blommiga småax. 2 6, 7. Fig. Fl.D.162. Ands.t.6,f.67. H.N.f.9, n:o 97. Skog. och betesm. (Sk.—Helsl. Dal. och Verm. Dalst. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) *Strået i början nedliggande, slutl. n. upprätt; bladslid:s mynning långhårig.* — *Festuca L. Poa Schrad. Danthonia DC.*

494. KOELERIA Pers. Tofs-åxing.

- 1 *K. glauca* DC. bladen smala, rännformiga, ytterst fint småludna; vippan före och efter blomn. axformigt hopdragen, smalt cylindrisk; småaxen 2—3blomm. med trubade blomfjäll. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1566. Ands.t.7,f.83. H.N.f.1, n:o 78. Sandfält, r. (Sk. hela öst. kusten från Ystad till Blek. gränsen; flerst. i mell. del.; i vest. del. vid Engelholm enl. F. Aresch. Hall. Laholm. Öl. Gårdslösa; Runsten; Gårdby.) *Fotshög, gråaktig, vanl. sträf af omärkl. hår; vippan under blomn. mera öppen.* — *Dact. crist. β Wg. K. intermedia Ahlq. Fl. Runsl.*

495. AVENA Lin. Hafre.

† Enåriga arter, med slutl. hängande småax och mångnerviga skärmsfjäll.

- 1 *A. sativa* L. vippan med utbredda slaka grenar; småaxen 2—3blommiga, kortare än skärmsfjällen; alla blrna med borst; yttre blomfjället spetsadt med 2klufven topp, håromgifven bas. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.144. Fl.D.1629. Ands.t.7,f.72.

\* *intermedia* Lindgr. blomfjällen glatta ell. med mycket få hår. Fig. Fl.D.2642. Ands.t.7,f.72,b\*. H.N.f.7, n:o 89.

Åkr. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Trondhj.) *Axen tumslånga, med långa borst; blomfj. beströdda med borstlika hår, som hos A. intermed., hvilken trol. är A. hybrida Peterm., blifva få ell. inga.*

- 2 *A. strigosa* Schreb. vippan rigtad åt en sida; småaxen 2—3blomm., af skärmsfj:s längd; alla blrna med borst; yttre fjället i spetsen 2syladt, glatt; axfästets hår omärkliga. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.2528. Ands.t.7,f.73. H.N.f.2, n:o 76.

Åkr. r. (Sk.—Boh. Verm. Christinehamn; Carlstad på Örsholmen; Gullsjö i Långserud sn. Smål. Ryhof, Torpa i Jönköpingstrakten; i vest. del. ymnig. ÖG. Järstad; V. Ny sn etc.) *Lik föreg.; småaxen mest 2blommiga.*

†† Fleråriga, med bladskott vid stråets bas, uppräta småax, 1—3nerviga skärmsfjäll.

- 3 *A. elatior* L. bladslid, glatta ell. sträfva; vippan sammansatt grenig; småaxen 2-blommiga; den nedre blomman meränd. med endast ståndare, utan pistill och med lång borst fästad nedom blomfjällets midt. 2 6, 7. Fig. Sv.B.48. Fl.D.165. Ands.t.7,f.74. H.N.f.9, n:o 88.

Hafsstr. äng. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. VG. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) *2—3 fot högt gräs med teml. breda platta blad, något slak vippa. Det yttre skärmsfjället meränd. ennervigt.* — *Arrhenatherum avenaceum* PB.

- 4 *A. pubescens* L. de nedre bladslid. vanl. mjukhåriga; vippan smal, grenig; småaxen 2—3blomm., föga längre än skärmsfjällen; alla blrna med borst, fästad ofvan fjällets midt. 2 6, 7. — *β alpestris*: dubb. större; slidorna 2sidigt hoptryckta, jemte alla blad mjukhåriga. Fig. Sv.B.263. Fl.D.1203. Ands.t.7,f.75.

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Ost-Finnm. — *β* N. Dovre, i birkelierna vid

Kongsvold och Drivstuen. Trol. i flere fjelltr.) *Vippan mer sammansatt än hos följ., gräset mjukare och nedtill finkudet, säll. glatt; det nedre skärmfj. än ennervigt, än med 2 fina sidonerver. — A. pratensis* Sv.B.

- 5 *A. pratensis* L. bladslid. *glatta ell. stråfva* [ej håriga]; småaxen i *smal*, nästan axlik klase, 4—5blommiga, betyd. längre än de båda 3nerviga skärmfjällen; *alla blrna* med borst fäst vid ell. strax ofvan fjällets midt. 2½, 6, 7. Fig. Fl.D.1083. Reich. f.207. Andst.7,f.76.

Äng. (Sk.—Ängml. och Dal. — N. till Helgel.) *Något styft, alnshögt gräs med mycket smala rotskottsblad; vippan klaselik, ell. med en eller annan längre, 1—2-axig gren nedtill.*

#### 496. TRISETUM Pers. Hafreäxing.

- 1 *T. flavescens* PB. strået och de öfre bladslid. *glatta*; vippan *utbredd tätblommig* med *stråfva* skaft; småaxen omkr. 3blommiga, med ena skärmfjället *dubb. längre* än det andra; yttre blomfjället med 2syldad spets. 2½, 6, 7. Fig. Fl.D.1507. Andst.7,f.79. H.N.f.3, n:o 91.

Äng. r. (Sk. Smål. Vestervik, kyrkogården: Dr Lund, och vid Rödsle; Misterhult, vid Virbo; Vexjö, vid Kampen. ÖG. Solberga i Herrberga sn; Åleryd i St. Lars sn; Adelsnäs m. fl. st. Södm. i Thorshällatrakten etc. Stockholm, vid Rörstrand m. fl. st. Uppl. Uppsala; Halqvad i Funbo sn; Ellgarn i Mälaren; Österby bruk; Norrtelge på Frötuna kyrkog. Götll. — N. Eger vid Fiskumvandet. Christiania.) 2—3 fot hög med *platta blad*, rik och *gulglänsande vippa. — Avena* L.

- 2 *T. agrostideum* Fr. strået *upptill* och de öfre bladslid. *glatta*; vippan *utbredd gles*, med *n. glatta* skaft, *efter blomn. n. axlikt sammandragen*; småaxen 2—3blomm., med ena skärmfjället *något längre* än det andra; yttre blomfj. med 2flikig spets. 2½, 7. Fig. Andst.7,f.80. H.N.f.3, n:o 92 och f.7, n:o 90.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Karesuando vid Maunu; Torn. träsk, vid bäcken Nagerijoki.) *Fotshög, med habitus af föreg.; karakterer mer af följ., och utgör en mellanform till båda; bladen dock smalare än hos någondera, stund. n. trådlika. — Avena subalpestris* Hn Ed.3.

- 3 *T. subspicatum* PB. strået och bladslid. *mjukhåriga*; vippan *alltid smal axformig* med *småhåriga* skaft; småaxen *som hos föreg.* 2½, 7. Fig. Sv.B.722. Fl.D.228. Andst.7,f.81. H.N.f.11, n:o 88.

Fjellv. (Lpt.—Herjed. — N. Ost-Finm.—Filefjeld.) ½—nära 1 fot högt, *mjukludet gräs, med platta blad, 1—1½ tum lång, vanl. gråbrun vippa. — Avena* L.

#### 497. AIROPSIS Fr. Smile.

- 1 *A. caryophyllea* Fr. vippan *utbredd*, med *utdragna och utstående* grenar; småaxen 2blomm., kortare än skärmfjällen, med i spetsen 2syldade yttre blomfjäll. ☉ 5, 6. Fig. Sv.B.508. Fl.D.382. Andst.7,f.77. H.N.f.2, n:o 74.

Sandfält, r. (Sk. mångenstädes i söd. och vest. del.; i den östra vid Rörum, Gladsax och Käseberga enl. F. Aresch.) 3—8 tum högt, *spädt gräs, med borstlika blad, silfverglänsande småax. — Avena* L. och *Parlat. Avena* Web.

- 2 *A. præcox* Fr. vippan *smal, n. axformig*, med *korta upprätta* grenar; småaxen *knappt* kortare än skärmfj.; för öfr. som föreg. ☉ 5, 6. Fig. Sv.B.508. Fl.D.383. Andst.7,f.78. H.N.f.2, n:o 75.

Torra st. (Sk. Blek. Smål. Kalm. län vid kusten; Jönköpingstrakten; syd-öst. del af Kronob. län, samt i Götheryd sn: Scheutz. ÖG. Lönö i HäradsHAMMAR; Åxelsö och Rövik i St. Annæ. Södm. Landsort: C. Ind. VG. Kollands-ö på stranden. Boh. Hall. Öt. Götll. — N. från Arendal och Christiansand upp till norra delen af Bergens st.) 2—4 tum hög, med *borstlika blad, slutt. blekgul, knappt tumslång, n. lancetlik vippa. — Avena* L. *Avena* PB.

#### 498. CORYNEPHORUS Pal. B. Sandborst.

- 1 *C. canescens* PB. bladen *borstlika stråfva*; vippan *tät, aflång ell. åggrund*; skärmfjällen *nående öfver blrna*. 2½, 6, 7. Fig. Sv.B.450. Fl.D.1023. Andst.8,f.84. H.N. f.1, n:o 77.

Sandfält. (Sk. allm. Hall. Blek. Smål. Kalmar och Åby; Skäggenäs, samt Refsudden i Ryssby sn; Misterhult, mell. Virbo och Figeholm m. fl. st. i Kalm. län;



Sandsjö i Konga enl. Scheutz. *Öl. Gottl.* — *N.* uppgifven för Bergen och Söndmøer, men aldrig sedd af Blytt.) *Tufvadt, gråaktigt gräs,  $\frac{1}{2}$ —1 fot högt.* — *Aira L.*

499. *AIRA Lin.* Ängståtel.

† Småax 3blommiga ell. med ämne [skaft] till 3:dje blomman; borsten n. rak: *Deschampsia PB.*

- 1 *A. alpina L.* bladen *hoprullade, glatta*; vippan upprätt, öppen med *glatta* grenar; småaxets *nedre* blomma med borst, fastad nära blomfjällets *midt* och *föga* längre än detta; den öfre med en kort borst nära spetsen. 2 7. Fig. Wg.Fl.L.3. Fl.D.1625. Andst.6.f.70. H.N.f.8, n:o 91 [axgroende].  
Fjellv. (*Lpl.*—*Jeml.* Åreskutan; Snasahögen; Sylfjellen. *Herjed.* på gränssjell. — *N.* från Ost-Finnm. till nor. del. af Christianss. st.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot högt, *glatt gräs, med of-tast axgroende vippa.*
  - 2 *A. bottnica Wg.* bladen *snart hoprullade*, på öfre sidan *något sträfvä*; vippan som hos föreg. med *glatta* ell. *omärkl. sträfvä* grenar; småaxets *båda* blr med borst fastad närmare *basen, dubbelt längre* än fjället. 2 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.4. Fl.D. suppl.64. Andst.6.f.68. H.N.f.3, n:o 88.  
Hafsstr. (*VB.*—*ÖG.* vid Bråviken enl. Kindb. *Smål.* på ön Jungfrun.) 2—3 fot högt, *tufvadt, snart gulnande gräs, med gulglänsande vippa; småaxen dubb. större än hos följ. Var. med mer utbredd vippa, smärre småax: var. micrantha Malmgr. i H.N.f.16, n:o 78.*
  - 3 *A. caespitosa L.* bladen *platta*, på öfre sidan *mycket sträfvä*; vippan slakt utbredd, med *sträfvä* grenar; småaxets *båda* blr med borst fastad närmare *basen, af fjällets längd.* 2 6, 7. Fig. Sv.B.132. Fl.D.240. Andst.6.f.69.  
\* *brevifolia Hn.* bladen korta och *platta*; vippan smal upprätt violett, småaxen med utskjutande, något krökt borst.  
\* *glauca:* vippan grågrön tät, med glattare grenar; borsten från blomfjällets midt.  
Äng. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* — Underarterna i *Jeml.* på Frösön etc. \* *brevif.* äfven i *N.* på Norfjellet; och \* *glauca* vid Elstad i Gudbrandsdalen: Doc. P. Olsson.) *Högt, mycket tufvadt gräs, vanl. med stor, yfvig, grå ell. brun, stund. gulglänsande vippa. A. brevifolia har alldeles utseende och färg af A. flexuosa β; rötbl. platta, 2 tum långa.*
- †† Småax 2blomm., utan ämne till en 3:dje; borsten med knä och dervedom vriden: *Avenella Koch.*
- 4 *A. flexuosa L.* bladen trådlika, med utdraget *tvärhugget* snärp; vippan meränd. utbredd och *lutande* med *flerböjda, föga sträfvä* grenar; småaxen knappt längre än de olikstora skärmfjällen, med *långt utskjutande* borst. 2 6, 7. — *β montana:* vippan smal, meränd. hopdragen, med större, rödvioletta småax. Fig. Fl.D.157. Andst.6.f.71. *β* Fl.D.1322.  
Torra äng. back. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* — *β* i *sjelltr.* ned till *Helsl. Boh.* på bergen vid Strömstad. — *N.*) *Vippan vanligen stor och glänsande blekgul, stundom med vid basen violetta småax; rotskottens blad glatta.*
  - 5 *A. uliginosa Weihe:* bladen trådlika, med utdraget, *spetsadt* snärp; vipp. *upprätt*, med utstående, något *flerböjda* och *sträfvä* grenar; småaxen af de *föga* oliklånga skärmfjällens längd, med *utskjut.* borst. 2 6, 7. Fig. Fl.D. suppl.t.3. Reich.f.184. Andst.12.f.143. H.N.f.2, n:o 73.  
Dyiga sjöstränd. samt sand och stenrös i sjöar, r. (*Smål.* Femsjö vid Bastesjö, Halle-sjö. — *N.* Möllevand nära Christiansand, samt vid Stavanger.) *Lik föreg., men vippan upprätt, brun, med tydligare sträfvä grenar; rotskottsbladen finare och ofta n. hårsmala, mycket sträfvä, då de strykas uppifrån och ned. Anses af Fries som afart af föreg. — A. discolor Thuill.*
500. *VAHLÓDEA Fr.* Fjelltåtel.
- 1 *V. atropurpurea Fr.* bladen *platta*; vippan gles, af utdragna slaka grenar; blomfjällens borst icke utskjutande öfver skärmfjällen. 2 6, 7. Fig. Sv.B.687. Fl.D.961. Andst.8.f.87. H.N.f.3, n:o 89.  
Fjellmossar, r. (*Lpl.*—*Jeml.* vid elfvarne Handölan och Herrhågan. *Herjed.* Storå-

dörren och Valdsjön, samt Haftorssstöten och Rutstöten. — *N. Ost-Finm.* ned till Johanskuden vid Mjösen. Norfjellet i Buskeruds amt. Hofhelderen i Ouse past. Christiansands st. Gousta fj. etc. allmän.) *Fotshögt gräs med slak vippa af brunvioletta småax.* — *Aira Wg. Fl.L. Holcus Wg. Sv.B.*

#### 501. HOLCUS Lin. Mjuktåtel.

- 1 *H. lanatus* L. strået och bladslid. *finludna*; bladen platta, breda, gråfludna; skärmfjällen *trubbiga*, meränd. *med kort udd*; blom borsten *rak* ell. *kroklikt böjd*, *icke nående öfver skärmfjällen*. 2 6, 7. Fig. Sv.B.84. Fl.D.1181. Andst.8.f.85.  
Fukt. äng. (Sk.—Upl. *Gestr.* Oslättfors. Ängml. Själevad sn. *Ner. Verm.* Årås nära Marviken. *VG. Dalsl. Boh. Öl. Gottl.* — *N. söd. och vest. delar upp till Romsdalen och Molde.*) *Vippan tät, vanl. rödlätt, stund. n. hvit; hela gräset mjukt.*
- 2 *H. mollis* L. strået och de öfre bladslid. *glatta*; bladen som hos föreg., *finludna*; skärmfj. *smalspetsade*; borsten *utskjutande, med knä* nedtill. 2 7. Fig. Sv.B.198. Fl.D.1059. Andst.8.f.86. H.N.f.13, n:o 91.  
Lund. r. (Sk. *Blek. Smål.* Dörby och Hosmo m. fl. st.; Kalmår; Vestervik; Vexjö, och i Lenhofda sn: Scheutz. *Södml.* Utön, Edenäs; Ornö, i Hesselmara äng. *Hall. Boh. Öl. Gottl.* Sproge. — *N. Christiansand upp till Romsdalen.*) *Med krypande rotstock; vippan gulaktig; borsten sträf.*

#### 502. MÉLICA Lin. Slokgräs.

- 1 *M. ciliata* L. bladen *hoprullade*, med *utdraget* snärp; vippan *axlikt* hopdragen; småaxen *enblommiga*, med ämne till andra blomman; den fullständiga blomman yttre fjäll nära kanten *långhårigt*. 2 6, 7. Fig. Sv.B.365. Fl.D.suppl.7. Andst.8, f.88. H.N.f.4, n:o 98.  
Torra berg, r. (*Smål.* Eds kyrka. *ÖG.* Alvastra; Omberg etc.; här och der i skärg. från Börrum upp till Kolmården enl. Kindb. *Södml.* Tullgarn på Fridön; Mörkö; Utön etc. *Stockh.* Danviksbergen; Norsborg; Kungshatt; klippor vid Bergianska trädg. Endast i de öst. prov. *Öl. Gottl.*) *Axet brunt, efter blomn. hvitludet af de långhåriga blrna.*
- 2 *M. nutans* L. bladen *platta*, med *omärkligt* snärp; vippan *ensidig, lutande, klase-lik*; småaxen 2blommiga, med ämne till en tredje blomma; de fullständiga blrnas yttre fjäll *glatt*. 2 5, 6. Fig. Sv.B.354.f.1. Fl.D.962. Andst.8.f.90.  
Stenback, a. (Sk.—Lpl. — *N. till Ost-Finm.*) *Småaxen ensam, på korta skaft, n. hängande, af brunviolett färg.*
- 3 *M. uniflora* Retz. bladen *platta*, med *hinnaktigt* snärp och *midt emot detta ett borstlikt bihang*; vippan *mycket gles långgrenig* lutande; småaxen *enblommiga* med ämne till andra blomman; den fullständiga blns yttre fjäll *glatt*. 2 6, 7. Fig. Sv.B.354.f.2. Fl.D.1144. Andst.8.f.89. H.N.f.14, n:o 89.  
Lund. r. (Sk.—*Södml.* t. ex. Tjustvik på Vermdön; Kappeberget vid Södertelge. *VG. Boh. Öl. Gottl.* — *N. på öar i Christiania-fjorden; Arendal; Christiansand etc.; söd. del. af Bergens st.*) *Småaxen lika föreg:s, men upprätt, i en fåblommig vippa af 1—2 tum långa, hårfinna grenar.*

#### 4 Flocken AGROSTIDÆ. Småaxen enblommiga [undant. *Phragmites*].

##### 503. PHRAGMITES Trin. Vass.

- 1 *P. communis* Trin. bladen n. lancettlika; vippan stor, utstående ell. utbredd; småaxen 2—6blommiga. 2 7, 8. Fig. Sv.B.114. Fl.D.2464. Andst.8.f.91.  
Stränd. stund. i fukt. åkr. a. (Sk.—Lpl. — *N. till Nordl. Bejeren; Norm.*) 3—4 *alnar högt gräs med fingerbredda blad. Blir på det torra mycket lägre.* — *Arundo Phragmites L.*

##### 504. PSAMMA Pal. B. Marehalm.

- 1 *P. arenaria* RS. bladen inrullade; vippan cylindriskt *axlik*; skärmfjällen *spetsiga*; håren kring blrnas bas *icke nående* blomfj:s midt; det yttre blomfjället med ett syltlikt borstämne tätt under och *icke längre* än fjällets spets. 2 7, 8. Fig. Sv.B.138. Fl.D.917. Andst.8.f.92. H.N.f.13, n:o 90.

Hafsstr. på flygsand. (Sk. Hall. Boh. på Koster; Lysekil. Smål. Kalmar. Öt. Götll. — N. Hvalöarne och vestra kusten upp till Nordfjord i Bergens st.) *Axet lått*, 3—6 tum långt, *halmfärgadt*. — *Arundo L. Ammophila arundinacea* Host. *Calamagrostis* Fr.

- 2 *P. baltica* RS. bladen snart inrullade; vippan grenig sammandragen spetsad; skärmsf. *sydspetsade*; håren kring blrnas bas nående blomf:s midt; yttre blomf. med en hårlig borst under och något längre än fjällets spets. 2 7, 8. Fig. Fl.D.1684. Andst.8.f.93. H.N.f.1, n:o 74.

Som föreg. r. (Sk. Ystad vid Köpingsåns utlopp; Kåseberga och Sandbammars m. fl. st. — N. Sandöund i Christianiafjorden.) *Snartlik Calam. epigejos*, men med tätare, n. lancettlik vipa; blrna stora violetta med grön bas. — *Arundo maritima* Ag. *Calamagr.* Fr.

### 505. CALAMAGROSTIS Roth. Rör.

† Blomborsten-fästad närmare fjällets bas och krökt vid midten: *Dejeuxia* PB.

\* Blomf:s borst mycket längre än skärmsf.

- 1 *C. arundinacea* Roth: vippan upprät öppen; skärmsfjällen lancettlika spetsade; håren kring bln-kortare än halva blomf. 2 6. Fig. Sv.B.96. Fl.D.1683. Andst.9.f.104. H.N.f.8, n:o 90.

Steniga back. a. (Sk.—söd. Lpm. — N. till Trondhj. i Stördalen.) 3—4 fot högt, styft, bredbladigt gräs. — *Agrostis L. C. silvatica* DC. ett yngre namn än både Linnés och Roths.

\*\* Blomf:s borst icke längre än skärmsf.

- 2 *C. acutiflora* DC. vipp. upprät, öppen; skärmsf. smalt lancettlika, *utdraget sylspetsade*, mycket längre än blomf. och lika långa som dettas borst; håren föga kortare än blomfjällen. 2 7. Fig. Fl.D.suppl.62. Andst.9.f.105. H.N.f.10, n:o 96.

Bergstr. r. (Hall. norra delen, vid Onne torfmosse och i Klefbergen. Boh. på vest. sidan af Koön. — N. Christiania, på Langöe; mell. Kongshavn och Bäckelaget; vid Sandvigen etc.) Omkr. 3 fot högt gräs, med tät och rikblommig, violett vipa; skärmsfjällens spets hoptryckt och nålsmall utdragen. — *C. subulglumis* Exc. Fl. ed.1.

- 3 *C. varia* PB. vippan som hos föreg.; skärmsf. lancettlika, *spetsade*, mycket längre än blomf.; borst och hår som hos föreg. 2 6, 7. Fig. Reich.f.146. Andst.9.f.106. H.N.f.8, n:o 89.

Torra st. r. (Götll. teml. allmän i norra delen, t. ex. vid Hau i Fläringe; Vestöo gård i Hall sn, etc.; i mell. och söd. del. sällsyntare, t. ex. på Thorsborgen och i Løjsta sn.) Omkr. 2 fot hög; vippan glesare än hos föreg. med mer bredfjälliga, viol. småax; bladen bredare, n. lancettlika. — *C. montana* Host. *Arundo varia* Schrad.

- 4 *C. chalybea* Fr. vipp. som hos föreg.; skärmsf. bredt lancettlika *spetsiga*, föga längre än blomf. och lika långa som dettas borst; håren kortare än blomf. 2 6, 7. Fig. Andst.9.f.103. H.N.f.15, n:o 93.

Torra st. r. (Ängml. Täsjöberget samt vid Täsjön och Hotingsjön; Liden och Ramsele snr ned till gränsen af Ed sn. Verml. vid Tabergs grufvor.) Har grön- och brunbrokiga småax, af mindre storlek än de öfr. i denna afdeln., med ena skärmsfjället något längre, det andra något kortare än blomf., båda spetsiga, utan udd. — Ar. lapp. β Læst. Ar. silvat. β Wg.

- 5 *C. lapponica* Hn. vippan upprät, meränd. smal, n. axformig [hos β mer yfvig]; skärmsf. lancettlika *trubbade* ell. *kortspetsiga*, längre än blomf. med dess hår; borsten och håren af blomf:s längd ell. något längre. 2 7, 8. — β *opima*: hela gräset större och gröfre; vippan af 1—2 tum långa utstående grenar. Fig. Wg.Fl.L.t.1. Sv.B.649. Fl.D.suppl.t.5, β t.6. Andst.9.f.102. H.N.f.3, n:o 86.

Fjelltr. (Lpl.—Jeml. Brunflo och Ragunda snr. VB. Lul. skärgård; Umeå sn. Ängml. Medelp. Borgsjö sn, Randklöfven. — N. Finnmark.) Vippan knappt fingertjock, violett, af n. dubb. större småax än hos föreg. Borsten mindre krökt än hos de öfr. i afdeln. — β *C. chalybea* Bl.N.Fl.

†† Borsten rak, fästad vid ell. ofvan midten af blomfjällets rygg.

\* Småaxen gytttrade på vippgrenarnes utsida; strået alltid enkelt.

- 6 *C. epigejos* Roth: vippan upprät, med styfva grenar; skärmfjällen *jembredt* lancettlika, *långt* sylspetsade; borsten fästad ned på blomfj:s rygg, kortare än de blomfj. öfverstående håren. 2/7. —  $\beta$  *riparia*: strået föga strått; vippan smal, n. cylindrisk. —  $\gamma$  *glauca*: spåhare och blåaktig, med utbredd och glesare vippa. Fig. Fl.D.2165. Reich.f.154—56. Andst.8.f.94. H.N.f.8, n:o 83, 84 [varr.].

Torra st. (Sk.—Lpl. — N. till Salten. —  $\beta$  Lpl. Karesuando vid stränd. —  $\gamma$  VG. på Råfholmen i Venern nära Degeberga. — N. Christiansand; Christiania.) *Styft gräs med vanl. mycket strått strå, brun- ell. gråbrokig vippa. \gamma C. rigens* Lindgr. i Fr. S.Veg.Sc.

\*\* Småaxen jemnt fördelade på vippgr:s alla sidor.

a — Vippan efter blomn. utbredd ell. något ensidigt sammandragen, med vanl. öppna skärmfjäll; strået slutl. grenigt.

- 7 *C. elata* Blytt: vipp. stor, med utdragna *utstående, slaka* grenar; skärmfj. lancettlika *spetsade*, mycket längre än blomfjällen; borsten från blomfj:s *midt, lika lång* som detta; håren kring bln *längre* än blomfj., *lika långa* som skärmfjällen. 2/7, 8. Fig. Fl.D.suppl.63. H.N.f.14, n:o 91.

Våta st. stränd. r. (*Ängml. flerest. i norra Ådalen ymnig. VB. vid Sangis- och Korpikelfvar. — N. Christiania, vid Ellingsrud.*) *Stort gräs med glatt strå, blåaktiga, 2—3 lin. breda, snart hoprullade blad, och rik vippa af 2—3 tum långa grenar; småaxens hår mycket längre än blomfjällen.*

- 8 *C. Langsdorffii* Trin. vipp. upprät, med *utstående, styfva* grenar, slutl. *något ensidigt* sammandragen; skärmfj. lancettlika, *spetsiga*, längre än blomfj.; borsten från blomfj:s *midt ell. högre upp, något längre* än fjället; håren *längre* än blomfj., *något kortare* än skärmfj. 2/7, 8. Fig. H.N.f.13, n:o 89.

Stränd. r. (*Verm. Långserud sn, Kolsäter vid Knappershåcken: mell. Gullsjö och Kastensbol; i Ekshärad, vid sjön Jangen. — N. Christiania, i Långmossen vid Abildsöe, nära Voxen etc.*) *2—3 fot högt gräs, med glatt strå, styfva, 3—4 lin. breda, platta blad och blekröd, slutl. gråaktig vippa. — C. rubicunda Blytt. — Anm. C. nutans Saul. ansöres äfven af Blytt, ehuru med någon osäkerhet, såsom funnen nära Christiania.*

- 9 *C. phragmitoides* Hn. vippan *utbredd* med lutande topp; skärmfj. lancettlika *långspetsade*; borsten från blomfj:s *midt, än högre upp* ända till från dess spets, *lika lång* som blomfj. *ell. något längre*; håren *af blomfj:s längd, kortare* än skärmfjällen. 2/7, 8. —  $\beta$  *breviaristata*: borsten utgående i toppen mell. blomfj:s *likar* ell. något längre ned. Fig. Reich.f.149? Andst.9.f.97. H.N.f.10, n:o 91; f.14 [varr.].

Bergstr. etc. (Lpl.—Herjed. och Ängml. allm. Medelp. Indals prestg. Helsl. Loos sn, Tenberget; Hassela, vid Elfåsen: Wistr. Uppl. Järlåsa sn, Lingonbacka; Tibble sn, vid Metsjön enl. Leffl. Vestml. Sättra brunn. Ner. mell. Stjernsund och Aspa. ÖG. Gopö och Sjöholmen i Vettern. Smål. vid Husqvarna-åns nedre lopp; Gärdesrum. Verm. Finnskoga, vid elfven Tåsan m. fl. st. Dalsl. Boh. — N. Finnm.—Christiania.) *Stort gräs, med mer och mindre strått strå, 3—5 lin. breda blad, rik brunviolet vippa af n. 2 lin. långa småax, som, då det tillika är bredbladigt, icke är olikt Phragmites. — C. latifolia Blytt.*

- 10 *C. Halleriana* DC. vippan *utbredd*, något *slak* och gles; skärmfj. lancettl. *spetsade*; borsten från blomfj:s *midt, lika lång* som fjället *ell. något längre*; håren *som hos föreg. 2/7. — \beta pulchella*: bladen 3 lin. breda; småaxen större. —  $\gamma$  *gracilescens*: strået lägre, med mindre och smalare vippa, smärre småax. Fig. Fl.D.2524. Andst.9.f.98. Reich.f.147; \beta 148. H.N.f.8, n:o 85 och f.10, n:o 93; \gamma 94; \beta f.14, n:o 92.

Fukt. äng. vid stränd. etc. (Lpl.—Smål. Jönköp. vid Storån; Gärdesrum och VG. Degeberga. Boh. Strömstad. — N. Ost-Finm. till söd. delen. —  $\beta$  Uppl. Funbo sn. — N. Christiania. —  $\gamma$  N. Christiania, vid Ellingsrud.) *Föga skiljd från föreg. med annat än mindre vippa och småax samt smalare [1—3 lin. breda] blad; stund. [såsom ex. i H.N.f.10, n:o 93] närmar den sig C. lanceolata, så att de knappt kunna skiljas af annat än borsten. — C. pseudophragmites Reich. och Bl. Norges Fl.*

b — Vippan smal, efter blomn. axlikt sammandragen, med slutna skärmsfj.

- 11 *C. Hartmanniana* Fr. strået upptill och vid lederna *stråft*; vippan upprät, *öppen*, efter blomn. hopdragen; skärmsf. lancettlika *smalspetsade*; borsten fästad vid ell. något nedom yttre blomf:s midt, något längre än fjället; håren kortare än detta. 24. 7. Fig. Andst. 9. f. 101. H.N.f. 10, n:o 95.

Fukt. ång. stränd. (*Smål.* i Hvena sn enl. Ekstr. *Södm.* Forssa pappersbruk; Thorsberga i Stenqvista sn. *Dal.* Thorsås sn enl. G. v. Ced. *Verm.* vid Knappersbäcken nära Kolsäter i Långserud sn. *Boh.* — *N.* Christiania vid Kjænskjern nära Ellingsrud, Tuttremyr i Maridalen, Gåslungen. Liggeren etc. Brufladt i Valders.) *Lik föreg:s spådare former, men med smalare, violett vipa, mer långspetsade skärmsfjäll, kortare blomhår.* — *C. ambigua* Hn. ed. 6. *C. intermedia* Lindb.

- \*12 *C. strigosa* Hn. strået upptill *stråft*; vippan upprät *smal och tät*, med *upprätta* grenar; skärmsf. *långspetsade*; borsten som hos föreg., af blomfjällens längd ell. något längre; håren kortare än blomfj. 24. 7, 8. Fig. Wg. Fl. L. t. 2. Andst. 9. f. 99. H. N. f. 8, n:o 86.

Stränd. r. (*N.* Finnm. Lyngen; Tana- och Altenelv. Trondhj. vid Namsenelv i Öfverhalden, nedom gårdarne Grande och Valskræ m. fl. st.) *Liknar följ., men har mycket stråfvare vippgrenar och mer spetsade skärmsfjäll; håren nående öfver halfta blomman, stundom högre upp. Strået likasom hos alla de följ. stull. grenigt i de nedre bladvecken.*

- 13 *C. stricta* Hn. strået vanl. *glatt*; vippan upprät, med vid blomn. n. *utsperrade*, korta grenar; skärmsf. lancettlika *kortspetsiga*; borsten och håren som hos föreg. 24. 6, 7. Fig. Sv. B. 301. Fl. D. 1803. Andst. 9. f. 100. H.N.f. 8, n:o 87, 88 [var.].

Fukt. ång. (*Lpl.* — *Sk.* Öl. Kastlösa sn. — *N.* till Ost-Finm.) *1—2 fot högt gräs med smal gråbrun vipa, smala, vanl. snart hoprullade blad; strået stund. upptill stråft. Var. efter olika lokaler dubb. högre, samt dels med stor vipa, dels med ett par lin. breda platta blad, och stund. med nedtill knobdjt strå.* — *Arundo stricta* Timm. *C. neglecta* Ehrh. och Fries. (*C. acutiflora*, *Langsdorffii*.)

††† Borsten fästad i blomfjällets spets.

- 14 *C. litorea* DC. vipp. upprät, med *utstående* och utdragna grenar; skärmsf. lancettlikt *syl-lika*; borsten utgående i yttre blomfjällets spets och *hålfen så lång* som detta; håren längre än blomfj. 24. 7, 8. Fig. Reich. f. 152. Andst. 9. f. 107.

Fjelltr. (*Jemtl.* Herjed. mell. Ljusnedals bruk och Vallarne. *Helsl.* Elfåsen i Hassela enl. Wistr. *Verm.* Sættren vid Pershöjd.) *Högt gräs, utmärkt af de mycket smala n. syl-lika skärmsfjällen, som af Reich. afbildas allt för breda. Äfven hos denna art kan borsten utgå nedom spetsen. Är måhända närmast beslägtad med C. epigejos. — C. laxa* Host.

- 15 *C. lanceolata* Roth: vipp. *utbredd lutande*; skärmsf. lancettlika *spetsade*; borsten fästad i blomfj:s spets mell. sikarne eller strax nedom dessa, *flere gånger kortare* än fjället; håren längre än både blomfj. och borsten. 24. 7. Fig. Sv. B. 312. Fl. D. 1624. Andst. 9. f. 96. H.N.f. 10, n:o 92.

Fukt. st. stränd. a. (*Sk.* — *Lpl.* — *N.* i Aggerhus och Christianss. st.) *Mjukt gräs med vanl. brun ell. gråbrokig, mera sällan grön vipa. Borsten än kortare än fjällets sikar, än längre och tydligare, dock aldrig öfver ½ så lång som sjelfva fjället. Jemf. C. Halleriana. — Arundo Calamagrostis L.* (*C. phragmitoides*, *Langsdorffii*.)

506. *APERA* Adans. Kjösa.

- 1 *A. Spica venti* PB. vippan yfvigt utbredd lutande; blomfj:s borst flere gånger längre än fjället. ☉ 7. Fig. Sv. B. 286. Fl. D. 853. Andst. 10. f. 108. H.N.f. 14, n:o 93 [var.]. Åkrar, a. (*Sk.* — *Ångml.* och *Jemtl.* VB. nor. delen. — *N.* till Finm.) *Var. från ett par fot till ett par tum [Öl. på Alfvaren] hög. Vippan stor ljusgrön, sällan rödbrun. — Agrostis L.*

507. *AGROSTIS* Lin. Hven.

† Blomman af 2 fullkomliga fjäll: *Vilfa* PB.

- 1 *A. stolonifera* L. bladen platta, med *utdraget*, aflångt snärp; vippan genom de *långt* Hartman, *Skandinavians Flora* (10:de uppl.).

*utdragna nedre grenarne pyramidformig; efter blomn. hopdragen.* 2 6, 7. — *β maritima*: strået nedtill kull-liggande, ofta rotsläande; vippan tät gyttad af smärre småax. Fig. Fl.D.1623. Reich.D.Fl.f.133—37. Andst.t.10.f.109.

Fukt. äng., hafsstr. a. (Sk.—VB. nor. del. Lpl. — N. till Ost-Finnm. — *β* på hafsstr.) *Vippans grenar vanl. stråfva. Var. i hög grad; ofta alnshög med stor och yfvig vippa: v. gigantea, samt än med, än utan borst på blomfj.; β stund. quartershög med tumslång vippa. Enl. Läst. skall denna art i Lpl. sammanflyta med följ. — A. alba L.Sp.Pl. A. stolonif. β L.Fl.Su.*

2 *A. vulgaris* With. bladen platta, med kort, tvärhugget snärp; vippan gles utbredd, genom de längre mellangrenarne äggformig, efter blomn. lika öppen. 2 6, 7. Fig. Sv.B.581. Fl.D.163. Andst.t.10.f.110. H.N.f.11, n:o 85.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Vippan vanl. yfvig af utsperrade, glatta eller något stråfva grenar och smågrenar, med mycket små småax; blomfj. dels med, dels utan borst. Både denna och föreg. hafva vanl. kryppande bladskott vid basen. — A. stolonifera a L.Fl.Su. A. rubra Wg.Fl.Su.*

†† Blomman af blott det yttre fjället; det inre föga ell. icke utveckladt: *Trichodium Mich.*

3 *A. canina* L. rotbl. trådsmla, hoprullade; de öfre bl. platta med utdraget snärp; vippan yngre slak, n. lancettformig, före och efter blomningen *hopdragen*, med utdragna mångblommiga och stråfva grenar; blrna meränd. med krökt ryggborst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1443. Reich.f.128, 29. Andst.t.10.f.112. H.N.f.9, n:o 87.

Fukt. äng. och betesm. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. Havörsund.) *Vippan brun, i skugga stund. gul: var. pallida. Var. mycket till storleken [vanl. 1—2 fot hög] och med mer ell. mindre tät vippa, större ell. mindre småax. Blomfj. stund. utan borst.*

4 *A. borealis* Hn. rotbl. smala, n. platta; de öfre bl. bredare, platta med utdraget snärp; vippan upprät, pyramidformig, efter blomn. icke *hopdragen*, med meränd. stråfva grenar; blrna med krökt ryggborst. 2 7, 8. — *β minor*: 3—7 tum hög, med smal vippa af glattare grenar. Fig. Sv.B.668; *β* 545. Fl.D.2581. Andst.t.10.f.111. H.N.f.3, n:o 87; *β* f.11, n:o 86, 87.

\* *hyperborea* Läst. fotshög, med vippa som *β*, alla bl. platta, men smala. Fig. H.N. f.16, n:o 80.

Fjelltr. på fukt. st., *β* på torrare, klipp. etc. (Lpl.—Herjed. Ängml. — N. Ost-Finnm. — nor. delen af Christiansands st. — \* Torn. Lpm.) *Fotshög, med öppen gråbrun vippa, bredare och plattare rotblad än föreg. Var. lika som denna med större och mindre småax. β är var. angustata Bl., A. alpestris Läst., A. rupestris ed.4 och Fr. S.V.Sc. samt A. alpina Wg.Fl.L., en form, som härrör af lokalen och tydl. öfvergår i a. — A. rubra Wg. och Fr. Jemf. Bot.Not.1840.*

#### 508. CINNA Lin. Sötgräs.

1 *C. pendula* Trin. bladen breda med trinda slidor och utdraget snärp; vippan med utdragna ensidigt lutande grenar. 2 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.1. Andst.t.10.f.113. H.N. f.7, n:o 87 [fr. N.]; f.16, n:o 81 [fr. Sv.].

Skugg. st. r. (Helsl. Hassela sn, på Elfåsen nära Fagnäs. — N. Christiania, i Nordmarken: Ax. Bl. Österdalen, Bjørnstad i Åmødt vid Getån etc. Ringeboe vid Herri-sjö-elv, nedanför Stulsbroen; vid Finden i Torpen, annex till Land; Valdres vid bergs-elfven nära Brufladt och vid Frydenlund.) 2—5 fot högt gräs, med  $\frac{1}{2}$ —1 fot lång, blekgrön vippa, 5—7 lin. breda blad, vålluktande. — *Agrostis suaveolens* Blytt. Blyttia Fr. Manf. *Cinna arundinac. var. pendula* Bl. N.Fl. Mühlenbergia ed.9.

#### 509. MILIUM Lin. Hässlebrodd.

1 *M. effusum* L. strået och bladslidorna glatta; vippan stor utbredd, med slaka gles-blommiga glatta grenar; småaxen äggrunda. 2 7. Fig. Sv.B.162. Fl.D.1143. Andst.t.10.f.115.

Lundar. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 3—4 fot högt och bredbladigt, vålluktande gräs.

#### 510. STIPA Lin. Fjäderborstgräs.

1 *S. pennata* L. vippans bas innesluten i öfversta bladslidan; blom borsten ganska lång,

nedtill glatt och vriden, den öfre, mycket längre delen fjunhårig. 2½, 6. Fig. Fl.D. suppl.61. Andst.10,f.114. H.N.f.7, n:o 88.

Åkerren. torra äng. r. (VG. nära Stenåsen ½ mil fr. Dala kyrka: Stud. N. S. Linnarsson. Förr äfven i Åsaka sn, i Vartofta härad; helt nära Hvaltorps kyrka, ½ mil från byn Segerstad, men numera genom odlingar utrotad.) Bladen genom hoprullning tagel-lika, särdeles rotbladen; borsten 6—10 tum lång.

## 5 Flocken **Oryzæ**. Skärmfjäll 0.

### 511. COLEANTHUS Seidel. Slidgräs.

- \*1 *C. subtilis* Seid. öfversta bladslidan stor och vid; vippans grenar n. flocklika, i skiftevisa gyttringar. ☉ 8. Fig. Fl.D.suppl.2. Reich.D.Fl.f.467. Andst.10,f.117. H.N.f.10, n:o 87.

Öfversvåmm. stränd. r. (N. vid Nitsundelv nedanför gården Braanaas i Skydsmoe sn, 2 mil från Christiania.) Roten fintrådig, bärande flere, 1—2 tum höga strån, med så små blr ell. småax [½ lin.], att stark förstoring behöfves att urskilja delarne. Hinnfrukten slutt. nära dubbelt så lång som blomfjället utom borsten, som är af fjällets längd. — *Schmidtia Tratt.*

- 2 Afdeln. **CLISANTHÆ**. Blomman under blomningen tillsluten. Stift utdragna, med i blommans spets utskjutande märken.

- 6 Flocken **Panicæ**. Småax hoptryckta från ryggen, på ena sidan konvexa, på den andra n. platta; af en fullständig och en vanl. felsläende ell. ofullständ. blomma.

### 512. PANICUM Lin. Hönshirs.

- 1 *P. Crus galli* L. bladen breda och platta, vanl. i kanten vågiga, utan snärp; vippan med ensidiga skiftevisa axlika grenar; blrna med borst. ☉ 7, 8. Fig. Fl.D.1564. Reich.D.Fl.f.516. Andst.11,f.119. H.N.f.1, n:o 75.

Od. st. r. (Sk. Christianstad; Ystad; Skanör; Helsingborg m. fl. st. Hall. vid Hasslöv; Vindrarps och Karups, helst bland hampa: Theor.; Hvalinge prestg. Blek. Sturkö; Thorhamn m. fl. st.) Den 2kånade blommans fjäll benhvit. — *Echinochloa PB. Oplismenus Kunth.*

### 513. DIGITARIA Scop. Blodhirs.

- 1 *D. humifusa* Pers. bladen och slidorna glatta; vippan n. fingerlikt delad i 3—5 ensidiga ax; småaxen ågrunda finludna borstlösa. ☉ 7, 8. Fig. Fl.D.2641. Reich.f.506. Andst.11,f.120. H.N.f.1, n:o 76.

Åkrar, r. (Sk. här oö. der. Hall. allm. i söd. del.: Theor. Blek. Ronneby; Hoby; Carlshamn enl. Goss.; Norge gästg. m. fl. st.) Stråen nedligg. ell. uppstig.; vippans nedre grenar vanl. något fränskildja; småaxen bruna. — *D. filiformis Reich. Panicum glabrum Gaud. P. sanguinale L. Fauna ed.2.*

### 514. SETARIA Pal. B. Kafvelhirs.

- 1 *S. viridis* PB. bladen breda, stråfva, med i fina hår upplöst snärp; vippan axlik, n. cylindrisk; svepeborsten stråfva af uppåt rigtade taggar. ☉ 7, 8. Fig. Fl.D.852. Andst.11,f.123. H.N.f.15, n:o 92.

Od. st. back. r. (Sk.—Uppl. Norrtelge, Beateberg i parken. Vestml. Ferna. Verm. Thorsby i Fryksände; Råda sn enl. Leffl. VG. Mariestadstrakten flerst. Dalsl. Boh. Hall. Ö. Gottl. Roma etc. — N. söd. del. Laurvig och Hvalöarne upp till Gudbrandsdalen.) Axet grönt. — *Cynosurus panicæus L.Fl.Su. Panicum viride L.Sp.Pl.*

- 7 Flocken **Sesleriaceæ**. Småax hoptryckta från sidorna, flerblommiga, föga kortare än de stora skärmfjällen.

### 515. SESLERIA Scop. Elfäxing.

- 1 *S. cærulea* Ard. bladen platta, smala; axet äggformigt—n. aflångt; småaxen 2—3-blommiga; ytre blomfjället med 2—4, korta borst i spetsen. 2½, 5. Fig. Sv.B.210. Fl.D.1506. Andst.11,f.124. H.N.f.12, n:o 96.

Fukt. äng. (Sk. Smål. öst. delen.—Gestr. Jemt. Vestml. Ner. Vinteråsa sn. Hall.

söd. del.: Theor. *Öl. Gottl.* — *N. Tellemarken enl. Hornem. Osäker enl. Bl.) Axet stort som en mindre nöt, af blå, säll. blekgul färg. — Cynosurus L.*

- 8 Flocken **Alopecureæ**. Småax som i föreg. flock, af en enda blomma innesluten i skärmsfjällen.

516. **ALOPECURUS** Lin. Ängkaffe.

- 1 *A. pratensis* L. strået upprätt, från en rotstock; axet cylindriskt, trubbigt; skärmsfjällen hopväxta till midlen, spetsiga, ludna, längre än blomfj. 2 6, 7. —  $\beta$  *alpestris*: strået och bl. glatta; öfversta bladslidan 3 gånger längre än bladet. Fig. Sv.B.14. F.I.D.1985. Andst.11.f.127.  $\beta$  H.N.f.11, n:o 83.
- \* *nigricans* Horn. rotstocken vidt krypande och skjutande aflägsnade bladskott; axet slutl. svartnande; skärmsfj:s spetsar utböjda; blomfj:s borst innesluten. Fig. Reich. D.F.f.477. Andst.11.f.126. H.N.f.4, n:o 94.
- Fukt. äng. a., \* nära strand. r. (Sk.—Jemtl. och Ängml. — *N. söd. om fjellryggen. —  $\beta$  Lul. och Pit. Lpm.* — *N. Ost-Finmm. Lebesbyfjellen. — \* Blek.—Uppl. och Vestml. VB. Tornio, vid elfven. Öl. — N. till Ost-Finmm. Varanger.) Axet mjukludet, ofta fingerlångt, hos  $\beta$  n. hälften kortare.*
- 2 *A. geniculatus* L. strået vid basen uppstigande ell. nedliggande, från en trådig rot; axet cylindr., något trubbigt; skärmsf. blott vidb åsen hopväxta, trubbiga, på ryggen håriga, af blomfj:s längd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.333. F.I.D.861. Andst.11.f.128. H. N.f.10, n:o 89.
- \* *fulvus* Sm. bladslid. vidgade; ståndarknapp. brandgula; borsten innesluten. Fig. F.I.D. 1804. Reich.f.476. Andst.11.f.129. H.N.f.10, n:o 90.
- Fukt. st. allmän, \* vanl. i vatt. (Sk.—Lpl. — *N. till Ost-Finmm. — \* Sk.—Lpl. — N. till Trondhj.) Hufvudformen har meränd. gråbrunt ax, med hvitgula slutt. bruna ståndarknappar; A. fulvus har grönligt ax och strået mer nedliggande. Var. 2—4 tum hög, med litet ax och n. trådsmla blad.*
- 3 *A. agrestis* L. strået upprätt, från en trådig rot; axet cylindr., spetsadt åt ändarne; skärmsfj. hopväxta till midlen, spetsiga, n. glatta, kortare än blomfj.  $\odot$  6, 7. Fig. Sv.B.432. F.I.D.697. Andst.11.f.125. H.N.f.4, n:o 95.
- Sandåkr. r. (ÖG. Slaka sn m. fl. st., men endast tillfällig: Kindb. Stockh. Biskopsudden. Uppala. VG. Göteborg. Gottl. Visby; Roma och Klinte socknar m. fl. st. — *N. Christiania flerest.) Axet 2—3 tum långt, blåaktigt, med långa krökta borst.*

517. **PHLEUM** Lin. Ängkampe.

+ Skärmsfjällen tvärhuggna, med utdragen borst.

- 1 *P. pratense* L. öfversta bladslidan tilltryckt; axet cylindriskt; skärmsfjällen hår-ryggade, med borsten mer än hälften kortare än sjelfva fjället. 2 6, 7. —  $\beta$  *nodosum*: strået vid roten lökformigt uppsväldt. Fig. Sv.B.23. F.I.D.1984. Andst.11, f.130.  $\beta$  F.I.D.380.
- Äng. a. (Sk.—Lpl. — *N. till Finmm.) 1—3 fot högt gräs, med grönt, n. fingerlångt ax; men får på torra ställen längre strå, med 1—1½ tum långt ax, samt då oftare rotnöl: P. nodosum Willd. — Skärmsfjällets borst stundom nog lång.*
- 2 *P. alpinum* L. öfversta bladslid. uppbåstat vidgad; axet ovalt—af långt cylindriskt; skärmsfj:s borst n. så lång som sjelfva fjället. 2 7. Fig. Sv.B.414. F.I.D.213. Andst.12.f.131. H.N.f.14, n:o 94.
- Fjelltr. a. (Lpl.—Helsl. Dal. Vestml. på Hampängen vid Högby i Vestanforss. Vermh. — *N. Ost-Finmm.—Christianss. och Aggerhus st.) Vanl. fotshög. Axet kortare, men tjockare än hos föreg., varierande utan gräns mell. klotrundt och cylindriskt; till färgen mer violett. Borsten alltid något sträf.*
- ++ Skärmsfj. tvärt spetsade i en kort udd: *Chilochloa* PB.
- 3 *P. Böhmeri* Wib. axet cylindr., uppåt afsmalnande; skärmsfj. med något sträf rygg, lancettlika, tvärt öfvergående i en kort udd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.396. F.I.D.531. Andst.12.f.132. H.N.f.11, n:o 84.
- Torra back. (Sk. Smål. Kalm. län enl. Scheutz. — *Geste och Vestml. Hall. Öl. Gottl. — N. Aggerhus st.) Fotshög ell. mer, tufvad, grågrön. Axet 2—3 tum långt, stundom med axgroende blr. — P. phalaroides Köl. Phalaris phleoides L.*



- 4 *P. arenarium* L. axet *afångt*, uppåt *vidgad*; skärmfj. lancetlika *hårryggade*, spetsiga med ganska kort udd. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.915. Reich.f.481. Andst.12,f.133. H.N.f.2, n:o 72.

Sand. hafsstr. r. (Sk. mell. Kåseberga och Christianstad, såsom vid Rastlunda, Åhus etc. Boh. Öl. Gottl. Visby på Snäckgården; Öster- och Vestergarn m. fl. st. — N. uppgifven för Tellemarken, men osäker enl. Blytt.) Stråden 2—6 tum höga, oflast tufvade; axet omkring tumslångt. — *Phalaris* Huds.

- 9 Flocken **Phalaridese**. Småax hoptryckta från sidorna, af en fullständig och en eller 2 ofullständ. blommor [antingen könlösa eller enkönade].

518. BALDINGÉRA Fl. Well. Flen.

- 1 *B. arundinacea* Dum. vippan under blomn. öppen, med tätblomm. grenar; de könlösa blrna fjäll-lik, långhåriga. 2 7, 8. — *β colorata*: bladen hvitrandiga. Fig. Sv.B.107. Fl.D.259. Andst.12,f.135.

Stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. — *β Jemtl.* Ströms sn, på Öhns skog. — N. vid Örkedalselven nedom gården Fanremmen i Trondhjs st.) 2—3 alnar högt, bredbladt gräs med rödlätt vippa. — *Phalaris* L. *Arundo colorata* Sv.B. *Di-graphis* Trin. och Fr.

519. HIERÓCHLOA J. G. Gmel. Myskegräs.

- 1 *H. borealis* RS. bladen *platta*, dubb. *bredare* än strået; vippan *utbredd*, med glatta grenar; småaxen äggrunda; blomfjällen *hårkantade*, med *ingen*, ell. *mycket kort* borst i spetsen. 2 5—7. — *β microstachya*: strået omgivet af långbladiga upprätta rotskott; småaxen n. hälften mindre. — *γ firma*: bladslid. sträva; blrna med kort borst tätt under spetsen. Fig. Sv.B.168. Fl.D.963. Andst.12,f.137. H.N.f.8, n:o 92.

\* *fragrans* RS. småaxen betydligt större, mörkbruna, med skärmfj. mycket längre än blrna.

Fukt. äng., \* i fjelltr. (Sk. Smål.—Lpl. — N. till Ost-Finm. — *β Sk.* Lund på Kungsmarken samt vid Fogelsång. VG. Skara och Lidköp. — *γ Gefle*, på Rönne-maren. — \* *Jemtl.* Åreskutan nedom Blå-sten. Stockh. vid Mofjärd på Svartsjö-landet. — N. Gudbrandsdalen, Dovre etc.) *Välluktande gräs med brungula glän-sande, 2 lin. långa småax, krypande rotstock.* — *H. odorata* Wg. *Holcus* od. L.

- 2 *H. alpina* RS. rotskottsbladen *trådlikt hoprullade*, *icke bredare* än strået; vippan *hopdragen* med glatta grenar; småaxen yngre aflånga, de båda nedra blrna *hårkantade* och med *utskjutande knäböjd* ryggborst. 2 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.t.2. Sv.B. 438. Fl.D.1508. Andst.12,f.139. H.N.f.3, n:o 90.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. vid Tornio träsk; Karesuando. — N. Finm. Alten, Goske-vare; Lyngen på Tsatsa.) *Rotstocken kort; stråen vanl. tufvade; slid. på strået med blott ämmen till blad.* — *Aira Liljebl.* *Holcus* Sv.B.

520. ANTHOXANTHUM Lin. Vårbrodd.

- 1 *A. odoratum* L. bladen *platta*; vippan smal axlik ell. lancetformig; de könlösa sido-blrns fjäll rundadt trubbiga, med lång ryggborst. 2 5, 6. Fig. Sv.B.11. Fl.D.666. Andst.12,f.136.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Tufvadt, välluktande gräs med skul. gul-glänsande vippa, som stund. är större och ojemnt ell. afbrutet gyttvad.*

- 10 Flocken **Nardese**. Småaxen oskaftade, i ax, utan skärmfjäll.

521. NARDUS Lin. Stag.

- 1 *N. stricta* L. bladen trådlika; axet borstsmalt, glatt, ensidigt. 2 7. Fig. Sv.B.174. Fl.D.1022. Andst.12,f.141.

Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Styft och segt gräs med kort rotstock och hårdt tufvade bladskott kring stråens bas.*

# III. HETERONEMELÆ.

## 17 KLASSEN

### FILICES *Lin.*

99 Fam. **POLYPODIACEÆ R. Br.** Stambladen i knoppen inrullade; slutl. bärande sporgömmena gytttrade på baksidan, mer sällan i kanten, omgifna af en elastisk ring [hos *Osmunda* endast antydd af en knöl på baksidan].

#### 522. POLYPODIUM *Lin.* Stensöta.

1 *P. vulgare L.* stambladet *afångt, glatt, engång pardeladt*; flikarne *skiftevisa, af långt jemnbreda* trubbiga, mot spetsen sågnaggade, de öfre mindre; fruktplättarne å ömse sidor om bladflikarnes ryggner. 2 6, 7 \*). Fig. Sv.B.37. Fl.D.1060.

Berg och sten, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 6—8 tum hög; rotstocken långt kryppande, tjock.

2 *P. Phegopteris L.* stambladet n. *triangulärt, hårigt, en gång parbladigt*, med n. motsatta oskaftade parblad, de 2 *nedersta nedböjda*, de öfre sammanflytande, alla djupt delade i n. *helbräddade* motsatta flikar; fruktpl. nära flikarnes kant. 2 8, 9. Fig. Fl.D.1241.

Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnsm.) Omkring fotshög.

3 *P. Dryopteris L.* stambl. *triangulärt*, vanl. *glatt, dubbelt parbladigt*; parbladen *motsatta*, de 2 nedersta skaftade, med pardelade småblad \*\*); flik. *naggade* och trubbiga; fruktpl. som hos föreg. 2 7, 8. Fig. Fl.D.1943.

\* *Robertianum Hoffm.* småbladen under glandelhåriga; plättarne slutl. sammanflytande. Fig. Fl.D.suppl.41. H.N.f.14, n:o 96 [var.].

Skog. mur. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. — \* ÖG. Motala flerst., och nära Skenninge. Dal. Osmundsberget. Öl. Gottl. — N. Christiania och Porsgrund till Nordl.: Norm.) *Fotshög, mjuk ormbunke. \* blir, äldre, mera styf och hopdragen, med plättar, som slutl. betäcka bladens hela rygg sida: P. calcareum Sm.*

4 *P. alpestre Hoppe:* stambladet *bredt lancettlikt, glatt, 2—3dubbelt parbladigt*; parbladen *skiftevisa*; småbladens flikar aflånga såglandade; fr.plättar runda åtskiljda. 2 8. Fig. Schk.Cr.Gew.80. H.N.f.14, n:r 95.

Fjellv. r. (Lpl.—Herjed. — N. Ost-Finnm. Lebesbyfjellen.—Hecke- och Byglefjell.) *Lik Asplenium Fil. sem.; alshög och quartersbred, men med runda svepelsa plättar och likformiga bladflikar. — P. rheticum L. och Fr. S.V.Sc.*

\*) Hos Kryptogamerna antyder månadsnummern den tid, då fröredningen är mest utvecklad, ell. då sporgömmena äro färdiga att släppa groddkornen, emedan de då böra examineras.

\*\*) Då stambladet är sammansatt, delas det först i parblad, parbladen i småblad, och dessa i flikar.

## 523. ASPIDIUM Sw. Taggbråken.

- 1 *A. Lonchitis* Sw. stambladets skaft fjälligt, *glatt*; stambladet n. *jernbredt, en gång* parbladigt; *parbladen hela, månliskt böjda taggsågade, glatta*. 2 7, 8. Fig. Fl.D. 497. H.N.f.13, n:o 95.

Bergsrött. r. (Torn. Lpm. Tornioträsk. Lul. Lpm. vid Sähkok etc. Um. Lpm. i de högsta fjellen. Jeml. Portfjellet; flerst. i Frostviken; Snasabögen; Åreskutan. Herjed. Dal. vid Porfyverket. Vestml. Sala mellan Kolarehagen och Stumpers-torp. Dalsl. Ullgrund; Hafsåsberget. Södra Hall. — N. Finnm.—Christiansand och Christiania.) *Stambladen tufvade, 1—1½ fot höga, 2 tum breda. — Polystichum Roth.*

- 2 *A. angulare* Kit. stambladets skaft fjälligt och *hårigt*; stambl. *lancettlikt, dubbelt* parbladigt; *parbladens småblad månliskt böjda, grundt och taggigt stikade, håriga*. 2 8. Fig. Fl.D.2559. H.N.f.13, n:o 96.

\* *aculeatum* Sw. mindre; stambl. blågrönt, mindre hårigt, men styfvare.

Skog. r. (Sk. Skäråli; Onsjo härad. — N. Christiania; Holmestrand; Tellemarken; Christiansand; Bergen upp till Bedstad i Trondhj. st. — \* Götll. Thorsborgens.) *Ålnshög, lått fjällig af bruna glänsande fjäll. — Polyst. Presl.*

## 524. POLYSTICHUM Roth. Ormkage.

† Stambladet en gång parbladigt.

\* Flikarne helbräddade ell. glest och omärkligt naggade.

- 1 *P. Thelypteris* Roth: stambladskafet n. af *bladets längd ell. längre*; parbladen utdraget lancettlika pardelade, *icke kådprickade*; flikarne n. *helbräddade*, kortspetsiga, de fruktbärandes kanter *tillbakavikna*; fruktplättarne nära kanten, sammanflytande. 2 7—9. Fig. Fl.D.760.

Stränd. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Verm. Boh. Hogdal sn, Sundby. Öl. Götll. Klinte. — N. till Nummedalen i Trondhj. st.; mest allm. i Aggerhus st. enl. Bl.) *Mycket bräcklig; af ljusgrön färg. Rotstocken lång, krypande och grenig. — Aspidium Sw. Lastrea Presl.*

- 2 *P. Oreopteris* DC. stambladskafet *flere gånger kortare* än bladet; parbladen utdraget lancettlika pardelade, *under fint kådprickade*; flikarne n. *helbräddade*, trubbiga, de fruktbärandes kanter *platta*; fruktplättar som hos föreg., knappt sammanflytande. 2 7, 8. Fig. Fl.D.1121. H.N.f.16, n:o 82.

Bergsrött. r. (Sk. Skäråli; Klöfvahallar; Hallandsås, vid Svartebäck. Hall. Kitterhall i Voxtorp; H. N.; Vallen: Theor. — N. från Christiansand längs kusten upp till Helgeland.) *Ålnshög och deröfver. Rotstocken kort, grof, med gytttrade stamblad. — Aspid. Sw. Lastrea Presl.*

\*\* Flikarne djupt naggade ell. sågade.

- 3 *P. Filix mas* Roth: stambladskafet *som hos föreg.*; parbladen lancettlika långspetsade, djupt pardelade, med aflånga, rundadt trubbiga, *trubbnaggade*, stundom inskurna flikar; fruktplättarne *talrika* runda, närmade till flikarnes medelnerv. 2 7, 8. Fig. Sv.B.51. Fl.D.2740; 2741, var. Somf.Crypt. exs.103.

Skog. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till Finnm.) *Stambl. 2—3 fot höga, vanl. talrika från rotstockens spets. Var. med halfvägs till medelnerven inskurna, och med n. rundtomkring sågade flikar. — Aspid. Sw. Lastrea Presl.*

- 4 *P. cristatum* Roth: stambladskafet vanl. *långt*, ofta n. af bladets längd; parbladen *äggrunda*, pardelade; flikarne merändels hela äggrunda, rundadt trubbiga, *hvasst naggågade*, med få (2—8) fruktplättar. 2 7—9. Fig. Sv.B.390. Fl.D.1591. H. N.f.9, n:o 98.

Mossar och tufviga skogsäng. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Hall. Götll. — N. söd. del. af Aggerhus st.) *Här fastare byggnad än P. spinulosum, från hvars enklare former den knappt är tillräckligt skild, och hvarmed den af flere förf. förenas. — Polypod. Callipteris Ehrh. Aspid. Sw. Lastrea Presl.*

†† Stambladet 2—3 dubb. parbladigt.

- 5 *P. spinulosum* DC. stambl. 2—3 dubbelt parbladigt; parbladens småblad parklufna eller pardelade med aflånga *taggsågade* flikar. 2 7, 8. — *β dilatatum*: fjällen på

stambladets skaft talrika, längs midten mörkbruna; stambl. bredt äggrundt, mörkgrönt, glandelprickigt, genom de n. till basen delade likarne 3dubbelt parbladigt. Fig. Fl.D.707,  $\beta$  1346 enl. Lge. H.N.f.13, n:o 97,  $\beta$  f.16, n:o 83.

Skogsmark, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. vid Alten- och Tanaelv. —  $\beta$  Sk.—VG. och Ner. Stockh. Jemtl. Mest i de vest. prov. — N. Finn.: Th. Fr.) Var. i hög grad.  $\beta$ , ell. *Aspid. dilatatum* Sw., är på mycket skuggiga ställen vid bergsrötter ganska utmärkt, men medelformer till den vanliga saknas icke. — *Aspid. Sw. Lastrea Presl.*

6 *P. rigidum* DC. stambl. dubb. parbladigt, under glandelprickigt; parbladens småblad n. lancetlika, parflikade med i spetsen hvasstandade flikar. 2 7, 8. Fig. Sturm 2 Afd. 11 häft. H.N.f.16, n:o 84.

Bergstr. r. (Stockh. Vermdön, i en skogsbacke nära kyrkan. Jemtl. Åreskutan? — N. enl. ex. i Ahnfelts herb.: Kindb.; Christianss. st., Sogendal enl. ex. i ett äldre herb.: Bl.) Stambl. omkr. 1½ fot högt, smalt lancetlikt, med skiftevisa parblad; småbl. lancetlikt aflånga trubbiga; flikarne ej nående medelnerven, spetsigt, men ej taggigt tandade som hos föreg. enl. utländska ex. — Ett exemplar från N. Kirkö, Vahlöarne instämmer noga med Alex. Brauns ex. af dess  $\beta$  remotum, som dock allt för mycket närmar sig föreg. art. — *Lastrea Presl.*

### 525. CYSTOPTERIS Bernh. Stenbräken.

1 *C. fragilis* Bernh. stambladskafet vanl. icke längre än bladet; detta lancetlikt, en gång—dubb. parbladigt; parbladen parklufna ell. pardelade, med tandade, flikade ell. a nyo delade småblad och trubbtandade flikar. 2 7, 8. Fig. Fl.D.401. —  $\beta$  *dentata*: parbl. en gång parklufna ell. pardelade, med rundadt trubbiga flikar.

\* *alpina* Desv. parbl. dubbelt pardelade, med i spetsen 2—3tandade flikar.

Berg, murar etc. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finn. — \* *Herjed.* på Ljungdalsberget.) 3—10 tum hög, spåd och bräcklig; till fördelningen högst omvexlande, från en gång till n. 3dubbelt parbladigt. \* den mest delade formen synes genom melanliggande varr. öfvergå i den vanliga och är, ehuru finare än denna, mycket gröfre än den utländska. — *Polypod L. Aspid. Sw. Cyathea Roth.* \* *C. regia v. alpina* Koch och Fr. S.V.Sc.

2 *C. montana* Bernh. stambladskafet vanl. längre, ofta dubb. längre än bladet; detta triangulärt, 3dubbelt parbladigt; småbladen [3:dje ordningens] djupt inskurna i aflånga tandade flikar. 2 7, 8. Fig. Sv.B.666. Fl.D.2250. H.N.f.3, n:o 96. Somf. Crypt.exs.4.

Bergsrött. r. (Torn. Lpm. Kurravaara, samt på Waiwanen- och Nulja-laki. Lul. Lpm. Jälle; Särjusjauere; Qvikkjokk. Åsele Lpm. Jemtl. allm. i Ströms och Frostvikens snr; Åreskutan; Hofverberget och vid Östberget på Frösön. *Herjed.* Funnedsdalsberget och stora Midtåkläppen etc. Ångml. kring Täsjön. — N. Ost-Finn.—Christiania. Krokkleven etc.) Stambl. 4—6 tum långt och n. lika bredt, med ofta fotshögt skaft. — *Aspid Sw. Polypodium Sv.B.*

### 526. WOODSIA R. Br. Hällebräken.

1 *W. ilvensis* Br. stambladskafet 2—3 gånger kortare än bladet; detta aflångt—jemnbredt, med tvär bas, parbladigt; parbl. likformiga, alla pardelade ell. parklufna, med flikiga ell. tandade, på baksidan håriga och fjälliga småbl. 2 7. Fig. Fl.D. 391 och 2186. H.N.f.11, n:o 95. Somf.Cr.exs.102.

\* *hyperborea* Br. parbladen bredare, blott parklufna, med färre, n. helbräddade, på baksidan håriga, icke fjälliga flikar. Fig. V.A.H.1793,t.8. H.N.f.12, n:o 97.

Bergsprick., \* i fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finn. — \* *Lpl.—Herjed. Dal.* Osmundsberget enl. Frist. — N. Finn. mångenst.; samt Nordl. Gildeskaal: Norm.; Langsvand enl. Frist. Dovre. Christiania, Hovedöen: Bl.) Bladets baksida hos hufvudformen bär talrika smala fjäll jemte håren. Ex., som utg. samlat vid Meehuus nära Trondhj., sakna alla fjäll, likt *hyperbor.*, men hafva parbl. smala och djupt pardelade, likt *ilv.*, och synas sål. sammanbinda bägge formerna. — *Acrostichum L. Polypodium Sw.*

2 *W. glabella* Br. stambladskafet många gånger kortare än bladet; detta jemnbredt lancetlikt, afsmalnande vid basen, parbladigt; de nedre parbl. n. njurlika, 3-

flikiga, de öfre triangulärt äggrunda, parklufna, alla jemte skafket glatta [utan hår och fjäll]. 24 7. Fig. Hook.Flor.am.t.237 enl. Frist.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurravaara och vid Suttajoki. Lul. Lpm. Wiribaure; Jälle; Nammats. Pil. Lpm. Kalkisbought m. fl. st. Allt enl. Frist. — N. Finnm. Porsanger, Alten, Rostasfeld etc.: Norm.; Tsatsa enl. ex. af Læst. Nordl. Langsvand och Solvaagtind enl. Frist.) Fullkomligt glatt, utom svepehåren. De ex., utg. sett, dro 1—3 tum höga, omkr. 3 lin. breda. Hos oss i sednare tider först igenkänd och utredd af R. F. Fristedt (se Bot.Not.1865). — *Polypodium hyperbor. a* Wg.Fl. Lapp. W. ilv. \* *lapponica* (Angstr.) ed.9.

### 527. ASPLENIUM Lin. Bergsspring.

† Fruktplätt. aflånga, krökta; bladen mycket sammansatta, med nedtill fjälligt skaft: *Athyrium* Roth.

- \*1 *A. crenatum* Fr. stambladskafket n. af bladets längd ell. längre; stambladet 3angulärt, 3dubbelt parbladigt; alla parbladen skiftevisa; slutflikarne bredt aflånga, rundadt trubbiga ell. n. tvärhuggna, trubbnaggade. 24 8. Fig. Fl.D.suppl.40. H.N.f.8, n:o 97.

Fjelltr. r. (N. hår och der i Sells Annex i Gudbrandsd. t. ex. mellan Kyrkan och Kringelen, vid vägen; Ringeboe, vid Lougens strand midtfor Elstad; vid Storstenuren ½ mil söd. om Vig.) Bladet omkr. 10 tum bredt och långt utom skafket; flikarne något lika dem hos följ., fruktbarande bladens djupare, något inskuret naggade. — *A. sibiricum* Turcz. *Aspidium* Somf.

- 2 *A. filix femina* Bernh. stambladskafket flere gånger kortare än bladet; detta lancettlikt, dubb. parbladigt; de nedersta parbladen motsatta; småbladen djupt parklufna, med sågade ell. tandade flikar, de nedersta olikformiga, den främre större. 24 7, 8. —  $\beta$  *complicatum*; parbladen S-formigt krökta, med nedböjda, mindre djupt flikade småblad. —  $\gamma$  *molle*: mycket mjuk; parbladen endast pardelade, i sammanflytande småblad. Fig. Fl.D.2436.

Skogsmark, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\gamma$  Sk. vid Bosarp. Ängml. Nora sn, Grönsvik.) Omkring alshög;  $\beta$  hälften mindre. — *Polypod. L. Aspid. Sw. \gamma* *Polypod. molle* Schreb. enl. Fr.

†† Fruktplättarne aflånga, raka; stambladskafket icke fjälligt.

\* Parbladen bredast vid basen ell. midten, med tydlig medelnerv.

a — Stambladet dubb. parbladigt.

- 3 *A. adiantum nigrum* L. stambladskafket af bladets längd ell. längre; stambl. utdraget äggrundt; parbladen skiftevisa pardelade, med aflånga, inskurna eller hvass-sågade flikar; fruktplättarne yngre jernbreda, slutl. sammanflytande. 24 7—9. Fig. Fl.D. 250. H.N.f.10, n:o 98.

Skugg. st. r. (Sk. Kullaberg, på klippan Bärakull m. fl. st. särdeles frodig i bokskogen; Hallandsås, strax norr om Rysjöholm på Trollehallar; Skäråli och Gladsaxhallar enl. F. Aresch. Fordom funnen mellan Dybeck och Everslöf. — N. på Findöe och Rennisöe i Stavangerfjorden; flerstädes i Bergens st., såsom Bogöen, på Goustalien; Leganger; Svanöe. Trondhj. st. Valdershoug.) Hela ormbunken från ½ till 1 fot hög, med äggrundt lancettlikt omkrets, glatt bladskaf.

b — Stambladet en gång parbladigt [parbladen odelade].

- \*4 *A. marinum* L. parbladen kort skafade, nedlöpande på det derigenom vingkantade gemensamma skafket [rachis], snedt rundadt ell. rutlikt äggrunda, groft naggade, de öfre sammanflytande. 24 7. Fig. E.B.392.

Strandklipp. r. (N. Møsterhavn på Møsteröen i söd. delen af Bergens st. 1864: Cand. F. Hoch.) Stambladet lancettlikt, på Norska ex. knappt ½ fot högt, tumsbreddt, med ½ tum långa och lika breda parbl. [Eng. ex. vanl. mer än dubb. större, med mer långsträckta parbl.] Skafket nedom och uti bladet glänsande mörkbrunt, med smala ljusgröna vingkanter af de nedlöp. parbl., mellan de öfversta parbl. grönt.

- 5 *A. trichomanes* L. parbladen oskafade, icke nedlöp., rundadt äggrunda, grundt naggade. 24 7. Fig. Sv.B.131. Fl.D.119. Somf.Cr.exs.6.

Bergssprick. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N. till Salten och Bejeren: Norm.) Hela bladskaflet till bladspetsen svartbrunt; bladet jemnbredt,  $\frac{1}{2}$  fot högt, knäppt  $\frac{1}{2}$  tum bredt.

- 6 A. *viride* Huds. parbladen ganska kort skaftade, icke nedlöp., åggrunda, inskuret naggade. 2 7, 8. Fig. Sv.B.462 och 774. Fl.D.1289. H.N.f.3, n:o 97. Somf. Cr.exs.5.

Bergssprick. r. (Lpl.—Herjed. Midtåkläppen; Ljungdalsberget etc. Ångml. Ytter-Lännäs sn, Borgen. Medelp. Randklöfven. Dal. Norrbärke sn, vid torpet Jätturvallen. Verm. Elgå socken, Gräns-sjötorp. Smål. Taberg: J. E. Zett.; Djupskuran i Ökna sn enl. Scheutz. — N. Finnm.—Christiania; Skien och Porsgrund.) Bladskaflet grönt, endast nedtill brunt; eljest mycket lik föregående.

\*\* Parbladen och småbl. bredast mot spetsen, omv. äggr.—vigglika ell. n. jemnbreda, utan märkbar medelnerv.

- 7 A. *Ruta muraria* L. stambladet n. triangulärt och dubb. parbladigt, med de nedre parbl. delade i flere, omv. åggrunda, hela ellerflikiga, naggade småblad. 2 6, 7. —  $\beta$  *tripinnatum*: stambl. bredt triangulärt, 3dubb. parbladigt; slutflik. omv. äggr., trubbigt 2—3stand. Fig. Sv.B.306. Fl.D.190. H.N.f.14, n:o 97.

Bergssprick. murar, r. (Sk. t. ex. Lunds domkyrka; Landskrona enl. F. Ar.—Södm. Utön; Nämdö; Vårdinge sn, m. fl. st. Stockh. i Danviksbergen. Gefle på Gråberget. Herjed. på Ulfberget. Dal. Vestml. Norberg vid Klacken. Verm. Boh. Christinedal. Öl. Gottl. — N. till Finnm. —  $\beta$  Gottl. Thorsborgens norra sida; Visby kalkugn; samt Rosl. Singö enl. G. v. Ced.) Småbladen bredare i jämförelse med längden och mer naggade än hos följ. 2 arter.

- 8 A. *Breynii* Retz. stambl. smalt lancettlikt, en gång parbladigt; småbladen skiftevisa, lancettlikt vigglika, oregelbundet inskurna; de nedersta något sammansatta. 2 6, 7. Fig. Sv.B.534,f.2. H.N.f.9, n:o 99.

Bergssprick. r. (Sk.—Helsl. Hudiksvall, Getberget. Ångml. Skuluberget; Säbrå sn, Grofellsberget; Arn. Vestml. Björnön; Köping, Gallberget etc. Ner. Lillkyrka sn; Tarstaborg i Sköllersta. Vg. Falbergs by. Dalsl. Boh. Hall. Välas i Vallda; Leffl. — N. Dröbak; Christiania; Laurvig—Trondhj.; Levanger, på Borgsen.) 3—4 tum hög. — A. *alternifolium* Wulf. A. *germanicum* Weis.

- 9 A. *septentrionale* Hoffm. stambl. i toppen flikadt i 2—3, n. jemnbreda ell. smalt vigglika, något inskurna, spetsade småblad. 2 6, 7. Fig. Sv.B.534,f.1. Fl.D.60.

Bergssprick. (Sk.—Ångml. och Jemtl. upp till Frostviken. — N.) *Quartershög*. — *Acrostichum* L.

## 528. SCOLOPENDRIUM Smith. Mjeltbräken.

- 1 S. *Phyllitis* Roth: stambladet odeladt, lancettlikt, med hjertlik bas; medelnerven fjällig. 2 7. Fig. Sv.B.143. H.N.f.10, n:o 99.

Bergsklyft. r. (Gottl. Lilla Carlsöns nordöstra del. Af gammalt äfven uppgifven för Sk. Ofvedskloster.) *Asplen. Scolopendrium* L. *Scolopendrium vulgare* Sm. *Sc. officinarum* Sw. *Sc. Lingua* Sv.B.

## 529. PTERIS Lin. Bräken.

- 1 P. *aquilina* L. stambladet triangelformigt, 3dubbelt parbladigt; slutflikarne aflånga trubbiga, de yttersta sammanflytande till en odelad uddflik. 2 8, 9. Fig. Sv.B.90. Fl.D.2303. H.N.f.8, n:o 98 [en hårig var.].

Skogar, vägar etc. a. (Sk.—Åsele Lpm. och Ångml. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) Stor ormbunke, med långt skaft. Stambl. stundom hårigt, särdeles på undre sidan: v. *pubescens* P. C. Afz. Stundom bildar en svamp [Dorhidea *Pteridis* Fr.] svarta linier på bladflikarnes undre sida, alldeles liknande smala fruktplättar.

## 530. STRUTHIOPTERIS Willd. Foderbräken.

- 1 S. *germanica* Willd. de ofruktsamma stambladen lancettlika, parbladiga, med par-delade parblad, helbräddade likformiga flikar; de frukt bärande enklare och smalare, n. jemnbreda. 2 8, 9. Fig. Fl.D.169. Fl.N.1,t.1.

Bäckdalar. (Sk. Smål.—Lul. Lpm. Torn. Lpm. Tornioträsk, vid Lalmolakti. Boh. — N. till Finnm.) 2—3 fot hög. De frukt bärande bladen äro mycket mindre, satta i midten af de struformigt samstående ofruktsamma stambladen. — *Osmunda Struth. L. Onoclea Sw.*

## 531. BLECHNUM Lin. Kambråken.

1 *B. Spicant Roth.*: stambladet utdraget lancettlikt, en gång pardeladt; flikarne skiftevisa, utdraget aflånga, n. trubbiga parallela; de frukt bärande bladens flikar smalare, spetsade. 2, 7, 8. Fig. Fl.D.99.

Bergsrött. r. (Sk. mångenstädes. Blek. Gredby; Augerum etc. Smål. mest i vest. del. ÖG. vid Gusum. Uppl. Elfkarleby sn, Ytterboda. Helsl. Norrbo, Bastvallen. Ängml. Bjerträ sn, Österstrinns skog; Arn. Jeml. Herjed. Ner. i Lerbäck sn. Verm. vid Carlstad. Dalsl. Ör sn. VG. Broholm i Sandhem sn; Göteborg. Boh. Hall. Öl. Rälla. Gottl. — N. till Ost-Finm.) Stambl. omkr. fotskåga, 1½ tum breda, de frukt bärande längre skafade och derigenom högre än de ofruktsamma, samt med glesare flikar. — *Osmunda L. Bl. boreale Sw.*

## 532. ALLOSORUS Bernh. Krusbråken.

1 *A. crispus Bernh.* stambladet äggrundt, 3dubbelt parbladigt; småbladen skiftevisa; slutflikarne aflånga—omv. äggrunda, inskurna; de frukt bärande bladens smalt lancettlika, helbräddade. 2, 7, 8. Fig. Fl.D.496. H.N.f.3, n:o 98. Somf.Cr.exs.104.

Fjellv. (Torn. Lpm. Ylistunturi; Kaisepakke. Lul. Lpm. Qvikkjokk; Nammats: And. Pit. Lpm. Örfjellet etc. Jeml. Åreskutan. Herjed. ned till Störsjö-fjellen. Dal. enl. Retz. Obs.f.1. — N. Ost-Finm. Varanger; samt Vest-Finm. på spridda st. Nordl. Ofoten och Bejeren: Norm. ned till Stavanger, Österdalen, Trysild- och Sölen-fjeld.) 3—9 tum hög. — *Osmunda L. Pteris Sm. Onoclea Sw. Cryptogramma Br.*

## 533. HYMENOPHYLLUM Smith. Hinnblad.

\*1 *H. Wilsoni Hook.* krypande; de uppstigande grenarne med skiftevisa, mest 2—3-delade, något ensidiga parblad, aflångt jemnbreda, uddsågade flikar eller småblad; blad bärande skafet smalvingadt; svepefjällen äggrunda, uppblåsta. 2, 5, 6. Fig. Fl.D. 954. H.N.f.11, n:o 96.

Fukt. st. på mossar, r. (N. Bergens st. Sognefæste, Tysnäs vid Kuppelvigghave; vid Sandvigselfven; Hardangerfjordens öar. Christansands st. Lysefjord vid Andrewsån.) Från en i mossan krypande tagellik rotstock uppstiga 2 tum höga, hinnaktiga, blad bärande grenar, än omärkligt, än temligen bredt vingade, sårdels upp emot bladen. Parbladen än raka, än tillbakaböjda; flikarne med en stark brun nerv, mycket liknande bladen af *Mnium undulatum*. Svepefjällen otydligt naggade. — *H. tunbridgense Fl.D.*

## 534. OSMUNDA Lin. Safsa.

1 *O. regalis L.* stambladet dubbelt parbladigt, med lancettlika glatta, vid basen snedt tvärhuggna småblad; de öfversta parbladen mycket smärre, frukt bärande och förenade till en vipplik samling. 2, 7. Fig. Sv.B.366. Fl.D.217. H.N.f.12, n:o 98.

Skugg. stränd. och holmar i åar, r. (Sk. flerst. i nor. delen. Blek. vid Nettraby, Ronneby och Lyckeby åar. Hall. Laholm; Tvååker. VG. Baggevarn, i Åtran. Smål. Femsjö, Viresta etc.; Barkeryd i Jönk. län; samt i de flesta åar inom Kalmar län. Gestr. mellan Åbyggeby och Oslättfors.) En skön, 1—2 alnar hög, n. busklik ormbunke.

- 100 Fam. **OPHIOGLOSSEÆ** R. Br. Stambladet i knoppen rakt. Fröredningen i enkelt ell. sammansatt ax af sporgömmen utan ring.

535. **BOTRYCHIUM** Sw. Låsgräs.

† Stammens [det gemens. skaftets] nedersta, mot rotstocken något vidgade del på alla sidor slutan omkring den deruti befintliga knopp, och n. trind; bladet \*) högst dubb. pardeladt: *Eubotrychium* Milde.

\* Bladet fästadt vid ell. ofvan stammens midt, n. oskaftadt.

- 1 B. *Lunaria* Sw. bladet vid stammens midt, vanl. hjertlikt aflångt, en gång pardeladt, med månl. halfrunda, helbrädd., tandade ell. inskurna småbl. 24 7, 8. Fig. Sv.B. 372.f.1. Fl.D.18, f. till venst.

\* *boreale* Milde \*\*): bladet hjertlikt äggrundt—triangulärt; småbl. hjertlikt äggrunda, parflikiga ell. inskurna, med vanl. mot spetsen bredareflikar. Fig. Fl.D.suppl.113. H.N.f.16, n:o 85.

Betesm. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. — \* *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Njuonjes vid Tarre-jokk; Sähkok enl. Ands. *Jeml.* Fogelberget i Frostviken. VB. Umeå sn flerst.; Vännäs sn: Dr Håk. *Ängml.* Tåsjöberget; Grisslands fiskläge; Hernösand. — N. Ost-Finnm. Renöe i Syd-Varanger. Dovre, Drivstuen och Kongsvold.) *Från ett par till 6 tum hög. — Osmunda L. \* innefattar B. Lun. β adianthisfol. ed.9, ett namn som enl. Milde redan förut är tilldeladt en annan form. — B. crassinervium Rupr., en föga känd form, med äggr. småbl. och grofva medelnerver, lär enl. Milde och Ängstr. äfven finnas hos oss. Ex. i Dr Håkansson's herb. godkännas dock icke numera af Milde, som hänför dem till boreale; dit äfven B. brevifol. Ängstr. enl. Dr Håk. ex. utan tvifvel hör.*

- 2 B. *matricariifolium* Al. Br. bladet ofvan stammens midt, äggrundt, dubb. pardeladt; småbl. äggrunda, trubbiga, med aflånga, tvärhuggna, n. helbräddadeflikar. 24 6, 7. Fig.

Betesm. r. (Sk. Hörje sn, v. om Maglebjør enl. G. v. Ced. *Smål.* Femsjö; Odensjö; Mjöhlut i Sandvik sn, och Hjelmärd i Blådinge enl. Scheutz; Kälmar, på Engö och vid Thorsbo i Mortorp enl. Ekstr. *ÖG.* Omberg enl. Kindb. *Rosl. Gestr.* Gefle, vid Stenbäcken. *Medelp.* Bykullen i Sättna. *Ängml.* Hernösand enl. ex af Ängstr. VB. Umeå sn, Koddis. *Dalsl. Öl.*) 3—6 tum hög. *Synes genom det från axel mer aflågnade, tjocka och fastare bladets smalare omkrets, samt småbladens och flikarnes trubbighet väl skiljd från följ. Af denna art lär B. tenellum Ängstr. vara spädare plantor. Var. någongång med de nedersta småbl. aflånga, jemle de öfre till rundflikade: var. rotundilobum Ängstr.*

- 3 B. *lanceolatum* Ängstr. bladet ofvan stammens midt, tält invid axel, dubb. pardeladt; småbl. lancettlika, spetsade, med jemnbreda, spetsade ell. snedt trubbad [icke tvärhuggna], vanl. sågadeflikar. 24 6, 7. Fig. Fl.D.18, f. till hög. H.N.f.16, n:o 86.

Betesm. r. (Torn. och Um. *Lpm.* samt VB.—Helsl. och Verml. VG. Kinna sn, Furu-bäck nedom Gillsberg. — N. Dovre; Slidre.) *Stor som föreg.; bladet på väl utvecklade ex. en god tum bredt och lika långt, af tunn byggnad med långa och smala småblad. — Ruprechts art af detta namn innefattar enl. Milde både närv. art och B. Lun. \* bor.*

\*\* Bladet fästadt långt ned, närmare stammens bas, utdraget skaftadt.

- 4 B. *simplex* Hitchc. bladet ensamt, rundadt ell. hjertlikt äggrundt, odeladt, ell. en

\*) För korthetens skull benämnas här den ofruktsamma blads kifvan blott bladet, och det för denna och den fruktbär. kifvan ell. axel gemensamma skaftet stammen.

\*\*) Mellan denna, i sina bäst utvecklade ex. onekligen ganska afvikande form och vanlig B. *Lunaria* har Utg. på Dovrefjeld och Dr C. P. Læst. vid Umeå (se Bot. Not. 1863, p. 11) funnit tydliga öfvergångar, och Milde sjelf har i bref till Utg. yttrat: »zu läugnen ist allerdings nicht, dass B. boreale in B. Lunaria übergeht». Den kan därför, ehuru af många ansedd för en utmärkt art, här icke upptagas som egen art, på sin höjd som underart. Sjelfva de för olika former begagnade namnen »evolutum», »intermedium», »affine» synas vittna mot växtens arträkt.



- gång parflikigt—pardeladt, med få [vanl. 3—5], sneda och olükformiga, rundadt trubbiga, hela ell. inskurna flikar. 24 6, 7? Fig.
- Betesm. r. (Sk. enl. ex. fordom funna vid Silfåkra. Verml. Nors sn. vid ett kärr nära Malma herrgård enl. Ångstr. Medelp. Söråker i Hässjö sn enl. ex. i Dr Håkansson herb.) 1—3 tum hög, mycket spåd och spenslig, med bladets spets icke nående upp till det enkla ell. kort pargreniga axels bas. Har varit ansedd för dels en ung form af följ., dels en var. af *B. Lun.* [var. *cordata* Fr.], men skall enl. Milde, Ångstr. med fl. vara en fullkomligt sjelfständigt art. Utg., som endast sett några få pressade ex. och sål. icke i detta fall kan hafva något eget omdöme, upptager den på de nämnde förf:s auktoritet, för att bättre vända uppmärksamheten på denna sällsynta form.
- 5 *B. rutaceum* Sw. blad ett ell. tvenne, triangulära, dubb. pardelade; småbladen bredt äggrunda, pardelade, med äggrunda, ofta tandade ell. inskurna flikar. 24 8, 9. Fig. Sv.B.372.f.2. Fl.D.18, f. upptill. H.N.f.3, n:o 99.
- Betesm. r. (Sk. Tossjö sn; Ystad. Smål.—Torn. Lpm. Karesuando. — N. till Salten.) 3—8 tum hög, med 1—2 tum breda blad. Det nedre, som anses vara kvar-sittande från föreg. året, är ofta halvvisnad, men stund. äfven lika friskt och grönt som årsbladet. — *B. matricarioides* W. *B. rutafolium* Al. Br. *B. ternatum* Sw. och Milde. *Osmunda* Lun. ö Lin. Fl.Su.

†† Stammens nedersta, knopphysande del längs ena sidan öppen, derig. djupt rännformig; bladet 3dubb. pardeladt: *Osmundopteris* Milde.

- 6 *B. virginianum* Sw. bladet fästadt vid ell. ofvan stammens midt, bredt triangulärt; slutflikarne trubbad, tandade. 24 7. Fig. Sv.B.665. Fl.D.suppl.112. H.N.f.10, n:o 100.
- Gräsbeväxta st. r. (Ångml. Tåsjöberget. Medelp. Hässjö sn, Söråker: Dr Håk.; Borgsjö sn, vid byn Ön. Jeml. Strånäset i Stugu sn. Dal. Osmundsberget. Gestr. Gefle skärg., på ön Rönmmaren.) Omkring fotshög, med 2—4 tum bredt och n. lika långt, kort skaftadt blad; de nedre småbl. af första ordn. tydligt skaftade, n. äggrunda, de af andra ordn. aflånga; sporgömmena smärre än hos alla de föreg. arterna.

### 536. OPHIOGLOSSUM Lin. Låketunga.

- 1 *O. vulgatum* L. bladet odeladt, äggrundt—aflångt. 24 7, 8. —  $\beta$  *microstichum*: mindre, bladet spetsigare. Fig. Sv.B.378. Fl.D.147.
- Ång. och betesm. r. (Sk.—Gefle. Helsl. Hudiksv., på Tjufskär och Saltvik. VB. Umeå skärg. på Kasskäret. Dal. Boda kapell. Ner. flerstäd. Dalsl. Frösökog och Hesselkog snr. Öl. Götll. Visby och Hallbros i Vesterhejde enl. Leffl. — N. Kongsberg, Drammen; Åresund vid Christianiafjorden. Toten etc. till Nordl. —  $\beta$  ÖG. Lärketorp i Mölby sn.) Bladet ensamt, midt på stammen; rotstocken upprätt, med talrika birötter. —  $\beta$  ansågs för egen art af Acharius och Swartz; en medelform är funnen på Götll. i Hall sn, och i VB. Umeå skärg. af Dr Håkansson.

- 101 Fam. **EQUISETACEÆ DC.** Växter utan blad, blott med slidor. Fruktsättning i toppax af kransvisa sköldlika fjäll, med sporgömmen på sin undersida, innehållande talrika groddkorn, som äro försedda med 2 spiralvridna springtrådar.

### 537. EQUISETUM Lin. Fräken.

† Den axbärande stjelen ogrerad, ell. med kransvisa grenar, icke öfverlevande vintern.

\* Axstjelen grenlös och snart förvisnande, eller med grenar utväxande vid och efter fruktsättningen. Vårväxter.

- 1 *E. arvense* L. axstjelen grenlös, snart förvisnande, med vida hvitaktiga slidor, djupt klufna i svartbruna lancetlika tänder; den ofruktsamma med mest enkla, 4- eller

- 3fårade kransgrenar. 2 4, 5. —  $\beta$  *alpestre*: mycket spåhare; de ofruktsamma stjelkarne nedliggande. Fig. Sv.B.474. Fl.D.2001.  $\beta$  H.N.f.8, n:o 99.
- Lerjord, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Axstjelken tidigare än den ofrukts., som ofta blir nedliggande och då får de nedre grenarne å nyo delade. Var. tillfälligt, på tidtals öfversvämmade ställen, med mycket lågväxt och spåd axstjolk, som i de nedersta lederna bär långa och fina kransgrenar: E. riparium Fr. [H.N.f.7, n:o 99].*
- 2 *E. pratense* Ehrh. axstjelken merändels utskjutande enkla, 3—4fårade, horisontala grenar; slidorna något vida och bleka, med hinnaktiga *ljusbruna smalspelsade* tänder; den ofrukts. stj. som hos föreg. 2 4, 5. Fig. Fl.D.1770. H.N.f.6, n:o 99.
- Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Är till alla delar spåhare än föreg.; vid första fruktsått. n. utan spår till kransgrenar, hvilka småningom utvecklas, dock äfven stundom saknas; någongång äro de redan vid fruktsått. fullt utbildade: var. serotina. — E. amphibolium Retz. E. umbrosum W.*
- 3 *E. silvaticum* L. axstjolkens kransgrenar ånyo delade i kransvisa 3—5fårade smågrenar; slidorna klufna i n. *åggunda trubbad* tänder. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1182. Somf.Crypt.exs. n:o 1. H.N.f.14, n:o 98 [var.].
- Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Grenarne vanligen båglikt nedböjda sammansatta, utväxande efter fruktsåttningen; blifva på mycket skuggiga st. jemte smågren. mycket fina och långa:  $\beta$  capillare ed.9.*
- \*\* Axstjelken kransgrenig [stund. enkel] med grenarne fullt utväxta vid fruktsåttningen. Sommarväxter.
- 4 *E. palustre* L. stjelen inuti *stjerpipig*, merändels grenig, 6—8fårad; grenarne enkla 4—5fårade, n. uppråta; slidorna n. *cyllindriska* [tilltryckta], med *dubb. större* längd än vid; deras tänder syl-likä svartbruna, med bred, *hvit hinnkant*. 2 6, 7. —  $\beta$  *polystachion*: alla kransgrenarne utdragna, n. jemnhöga och axbärande. —  $\gamma$  *tenellum*: stjelkarne tulfade enkla trådlika 4kantiga. Fig. Sv.B.402. Fl.D.1183. Somf.Cr.exs. n:o 2. H.N.f.13, n:o 98.
- Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *En del stjekar sakna ofta kransgrenar; andra förgrenas vid basen i axbärande sidostjelkar.*
- 5 *E. litorale* Kuhl. stj. som hos föreg., 10—15fårad; gren. som hos föreg., utstående; slid. vanl. *upptå vidgade*, mer långa än vida; deras tänder som hos föreg., med *smal* vit kant. 2 6, 7. Fig. H.N.f.13, n:o 99.
- Fukt. st. r. (Uppl. Valloxen i Östuna sn: Ängstr. enl. Doc. P. Olsson.) *Omkring fotshög, med utseende af E. arvensis ofruktsamma stånd, men lätt skiljd derifrån med stjolkens vida ihållighet [centralkavitet]. Anses af flere förf. vara hybrid af E. arv. och följ. art. Svenska ex. osedda af utg.*
- 6 *E. fluviatile* L. stjelen inuti *enpipig*, mångstrimmig eller refflad, enkel eller med mest 5kantiga utstående, enkla grenar; slid. *cyllindriska*, n. lika långa som vida; deras tänder syl-likä svarta, n. utan hinnkant. 2 6, 7. —  $\beta$  *limosum*: stj. enkel eller med några få korta kransgrenar. Fig. Fl.D.1184. E.B.929. H.N.f.11, n:o 97;  $\beta$  n:o 98.
- Vatt. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Stj. tjock, alnshög, med stort svart ax; hos husvudf., hvilken växer i djupare, ofta rinnande vatten, blifva grenarne vanligen talrika, 3—5 tum långa och smala; hos  $\beta$ , som växer i diken och dynga ställen, framskjuta alls inga, eller blott 1—6, kortare och tjockare grenar. — E. verticillatum Doll.  $\beta$  E. limosum L., E. Linnæum Doll.*
- †† Stjelen endast grenad nedtill, eller vid roten, utan kransgrenar, fortfarande öfver vintern.
- 7 *E. hiemale* L. stjelen inuti *enpipig*, mångreflad, skarp; slidorna *cyllindriska* med *snart affallande*, hinnaktiga tänder, härigenom *värhuggna* och naggade. 2 5, 6. Fig. Sv.B.330. Fl.D.1409. Somf.Cr.exs.101.
- Skog. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.: Norm.) *Stjelen hård, 1—2 fot hög, tjock som en skripenna, med hvita slidor, vid basen tecknade med en svart ring.*
- 8 *E. variegatum* Schleich. stj. inuti *stjerpipig*, 6—8fårad; slid. *upptå vidgade*, svarta,

med 6—8 *hvitkantade* tänder. i början försedda med en syl-lik. affallande spets. 24 7, 8. Fig. Sv.B.702. Fl.D.2490. H.N.f.4, n:o 100. Somf.Cr. n:o 3.

\* *scirpoides Michx.* stj. hälften smalare, trådläk, 6kantig, oftast nedliggande ell. upp-böjd; slid. vanl. med 3 tänder.

Kärräng. str., \* i skogskärr, r. (*Lpl.*—*Rosl.* Hargs bruk, vid ån. *Vestml.* Sala i Gröna gången. *Verm.* bergslag, Hyttsjöns stränder, och vid sjön Långban. *VG.* Mössberg: J. Hult. *Gottl.* — *N. Finnm.*—Dovre; Gudbrandsdalen. — \* *Lpl.*—*Gestr.* Kubbo. *Uppl.* Vitulfsberg enl. P. Olsson. *Dal.* Osmundsberget enl. Olss.; Morånget i Ohre enl. ex. af C. G. Clason. — *N.*) *Grenad* vid basen i talrika, 3—10 tum långa, ofta nedligg. stjekar; *hufvudarten stundom grof som E. palustre, ofta smalare, knappt skiljbar från underarten, hvilken icke har andra karakterer än de, af groflekens beroende, färre kanterna.*

102 Fam. *MARSILEACEÆ* R. Br. Växter med enkla trinda blad. Sporgömmen af 2:ne slag, finare och gröfre, i egna klotrunda fruktgömmen vid bladens bas.

538. *PILULARIA* Lin. Furgräs.

1 *P. globulifera* L. trådläk krypande och rotsläende, med borstlika uppräta blad. 24 6, 7. Fig. Sv.B.599. Fl.D.223. H.N.f.15, n:o 98.

Öfersvåmm. stränd. r. (*Sk.* särdeles i nor. och mell. del. *Blek.* Ronneby vid Skär-sjön; Lyckeby-å och Bastasjö; Gredby vid Nettraby å; Thorhamn m. fl. st. *Smål.* vest. del. t. ex. Femsjö; Pjetteryd; Ljuder; Braås i Dref sn; Grenna, mell. Bunn och Ör. *ÖG.* Motala: Kindb. *Södml.* Öst. Vingåker, vid sjöarne Viren och Gölen. *Verm.* Karlskoga, i Möckeln: Reuterm. *VG.* Göteborg, vid Delsjön etc. *Hall.* Vålås i Vallda: Leffl. *Gottl.* Fröjel; Martebo myr. — *N. Bergen;* Møllevand nära Christiansand.) *Fruktg. stora som pepparkorn, brunludna.*

103 Fam. *ISOËTEÆ* Rich. Växter med ett enda knippe af syl-rika blad. Sporgömmen inneslutna uti bladens bas, hysande sporer af tvenne slag, större [makrosporer] och mindre [mikrosporer].

539. *ISOËTES* Lin. Braxengräs.

1 *I. lacustris* L. (och *Dur.*) bladen styfva, *svartgröna* och ogenomskinliga; de större sporerne med låga, ås-rika, ofta sammanflyt. ojemnheter på ytan, *gulaktiga*. 24 7, 8. Fig. Sv.B.600 [i ans. till sporerernas storlek]. Fl.D.2742. H.N.f.11, n:o 99 [?, spor. för unga].

Sjöbott. alltid under vatten. (*Sk.*—*Stockh.* *Helsl.* Skog sn; Täfsjön i Undersvik. *Vestml.* Stjernfors. *Ner.* *VG.* Boh. *Hall.* Hasslöf. *Gottl.*? — *N. Bergens* st. Ost-Finnm. Sydvaranger: Norm.) *Bladen* 2—7 tum långa, vanl. *utböjda, hvilken ställning de, upplagna ur vattnet, i ans. till sin styfhet bibehålla; makrosporer märkbart större än hos följ.* — *I. atrovirens* Th. Fr. i *Bot.Not.* 1863.

2 *I. echinospora* *Dur.* bl. föga styfva, *ljusgröna*, något genomskinliga; de större sporerne med talrika, fina och spröda, *utstående* borst, *krithvita*. 24 7, 8. Fig. Fl. D.2743.

Sjöar som föreg. (*Sk.*—*VB.* Kalix och Torn. *Lpm.* Boh. Uddevalla, i Ris-ån. — *N. Vest-Finnm.* Skjervö; samt Ost-Finnm. Sydvaranger, Pasvigelv m. fl. st.: Norm.) *Bladen* variera i längd som föreg., men äro mer smalspetsade, och hop-falla gerna i flere raka knippor, när växten toges ur vattnet; äro stund. *gulaktiga*. Bäst skiljas dock de bägge arterna på makrosporerernas storlek och färg.

104 Fam. LYCOPODIACEÆ *Sw.* Växter med stielk, täckt af enkla platta blad. Spörgömmen i bladens ell. axfjällens vinkel, oftast uppbristande med en tvärremma.

540. LYCOPODIUM *Lin.* Lummer.

† Spörgömmen i bladvecken.

1 *L. Selago L.* stielken klynnedelad, med uppräta, n. jemnhöga grenar; bladen jemnt spridda, utstående åt alla sidor, lancettlika, vanl. helbräddade. 2½—10. Fig. Sv.B. 119. Fl.D.104.

Skogar, berg. (Sk.—Lpl. Öl. Thorslunda. — N. till Finnm.) *Har tätta, n. fingerjocka och styfva grenar. Var. i fjelltr. med uppräta, mer tilltryckta blad.*

†† Spörgömmen i egna ax.

\* Bladen spridda, något ensidigt böjda ell. i 5 rader.

2 *L. inundatum L.* stielken nedliggande, rotsläende, med de axbärande grenarne uppräta; bladen på de ofrukt. grenarne böjda åt en sida uppåt, smalt lancettlika helbräddade; axen ensamma, oskaftade. 2½—9. Fig. Sv.B.612,f.1. Fl.D.336. H. N.f.15, n:o 97.

Dyga kärräng. (Sk.—Helsl. Ångml. Ulånger, vid Lidsjön: Arn. Dal. Ore och Elfdalen. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Uddevalla. Hall. flerst. mell. Lagan och Nissan: Theor. — N. Aggerhus och Christiansands st.) 2—4 tum lång, med korta uppräta axgrenar i de rotsläende lederna; bladen n. jemnbreda.

3 *L. annotinum L.* stielken som hos föreg., med alla gren. uppräta ell. uppstig.; bladen spridda i omkring 5 rader, utstående, smalt lancettlika med udd, mot spetsen naggsågade; axen ensamma, oskaftade. 2½—8. — β *alpestre*: bladen n. tegelagda, utan märklig nerv. Fig. Sv.B.570. Fl.D.127.

Skog. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finm. — β Lpl.—Herjed. — N. Finnm.—Dovre.) Stielken vanl. flere fot lång, med ½—1 fot höga, enkla ell. gaffel-likte delade grenar.

4 *L. clavatum L.* stielken och gren. som hos föreg.; bladen på stj. något ensidigt böjda, alla hårspetsade, helbräddade ell. sågade; axen parvisa, stund. flere tillsammans, vanl. långt skaftade. 2½, 7, 8. — β *lagopus Læst.* gren. korta, med tät tegelagda blad; axen kort skaftade. Fig. Sv.B.59. Fl.D.126.

Skog. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. till Finnm. — β Torn. Lpm. Karesuando.) Stj. vanl. flere fot lång, med 3—4 t. höga grenar, som oftast bära flere små utstående sidogrenar; axskaftet hos α 2—3 tum, hos β knappt ½ tum långt.

\*\* Bladen, åtm. på de yngre grenarne, tydligt 4radiga.

5 *L. complanatum L.* stielken krypande; de uppstigande grenarne klynnedelade, platta; bladen på grenarnes platta sidor tilltryckta, små och otydliga, de i kanten större kölade; axen långt skaftade, merändels parvisa, ell. flere tillsammans. 2½ 8. Fig. Sv. B.95. Fl.D.2671.

\* *Chamaecyparissus Al. Br.* blågrön; gren. mer tätta och uppräta, n. jemnhöga; alla bl. tilltryckta. Fig. Fl.D.2672. H.N.f.13, n:o 100.

Skog. \* ljunghed. (Lpl. och VB.—Sk. nor. del. Öl. nor. del. Gottl. Mästerby sn. — N. Ost-Finm.—Christiania. — \* Sk. Hjelmalung i Hörja sn, Drakelia i Finja m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. Hjelmaryd i Blådinge sn; Ljunga och Ljungby; samt Stenhöga i Lidhult sn: Scheutz; Ingebo nära Vimmerby: Dr Lund. Hall. flerst. i Knäred sn: Theor.; Thorup sn. VG. vid Göteborg. Boh. Uddevalla. Verm. nära Carlstad. VB. vid Kengis.) Bladen växa tillsammans och bilda de platta grenarne. Var. med 1, 2 och 4 ax på det 2—3 tum långa skaftet. Har de större ell. kantbladen bredare, och grenarne n. dubb. bredare än hos \*, som är *L. sabinaefolium Rupr.*, mindre säkert Willd:s art af samma namn.

6 *L. alpinum L.* stielken krypande; de uppräta grenarne tydligt 4kantiga; alla bladen likformiga, okölade, spetsiga; axen oskaftade, merändels ensamma, trinda. 2½ 8. Fig. Fl.D.79.

Fjellv. (Lpl.—Dal. VB. Umeå sn, Klaberget. Ångml. Ramsele prestg. Medelp. Torp sn: Reuterm. — N. från Finnm. till nor. del. af Christianss. st.) Axen sällsynta, stundom parvisa.

541. *SELAGINELLA* Spring. Dverglummer.

1 *S. spinulosa* Al. Br. stjelken nedligg., nedtill delad i n. uppräta grenar; bladen spridda utstående, lancettlika spetsade, uddtandade; sporgömm. i oskaftade ensamma ax, med större, n. fluktandade skärmbblad. 24 7, 8. Fig. Sv.B.612,f.2. Fl.D.70. H.N. f.11, n:o 100.

Fukt. äng. (*Lpl.*—*Rosl.* ÖG. Kärna mosse enl. Kindb.; Gålstad i Slaka sn. Ner. vid Guntjuga i Leke bergslag. *Verm.* Boh. Skafthö och Koster. — N. Finnm. ned till Stavanger.) 2—6 tum hög, mjuk, med ofta gulröda ax. — *Lycopod. selaginoides* L.

---

# BIHANG,

upptagande sådana växter, som dels äro tvifvelaktiga, dels stundom funnits förvildade, inkommit utifrån med andra frön, ballast o. s. v., men icke hittills spriddt eller naturaliserat sig.

## I FAM. SYNANTHEREÆ.

- 1 *COTULA* L. Blomholken halft klotrund, med rörformiga blr; honblrna i kanten, kronlösa; de 2könade blrna 4flikiga; skalfr. vingkantade, nakna. — *C. coronopifolia* L. glatt, med smala, parflikigt tandade ell. hela bl., gula blr. Införd med ballast till Kasens Nabb nära Uddevalla; men nu försvunnen. Fig. Fl.D.341. H.N.f.14, n:o 6.
- SENECIO saracenicus* L. bladen bredt lancettlika [ $1\frac{1}{2}$ —2 tum breda], hvass-sågade; blomk. i qvastlik samling. Stjelken mot 2 alnar hög med gula blr. Finnes stundom förvildad i och vid trädgårdar. Fig. Fl.D.2059. Reich.Corymb.t.970.
- 3 *S. crassifolius* W. bladen köttiga, jemnbreda, bugtiga ell. fliktandade; blomk. med tillbakarullade strålblr. Fanns 1848 på Gefle Brobänk. Fig. Reich.t.962,f.3.
- 4 *ERIGERON canadensis* L. bladen smalt lancettlika, hårbräddade, de nedre sågade; blomk. mycket små, men talrika, med hvitgula blr. Fanns förr vid Ystad; vid flere sjöstäder (t. ex. Kalmar, Stockh., Gefle m. fl.) införd med ballast. Fig. Fl.D.1274.
- 5 *CALÉNDULA* L. Holksfjäll jemnhöga. Skälfrukter krökta, båtljka, utan tjun; diskblommornas felsläende. — *C. arvensis* L. med nedligg. stjelk och n. lancettl. blad, upptages af Linné i Fl.Su. under namn af *C. officinalis*, såsom funnen i Uppl. vid Malma gästg.
- 6 *C. officinalis* L. med upprätt stjelk, aflånga ell. omv. äggrunda blad, finnes stundom flyktad ur trädgårdstäpporna. Båda arterna hafva gula blr.
- 7 *CENTAUREA Calcitrapa* L. bladen pardelade; holksf. i spetsen bärande styfva och stickande tornar; blr röda. På ballast vid Visby. Fig. Reich.Cynaroceph.t.798.
- 8 *C. solstitialis* L. rotbl. lyrformiga; holksf. som hos föreg.; blr gula. Gottl. vid Kopparsvik i Vesterhejde önl. G. v. Ced. Fig. Reich.t.795.f.1.
- 9 *CARDUUS tenuiflorus* Curt. med nedlöpande, bugtbräddade och taggiga blad, cylindrisk holk, röda blr, är funnen vid Göteborg och Gefle på ballast. Fig. Fl.D.2058.
- 10 *CIRSIIUM tuberosum* All. rotknölar tapplika; stjelken med lancettlika, parklufna ludna blad, 1—3 blomk.; röda blr; skall fordom af Leche vara funnen vid Krageholm eller Simonstorp i Skåne. Fig. Reich.t.108.
- 11 *LACTUCA quercina* L. lik *L. Scariola*, men bladen med slät, oväpnad ryggnerv, finnes nu icke mer på Lilla Carlsön vid Gottland, der Linné fordom tagit den. Fig. Reich.Cichoriac.t.1419,t.2.

- 12 *SCORZONERA hispanica* L. med flerbladig, ofta mångblomstrig stielk, triangulärt äggrunda holkfj. Stundom förvildad i och omkring trädgårdar. Fig. Reich.t.1384.
- 13 *HELMINTHIA* Juss. skiljd från *Picris*, med blomholken omgifven af 5, stora, n. hjertlika foderholksblad. — *H. echinoides* Gärtn. med stielkomfattande, i kanten taggiga blad, gula blr, fanns fordom förvildad i Paradislyckan vid Lund. Fig. E.B.972. Reich.t.1378.
- 14 *CREPIS sibirica* L. med luden stielk, ojemna, bredt aflånga, tandade blad, gula blr och omkr. 30strimmiga skalfr., anföres som förvildad i mell. Sv. af Prof. Fries i S.V.Sc. Fig. Reich.t.1458.
- 15 *PICRIDIMUM* Desf. från *Crepis* skiljdt slägte med blomholk af tegel-lagda [ägg.] fjäll utan foderholk, samt 4kantiga skalfr. — *P. vulgare* Desf. med gula blr, hinnkantade holkfjäll och parklufna blad, fanns 1841 på Gefle nya Brobänk.

#### AMBROSIACEÆ.

- Fam. skiljd från Dipsacæ med ♂ och ♀blr i serskilda blomkorgar. Ståndare 5, fria. Honblrnas holk slutl. nötlit tillhårdnande kring frukten, groftaggig.
- 16 *XANTHIUM* L. Sambyggare, med enkla rörformiga hanblr inom holk, honblr utan kalk. — *X. strumarium* L. stielken och de hjertlika bladen utan taggar; blrna gröna. Fordom funnen flerst. i Sk. samt vid Göteborg. Tillfällig och strax försvinnande har den i sista åren träffats vid Örebro, Nyköping m. fl. st. Fig. Fl. D.970.
- 17 *X. spinosum* L. bladen 3klufna, med utdragen mellanflik, och långa, 2—3gafflade tornar vid basen; blrna gröna; fanns 1846 vid Gefle Lazarett, 1865 vid Malmö slott, 1866 vid Nyköping. Fig. Reich.t.1575.

#### 3 FAM. VALERIANEÆ.

- 18 *SAMBUCUS racemosa* L. buske, med parbladiga blad, hvita blr i äggrundt knippe; bären röda. Förvildad på Experimentalfältet vid Stockh.; enl. C. Ind. vild vid Oppely nära Nyköping.

#### 4 FAM. RUBIACEÆ.

- 19 *GALIAM murale* DC. späd och släk, med parvisa, kortskaftade blr i bladvecken, fanns i Kammar-rätts-Rådet Billbergs saml. med påskrift: Gottland.
- 20 *G. tricornis* With. bladen 8 i krans jemnbreda; blomskäften i bladvecken, 1—4blommiga, slutl. tillbakaböjda. Fanns år 1818 vid Halmstad och Femsjö af Prof. Fries. Fig. E.B.1641.

#### 7 FAM. CAMPANULACEÆ.

- 21 *CAMPANULA bononiensis* L. stielken trind; bladen trubbsågade, under gråludna, de nedre skaftade hjertlika, de öfre något omfattande, äggrunda—lancettl.; blr som *C. rapunculoides*. Skåne, som ogräs i trädgårdar i Billinge, samt Smål. i Högsby sn. Förvildad vid Uppsala enl. Fr. i H.N.f.10, n:o 12. Fig. Reich.t.1598,f.3.

#### 9 FAM. CONV OLVULACEÆ.

- 22 *CUSCUTA Epithymum* L. hårfin, röd, med kronpipen tillsluten af fjäll så långa som sjelfva pipen. Växer på Ljung, *Thymus Serp.* m. m. och uppgifves som Svensk af Retz. m. fl. Fig. Fl.D.427.

#### 10 FAM. BORAGINEÆ.

- 23 *SYMPHYTUM asperinum* MB. horsttaggig; bladen hjertlikt äggrunda, nedlöpande på skaftet, de öfversta n. oskaftade. Förvildad vid Uppsala och Stockholm m. fl. st.

#### 11 FAM. LABIATÆ.

- 24 *MENTHA nepetoides* Lej. [*M. pubescens* W.] bladen skaftade äggrunda; blrna i aflånga, nedtill gleskransiga, mjukludna ax, med jemnbredt syl-lika fodertänder; uppgifves af Hr Lilja i Bot.Not.1846 växa förvildad i kryddgårdar vid Ekeröd i Skåne.

- 25 *SALVIA verticillata* L. med täta, 20—30blommiga blomkransar, hjertlika blad, fanns i Liljeblads tid förvildad vid Linköping.
- 26 *SATUREJA* L. skiljd från *Calamintha* endast med regelbundet 5klufvet blomfoder. — *S. hortensis* L. stj. upprät,  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  fot hög, mycket grenig med jemnbredt lancettlika n. helbräddade spetsiga, men uddlösa blad; små hvitröda blr i korta klasar i bladvecken. Fanns 1853 af Dr Lokrantz förvildad i Uppl. på nyodlingar vid Untra nära Söderfors.
- 27 *BALLOTA foetida* Lam. skiljd från *B. ruder.* endast med halfbrunda, kort uddspetsiga fodertänder. Fanns fordom i Sk. vid Åhus och Rastunda; äfven införd med ballast till några sjöstäder. Fig. Fl.D.673. H.N.f.11, n:o 18.
- 28 *STACHYS alpina* L. något lik *St. silvatica*, men skiljd med trubbigare blad, tät-sittande, mångblommiga blomkransar. Uppgafs af Ol. Celsius vara funnen i Uppl.; men är aldrig återfunnen. Fig. Reich.t.1209,f.2.
- 29 *LAMIUM maculatum* L. med alla bladen skaftade, hjertlika, spetsade; blomkrans. omkr. 10blommiga, med stora röda blr. Fordom funnen vid Käflinge i Skåne. Fig. Fl.D.1649. H.N.f.15, n:o 18.

### 17 FAM. GENTIANEÆ.

- 30 *GENTIANA acaulis* L. med en enda stor klocklik blå blomma, högre än sjelfva stjelen, uppgifves af Vilse vara funnen i N. vid Gröten i Romsdalen, hvilket aldrig torde komma att bekräfta sig. Fig. E.B.1594.
- 31 *G. germanica* Willd. skiljd från *G. Amarella* med mycket större blr, och foderflik kortare än kronans pip. Af gammalt funnen vid Ignaberga i Sk., och i ÖG., men på många år icke återfunnen. Fig. Fl.D.suppl.t.67. H.N.f.14, n:o 17.
- 32 *SWERTIA* L. [*Pleurogyne* Eschh.] skiljd från *Gentiana* med hjulformig 5delad blomkrona. — *S. sulcata* [Pleur. rotata Griseb.] med n. jemnbreda blad och blomfoder af den blå kronans längd; uppgifves af Gunner växa i Gudbrandsdalen, men förmodas af Prof. Blytt vara *Gent. tenella*. På Island är arten icke sällsynt. Fig. Fl.D.343.

### 18 FAM. SOLANACEÆ.

- 33 *SOLANUM tuberosum* L. med stora knölar på rotstockens grenar, bladen ojemnt parbladiga, blrna flockvisa i de öfre bladvecken. Potatesväxten träffas ofta förvildad, men fortvarar icke.
- 34 *ATROPA* L. Blomkronan bägerlik, 5standad; frukten ett bär. — *A. belladonna* L. med stora ägggrunda helbräddade blad, violettbruna blr, stora svarta bär, ej olika kersbär. En mycket giftig växt, som uppgifves af Hornem. växa i sydl. Norge, hvilket ej är troligt. Fig. Fl.D.758.

### 19 FAM. PERSONATÆ.

- 35 *SCROPHULARIA alata* Gil. [*S. Ehrharti* Stev.] stj. vingadt 4kantig, glatt; bladen ägggrunda, likformigt hvass-ågade, glatta; blomkr. mörkröda, öppna. Fordom i Sk vid Storkällebacken i Billinge. Fig. Fl.D.507. H.N.f.14, n:o 19.
- 36 *MIMULUS* L. Fodret bägerlikt, kronan n. klocklik, med något olikformigt 5klufvet bräm; märket 2klufvet. — *M. guttatus* DC. glatt, kronan stor, gul, med en blodröd fläck på de nedreflikarne; uppgifves af Hr Lilja i Bot.Not.1846 hafva blifvit förvildad i Skåne vid kalkkällor i Billinge.
- 37 *LINARIA Cymbalaria* W. [E.B.502] glatt med slak stielk, hjertlika 5flikiga blad, och
- 38 *L. spuria* W. med slak stielk och rundadt äggform., helbräddade blad, funnos båda på Geste nya Brobänk 1841. Fig. E.B.691.
- 39 *VERONICA arguta* Schrad. i Sw. Summ.Veg.Scand. med luden stielk, glest och likformigt sågade, mot spetsen helbräddade blad, talrika blomax. Sannolikt har någon afart af *V. spicata* blifvit ansedd för denna syd-europeiska art. Fig. Schrad. Ver.t.2,f.2.



- 40 *V. peregrina* L. blrna oskaftade, i bladvecken; bladen aflånga, mot basen afsmalnande, glest naggade; fanns i Linnés tid förvildad vid Uppsala enl. Fl.Su.ed.1.
- 41 *V. præcox* All. de öfre bladen jemnbreda, de nedre hjertlikt åggrunda; blomfoderflikarne åggrunda spetsiga glandelbräddade; Skåne, Torup på en sandbacke: Rosén. Obs.Bot.p.59, enl. Fries. Fig. Sturm 58 häft.
- 42 *OROBANCHE minor* Sult. liten, 6—7 tum hög, med 2:ne hela ell. olikformigt flikiga foderbl., nedtill håriga ståndarsträngar; funnen en gång för många år sedan på Hallands Väderö. Fig. Fl.D.1219.
- 43 *O. epithymum* DC.? liten, med sambladigt, 4klufvet foder, upptill håriga ståndarsträngar; en enda gång funnen på Gottl. vid Thorsborg. Fig. Reich.t.1784.

### 23 FAM. PLANTAGINÆÆ.

- 44 *PLANTAGO arenaria* WK. stjelen grenig, med smalt jemnbreda blad, n. flockvis ordnade, långskaftade åggformiga ax; främre foderflikar trubbiga. Funnen af L. J. Wahlstedt i Skåne, nära Malmö slott; förmodl. inkommen med ballast.

### 28 FAM. UMBELLIFERÆ.

- 45 *CHÆROPHYLLUM bulbosum* L. med tjock, rundad ell. kägellik rot; nedtill stråfhårig, upptill glatt och under lederna uppsväld stielk, 3dubb. parbl. delade bl., med jemnbredt lancettlika flikar, glatta enskilda svepen, stift af stiftföternas [diskens] längd. Fordom funnen i Norge, vid Christiansand, Stavanger och Bergen; men knappt på de sista 50 åren enl. Ax. Blytt. Fig. Fl.D.1868. H.N.f.8, n:o 16.
- 46 *TORILIS infesta* Hoffm. liknar *T. Anthriscus*, men är mindre och skiljd med utsperrade grenar ända nedifrån, hvarjemte den saknar eller har blott en-bladiga allm. svepen. Anförd af Reizius efter Afzelius. Fig. E.B.1314.
- 47 *CAUCALIS daucoïdes* L. skiljd till släktet från *Torilis* med stora groftaggiga frukter, samt utmärkt af 3stråliga blomflockar och findelade blad, hv. blr; har funnits vid Fjelkinge i Skåne bland säden. Fig. Fl.D.2346.
- 48 *PEUCEDANUM salinum* Pall.? bladen 2—3 gr: pardelade, på långa slidor, samt med mer utsperrade grenar, långa, n. trådsmla flikar; allm. svepe 0, eller 1—3bladigt och affallande; hv. blr. Meddelad af Håradsh. Kröningssvärd, som tagit växten »i vattendraget, hvilket nedlöper till Sælbo hytta i Norge». *Cenoloph. Fischeri* Bot. Not.1846, n:o 12. Förf., som blott eger ett blommande ex. från Norge, är oviss, om detta hörer till denna art eller till *P. salinum*, hvars af Ledebour citerade fig. i Gmel.Fl.Sib.I,t.41 det Norska ex. fullkomligt liknar.

### 31 FAM. RESEDACEÆ.

- 49 *RESEDA lutea* L. bladen pardelade; blomfod. 6deladt; funnen på ballastplatser vid Göteborg, Stockh., Gefle, Gottl.
- 50 *R. phyteuma* L. bladen hela, de mellersta 3flikiga, blomfod. 6klufna; funnen på Gefle Brobänk.

### 33 FAM. RANUNCULACEÆ.

- 51 *RANUNCULUS lanuginosus* L. bladskaften utsperradt brunhåriga; rot- och stielkbl. likformiga, 3—5klufna, med rutformiga, inskurna flikar. En möjligen hit hörande form har funnits på Gottl.
- 52 *BATRACHIUM Rionii* Nym. något lik *B. Drouetii*, men med stånd. kortare än pist., och fruktfästet n. kägellik, är uppgifven såsom funnen på Gottl., men aldrig återfunnen.
- 53 *CERATOCEPHALUS* Mönch. Skiljd från *Ranunculus* med 2knöliga och groft långsprötlade karpeller. — *C. falcatus* (Pers.) 3—4 tum hög, med axlikt gytrade karp., hvilkas spröt är böjdt, findelade blad. Nyköping, dit den inkommit med utländsk ull: C. Ind.
- 54 *HELLEBORUS* L. Foderbl. 5, kronlika; kronbl. strutlika. — *H. viridis* L. med bladen fotlikt klufna i flere sågade flikar, gröna kalkblad, skall enl. Hr Lilja växa som ogräs i trädgårdar vid Billinge prestg. i Skåne.

## 36 FAM. FUMARIACEÆ.

- 55 *CORYDALIS rutacea* Th. Fr. med lökformig knölstam; blrna få, i tät klase, kort skaftade, med urnupna yttre kronblad. Uppsala i gamla Bot. trädg., samt vid Linnés Hammarby, der den enl. Th. Fr. årligen skall förekomma i ymnighet.
- 56 *C. nobilis* Pers. grof grenig rotstock; bladen pardelade ochflikiga; blomklasen tät, af talrika gula blr; träffas ofta förvildad i trädgårdar ända upp till Gestr. [Hammarby].
- 57 *FUMARIA capreolata* L. bladen med klängelikt vridda skaft, aflånga flikar; fodr. af halfva kronans längd; frukt. klotrunda, släta. Tillfalligt förvildad vid Lund. Fig. FLD.2358. H.N.f.13, n:o 47.
- 58 *F. micrantha* Lag. bladen med jemnbreda flikar; fodr. något kortare än halfva kronan; frukt. klotrunda. Träffades 1849 i åkrar nära Uppsala, men har sedan försvunnit. Fig. H.N.f.13, n:o 48.

## 37 FAM. CRUCIFERÆ.

- 59 *ERUCA* DC. skiljd från *Brassica* med 2radiga frön. — *E. sativa* Lam. med parflikade blad, hvitgula blå-ådriga blr på mycket korta skaft, finnes stundom på Gefle Brobänk. Fig. Reich.Tetrad.f.4421.
- 60 *DILOTAXIS muralis* DC. med endast ned mot roten bladig stjelk, djupt bugtandade blad, smärre blr; eljest lik *D. tenuif.* På ballastpl. Fig. Reich.4417. H.N. f.15, n:o 32.
- 61 *MORICANDIA* DC. fod. slutet; skida fyrkantig, med 2radiga frön, i öfr. som *Diplo-taxis*. — *M. arvensis* DC. med hjertlika, stjelkomfatt., blåakt. blad, gredel. blr; skall enl. Fries i Bot.Not.1843 vara funnen i en åker  $\frac{1}{4}$  mil från Skara. Fig. Reich. 4431.
- 62 *SISYMBRIUM Irio* L. med lyrförmiga, nedåt parflikiga blad, n. uppräta skidor, 4—5 gånger längre än skaften. I äldre tider funnen i Sk. och vid Uppsala, samt på ballastplatser.
- 63 *ERYSIMUM Cheiranthus* Pers. lik *E. hieracifol.*, men med silkeslik hårlighet af parallela hår och mycket större blr; fanns 1842 på Gefle Brobänk. Fig. Reich.4393.
- 64 *CARDAMINE trifolia* L. med långt skaftade 3fingradt delade rotblad, hvilkas småblad äro rundade och trubbigt tandade, med småuddiga tänder, hvita blr i knippe. Uptages i äldre Svenska florer; men, såsom icke i sednare tider funnen, tros *C. amara* var. *trisecta* vara därför misstagen. Fig. Reich.4298.
- 65 *RAPHANUS sativus* L. roten köttig; bladen vid basen pardelade med stor ändflik; blrna violettröda; skid. knöliga oledade. Förekommer stundom förvildad i och utom plantager. Fig. Reich.4175.
- 66 *R. maritimus* Sm. bl. lyrförmiga, med små parvisa flikar, omväxlande med de större; skid. som hos *R. Raphanistr.*, hvaraf den i Sv. funna torde vara en form. Fordom vid Varberg funnen af Fries.
- 67 *EUCLIDIUM* Br. Skidan rundad, med spröt, 2rummig, affall. öppnad. — *E. syriacum* Br. med skaftade, lancettlika, glest sågade blad, borstaggiga skidor. Nyköping, inkommen med utländsk ull: C. Ind. Fig. Reich.4157.
- 68 *VELLA annua* L. [*Carrichtera Velle* DC.] bladen dubbelt pardelade; skidorna ägrunda, borsthåriga, med bladlikt stift, slutl. nedböjda; blrna blekgula; fanns på Gefle nya Brobänk 1841.
- 69 *LUNARIA annua* L. lik *L. rediviva*, men med elliptiska, d. v. s. i ändarne rundade skidor; skall stundom träffas förvildad i och vid trädgårdar, enl. Sv.B.478.
- 70 *LEPIDIUM virginicum* L. med smalt lancettlika, inskuret sågade, glatta blad, cirkelrunda urnupna skidor, hvita blr med 2—4 stånd., fanns 1845 på Gefle nya Brobänk. Fig. Reich.4216.

## 41 FAM. MALVACEÆ.

- 71 *MALVA litoralis* Deth. en medelform mell. *M. rotundifol.* och *silvestris*, med upp-

stig. stielk, hjertlika blad, med 5—7, spetsade och sågade flikar, medelstora violettblå blr, skall enl. Fries i S.V.Sc. vara funnen i Norge.

#### 42 FAM. GRUINALES.

- 72 *GERANIUM viscidulum* Fr. skiljd från *G. pusill.* med horstuddiga foderbl., i spetsen hela kronbl. och gropiga karpeller; finnes numera enl. F. Aresch. endast förvild. i Lunds Bot. trädg. H.N.f.13, n:o 52.
- 73 *ERODIUM moschatum* Ait. bladen parblad. delade, med äggrunda, grundt flikade småbl.; de knappbärande ståndsträng. tandade på den vidgade basen. Tillfälligt förvildad.
- 74 *OXALIS corniculata* L. skiljd från *O. stricta* med nedligg. stielk och vid bladskäften fastväxta stipler. Tillfälligt förvildad vid Lund. Fig. F.I.D.1753.
- 75 *LINUM usitatissimum* L. med spridda, smalt lancettlika blad; foderflik. af fröhus längd; blrna blå. Ofta sjelfsödd af spildt linfrö, men icke fortvarande.

#### 47 FAM. SILENACEÆ.

- 76 *SILENE gallica* L. luden, med n. jemnbreda blad, ensamma och skiftevisa blr i enkel klase, cylindriskt foder, tandade ell. urnupna blekröda kronbl. Fordom funnen i Sk. vid Malmö och Lund. Fig. F.I.D.1643. H.N.f.7, n:o 32.
- 77 *S. Armeria* L. glatt, med äggr. hjertlika blad, blr i täta jemnhöga knippen, uppåt vidgad foder, odelade röda kronbl. Tillfälligt förvildad i gamla trädgårdar. Fig. F.I.D.559. H.N.f.10, n:o 39.
- 78 *DIANTHUS barbatus* L. med r. ell. hv. blr i tät jemnhögt knippe och lancettlika blad, förvildas stundom med trädgårdsafskräden.

#### FRANKENIACEÆ.

Fam. skiljd från *Silenaceæ* med ett enda stift, och fröen fästade i kanten af fröhus väggar.

- 79 *FRANKENIA* L. fod. och kr. 4—5bladiga; stånd. 6. — *F. pulverulenta* L. med omv. äggrunda motsatta, under mjöliga blad, har funnits förvildad på Djurgården vid Stockholm, i grannskapet af Belhmans byst.

#### 53 FAM. SAXIFRAGEÆ.

- 80 *SAXIFRAGA umbrosa* L. stäng. bladlös; alla bl. vid roten, omv. äggrunda, rundnaggade, med hvit, broskaktig kant; blrna hvita, rödprickiga. Fanns några år på Billingen, nära Sköfde; efter all anledning, såsom sedan visat sig, ditplanterad; nu utgången.

#### 54 FAM. CRASSULACEÆ.

- 81 *SEDUM hybridum* L. bladen platta spadlika; blrna gula. Förvildad på Egeberget vid Christiania.
- 82 *S. dasyphyllum* L.  $\beta$  *glanduliferum* hela växten glandelhårig; bladen rundadt elliptiska; blrna hvita. Lär endast finnas odlad i Visby, der den förr uppgifvits växa på stadsmuren.

#### 56 FAM. ONAGRARIEÆ.

- 83 *ISNARDIA palustris* L. (*Ludwigia nitida* Spreng.) blrna små, med 4 ståndare, 1 pist., utan krona, klocklika gröna oskaftade, i de äggrunda spetsiga motsatta bladens veck; fr. fröhus. Uppgifves vara funnen i ån vid Hemmeslöf i Karup sn i Hall.; vid Alingsås och Nohhaga (Norrhaga?); ÖG. i Ringskällan vid Örverstad i Askeby sn. På sistnämnda ställe finnes en ovanligt stor *Montia*, som torde blifvit misstagen för *Isnardia*. — F.I.D.1745.
- 84 *TRAPA* L. Fod. 4deladt. Krona af 4, fria blad. Stånd. 4. Frukt groftaggig nöt. — *T. natans* L. vattenväxt med finelade nedsänkta, rutformiga flytande blad. Ford. uppgifven för en mängd sjöar i mellersta Smål., samt för Svanö i VG. Ej funnen sedan förra århundradet.

## 59 FAM. SENTICOSÆ.

- 85 *ROSA laxa* Retz. taggarne på stammen raka, de vid stiplerna krokiga; småbladen 3—4pariga, enkelt sågade glatta; nyp. aflånga, på tillbakaböjda skaft; blirna hvita. Vid Linnés Hammarby och annorstädes fordom odlad enl. Fries, som anser denna föga kända art för Linnés i Mant. 2 som svensk anförda *R. arvensis*. H.N.f.8, n:o 46.
- 86 *POTENTILLA inclinata* Vill. lik *P. argent.*, men med i kanten långhåriga, under gråldna småblad. Tillfälligt förvildad på några få ställen.

## 61 FAM. PAPILIONACEÆ.

- 87 *LATHYRUS Aphaca* L. egentl. blad 0, endast stora spjutlika stipler och klängen; blomskafven enblommiga; blirna gula; förekom 1841 på Gefle Brobänk. Fig. E.B. 1167.
- 88 *MEDICAGO denticulata* W. baljan 2—3 gr snäckvriden, glatt, nätådrig, med i spetsen kroklika taggar, n. så långa som halva baljans diam.; finnes stundom införd med ballast på Gefle Brobänk, samt med utl. uil vid Nyköping.
- 89 *M. apiculata* W. lik föreg., men med mycket korta, n. raka taggar, fanns 1843 jemte föreg. vid Gefle.
- 90 *TRIGONELLA* L. skiljd från *Melilotus* med mångfröiga baljor. — *T. ornithopodioides* DC. stjelen utbredd 3—6 tum lång, med rödaktiga blir i 2—4blommiga klasar, har blifvit uppgifven för Gottl. på en ång vid Nygård i Etelhem. Fig. F.D.368.
- 91 *MELILOTUS cœrulea* Lam. med ovala hufvudlika ljusblå blomklasor, skall stundom träffas förvildad i Skåne, t. ex. vid Vegeholm. Fig. Sturm 15 häft.
- 92 *TRIFOLIUM incarnatum* L. med omv. äggrunda småblad; långt skaftade äggformiga, slutl. cylindriska blomhufvud; röda blir. Är i sednare åren funnen i Verml. vid Carlberg i Grums sn, och Motorp i Ekshärad; Vestml. i nya Kopparberget och i Smål. vid Vexjö i Dörby sn, troligen införd med utländskt klöfverfrö.
- 93 *GENISTA anglica* L. taggig; blirna gula, i öfre bladvecken; bladen lancettlika glatta; införd med ballast till Vestervik. Fig. F.D.619. H.N.f.13, n:o 63.
- 94 *ULEX* L. Skiljd från *Genista* med ända till basen 2deladt foder, båtl. kronköl. — *U. europæus* L. högväxt taggig buske, med fårade taggar, syl-lika blad, gula blir. Fördom i Sk. vid Torup, samt införd med ballast till Vestervik och Gottl.

## 62 FAM. ERICINÆÆ.

- 95 *CASSANDRA* Don. Fod. 5deladt, inom en 2bladig holk. Kronan båglik. Stånd. 10, utan sporrar på knapparne. Fr.: 5rumm. fröhus. — *C. calyculata* Don: buske, med skiftevisa, aflånga blad, blekgula blir i ensidig klase. Enl. gammal uppgift funnen vid Skellefteå i VB. och vid Tornio elf; åtm. på 40 år icke anträffad.

## 64 FAM. EUPHORBIACEÆ.

- 96 *MERCURIALIS Ladanum* C. Hn. stj. enkel, ell. med korta grenar upptill; blirna 1, säll. 2 i bladvecken, oskaftade. Fanns 1848, med *annua*, vid Gefle. Bot.Not.1849.

## 68 FAM. POLYGONÆÆ.

- 97 *RUMEX Patientia* L. örthl. äggrundt aflånga, något vågiga; kalkbladen hjertlikt rundade småtandade nätådriga, ett enda grynbarande. Hufvudsakligen med bladen skiljd från *R. conspersus*. Förvildas stundom ur plantager, särdeles i södra Sv.
- 98 *RHEUM* L. Lik *Rumex*, men med 9 ståndare. — *R. Rhaponticum* L. bladen mycket stora, hjertlika trubbiga, med ofvan fårade skaft. Förvildas stundom ur trädgårdar.

## 70 FAM. SANTALACEÆ.

- 99 *THESIUM Linophyllum* L. lik *Th. alpinum*, men med horisontala fruktgrenar, mer

sammansatt blomklase och 5taliga blomdelar. Skall enligt Retz. och Lilj. vara funnen på ängsbackar i Skåne. Fig. Reich.Deutschl.Fl.f.1160.

#### 74 FAM. URTICACEÆ.

- 100 *PARIETARIA diffusa* Koch: nedliggande och grenig med äggrunda blad; kalken slutl. dubbelt längre än ståndarne; fanns 1848 på Gefle nya Brobänk. Fig. E. B.879.

#### 75 FAM. AMARANTACEÆ.

- 101 *AMARANTUS retroflexus* L. blr med 5 ståndare, i axlika gyttringar; stjelken upprät, med äggrunda spetsade, i spetsen trubbad blad. Gefle Brobänk 1848. Fig. Reich.Icon.f.668.

#### 76 FAM. CHENOPODIACEÆ.

- 102 *ATRIPLEX nitens* Reb. skiljd från *A. hortensis* med på undre sidan hvitmjölliga blad, äggrunda och spetsiga kalkblad. Funnen på ballast vid Malmö, Kalmar och Stockh.
- 103 *HALIMUS portulacoides* Wallr. fotsbög, med vedartad stam; bladen n. tunglika; kalkbl. oskaftade. Enl. L.Fl.Su. fordom funnen af Leche vid Helsingborg och på ön Hven. H.N.f.14, n:o 61.
- 104 *CHENOPODIUM scifolium* Sm. bladen aflånga olikformigt bugttandade; frön punkterade. Är funnen, införd utifrån, vid Carlshamn af Fries, på Gefle Brobänk af förf. Fig. E.B.1724.
- 105 *C. ambrosioides* L. bladen lancettlika, glest tandade; blrna gyttrade i toppen och grenarnes bladveck, hvarför de bilda liksom bladiga ax. Fanns fordom förvildad på Halmstads gator.
- 106 *C. opulifolium* Schrad. skiljd från *C. album* med kortare och bredare, oftast rundtrubbad blad, mycket grenig blomställning. Uppgifven för Uppsala, samt Carlskrona och Ronneby. H.N.f.14, n:o 62.
- 107 *BETA maritima* L. karakterer af *Chenopod.*, men märket utan stift och kalken slutl. tillhårdnande. Stjelken utbredd, blrna mest parvisa i de rutformiga bladens veck. Fanns 1810 och 1841 på Gefle Brobänk. Fig. Fl.D.1571. H.N.f.13, n:o 68.
- 108 *XYRIS prostrata* L. Sambyggare. Blomkalk foderlik, 4—5delad; stift 2. Frö ett, inom fröblåsa. Stjelken fotslång, utbredd med långskaftade, omv. äggrunda blad, och blr gyttrade i hufvud. Uppgifves af Gunner vara funnen i Norge på ett fuktigt ställe vid gården Backe nära Trondhj., troligen införd utifrån, sedermera utgången. Fanns på Gefle nya Brobänk 1843. Fig. Gmel.Fl.Sib.3, tab.4, f.2.

#### 79 FAM. BETULINEÆ.

- 109 *BETULA fruticosa* Pall. Lik *B. humilis*, med mer runda blad och mer framåt rigtade flikar på frukthängenas fjäll. En ostasiatisk, möjl. från *B. humilis* icke skiljd form, som för 20 år sedan ansågs vara funnen i Smål. vid Mjöhult i Fryeled sn, men sedan aldrig återfunnits. Ex. under detta namn från Herjed. synas knappt skiljbara från *B. alpestris*.

#### 84 FAM. ORCHIDEÆ.

- 110 *ORCHIS pallens* L. stjelknölarne odelade; kalken gul, med 3flikig helbräddad läpp, konisk sporre af fruktlämnets längd; blomskärmen ennerviga. Upptages af Retzius, men har icke blifvit bestyrkt som inhemsk; trol. har någon storblommig *O. sambucina* blifvit ansedd för denna. Fig. Reich.Orch.t.34.

#### 85 FAM. IRIDEÆ.

- 111 *IRIS squalens* L. kalkbladen vid basen håriga, de yttre blå, de inre smutsgula; örtbladen breda svärdlika, kortare än stjelken, lärer finnas förvildad i plantager i söd. Sverige. Fig. Reich.D.Fl.763.
- 112 *CROCUS luteus* Lam. lik *C. vernus*, men med gula blr och hårlikade märken, fanns fordom förvildad på gräsplänerna i Löfsta trädgård i Uppl. Fig. Reich.D.Fl.793.

## 87 FAM. HYDROCHARIDÆ.

- 113 VALLISNERIA L. Tvåbyggare. ♂ blr gytttrade på blomkolf inom hölster; ♀ blomma ensam. Foder och kroma 3bladiga. — V. *spiralis* L. vattenväxt, med jemnbreda gräslika, i spetsen tandade blad; honblomman hvit, med långt trådlikt, spiralvridet skaft från roten. Uppgifves för flere sjöar i VG., ursprungl. anförd af Prof. A. Afzelius såsom tagen i en graf, som går genom Nohlbagas [Nordhagas] egor vid Alingås. Trol. ha *Sagittariæ* jemnbreda rotblad blifvit misstagna för denna fullkomligt Syd-Europeiska växt. Se ed.4.p.330. Fig. Reich.D.Fl.108—10.

## 89 FAM. LILIACEÆ.

- 114 FRITILLARIA *montana* Hop. meränd. enblommig; bladen lancettlikt jemnbreda, de öfversta och nedersta motsatta. Lik *F. Meleag.*, men med smärre blr, något mer lancettlika blad. Fordom förvildad på gräsplanerna i Ulriksdals trädgård. Fig. Reich.D.Fl.978, 79. [*F. tenella*].
- 115 ALLIUM *fistulosum* L. flöck klotrund, utan knopplökar; ståndarne enkla, längre än kalken; stj. och de trinda hl. uppblåst ihåliga. Ymnig på torftak i Gudbrandsdalen i Norge; trol. sedan äldre tider der odlad, emedan den ej upptages af Blytt i Norg. Fl. Fig. Reich.f.1084.
- 116 A. *odorum* L. fotshög, med skaftade blr i flock, utan knopplökar; blr hvita, väl-luktande; stånd. enkla, kortare än kalken; bl. smala, 3kantigt kölad; i st. för lök en lång krypande, af hinnaktiga fjäll beklädd rotstock. Funnen 1862 af Lindb. på Observatori-backen i Stockh., dit denna Sibiriska art förmodl. blifvit planterad. Fig. Gmel.Fl.Sib.I.t.x.f.2.
- 117 ASPHODELUS L. Lik *Anthericum*, men ståndarsträngarnes bas bred och betäckande fruktämnet. — A. *fistulosus* L. med syl-rika haftrinda ihåliga blad från roten, hvita blr med en rödbrun rand efter midten; fanns temligen ymnigt på Gefle Brobänk 1843. Fig. Reich.f.1117.
- 118 SCILLA L. Skiljd från *Ornithogalum* med blr i klase och smala syl-rika ståndarsträngar. — S. *verna* Huds. klasen fåblommig, halfgrund. Uppgifven af gammalt för Norges vestkust, men ej bekräftad. Fig. Fl.D.562.
- 119 S. *italica* L. klasen mångblommig, slutl. cylindrisk. Tillfälligt förvildad i Skåne.
- 120 MUSCARI *racemosum* Mill. lik *M. botr.*, men med, mer cylindriska blr, slakare blad, anføres af Retzius i Fl.Oecon. och Prof. Fries i Fl.Scan. såsom stundom förvildad på gräsplaner i Lund. Fig. Reich.f.999.

## 91 FAM. ALISMACEÆ.

- 121 ALISMA *natans* L. stj. flytande ell. nedliggande, med ågrunda flytande blad, enblommiga blomskaft från lederna. Af Lin. uppgifven att växa vid vägen mell. Stockh. och Uppsala, samt af Retz. för Skåne vid Ramsjö by i Karup; på ingendera stället sedan funnen. Fig. Fl.D.1573.

## 93 FAM. JUNCACEÆ.

- 122 JUNCUS *Tenageja* Ehrh. är granne till *J. bufonius*, men har kortare knippe med bruna blr, och kalkblad icke längre än det klotrunda fröhuset. Anförd af Retz. och växer möjligtvis i Skånes torfmossar; finnes åtminstone i Danmark och norra Tyskl. Fig. Fl.D.1160.

## 97 FAM. CYPERACEÆ.

- 123 HELEOCHARIS *ovata* Br. axet ågrundt; nötens bihang koniskt, nedplattadt med basen öfver nötens topp; roten trådig, tufvad. Är af gammalt uppgifven att vara funnen i Norge, men detta är sannolikt ett misstag. Fig. Andst.2,t.25.
- 124 CAREX *gynocrates* Wormskj. med enkelt ax, glesa, upprätta, mångstrimmiga fruktg. 2 märken. Af Somf. uppgifven för Saltalen i Norge, men sedan icke återfunnen. Fig. Fl.D.1529.

98 FAM. GRAMINEÆ.

- 125 *TRITICUM rigidum* Schrad. Lik *T. acutum* DC., men har bredt tvärhuggna skärmsjäll, hälften kortare än småaxen, och bladen slutt. hoprullade med en rad korta borst längs nerverna. Fordom funnen i Skåne enl. Prof. Fries, men trol. tillfälligtvis dit införd. Fig. Reich.f.271. H.N.f.6, no 95.
- 126 *T. vulgare* Vill. (Hvete) med tät, n. 4kantigt ax; skärmsj. breda, äggrunda, kupigt hvällda. Träffas ofta sjelfsådt, men fortvarar icke.
- 127 *SECALE L.* Skiljd från *Triticum* med 2blommiga småax och syl-lik, ennerviga skärmsj. — *S. cereale L.* (Råg) axet tät af tegellagda småax; blomfj. med lång borst. Uppväxer ofta sjelfsådd, men fortvarar icke.
- 128 *HORDEUM distichon L.* småaxen i 2 rader; sidosmåaxen med blott hanblir utan borst.
- 129 *H. polystichon* Döll. småaxen i 6 rader, alla 2kånade, med lång borst. Denna och föreg. art af Korn ofta sjelfsådda, men icke fortvarande.
- 130 *H. maritimum* With. skiljd från *H. pratense* med ända upp till axet bladigt strå och sidosaxens inre skärmsj. vid basen hinnkantadt. Vid Göteborg, samt i N. vid Mandal och Christiansand på ballastplatser. Fig. Fl.D.1632. H.N.f.12, no 95.
- 131 *LOLIUM multiflorum* Lam. lik *L. perenne*, men med upptill stråft strå, flere och mer mångblommiga småax, kortare skärmsj. Stundom förvildad i Skåne. H.N.f.16, no 76.
- 132 *VULPIA myuros (L.)* vippan smal, fingerlång och lutande; det nedre skärmsjället 2 ell. flere gånger kortare än det öfre; blomfj. kortare än borsten; bladen smala 2örade; roten trådig enårig. Funnen på Gefle Brobänk, samt vid Göteborg af Kamphövener, trol. äfven på ballast. Fig. Reich.D.Fl.f.270. [Fest. *pseudo-myuros*.]
- 133 *SCHEDONORUS longiflorus* Fr. [*Bromus W.*] vippan långgrenig slak; småaxen lancettlika, omkr. 10blommiga, med borst; bladen stråfva och håriga, med utdraget, sargadt snärp. Skall enl. Fr.S.V.Sc. vara funnen förvildad någonstades i södra Sverige. Fig. H.N.f.13, no 94 (från Kinnekulle).
- 134 *KOELERIA cristata* Pers. skiljd från *K. glauca* med håriga blad, spetsiga blomfj. Fordom funnen vid Oppmanna i Sk.; och enl. Liljebl. i Stockh.-skären, men der aldrig återfunnen. Fig. Fl.D.2223. H.N.f.14, no 88.
- 135 *AVENA brevis* Roth. enårig, med stora, vanl. 2blommiga småax af de mångnerviga skärmsjällens längd; yttre blomfjället kort 2syladt, med härömgifven bas. Införd med utländsk säd till Småland. Fig. Ands.Gram.t.12.f.142.
- 136 *A. sativa L.* lik *A. fatua*, men med blott en borstbärande blomma i hvarje småax. Hafren träffas oftast af våra sädesslag sjelfsådd.
- 137 *LEERSIA Sol.* småax enblomm., utan skärmsjäll; blomfj. utan borst. — *L. oryzoides Sw.* vippan öppen, med håriga småax. Har af Prof. Fries blifvit funnen i Hall. vid Dahla bland buskar; misstänkes dock att vara ditplanterad. Fig. Fl.D. 1744. Reich.f.494. Ands.Gram.t.10.f.116.
- 138 *PANICUM miliaceum L.* med stor utbredd lutande vippa; lancettlika, tillika med slidorna håriga blad; fanns 1846 på Gefle Brobänk. Fig. Reich.f.519.
- 139 *DIGITARIA ciliaris* Koel. lik *D. humifusa*, men skiljd med mycket håriga bladslidor, mer lancettlika småax. Stund. förvildad i trädg. i Skåne. H.N.f.13, no 88.
- 140 *SETARIA verticillata* PB. skiljd från *S. viridis* med nedåt vända småtaggar på svepeborsten. Tillfälligt förvild. i trädg. i Sk. och Hall. Fordom äfven vid Hargs bruk i Rosl. H.N.f.15, no 91.
- 141 *PHALARIS L.* vippan tät, axlik; skärmsj. med vingad rygg. — *P. canariensis L.* med oval ell. äggformig vippa, förekommer stundom förvildad vid husen af utkastadt Canariefrö. Fig. Reich.f.491. Ands.t.12.f.134.
- 142 *HIEROCHLOA australis* RS. med platta bl., något utbredd vippa, n. glatta grenar, mell. blomman med krökt ryggborst, den nedersta med kort borst under spet-

sen. Skall enl. Wessén i Pl.Cot.Kärn. och ett fordom af Fr. meddeladt ex. vara funnen i ÖG. vid Svartån nära Odenfors-bron; men har aldrig återfunnits. Fig. Andst.12,f.138.

- 143 *H. setifolia* Hn. bladen tagelsmala; vippan något utbredd, med sträfv, upp emot de äggrunda småaxen glatta grenar; blomfj. i kanten n. hårlösa, med utskjut., knäböjd ryggborst på båda blrna, kort borst nedom spetsen på den 3:dje bln [då sådan finnes]. Funnen 1846 i Vestml. Kärbo sn, på berg vid Mälaren; sedan aldrig återfunnen. Är möjl. en egendomlig lokalform af *H. bor*.

### 101 FAM. EQUISETACEÆ.

- 144 *EQUISETUM Telmateja* Ehrh. axbär. stjelen enkel, grenlös; den ofruktsamma med mycket talrika, åttkantiga, slutl. quarterslånga grenar i krans, invändigt mångpipig, alnshög eller mer. Anförd som Svensk af Retzius, men har icke blifvit bestyrkt. Fig. Fl.D.1469.



# REGISTER

öfver Phanerogamernas och Ormbunkarnes Familjer, Släkten och  
Arter samt dessas Synonymer.

Den cursiva stilen utmärker synonymerna; vid släktnamnen angifver den första siffran det nummer, hvarunder de upptagits i Släktöfversigten uti Inledningen, den andra deremot afser den sida, hvarpå de återfinnas i Floran.

## A.

*Abies excelsa* DC. 197.  
*obovata* Loud. 197.  
*Abrotanum* Fr. 4.  
*Absinthium vulgare* Lam. 3.  
*Acer* L. 521, 84.  
     *campestre* L. 84.  
     *platanoides* L. 84.  
     *Pseudoplatanus* L. 84.  
 ACERINEÆ DC. 84.  
*Achillea* L. 455, 3.  
     *Millefolium* L. 3.  
     *Parmica* L. 3.  
*Achyrophorus maculatus* Scop. 34.  
*Acinos vulgaris* Pers. 50.  
*Aconitum* L. 298, 95.  
     *Cammarum* L. 95.  
     *Lycotconum* L.Fl.Su. 95.  
     *napelloides* Sw. 95.  
     *Napellus* L. 95.  
     *neomontanum* Fl.D. 95.  
     *neubergense* Reich. 95.  
     *septentrionale* Köll. 95.  
     *Störchianum* Reich. 95.  
*Acorus* L. 210, 223.  
     *Calamus* L. 223.  
*Acrostichum ilvense* L. 280.  
     *septentrionale* L. 282.  
*Actæa* L. 292, 96.  
     *spicata* L. 96.  
*Adonis* L. 308, 94.  
     *vernalis* L. 94.

*Adoxa* L. 238, 84.  
     *Moschatellina* L. 84.  
 ADOXÆE E. Mëy. 84.  
*Ægopodium* L. 164, 82.  
     *Podagraria* L. 82.  
*Æsculus* L. 224, 84.  
     *Hippocastanum* L. 84.  
*Æthusa* L. 171, 81.  
     *Cynapium* L. 81.  
*Agrimonia* L. 272, 148.  
     *Eupatoria* L. 148.  
     *odorata* Mill. 148.  
     *procera* Wallr. 148.  
*Agropyrum acutum* RS. 256.  
     *caninum* RS. 256.  
     *hebestachyum* Fr. 256.  
     *juncum* PB. 255.  
     *pungens* RS. 256.  
     *repens* PB. 256.  
     *strictum* Reich. 255.  
*Agrostemma* L. 260, 123.  
     *Githago* L. 123.  
*Agrostis* L. 34, 273.  
     *alba* L. 274.  
     *algida* Wg. 266.  
     *alpestris* Læst. 274.  
     *alpina* Wg. 274.  
     *arundinacea* L. 271.  
     *borealis* Hn. 274.  
     *canina* L. 274.  
     *hyperborea* Læst. 274.

- rubra* Wg. 274.  
*rupestris* Hn. 274.  
*Spica venti* L. 273.  
*stolonifera* L. 273.  
*suaveolens* Bl. 274.  
*vulgaris* With. 274.  
**Aira** L. 50, 269.  
   *alpina* L. 269.  
   *alpina* Lilj. 277.  
   *aquatica* L. 266.  
   *atropurpurea* Wg. 270.  
   *bottnica* Wg. 269.  
   *brevifolia* Hn. 269.  
   *cæspitosa* L. 269.  
   *canescens* L. 269.  
   *caryophyllea* L. 268.  
   *discolor* Thuill. 269.  
   *flexuosa* L. 269.  
   *glauca* Hn. 269.  
   *præcox* L. 268.  
   *subspicata* L. 268.  
   *uliginosa* Weihe 269.  
**Airopsis** Fr. 47, 268.  
   *caryophyllea* Fr. 268.  
   *præcox* Fr. 268.  
**Ajuga** L. 313, 53.  
   *alpina* L. Herb. Fr. Nov. 54.  
   *alpina* Fr. S.V. Sc. 54.  
   *genevensis* L. 54.  
   *pyramidalis* L. 54.  
   *reptans* L. 53.  
**Albersia** *Blitum* Kunth. 181.  
**Albucea** *nutans* Reich. 213.  
**Alchemilla** L. 85, 148.  
   *alpina* L. 148.  
   *Aphanes* Leers 149.  
   *arvensis* Scop. 149.  
   *vulgaris* L. 148.  
**Alisma** L. 222, 216.  
   *natans* L. 298.  
   *Plantago* L. 216.  
   *ranunculoides* L. 216.  
**ALISMACEÆ** Juss. 216, 298.  
**Alliaria** Adans. 366, 101  
   *officinalis* Andr. 101.  
**Allium** L. 197, 212.  
   *angulosum* L. herb. 212.  
   *arenarium* L. 212.  
   *arenarium* L. herb. 212.  
   *carinatum* L. 212.  
   *fallax* R. & S. 212.  
   *fistulosum* L. 298.  
   *montanum* Schmidt 212.  
   *odorum* L. 298.  
   *oleraceum* L. 212.  
   *Schoenoprasum* L. 212.  
   *Scorodoprasum* L. 212.  
   *sibiricum* L. 212.  
   *ursinum* L. 212.  
   *vineale* L. 212.  
**Allosorus** Bernh. 536, 283.  
   *crispus* Bernh. 283.  
**Alnus** Gært. 489, 196.  
   *barbata* Mey. 196.  
   *glutinosa* W. 196.  
   *hybrida* Al. Br. 196.  
   *incana* Tausch. 196.  
   *pubescens* Tausch. 196.  
**Alopecurus** L. 28, 276.  
   *agrestis* L. 276.  
   *fulvus* Sm. 276.  
   *geniculatus* L. 276.  
   *nigricans* Horn. 276.  
   *pratensis* L. 276.  
**ALSINACEÆ** Bartl. 125.  
**Alsine** Wg. 259, 129.  
   *biflora* Wg. 130.  
   *hirta* Hn. 130.  
   *media* L. 125.  
   *peptoides* Wg. 129.  
   *rubella* Wg. 130.  
   *rubra* Wg. 132.  
   *stricta* Wg. 130.  
   *tenuifolia viscosa* Schreb. 129.  
   *verna* Led. 130.  
**Alsinella** *biflora* Sw. 130.  
**Althæa** L. 388, 113.  
   *officinalis* L. 113.  
**Alyssum** L. 360, 108  
   *calycinum* L. 108.  
   *incanum* L. 108.  
   *sativum* Sv. B. 108.  
**AMBROSIACEÆ** Link. 291.  
**AMARANTACEÆ** Juss. 181, 297.  
**Amarantus** L. 490, 181.  
   *Blitum* L. 181.  
   *retroflexus* L. 297.  
**Ammadenia** *peptoides* Gm. 129.  
**Ammophila** *arundinacea* Host. 271.  
**Anacamptis** Rich. 461, 203.  
   *pyramidalis* Rich. 203.  
**Anagallis** L. 109, 71.  
   *arvensis* L. 71.  
   *cærulea* Koch. 71.  
**Anchusa** L. 105, 44.  
   *arvensis* MB. 45.  
   *officinalis* L. 44.  
**Andromeda** L. 242, 169.  
   *cærulea* L. 169.  
   *hypnoides* L. 169.  
   *polifolia* L. 169.  
   *tetragona* L. 169.  
**Androsace** L. 113, 72.  
   *septentrionalis* L. 72.  
**Anemone** L. 392, 93.  
   *Hepatica* L. 94.

- memorosa* L. 93.  
*patens* L. 94.  
*pratensis* L. 94.  
*Pulsatilla* L. 94.  
*ranunculoides* L. 93.  
*silvestris* L. 93.  
*vernalis* L. 94.  
*Anethum* L. 156, 79.  
   *graveolens* L. 79.  
*Angelica* L. 162, 80.  
   *Archangelica* L. 80.  
   *litoralis* Fr. 80.  
   *silvestris* L. 80.  
*Antennaria* Gärtn. 443, 7.  
   *alpina* [L.] 7.  
   *alpina* Gärtn. 7.  
   *carpatica* Bl. & Fing. 7.  
   *dioica* Gärtn. 7.  
*Anthemis* L. 456, 2.  
   *agrestis* Wallr. 3.  
   *arvensis* L. 3.  
   *Cotula* L. 3.  
   *maritima* Retz. 3.  
   *tinctoria* L. 2.  
*Anthericum* L. 207, 213.  
   *calyculatum* L. 217.  
   *Liliago* L. 213.  
   *ossifragum* L. 217.  
   *ramosum* L. 213.  
*Anthoxanthum* L. 40, 277.  
   *odoratum* L. 277.  
*Anthriscus* Pers. 181, 78.  
   *Cerofolium* Hoffm. 78.  
   *silvestris* Hoffm. 78.  
   *vulgaris* Pers. 78.  
*Anthyllis* L. 395, 167.  
   *Vulneraria* L. 167.  
*Antiphylla oppositifolia* Haw. 136.  
*Antirrhinum* L. 343, 61.  
   *Elatine* L. 62.  
   *Linaria* L. 61.  
   *minus* L. 62.  
   *Orontium* L. 61.  
   *repens* L. 62.  
   *supinum* L. 62.  
*Apargia alpina* Sw. 35.  
   *autumnalis* Hoffm. 34.  
   *hastilis* Hoffm. 34.  
*Apera* Adans. 35, 273.  
   *Spica venti* PB. 273.  
*Aphanes arvensis* L. 149.  
*Apium* L. 163, 82.  
   *graveolens* L. 82.  
*Aquilegia* L. 299, 95.  
   *vulgaris* L. 95.  
*Arabis* L. 376, 102.  
   *alpina* L. 103.  
   *arenosa* Scop.  $\beta$  *borealis* Fr. 103.  
   *Gerardi* Bess. 103.  
   *glastifolia* H.N. 103.  
   *hirsuta* Scop. 102.  
   *perfoliata* Lam. 103.  
   *petræa* Lam. 103.  
   *sagittata* DC. 103.  
   *suecica* Fr. 103.  
   *Thaliana* L. 103.  
*Aracium paludosum* Less. 17.  
**ARALIACEÆ** Juss. 77.  
*Arbutus alpina* L. 169.  
   *uva ursi* L. 169.  
*Archangelica officinalis* Fr. 80.  
*Arctium Bardana* W. 14.  
   *Lappa* L. 14.  
*Arctophila* Rupr. 63, 264.  
   *fulva* \* *pendul.* Ands. 264.  
   *Lastadii* Rupr. 264.  
   *pendulina* Ands. 264.  
*Arctostaphylos* Adans. 241, 168.  
   *alpina* Spr. 169.  
   *officinalis* W. & Gr. 168.  
*Arenaria* L. 257, 129.  
   *ciliata* L. 129.  
   *Giesekii* Fl.D. 130.  
   *gothica* Fr. 129.  
   *hirta* Fl.D. 130.  
   *lateriflora* L. 129.  
   *marginata* DC. 133.  
   *media* L. 132.  
   *media* Wallr. 133.  
   *norvegica* Gunn. 129.  
   *peploides* L. 129.  
   *rubra* L. 132.  
   *serpyllifolia* L. 129.  
   *tenuifolia* L. 130.  
   *trinervia* L. 129.  
**ARISTOLOCHIACEÆ** 179.  
*Aristolochia* L. 480, 179.  
   *Clematidis* L. 179. \*  
*Armeria* W. 189, 74.  
   *elongata* Koch. 74.  
   *maritima* W. 74.  
   *pubescens* Lk. 75.  
   *sibirica* Turcz. 75.  
   *vulgaris* W. 74.  
*Armoracia rusticana* Koch. 104.  
*Arnica* L. 445, 4.  
   *alpina* Murr. 4.  
   *angustifolia* Fl.D. 5.  
   *montana* L. 4.  
*Arnoseris* Gärtn. 424, 35.  
   *pusilla* Gärtn. 35.  
**AROIDEÆ** Juss. 223.  
*Arrhenatherum avenaceum* PB. 267.  
*Artemisia* L. 440, 3.  
   *Absinthium* L. 3.

- campestris* L. 4.  
*laciniata* W. 4.  
*maritima* L. 4.  
*norvegica* Fr. 4.  
*rupestris* Fl.D. 4.  
*rupestris* L. 3.  
*salina* Liljebl. 4.  
*tanacetifolia* Retz. 4.  
*vulgaris* L. 4.  
**Arum** L. 495, 223.  
*maculatum* L. 223.  
**Arundo arenaria** L. 271.  
*Calamagrostis* L. 273.  
*colorata* Sv.B. 277.  
*maritima* Ag. 271.  
*Phragmites* L. 270.  
*stricta* Timm. 273.  
*varia* Schrad. 271.  
**Asarum** L. 270, 179.  
*europæum* L. 179.  
**ASCLEPIADEÆ** Juss. 57.  
*Asclepias Vincetoxicum* L. 57.  
**Asparagus** L. 206, 214.  
*officinalis* L. 214.  
**Asperugo** L. 108, 47.  
*procumbens* L. 47.  
**Asperula** L. 88, 37.  
*odorata* L. 37.  
*tinctoria* L. 37.  
**Asphodelus fistulosus** L. 298.  
**Aspidium** Sw. 528, 279.  
*aculeatum* Sw. 279.  
*angulare* Kit. 279.  
*crenatum* Somf. 281.  
*cristatum* Sw. 279.  
*dilatatum* Sw. 280.  
*Filix femina* Sw. 281.  
*Filix mas* Sw. 279.  
*fragile* Sw. 280.  
*Lonchitis* Sw. 279.  
*montanum* Sw. 280.  
*Oreopteris* Sw. 279.  
*spinulosum* Sw. 280.  
*Thelypteris* Sw. 279.  
**Asplenium** L. 532, 281.  
*Adiantum nigrum* L. 281.  
*alternifolium* Wulf. 282.  
*Breynii* Retz. 282.  
*crenatum* Fr. 281.  
*Filix femina* Bernh. 281.  
*germanicum* Weis. 282.  
*marinum* L. 281.  
*Ruta muraria* L. 282.  
*Scolopendrium* L. 282.  
*septentrionale* Hoffm. 282.  
*sibiricum* Turcz. 281.  
*Trichomanes* L. 281.  
*viride* Huds. 282.  
**Aster** L. 453, 9.  
*Tripolium* L. 9.  
**Asterocephalus Columbaria** Hn. 36.  
*suaveolens* Hn. 36.  
**Astragalus** L. 399, 161.  
*alpinus* L. 161.  
*arenarius* L. 161.  
*arenarius* Fl.D. 161.  
*danicus* Retz. 161.  
*glycyphyllus* L. 161.  
*Hypoglottis* L. 161.  
*leontinus* Wg. 161.  
*oroboides* Horn. 161.  
*pilosus* L. 162.  
*sordidus* W. 162.  
*uralensis* L. 162.  
**Athamanta Libanotis** L. 81.  
*Oreoselinum* L. 80.  
**Athyrium** Roth. 281.  
**Atriplex** L. 518, 181.  
*angustifolia* Sm. 182.  
*Babingtonii* Woods. 182.  
*calotheca* Fr. 182.  
*crassifolia* Fr. 182.  
*deltoidea* Bab. 182.  
*depressa* Hn. 182.  
*hastata* L. 182.  
*hastata* L. herb. 182.  
*hortensis* L. 181.  
*laciniata* L. Su. 182.  
*laciniata* Wg. 182.  
*latifolia* Wg. 182.  
*litoralis* L. 182.  
*longipes* Drej. 182.  
*marina* L. 183.  
*microsperma* Kit. 182.  
*nitens* Reb. 297.  
*patula* L. 182.  
*patula* Sm. 182.  
*pedunculata* L. 183.  
*prostrata* Bouch. 182.  
*rosea* L. 182.  
**Atropa Belladonna** L. 292.  
**Avena** L. 45, 267.  
*brevis* Roth. 299.  
*caryophyllea* Web. 268.  
*elatior* L. 267.  
*fatua* L. 267.  
*flavescens* L. 268.  
*hybrida* Peterm. 267.  
*intermedia* Lindgr. 267.  
*præcox* PB. 268.  
*pratensis* L. 268.  
*pratensis* Sv.B. 268.  
*pubescens* L. 267.  
*sativa* L. 299.  
*strigosa* Schreb. 267.  
*subalpestris* Hn. 268.  
**Avenella flexuosa** Koch 269.  
*uliginosa* Koch 269.

*Axyris prostrata* L. 297.  
*Azalea* L. 126, 169.  
     *lapponica* L. 170.  
     *procumbens* L. 169.

**B.**

*Baldingera* Fl. Wett. 29, 277.  
     *arundinacea* Dum. 277.

*Ballota* L. 317, 51.  
     *foetida* Lam. 292.  
     *nigra* L. 51.  
     *ruderalis* Sw. 51.

**BALSAMINEÆ** DC. 111.

*Barbarea* Br. 367, 103.  
     *arcuata* Reich. 104.  
     *parviflora* Fr. 104.  
     *præcox* Br. 104.  
     *stricta* Fr. 104.  
     *vulgaris* Br. 103.  
     *vulgaris* Wg. 104.

*Bartsia* L. 335, 65.  
     *alpina* L. 65.  
     *Odontites* Huds. 65.

*Batrachium* Wimm. 307, 90.  
     *admixtum* W. Nyl. 91.  
     *aquatile* Wimm. 90.  
     *circinatum* Fr. 90.  
     *confervoides* Fr. 91.  
     *confusum* Schultz. 91.  
     *crassicaule* Fr. 91.  
     *Drouetii* Nym. 90.  
     *hederaceum* Fr. 91.  
     *heterophyllum* Fr. 91.  
     *Lenormandii* Schulz. 91.  
     *marinum* Fr. 90.  
     *pantothrix* DC. 90.  
     *peltatum* Fr. 91.  
     *Peltiveri* Koch. 91.  
     *Rionii* Nym. 293.  
     *sceleratum* Th. Fr. 90.  
     *setigerum* Fr. 91.  
     *trichophyllum* Chaix. 90.  
     *tripartitum* Fr. 91.

*Bellis* L. 457, 8.  
     *perennis* L. 8.

**BERBERIDEÆ** Juss. 96.

*Berberis* L. 213, 96.  
     *vulgaris* L. 96.  
*Berteroa incana* DC. 108.  
*Berula angustifolia* Koch. 83.  
*Beta maritima* L. 297.

*Betonica* L. 318, 51.  
     *officinalis* L. 51.  
     *stricta* Ait. 51.

*Hartman, Skandinavien Flora* (10:de uppl.).

*Betula* L. 500, 195.

*alba* Fl.D. 195.  
     *alba* L. 195.  
     *Alnus* L. 196.  
     *alpestris* Fr. 196.  
     *carpatica* W. 195.  
     *dalecarlica* L. 195.  
     *fruticosa* Pall. 297.  
     *fruticosa* W. och Reich. 196.  
     *glutinosa* Wallr. 195.  
     *humilis* Hn. 196.  
     *humilis* Schrank. 196.  
     *hybrida* Blom. 195.  
     *intermedia* Thom. 195.  
     *laciniosa* Thunb. 196.  
     *nana* L. 196.  
     *odorata* Bechst. 195.  
     *odorata* Reich. 195.  
     *oycowiensis* Larsson 196.  
     *pallescent* Larss. 196.  
     *pinnata* Lundm. 197.  
     *pubescens* Ehrh. 195.  
     *subalpina* Larss. 196.  
     *verrucosa* Ehrh. 195.

**BETULINEÆ** Reich. 195, 297.

*Bidens* L. 437, 1.  
     *cernua* L. 1.  
     *frondosa* Retz. 1.  
     *minima* L. 1.  
     *platycephala* Oerst. 1.  
     *tripartita* L. 1.

*Blechnum* L. 535, 283.  
     *boreale* Sw. 283.  
     *Spicant* Roth. 283.

*Blitum* L. 141, 183.  
     *Bonus Henricus C. A. M.* 183.  
     *capitatum* L. 183.  
     *glaucum* Koch. 183.  
     *rubrum* Reich. 183.  
     *virgatum* L. 183.

*Blasmas compressus* Panz. 232.  
     *rufus* Lk. 232.

*Blyttia suaveolens* Fr. 274.

**BORAGINEÆ** Juss. 44, 291.

*Botrychium* Sw. 540, 284.  
     *boreale* Milde. 284.  
     *brevifolium* Ångstr. 284.  
     *crassinervium* Rupr. 284.  
     *lanceolatum* Rupr. 284.  
     *lanceolatum* Ångstr. 284.  
     *Lunaria* Sw. 284.  
     *matricariifolium* Al. Br. 284.  
     *matricarioides* Willd. 285.  
     *rutaceum* Sw. 285.  
     *rutafolium* Al. Br. 285.  
     *simplex* Hjtchc. 284.  
     *tenellum* Ångstr. 284.  
     *ternatum* Sw. Milde 285.  
     *virginianum* Sw. 285.

- Brachypodium* PB. 72, 258.  
*gracile* PB. 258.  
*loliaceum* Fr. 258, 265.  
*pinnatum* PB. 258.  
*silvaticum* RS. 258.
- Brassica* L. 372, 99.  
*campestris* L. 99.  
*Napus* L. 99.  
*nigra* Koch. 99.  
*Rapa* L. 99.
- Braya* Sternb. et Hop. 377, 101.  
*alpina* Sternb. & Hop. 101.  
*supina* Koch. 100.
- Breca arvensis* Less. 14.
- Briza* L. 64, 262.  
*media* L. 262.
- Bromus* L. 55, 261.  
*arvensis* L. 261.  
*asper* Murr. 261.  
*commutatus* Schrad. 261.  
*erectus* Huds. 260.  
*erectus* Sv.B. 261.  
*giganteus* L. 259.  
*hordeaceus* Wg. 262.  
*inermis* L. 260.  
*mollis* L. 262.  
*nanus* Weig. 262.  
*patulus* MK. 261.  
*pinnatus* Fl.D. 258.  
*pinnatus* L. 258.  
*pratensis* Ehrh. 262.  
*racemosus* L. 262.  
*secalinus* L. 261.  
*silvaticus* Sm. 258.  
*sterilis* L. 261.  
*suberectus* Fr. 260.  
*tectorum* L. 261.
- Bryonia* L. 502, 134.  
*alba* L. 134.
- Bulliarda* DC. 93, 140.  
*aquatica* DC. 140.
- Bunias* L. 347, 105.  
*Cakile* L. 105.  
*orientalis* L. 105.
- Bunium* L. 177, 82.  
*Carvi* Godr. & Gren. 82.  
*flexuosum* With. 82.
- Bupleurum* L. 151, 83.  
*Odontites* Spreng. 83.  
*tenuissimum* L. 83.
- Butomus* L. 240, 216.  
*umbellatus* L. 216.
- C.**
- Cakile* Scop. 351, 105.  
*maritima* Scop. 105.
- Calamagrostis* Roth. 31, 271.  
*acutiflora* DC. 271.  
*ambigua* Hn. 273.  
*arenaria* Fr. 271.  
*arundinacea* Roth. 271.  
*baltica* Hn. Fr. 271.  
*chalybea* Bl. 271.  
*chalybea* Fr. 271.  
*elata* Bl. 272.  
*epigejos* Roth. 272.  
*Halleriana* DC. 272.  
*Hartmanniana* Fr. 273.  
*intermedia* Lindeb. 273.  
*lanceolata* Roth. 273.  
*Langsdorfii* Trin. 272.  
*lapponica* Hn. 271.  
*latifolia* Bl. 272.  
*laxa* Host. 273.  
*litorea* DC. 273.  
*montana* Host. 271.  
*neglecta* Ehrh. 273.  
*nutans* Saut. 272.  
*phragmitoides* Hn. 272.  
*pseudo-phragmites* Reich. 272.  
*rigens* Lindgr. 272.  
*rubicunda* Bl. 272.  
*silvatica* DC. 271.  
*stricta* Hn. 273.  
*strigosa* Hn. 273.  
*subulglumis* Hn. 271.  
*varia* PB. 271.
- Calamintha* Mönch. 329, 49.  
*Acinos* Clairv. 49.
- Calendula arvensis* L. 290.  
*officinalis* L. 290.
- Calla* L. 209, 223.  
*palustris* L. 223.
- Callitriche* L. 482, 199.  
*autumnalis* Kütz. 200.  
*autumnalis* L. 200.  
*hamulata* Kütz. 199.  
*platycarpa* Kütz. 199.  
*polymorpha* Lönnr. 199.  
*stagnalis* Scop. 199.  
*tenuifolia* Fr. 200.  
*verna* L. 199.  
*virens* Goldb. 200.
- CALLITRICHINÆ** Link. 199.
- Calluna* Salisb. 227, 169.  
*Erica* DC. 169.  
*vulgaris* Salisb. 169.
- Caltha* L. 303, 95.  
*palustris* L. 95.

*Calypso* Salisb. 469, 207.  
*borealis* Salisb. 207.

*Calystegia sepium* Br. 43.

*Camelina* Crantz. 359, 107.  
*dentata* Fr. 108.  
*fætida* Fr. 108.  
*microcarpa* Reich. 108.  
*sativa* Fr. 108.  
*silvestris* Wallr. 107.

*Campanula* L. 128, 41.  
*barbata* L. 41.  
*bononiensis* L. 291.  
*Cervicaria* L. 41.  
*glomerata* L. 41.  
*latifolia* L. 42.  
*patula* L. 42.  
*persicifolia* L. 42.  
*rapunculoidea* L. 42.  
*Rapunculus* L. 42.  
*rotundifolia* L. 42.  
*Trachelium* L. 41.  
*uniflora* L. 42.  
*urticifolia* Schmidt. 41.

**CAMPANULACEÆ** Juss. 41, 291.

**CAPRIFOLIACEÆ** Juss. 40.

*Capsella* Mönch. 355, 106.  
*Bursa pastoris* Mönch. 106.  
*petræa* Fr. 107.

*Cardamine* L. 370, 101.  
*æquiloba* C. Hn. 101.  
*amara* L. 101.  
*bellidifolia* L. 102.  
*hirsuta* Fl.D. 101.  
*hirsuta* L. 102.  
*impatiens* L. 102.  
*intermedia* Horn. 102.  
*parviflora* L. 102.  
*petræa* L. 103.  
*pratensis* L. 101.  
*silvatica* Hoffm. 101.  
*silvatica* Link. 102.  
*trifolia* L. 294.

*Cardaria* *Draba* Reich. 106.

*Carduus* L. 430, 12.  
*acanthoides* L. 12.  
*acaulis* L. 14.  
*canus* L. Jacq. 13.  
*crispus* L. 13.  
*heterophyllus* L. 12.  
*lanceolatus* L. 12.  
*nutans* L. 12.  
*palustris* L. 13.  
*polyacanthos* Schreb. 13.  
*tenuiflorus* Curt. 290.

*Carex* L. 484, 235.  
*acuta* L. 245.  
*acutiformis* Ehrh. 235.

*alpina* Sw. 243.  
*ampullacea* Good. 236.  
*aquatilis* Wg. 244.  
*arctica* Deimb. 251.  
*arctophila* Nyl. 244.  
*arenaria* L. 250.  
*atrata* L. 242.  
*atrata* L. herb. 238.  
*bicolor* All. 247.  
*binervis* Sm. 239.  
*Bœnninghausiana* Weih. 247.  
*bolina* Lang. 246.  
*borealis* Lang. 244.  
*brevirostris* Cederstr. 253.  
*brizoides* L. herb. 248.  
*bullata* v. Fr. 236.  
*Buxbaumii* Wg. 242.  
*cæspitosa* L. 247.  
*cæspitosa* L. herb. 246.  
*canescens* L. 248.  
*canescens* L. herb. 242.  
*capillaris* L. 238.  
*capitata* L. 253.  
*chordorhiza* Ehrh. 251.  
*ciliata* W. 242.  
*collina* W. 241.  
*crassa* Ehrh. 235.  
*cryptocarpa* Mey. 243.  
*curta* Good. 248.  
*curvirostra* Hn. 241.  
*cuspidata* Wg. 244.  
*Davalliana* Retz. 253.  
*Deinbolliana* Gay. 251.  
*digitata* L. 242.  
*dioica* L. 253.  
*discolor* Nyl. 244.  
*disperma* Dew. 249.  
*distans* L. 239.  
*disticha* Huds. 250.  
*divisa* Fl.D. 240.  
*divulsa* Good. 251.  
*Drejeri* Lang. 247.  
*Drymeja* Ehrh. 238.  
*echinata* Murr. 248.  
*Ehrhartiana* Hop. 252.  
*elongata* L. 248.  
*elytroides* Fr. 246.  
*epigejos* Fr. 244.  
*epigejos* Læst. 244.  
*ericetorum* Poll. 242.  
*evoluta* Hn. 236.  
*extensa* Good. 240.  
*festiva* Dew. 250.  
*filiformis* Fl.D. 241.  
*filiformis* L. 237.  
*filipendula* Drej. 243.  
*flacca* Schreb. 237.  
*flava* L. 240.  
*Friesii* Bl. 236.  
*frigida* Wg. 238.  
*fuliginosa* Hop. 238.

- fulva* Good. 239.  
*fusca* Schk. 236.  
*Gaudiniana* Guthn. 248.  
*Gebhardi* Hop. 248.  
*glareosa* Wg. 250.  
*glauca* Scop. 237.  
*globularis* L. 241.  
*Goodenowii* Gay. 246.  
*gracilescens* Hn. 235.  
*gracilis* Ehrh. 249.  
*gynocrates* Wormsk. 298.  
*hæmatolepis* Drej. 244.  
*halophila* Nyl. 243.  
*heleonastes* Ehrh. 249.  
*helvola* Bl. 248.  
*hirta* L. 237.  
*Hornschuchiana* Hop. 239.  
*hyperborea* Drej. 245.  
*incurva* Lightf. 251.  
*intermedia* Good. 250.  
*irrigua* Sm. 238.  
*juncella* Fr. 246.  
*Katlegatensis* Fr. 244.  
*Kochiana* Sturm. 235.  
*lacustris* Th. Fr. 236.  
*lævirostris* Fr. 236.  
*lagopina* Wg. 249.  
*Langii* Steud. Bl. 240.  
*lapponica* Lang. 248.  
*lasiocarpa* Ehrh. 237.  
*laxa* Wg. 238.  
*lepidocarpa* Tausch. 240.  
*leporina* Fl.D. 249.  
*leporina* L. 250.  
*leucoglochin* Ehrh. 252.  
*ligerica* Gay. 250.  
*limosa* L. 238.  
*Limula* Fr. 245.  
*livida* Wg. 241.  
*loliacea* L. 249.  
*macilentia* Fr. 248.  
*maritima* Müll. 243.  
*membranacea* Hop. 242.  
*microglochin* Wg. 252.  
*microstachya* Ehrh. 248.  
*misandra* Br. Bl. 238.  
*montana* L. 241.  
*multiculmis* Ehrh. 248.  
*muricata* L. 251.  
*nardina* Fr. 253.  
*nigra* All. 243.  
*nigritella* Drej.? 241.  
*norvegica* W. 249.  
*nulans* Fr. 235.  
*obtusata* Lilj. 252.  
*Oederi* Ehrh. 240.  
*Oederi* Retz. 1. 241.  
*ornithopoda* W. 242.  
*orthostachya* Mey. 237.  
*ovalis* Good. 250.  
*pacifica* Drej. 247.  
*pallescens* L. 237.  
*paludosa* Good. 235.  
*panicea* L. 240.  
*paniculata* L. 251.  
*paradoxa* W. 252.  
*parallela* Somf. 253.  
*pauciflora* Lightf. 252.  
*pedata* All. 242.  
*pedata* L. 240.  
*pedata* Wg. 240.  
*pediformis* Mey. 242.  
*pelia* Lang. 240.  
*Persoonii* Sieb. 248.  
*pilulifera* L. 241.  
*præcox* Jacq. 241.  
*prolixa* Fr. 245.  
*pseudo-Cyperus* L. 237.  
*psyllophora* Ehrh. 253.  
*pulicaris* L. 253.  
*pulla* Good. 236.  
*punctata* Gaud. 239.  
*rariflora* Sm. 239.  
*recurva* Fl.D. 237.  
*remota* L. 247.  
*rhynchophysa* Mey. 236.  
*rigida* Good. 246.  
*riparia* Curt. 235.  
*rotundata* Wg. 236.  
*rufina* Drej. 247.  
*rupestris* All. 252.  
*salina* Wg. 243.  
*salinoides* Beurl. 244.  
*saxatilis* L. 236.  
*saxatilis* Wg. 246.  
*Schreberi* Schrank. 250.  
*scirpoidea* Michx. 253.  
*silvatica* Huds. 237.  
*spadicea* Roth. 235.  
*sparsiflora* Fr. 241.  
*speirostachya* Sm. 239.  
*stellulata* Schreb. 247.  
*stenolepis* Less. 236.  
*stricta* Good. 246.  
*stygia* Fr. 239.  
*stylosa* Mey. 241.  
*subspathacea* Wormsk. 244.  
*tenella* Schk. 249.  
*tenuiflora* Wg. 248.  
*teretiuscula* Good. 252.  
*tomentosa* Fl.D. 241.  
*tomentosa* L. 241.  
*tricostata* Fr. 245.  
*turfosa* Fr. 246.  
*uliginosa* L. 251. 232.  
*undulata* Kunze 237.  
*ustulata* Wg. 238.  
*vacillans* Drej. 244.  
*vaginata* Tausch. 240.  
*VahlIIi* Schk. 243.  
*vesicaria* L. 235.  
*virens* Lam. Hn. 251.



- vittilis* Fr. 248.  
*Wormskjoldiana* Horn. 253.  
*vulgaris* Fr. 246.  
*vulpina* L. 251.
- Carlina** L. 432, 12.  
*vulgaris* L. 12.
- Carpinus** L. 499, 186.  
*Betulus* L. 186.
- Carrichtera Vellæ** DC. 294.
- Carum** L. 165, 82.  
*Carvi* L. 82.  
*flexuosum* Fr. 82.
- Cassandra calyculata** Don. 296.
- Cassiope hypnoides** Don. 169.  
*tetragona* Don. 169.
- Catabrosa** PB. 61, 266.  
*algida* Fr. 266.  
*aquatica* PB. 266.  
*latifolia* Fr. 266.
- Caucalis Anthriscus** Liljebl. 79.  
*daucoides* L. 293.
- Caulinia flexilis** Willd. 210.
- CELASTRINEÆ** R. Br. 76.
- Cenolophium Fischeri** Bot. Not. 293.
- Centaurea** L. 438, 11.  
*austriaca* W. 11.  
*Calcitrapa* L. 290.  
*Cyanus* L. 11.  
*Jacea* L. 12.  
*nigra* L. 11.  
*phrygia* L. 11.  
*Scabiosa* L. 10.  
*solstitialis* L. 290.
- Centunculus** L. 83, 71.  
*minimus* L. 71.  
*simplex* Fl.D. 71.
- Cephalanthera** Rich. 471, 205.  
*ensifolia* Rich. 205.  
*Lonchophyllum* Reich. y. 206.  
*pallens* Rich. 205.  
*rubra* Rich. 205.  
*Xiphophyllum* Reich. y. 205.
- Cerastium** L. 266, 127.  
*alpestre* Hn. 127.  
*alpinum* L. 127.  
*aquaticum* L. 125.  
*arvense* L. 127.  
*atrovirens* Bab. 128.  
*brachypetalum* Desp. 128.  
*glomeratum* Thuill. 128.  
*glutinosum* Fr. 128.  
*latifolium* L. 127.  
*macilentum* Aspeg. 128.  
*ovale* Pers. 128.  
*pumilum* Koch. 128.  
*semidecandrum* L. 128.
- stellarioides* Hn. 127.  
*strigosum* Fr. 128.  
*tetrandrum* Curt. 128.  
*trigynum* Vill. 127.  
*triviale* Link. 127.  
*viscosum* L. 128.  
*viscosum* Sm. Wg. 127.  
*vulgare* Hn. 127.  
*vulgatum* L. 127.  
*vulgatum* Sm. 128.
- Cerasus acida** Barkh. 156.  
*avium* Mönch. 157.  
*vulgaris* Mill. 156.
- Ceratocephalus falcatus** (Pers.) 293.
- CERATOPHYLLÆ** DC. 200.
- Ceratophyllum** L. 493, 200.  
*demersum* L. 200.  
*muticum* Cham. 200.  
*oxyacanthum* Cham. 200.  
*submersum* L. 200.
- Cerefolium** Hall. 182, 78.  
*sativum* Bess. 78.  
*silvestre* Bess. 78.
- Chærophyllyum** L. 183, 78.  
*Anthriscus* Wg. 78.  
*aureum* L. 78.  
*bulbosum* L. 293.  
*maculatum* W. 78.  
*sativum* Wg. 78.  
*silvestre* L. 78.  
*temulum* L. 78.
- Chætospora ferruginea** Reich. 231.
- Chamaledon procumbens** Link. 169.
- Chamæmelum inodorum** Vis. 2.
- Chamænerion** Scop. 232, 140.  
*angustifolium* Scop. 140.
- Chamæorchis** Rich. 467, 205.  
*alpina* Rich. 205.
- Chamæplium officinale** Wallr. 100.  
*supinum* Wallr. 100.
- Cheiranthus alpinus** Wg. 101.
- Chelidonium** L. 291, 97.  
*Glaucium* L. 97.  
*majus* L. 97.
- CHENOPODIACEÆ** Juss. 181, 297.
- Chenopodium** L. 140, 184.  
*album* L. 184.  
*ambrosioides* L. 297.  
*Bonus Henricus* L. 183.  
*ficifolium* Sm. 297.  
*glaucum* L. 183.  
*glomerulosum* Reich. 184.  
*hirsutum* Wg. 184.  
*hybridum* L. 184.  
*maritimum* L. 185.

- murale* L. 184.  
*olidum* Curt. 184.  
*opulifolium* Dr. 184.  
*opulifolium* Schrad. 297.  
*paganum* Reich. 184.  
*polyspermum* L. 184.  
*rubrum* L. 183.  
*urbicum* L. 184.  
*viride* L. 184.  
*Vulvaria* L. 184.  
*Chimaphila umbellata* Nutt. 171.  
*uniflora* Fr. 170.  
*Chondrosea Aizoon* Haw. 136.  
*Cotyledon* Haw. 135.  
*Chrysanthemum* L. 459, 2.  
*Leucanthemum* L. 2.  
*Parthenium* Pers. 2.  
*segetum* L. 2.  
*Chrysocoma Linosyris* L. 10.  
*Chrysosplenium* L. 234, 138.  
*alternifolium* L. 138.  
*oppositifolium* L. 138.  
*tetrandrum* Th. Fr. 138.  
*Cichorium* L. 426, 15.  
*Intybus* L. 15.  
*Cicuta* L. 167, 82.  
*virosa* L. 82.  
*Cineraria* L. 446, 5.  
*alpina* L. herb. 5.  
*campestris* Retz. 5.  
*integrifolia* E.B. 5.  
*palustris* L. 5.  
*Cinna* L. 33, 274.  
*arundinacea* var. Bl. 274.  
*Brownii* Rupr. 266.  
*pendula* Trin. 274.  
*Circæa* L. 12, 142.  
*alpina* L. 142.  
*intermedia* Ehrh. 142.  
*lutetiana* L. 142.  
*Cirsium* Hall. 431, 13.  
*acaule* All. 14.  
*acauli-oleraceum* Näg. 14.  
*arvense* Scop. 14.  
*canum* MB. 13.  
*decoloratum* Koch. 14.  
*heterophyllum* All. 13.  
*heterophyllo-acaule* Näg. 13.  
*lanceolatum* Scop. 13.  
*nemorale* Reich. 13.  
*oleraceum* Scop. 14.  
*oleraceo-heterophyllum* Näg. 13.  
*palustre* Scop. 13.  
*rigens* Wallr. 14.  
*tuberosum* All. 290.  
**CISTINEÆ** DC. 118.  
*Cistus Canus* L. 118.  
*Fumana* L. 118.  
*Helianthemum* L. 118.  
*marifolius* E.B. 118.  
*olandicus* L. 118.  
*Cladium* P.Br. 21, 231.  
*germanicum* Schrad. 231.  
*Mariscus* P.Br. 231.  
*Clinopodium* L. 330, 50.  
*vulgare* L. 50.  
*Oniscus acaulis* Roth. 14.  
*acauli-oleraceus* Schiede. 14.  
*arvensis* Sm. 14.  
*heterophyllus* W. 13.  
*lanceolatus* W. 13.  
*oleraceus* L. 14.  
*palustris* Roth. 13.  
*Cnidium pratense* Sm. 81.  
*venosum* Koch. 81.  
*Cochlearia* L. 358, 108.  
*anglica* L. 109.  
*arctica* Fr. 108.  
*arctica* (Schlecht.) 108.  
*Armoracia* L. 104.  
*Coronopus* L. 107.  
*danica* L. 108.  
*officinalis* L. 108.  
*Coeloglossum* Hn. 464, 204.  
*albidum* Hn. 204.  
*viride* Hn. 204.  
**COLCHICACEÆ** DC. 215.  
*Colchicum* L. 217, 215.  
*autumnale* L. 215.  
*Coleanthus* Seid. 26, 275.  
*subtilis* Seid. 275.  
*Colpodium* Trin. 60, 266.  
*latifolium* Br. 266.  
*Comarum* L. 286, 152.  
*palustre* L. 152.  
**CONIFERÆ** Juss. 197.  
*Conioselinum* Fisch. 160, 81.  
*Fischeri* Wimm. 81.  
*Gmelini* Bray. 81.  
*tataricum* Fisch. 81.  
*Conium* L. 172, 77.  
*maculatum* L. 77.  
*Conopodium denudatum* Koch och Fr. 82.  
*Conringia Thaliana* Reich. 103.  
*Convallaria* L. 204, 214.  
*bifolia* L. 215.  
*bracteata* Thom. 215.  
*majalis* L. 214.  
*multiflora* L. 215.  
*Polygonatum* L. 214.

- stellata* L. 215.  
*verticillata* L. 214.  
**CONVOLVULACEÆ** Juss. 43, 291.  
*Convolvulus* L. 118, 43.  
     *arvensis* L. 43.  
     *sepium* L. 43.  
*Conyza squarrosa* L. 8.  
*Coptidium ranunculoides* Beurl. 88.  
*Coreopsis Bidens* L. 2.  
*Corallorhiza* Hall. 478, 208.  
     *innata* Br. 208.  
     *nemoralis* Sw. 208.  
     *virescens* Drej. 208.  
*Coriandrum* L. 168, 77.  
     *sativum* L. 77.  
**CORNEÆ** DC. 76.  
*Cornus* L. 90, 76.  
     *sanguinea* L. 76.  
     *suecica* L. 76.  
*Coronilla* L. 397, 160.  
     *Emerus* L. 160.  
*Coronopus depressus* Mönch. 107.  
     *didymus* Sm. 107.  
*Corvisartia Helenium* Mer. 8.  
*Corydalis* Pers. 390, 97.  
     *bulbosa* Pers. 98.  
     *cava* Schw. & K. 98.  
     *fabacea* Pers. 97.  
     *laxa* Fr. 97.  
     *Lobelia* Tausch. 97.  
     *nobilis* L. 294.  
     *pumila* Host. 97.  
     *rutacea* Th. Fr. 294.  
     *solida* Sm. 97.  
*Corylus* L. 498, 186.  
     *Avellana* L. 186.  
*Corynephorus* P.B. 48, 268.  
     *canescens* P.B. 268.  
*Cota tinctoria* Gay. 3.  
*Cotoneaster* Med. 277, 145.  
     *melanocarpa* Blytt. 145.  
     *nigra* Wahlb. 145.  
     *vulgaris* Lindl. 145.  
*Cotula coronopifolia* L. 290.  
     *matricarioides* Bong. 2.  
*Cracca major* Godr. & Gren. 159.  
     *minor* Godr. & Gren. 160.  
*Crambe* L. 350, 105.  
     *maritima* L. 105.  
**CRASSULACEÆ** Juss. 138, 295.  
*Crataegus* L. 278, 145.  
     *Aria* L. 144.  
     *kyrtostyla* Fingerh. 145.  
     *monogyna* Fingerh. 145.  
     *monogyna* Jacq. 145.  
     *Oxyacantha* L. 145.  
     *oxyacanthoides* Thuill. 145.  
*Crepis* L. 423, 17.  
     *biennis* L. 17.  
     *multicaulis* Led. 18.  
     *nicænsis* Balb. 17.  
     *paludosa* Mönch. 17.  
     *præmorsa* Tausch. 18.  
     *sibirica* L. 291.  
     *tectorum* L. 17.  
     *virens* L. 17.  
*Critamus Falcaria* Reich. 83.  
*Crocus* L. 16, 209.  
     *luteus* Lam. 297.  
     *vernus* All. 209.  
**CRUCIFERÆ** Juss. 99, 294.  
*Cryptogramma crispa* Br. 283.  
*Cucubalus Behen* L. 122.  
     *viscosus* L. 122.  
**CUCURBITACEÆ** Juss. 134.  
**CUPULIFERÆ** Rich. 186.  
*Cuscuta* L. 147, 43.  
     *Epilinum* Weihe. 44.  
     *Epithymum* L. 291.  
     *europæa* L. 43.  
     *halophila* Aresch. 44.  
     *halophyta* Fr. 44.  
     *Ligustri* Aresch. 44.  
     *Schkuhriana* Pfeif. 44.  
     *Trifolii* Bab. 44.  
*Cyathea fragilis* Roth. 280.  
*Cynanchum* Br. 146, 57.  
     *Vincetoxicum* Br. 57.  
*Cynoglossum* L. 102, 47.  
     *officinale* L. 47.  
*Cynosurus* L. 67, 258.  
     *cæruleus* L. 276.  
     *cristatus* L. 258.  
     *panicus* L. 275.  
**CYPERACEÆ** Juss. 231, 298.  
*Cyperus* L. 17, 231.  
     *fuscus* L. 231.  
*Cypripedium* L. 479, 208.  
     *bulbosum* L. 207.  
     *Calceolus* L. 208.  
*Cystopteris* Bernh. 530, 280.  
     *alpina* Desv. 280.  
     *fragilis* Bernh. 280.  
     *montana* Bernh. 280.  
     *regia* var. *alpina* Koch. 280.

**D.**

- Dactylis* L. 51, 258.  
     *cristata* var.  $\beta$  Wg. 267.  
     *glomerata* L. 258.  
*Danthonia decumbens* DC. 267.  
*Daphne* L. 225, 180.  
     *Mezereum* L. 180.  
*Datura* L. 119, 59.  
     *Stramonium* L. 59.  
*Daucus* L. 178, 79.  
     *Carota* L. 79.  
*Delphinium* L. 297, 95.  
     *Consolida* L. 95.  
*Dentaria* L. 369, 101.  
     *bulbifera* L. 101.  
*Dermasea nivalis* Haw. 136.  
*Dianthus* L. 251, 124.  
     *arenarius* L. 124.  
     *Armeria* L. 124.  
     *barbatus* L. 295.  
     *deltoides* L. 124.  
     *glaucus* L. 124.  
     *plumarius* Gunn. 124.  
     *prolifer* L. 124.  
     *superbus* L. 124.  
*Diapensia* L. 125, 55.  
     *lapponica* L. 55.  
*Digitalis* L. 340, 61.  
     *purpurea* L. 61.  
*Digitaria* Scop. 39, 275.  
     *ciliaris* Koel. 299.  
     *filiformis* Reich. 275.  
     *humifusa* Pers. 275.  
*Digraphis arundinacea* Trin. 277.  
*Diploaxis* DC. 374, 99.  
     *bracteata* Godr. & Gr. 99.  
     *muralis* DC. 294.  
     *tenuifolia* DC. 99.  
**DIPSACEÆ** Juss. 35.  
*Dipsacus* L. 81, 35.  
     *pilosus* L. 35.  
*Draba* L. 362, 109.  
     *alpina* L. 110.  
     *androsacea* Wg. 110.  
     *brachycarpa* Zett. 110.  
     *contorta* Ehrh. 109.  
     *doverensis* Fr. 109.  
     *glacialis* Ad. 110.  
     *hirta* Lindbl. 110.  
     *hirta* L. 109.  
     *hirta* Sm. 110.  
     *hirta* Wg. 110.  
     *incana* L. 109.

- incano-hirta* Hn. 109.  
     *lactea* Adams. 110.  
     *lapponica* DC. 110.  
     *laxa* Lindbl. 110.  
     *Liljebladii* Wallm. 110.  
     *lutea* Gilib. 109.  
     *lutescens* Hn. 110.  
     *muralis* L. 109.  
     *muricella* Wg. 110.  
     *nemorosa* L. 109.  
     *nivalis* Liljebl. 110.  
     *ochroleuca* Bunge & Led. 110.  
     *oxycarpa* Somf. 110.  
     *rupestris* Bab. 110.  
     *rupestris* Br. 110.  
     *scandinavica* Lindbl. 110.  
     *stellata* Fl.D. 110.  
     *trichella* Fr. 110.  
     *Wahlenbergii* Hn. 110.  
     *verna* L. 109.

- Dracocephalum* L. 327, 51.  
     *Ruyschiana* L. 51.  
     *thymiflorum* L. 51.

- Drosera* L. 191, 121.  
     *anglica* Sm. 121.  
     *intermedia* Hayne 121.  
     *longifolia* L. 121.  
     *obovata* Koch. 121.  
     *rotundifolia* L. 121.

**DROSERACEÆ** DC. 121.**DRUPACEÆ** L. 156.

- Dryas* L. 288, 155.  
     *octopetala* L. 155.

**E.**

- Echinochloa Crus galli* P.B. 275.  
*Echinops* L. 427, 11.  
     *sphærocephalus* L. 11.  
*Echinosperrum* Sw. 103, 47.  
     *deflexum* Lehm. 47.  
     *Lappula* Lehm. 47.  
*Echium* L. 98, 46.  
     *vulgare* L. 46.  
**ELÆAGNEÆ** Br. 180.  
*Elatine* L. 239, 133.  
     *callitrichoides* Rupr. 133.  
     *hexandra* DC. 133.  
     *Hydropiper* L. 133.  
     *orthosperma* v. Dub. 133.  
     *paludosa* var. Godr. 133.  
     *spathulata* Gorsk. 133.  
     *triandra* Schk. 133.  
**ELATINEÆ** Juss. 133.

*Elsholtzia* Willd. 311, 47.  
*cristata* L. 47.

*Elymus* L. 70, 257.  
*arenarius* L. 257.  
*caninus* L. 256.  
*europæus* L. 257.  
*geniculatus* Curt. 257.

*Elyna spicata* Schrad. 254.

**EMPETREÆ** Nutt. 171.

*Empetrum* L. 505, 171.  
*nigrum* L. 171.

*Enodium coeruleum* Gaud. 266.

*Epilobium* L. 231, 140.  
*alpinum* L. 141.  
*alsinifolium* Vill. 141.  
*angustifolium* L. 140.  
*Gesneri* Vill. 140.  
*hirsutum* L. 140.  
*Hornemanni* Reich. Beurl. 141.  
*intermedium* Reich. 140.  
*lineare* Mühl. 142.  
*montanum* L. 141.  
*nulans* Schmidt. 141.  
*origanifolium* Lam. 141.  
*palustre* L. 142.  
*parviflorum* Schreb. 141.  
*pubescens* Roth. 141.  
*purpureum* Fr. 141.  
*rivulare* Wg. 141.  
*roseum* Schreb. 141.  
*spicatum* Lam. 140.  
*sudeticum* Beurl. 141.  
*tetragonum* L. 141.  
*virgatum* Fr. 141.

*Epipactis* Crantz. 472, 206.  
*atrorubens* Hoffm. 206.  
*cordata* Sw. 206.  
*ensifolia* Sw. 205.  
*Helleborine* Cr. 206.  
*latifolia* Sw. 206.  
*longifolia* Reich. 206.  
*media* Fr. 206.  
*microphylla* Sw. 206.  
*Nidus avis* Sw. 207.  
*ovata* Sw. 206.  
*pallens* Sw. 206.  
*palustris* Cr. 206.  
*rubiginosa* Gaud. 206.  
*rubra* Wg. 205.

*Epipogium* Gmel. 470, 207.  
*aphyllum* Sw. 207.  
*Gmelini* Rich. 207.

**EQUISETACEÆ** DC. 285.

*Equisetum* L. 522, 285.  
*amphibolium* Retz. 286.  
*arvense* L. 285.

*fluviatile* L. 286.  
*hiemale* L. 286.  
*limosum* L. 286.  
*Linnaeanum* Döll. 286.  
*litorale* Kuhl. 286.  
*palustre* L. 286.  
*pratense* Ehrh. 286.  
*riparium* Fr. 286.  
*scirpoides* Michx. 287.  
*silvaticum* L. 286.  
*Telmateja* Ehrh. 300.  
*umbrosum* W. 286.  
*variegatum* All. 286.  
*verticillatum* Döll. 286.

*Erica* L. 226, 169.  
*cinerea* L. 169.  
*Tetralix* L. 169.  
*vulgaris* L. 169.

**ERICINEÆ** Juss. 168, 296.

*Erigeron* L. 454, 9.  
*acris* L. 9.  
*alpinus* L. 9.  
*canadensis* L. 290.  
*dröbachensis* Fr.-9.  
*elongatus* Led. 9.  
*elongatus* Fr. 9.  
*Mülleri* Lund. 9.  
*politus* Fr. 9.  
*rigidus* Fr. 9.  
*uniflorus* L. 10.

*Eriophorum* L. 19, 234.  
*alpinum* L. 234.  
*angustifolium* Roth. 234.  
*callithrix* Cham. 234.  
*capitatum* Host. 235.  
*Chamissonis* Mey. 235.  
*gracile* Koch. 234.  
*latifolium* Hop. 234.  
*latifolium* Sm. 234.  
*medium* Ands. 235.  
*opacum* Björnstr. 235.  
*polystachion* L. 234.  
*polystachion* Sv.B. 234.  
*pubescens* Sm. 234.  
*rufescens* Ands. 235.  
*russeolum* Fr. 235.  
*Scheuchzeri* Hop. 235.  
*triquetrum* Hop. 234.  
*vaginatum* L. 234.

*Erodium* l'Her. 382, 116.  
*cicutarium* l'Her. 116.  
*moschatum* Ait. 295.

*Erophila vulgaris* DC. 109.

*Eruca sativa* Lam. 294.

*Erucastrum* Sch. et Spen. 373, 99.  
*Pollichii* Sch. & Sp. 99.

- Ervum* L. 406, 160.  
     *hirsutum* L. 160.  
     *lens* L. 160.  
     *tetraspermum* L. 160.  
*Eryngium* L. 148, 84.  
     *maritimum* L. 84.  
*Erysimum* L. 365, 100.  
     *Alliaria* L. 101.  
     *Barbarea* L. 104.  
     *cheirantoides* L. 100.  
     *Cheiranthus* Pers. 294.  
     *hieracifolium* Fr. S.V. 101.  
     *hieracifolium* L. 100.  
     *officinale* L. 100.  
     *strictum* Koch. 101.  
*Erythraea* Pers. 117, 58.  
     *angustifolia* Wg. 58.  
     *Centaurium* Pers. 58.  
     *linariifolia* Pers. 58.  
     *litoralis* Fr. 58.  
     *pulchella* Fr. 58.  
*Euclidium syriacum* Br. 294.  
*Euonymus* L. 135, 76.  
     *europæus* L. 76.  
*Eupatorium* L. 435, 10.  
     *cannabinum* L. 10.  
*Euphorbia* L. 274, 171.  
     *Cyperissias* L. 172.  
     *Esula* L. 171.  
     *exigua* L. 172.  
     *Helioscopia* L. 172.  
     *palustris* L. 171.  
     *Peplus* L. 172.  
**EUPHORBIACEÆ** Juss. 171, 296.  
*Euphrasia* L. 333, 63.  
     *alpina* DC. 66.  
     *gracilis* Fr. 66.  
     *Odontites* L. 65.  
     *officinalis* L. 66.  
     *parviflora* Fr. 66.  
     *salisburgensis* Funk. 66.  
*Eurythalia Amarella* Ren. 58.  
     *campestris* Ren. 58.  
     *tenella* Ren. 58.

## F.

- Fagopyrum* Gærtn. 235, 173.  
     *emarginatum* Gærtn. 174.  
     *esculentum* Gærtn. 173.  
*Fagus* L. 497, 186.  
     *silvatica* L. 186.  
*Falcaria* Host. 176, 83.  
     *Rivini* Host. 83.  
*Farsetia* R.Br. 361, 108.  
     *incana* Br. 108.  
*Fedia dasycarpa* Stev. 37.  
     *mixta* Wg. 37.  
     *olitioria* Vahl. 37.  
*Festuca* L. 53, 259.  
     *arenaria* Osb. 259.  
     *arundinacea* Schreb. 259.  
     *arundinacea* Lilj. 267.  
     *aspera* MK. 261.  
     *borealis* MK. 267.  
     *bromoides* L. 260.  
     *decumbens* L. 267.  
     *donacina* Wg. 267.  
     *dumetorum* L. 260.  
     *duriuscula* Fr. 259.  
     *elator* L. 259.  
     *elator* E.B. 259.  
     *erecta* Wallr. 260.  
     *fluitans* L. 265.  
     *gigantea* Vill. 259.  
     *glauca* Fr. 260.  
     *heterophylla* Hænke. 260.  
     *inermis* DC. 260.  
     *litorea* Wg. 259.  
     *lobiacea* Huds. 258, 265.  
     *myuros* L. 299.  
     *nemorum* Leys. 260.  
     *ovina* L. 260.  
     *pinnata* Schrad. 258.  
     *pratensis* Huds. 259.  
     *rubra* L. 259.  
     *sciuroides* Roth. 260.  
     *silvatica* Vill. 259.  
     *violacea* Gaud. 260.  
*Ficaria* Hall. 305, 91.  
     *ranunculoides* Mönch. 92.  
*Filago* L. 444, 7.  
     *apiculata* Sm. 7.  
     *arvensis* L. 7.  
     *arvensis* Wg. 8.  
     *germanica* L. 7.  
     *minima* Fr. 8.  
     *montana* L. 7.  
     *pyramidalis* L. 7.  
*Fluminia* Fr. 57, 267.  
     *arundinacea* Fr. 267.  
*Fragaria* L. 284, 152.  
     *collina* Ehrh. 152.  
     *elator* Ehrh. 152.  
     *magna* Thuill. 152.  
     *vesca* L. 152.  
*Frangula vulgaris* Reich. 135.  
**Frankeniaceæ** L. 295.

*Frankenia pulverulenta* L. 295.

*Fraxinus* L. 520, 56.  
*excelsior* L. 56.

*Fritillaria* L. 200, 211.

*Meleagris* L. 211.  
*montana* Hop. 298.

*Fumana procumbens* Godr. & Gren. 118.

*Fumaria* L. 389, 98.

*bulbosa* L. 97.  
*capreolata* L. 294.  
*media* Lois. 98.  
*micrantha* Lag. 294.  
*muralis* Sond. 98.  
*officinalis* L. 98.  
*tenuiflora* Fr. 98.  
*Vaillantii* Lois. 98.  
*Wirtgeni* Koch. 98.

FUMARIACEÆ DC. 97, 294.

## G.

*Gagea* Salisb. 203, 213.

*arvensis* Schult. 214.  
*lutea* Ker. 213.  
*minima* Schult. 213.  
*polymorpha* Schultz. 213.  
*spathacea* Schult. 214.  
*stenopetala* Reich. 213.  
*villosa* Dub. 214.

*Galanthus* L. 194, 209.  
*nivalis* L. 209.

*Galatella Linosyris* Reich. 9.

*Galeobdolon* Huds. 322, 52.  
*luteum* Huds. 52.

*Galeopsis* L. 320, 53.

*bifida* Bönner. 53.  
*cannabinæ* Roth. 53.  
*Galeobdolon* L. 52.  
*Ladanum* L. 53.  
*pubescens* Bess. 53.  
*Tetrahit* L. 53.  
*versicolor* Curt. 53.

*Galium* L. 89, 38.

*Aparine* L. 39.  
*austriacum* Hn. 39.  
*boreale* L. 38.  
*elatum* Thuill. 39.  
*elongatum* Presl. 38.  
*erectum* Huds. 39.  
*hercynicum* Weig. 38.  
*infestum* Kit. 39.  
*Mollugo* L. 39.  
*murale* DC. 291.  
*multicaule* Wallr. 39.

*palustre* L. 38.

*pusillum* Wg. 39.  
*rotundifolium* L. 38.  
*saxatile* L. 38.  
*spurium* L. 39.  
*suaveolens* Wg. 38.  
*silvestre* Poll. 39.  
*tricornæ* With. 291.  
*trifidum* L. 38.  
*triflorum* Mich. 38.  
*verum* L. 39.  
*uliginosum* L. 38.

*Genista* L. 393, 166.

*anglica* L. 296.  
*germanica* L. 166.  
*pilosa* L. 166.  
*tinctoria* L. 166.

*Gentiana* L. 116, 57.

*acaulis* L. 292.  
*Amarella* L. 58.  
*aurea* L. 57.  
*campestris* L. 58.  
*Centaureum* L. 58.  
*ciliata* Gunn. 57.  
*detonsa* Rottb. 57.  
*germanica* W. 292.  
*glacialis* Vill. 58.  
*involucrata* Rottb. 57.  
*Koenigii* Gunn. 58.  
*lingulata* Ag. 58.  
*lutea* L. Fl.Su. 57.  
*nivalis* L. 57.  
*Pneumonanthe* L. 57.  
*pulchella* Sw. 58.  
*purpurea* L. 57.  
*quinquefolia* Fl.D. 57.  
*serrata* Gunn. 57.  
*tenella* Rottb. 58.  
*umbellata* MB. 57.

GENTIANEÆ Juss. 57, 292.

*Geracium paludosum* Reich. 17.  
*præmorsum* Reich. 18.

*Geranium* L. 383, 114.

*bohemicum* L. 115.  
*cicutarium* L. 116.  
*columbinum* L. 116.  
*dissectum* L. 115.  
*lucidum* L. 115.  
*macrorrhizum* L. 114.  
*molle* L. 115.  
*palustre* L. 114.  
*phæum* L. 114.  
*pratense* L. 114.  
*purpureum* Willd. 115.  
*pusillum* L. 115.  
*pyrenaicum* L. 115.  
*Robertianum* L. 115.  
*rotundifolium* L. Fl.Su. 115.  
*sanguineum* L. 114.

- silvaticum* L. 114.  
*umbrosum* Kit. 115.  
*viscidulum* Fr. 295.  
**Geum** L. 287, 155.  
   *hirtum* Wahlb. 155.  
   *hispidum* Fr. 155.  
   *hybridum* Wulf. 155.  
   *intermedium* Ehrh. 155.  
   *rivale* L. 155.  
   *urbanum* L. 155.  
*Gifola germanica* Cass. 7.  
*Githago segetum* Ledeb. 124.  
**Glaucium** Scop. 290, 97.  
   *luteum* Scop. 97.  
**Glaux** L. 96, 71.  
   *maritima* L. 71.  
**Glechoma** L. 314, 50.  
   *hederacea* L. 50.  
**Globularia** L. 77, 73.  
   *spinosa* Lam. 73.  
   *suecica* Nym. 73.  
   *Willkommii* Nym. 73.  
   *vulgaris* L. 73.  
**GLOBULARIÆ DC.** 73.  
**Glyceria** R.Br. 62, 265.  
   *algida* Hn. 266.  
   *aquatica* Wahlb. 265.  
   *aquatica* Presl. 266.  
   *conferta* Fr. 266.  
   *distans* Wg. 266.  
   *festuciformis* Heynh. 265.  
   *fluitans* Br. 265.  
   *loliacea* Godr. 265.  
   *maritima* Wg. 265.  
   *norvegica* Somf. 265.  
   *pendulina* Læst. 264.  
   *plicata* Fr. 265.  
   *remota* Fr. 265.  
   *spectabilis* MK. 265.  
**Gnaphalium** L. 442, 6.  
   *alpinum* Fl.D. 7.  
   *alpinum* L. 7.  
   *arenarium* L. 6.  
   *carpathicum* Wg. 7.  
   *dioicum* L. 7.  
   *fuscum* W. 7.  
   *germanicum* W. 7.  
   *hyperboreum* Don. 7.  
   *luteo-album* L. 6.  
   *montanum* Fl.D. 8.  
   *norvegicum* Gunn. 7.  
   *nudum* Hoffm. 6.  
   *pilulare* Wg. 6.  
   *procumbens* L. Herb. 7.  
   *supinum* L. 6.  
   *silvaticum* L. 7.  
   *uliginosum* L. 6.

- Goodyera** R. Br. 475, 205.  
   *repens* Br. 205.  
**GRAMINEÆ** Juss. 255, 299.  
**GRUINALES** L. 114, 295.  
**Gymnadenia** Br. 462, 203.  
   *albida* Rich. 203.  
   *Conopsea* Br. 203.  
   *odoratissima* Br. 203.  
**Gypsophila** L. 253, 124.  
   *arenaria* Kit. 125.  
   *fastigiata* L. 124.  
   *muralis* L. 125.  
   *serotina* Hayne 125.

## H.

- Habenaria albida* Br. 204.  
   *viridis* Br. 204.  
**Halianthus** Fr. 256, 129.  
   *peplodes* Fr. 129.  
**Halimus** Wallr. 519, 183.  
   *pedunculatus* Wallr. 183.  
   *portulacoides* Wallr. 297.  
**HALORAGEÆ** Br. 142.  
**Haloscias** Fr. 174, 81.  
   *scoticum* Fr. 81.  
**Hedera** L. 136, 77.  
   *Helix* L. 77.  
*Hedysarum Onobrychis* L. 161.  
**Heleocharis** R.Br. 23, 233.  
   *acicularis* Br. 233.  
   *multicaulis* Lindl. 233.  
   *ovata* Br. 298.  
   *palustris* Br. 233.  
   *uniglumis* Lk. 233.  
*Heleogiton fluitans* Lk. 233.  
**Helianthemum** Juss. 293, 118.  
   *Fumana* Mill. 118.  
   *obscurum* Pers. 118.  
   *ölandicum* Pers. 118.  
   *vulgare* Gärtn. 118.  
**Helichrysum** Gärtn. 441, 6.  
   *arenarium* DC. 6.  
**Helleborus viridis** L. 293.  
**Helminthia echiioides** Gärtn. 91.  
**Helosciadium** Koch. 170, 83.  
   *inundatum* Koch. 83.  
*Hepatica triloba* DC. 94.  
**Heracleum** L. 153, 79.  
   *angustifolium* L. 79.  
   *australe* Hn. 79.



- sibiricum* L. 79.  
*Sphondylium* L. och Fr. 79.  
*suecicum* Fr. 79.  
*Herminium* L. 468, 205.  
   *alpinum* Sw. 205.  
   *Monorchis* Br. 205.  
*Herniaria* L. 139, 173.  
   *glabra* L. 173.  
*Hesperis* L. 364, 100.  
   *matronalis* L. 100.  
   *inodora* L. 100.  
*Heterotrichum alpinum* Link. 12.  
*Hieracium* L. 422, 18.  
   *æstivum* Fr. 34.  
   *alpinum* L. 23.  
   *anfractum* Fr. 29.  
   *argenteum* Fr. 26.  
   *atratum* Fr. 24.  
   *aurantiacum* L. 21.  
   *auratum* Fr. 34.  
   *Auricula* L. 19.  
   *auriculæforme* Fr. 19.  
   *bifidum* Kit. 28.  
   *bifidum* Koch. 25.  
   *bifurcum* MB. 19.  
   *Blyttianum* Fr. 20.  
   *boreale* Fr. 30, 33.  
   *cæsius* Fr. 27.  
   *canescens* Schleich.? 25.  
   *cernuum* Fr. 19.  
   *commutatum* Lindeb. 24.  
   *corymbosum* Fr. 33.  
   *crocatum* Fr. 33.  
   *cymosum* L. 22.  
   *decolorans* Fr. 20.  
   *diaphanum* Fr. 28.  
   *dovreense* Fr. 31.  
   *dubium* L. 22.  
   *elatum* Fr. 32.  
   *eximium* Backh. 23.  
   *fasciculare* Fr. 27.  
   *filiforme* Lindeb. 31.  
   *flammeum* Fr. 20.  
   *floribundum* Fr. Hn. 20.  
   *floribundum* Wimm. 19.  
   *Friesii* Hn. 30.  
   *fuliginosum* Læst. 23.  
   *furcatum* Hn. 19.  
   *fusum* Fr. 20.  
   *glaucellum* Lindeb. 27.  
   *glomeratum* Fr. 22.  
   *gothicum* Fr. 30.  
   *hyperboreum* Fr. 21.  
   *lævigatum* Fr. 30.  
   *lapponicum* Fr. 29.  
   *Leontodontis* L. Faun. 34.  
   *lingulatum* Backh. 25.  
   *macranthum* Lindeb. 29.  
   *melanocephalum* Fr. 23.  
   *murorum* L. 26.  
   *Nestleri* Vill. 23.  
   *nigrescens* Fr. 24.  
   *nigrescens* W. 24.  
   *norvegicum* Fr. 29.  
   *onosmoides* Fr. 26.  
   *Oreades* Fr. 26.  
   *pallidum* Biv. 25.  
   *paludosum* L. 17.  
   *personatum* Fr. 24.  
   *Pilosella* L. 18.  
   *plumbeum* Fr. 28.  
   *præaltum* Vill. 21.  
   *prælongum* Lindeb. 32.  
   *præmorsum* L. 18.  
   *pratense* Tausch. 19.  
   *prenanthoides* Vill. 32.  
   *protractum* Fr. 31.  
   *ramosum* Kit. 34.  
   *rhaticum* Fr. 23.  
   *rigidum* Hn. 30.  
   *rigidum* Fr. 30.  
   *rupicolum* Fr. 25.  
   *sabaudum* L. 33.  
   *saxifragum* Fr. 26.  
   *Schmidtii* Tausch. 25.  
   *setigerum* Fr. 23.  
   *setigerum* Tausch. 23.  
   *sparsifolium* Lindeb. 33.  
   *stellatum* Lindeb. 20.  
   *stoloniflorum* Kit. 19.  
   *strictum* Fr. 32.  
   *subcæsius* Fr. 28.  
   *subpræaltum* Lindeb. 22.  
   *sudeticum* Sternb. 24.  
   *succicum* Fr. Hn. 20.  
   *Taraxaci* L. 34.  
   *tridentatum* Fr. 30.  
   *truncatum* Lindeb. 31.  
   *umbellatum* L. 33.  
   *vulgatum* Fr. 28.  
*Hierochloa* I. G. Gmel. 41, 277.  
   *alpina* R.S. 277.  
   *australis* R.S. 299.  
   *borealis* R.S. 277.  
   *fragrans* R.S. 277.  
   *odorata* Wg. 277.  
   *setifolia* Hn. 300.  
*Hippoglossum maritimum* Hn. 46.  
*Hippophaë* L. 507, 180.  
   *rhamnoides* L. 180.  
*Hippuris* L. 2, 143.  
   *vulgaris* L. 143.  
*Holcus* L. 44, 270.  
   *alpinus* Sv.B. 277.  
   *atropurpureus* Wg. 270.  
   *lanatus* L. 270.  
   *mollis* L. 270.  
   *odoratus* L. 277.

- Holosteum** L. 76, 128.  
     *umbellatum* L. 128.  
     *sperguloides* Lehm. 132.  
**Honkenya** *peploides* Ehrh. 129.  
**Hordeum** L. 69, 257.  
     *distichon* L. 299.  
     *maritimum* With. 257, 299.  
     *murinum* L. 257.  
     *polystichon* Döll. 299.  
     *pratense* Huds. 257.  
     *secalinum* Schreb. 257.  
**Hottonia** L. 112, 72.  
     *palustris* L. 72.  
**Humulus** L. 508, 181.  
     *Lupulus* L. 181.  
**Hutchinsia** R.Br. 353, 107.  
     *petræa* Br. 107.  
**Hyacinthus** *botryoides* L. 214.  
**HYDROCHARIDÆE** Juss. 209, 298.  
**Hydrocharis** L. 514, 209.  
     *morsus ranæ* L. 209.  
**Hydrocotyle** L. 150, 84.  
     *vulgaris* L. 84.  
**Hymenophyllum** Sm. 538, 283.  
     *tunbridgensæ* Fl.D. 283.  
     *Wilsonii* Hook. 283.  
**Hyoscyamus** L. 121, 59.  
     *niger* L. 59.  
**Hyoseris** *minima* L. 35.  
**HYPERICINÆE** DC. 117.  
**Hypericum** L. 412, 117.  
     *dubium* Willd. Sm. 117.  
     *hirsutum* L. 117.  
     *humifusum* L. 117.  
     *montanum* L. 117.  
     *perforatum* L. 117.  
     *pulchrum* L. 117.  
     *quadrangulum* L. 117.  
     *quadrangulum* Sm. 117.  
     *quadrialatum* Wg. 117.  
     *tetrapterum* Fr. 117.  
**Hypochaeris** L. 414, 34.  
     *glabra* L. 35.  
     *maculata* L. 34.  
     *radicata* L. 35.  
**Hypopitys** *glabra* Bernh. 171.  
     *multiflora* Scop. 171.
- I. J.**
- Jasione** L. 130, 43.  
     *montana* L. 43.  
     *perennis* Fr. 43.  
**Iberis** *nudicaulis* L. 107.  
     *petræa* Wg. 107.  
**Ilex** L. 91, 76.  
     *Aquifolium* L. 76.  
**Impatiens** L. 134, 111.  
     *Noli tangere* L. 111.  
**Imperatoria** L. 159, 80.  
     *Ostruthium* L. 80.  
**Intybus** *multicaulis* Fr. 18.  
     *præmorsa* Fr. 18.  
**Inula** L. 451, 8.  
     *Britannica* L. 8.  
     *Conyza* DC. 8.  
     *ensifolia* L. 8.  
     *Helenium* L. 8.  
     *Pulicaria* L. 8.  
     *salicina* L. 8.  
**IRIDÆE** Juss. 208, 297.  
**Iris** L. 15, 208.  
     *Pseudacorus* L. 208.  
     *sibirica* L. 208.  
     *squalens* L. 297.  
**Isatis** L. 348, 105.  
     *tinctoria* L. 105.  
**Isnardia** *palustris* L. 295.  
**ISOETÆE** Rich. 287.  
**Isoetes** L. 524, 287.  
     *atrovirens* Th. Fr. 287.  
     *echinospora* Dur. 287.  
     *lacustris* L. Dur. 287.  
**Isolepis** *setaceus* Br. 233.  
**JUNCACEÆ** DC. 217, 298.  
**Juncus** L. 211, 217.  
     *acutiflorus* Ehrh. 219.  
     *alpestris* Hn. 219.  
     *alpinus* Vill. 219.  
     *arcticus* W. 218.  
     *articulatus* L. 219.  
     *atratus* Fr. 219.  
     *balticus* W. 218.  
     *biglumis* L. 221.  
     *bottnicus* Wg. 220.  
     *bufonius* L. 220.  
     *bulbosus* L. 220.  
     *campestris* L. 222.  
     *capitatus* Weig. 220.  
     *castaneus* Sm. 220.  
     *compressus* Jacq. 220.  
     *conglomeratus* L. 217.  
     *diffusus* Hop. 218.  
     *effusus* L. 218.  
     *filiformis* L. 218.  
     *Gerardi* Lois. 220.  
     *glaucus* Ehrh. 218.  
     *glaucus* Wg. 218.

*Hostii* Tausch. 220.  
*inflexus* Retz. 218.  
*insulanus* Reich. 220.  
*lamprocarpus* Ehrh. 219.  
*maritimus* Lam. 218.  
*nigritellus* Koch. 219.  
*nodulosus* Wg. 219.  
*obtusiflorus* Ehrh. 219.  
*pilosus* L. 221.  
*pygmaeus* Thuill. 220.  
*silvaticus* L. 219.  
*spicatus* L. 222.  
*squarrosus* L. 220.  
*stygius* L. 221.  
*subuliflorus* Dr. 218.  
*subverticillatus* Wulf. 219.  
*supinus* Mönch. 219.  
*Tenageja* Ehrh. 298.  
*trifidus* L. 220.  
*triglumis* L. 221.  
*uliginosus* Roth. 219.  
*ustulatus* Hoppe. 219.  
*Juniperus* L. 515, 198.  
*communis* L. 198.  
*nana* Willd. 198.

## K.

*Knautia arvensis* Coult. 35.  
*Kobresia* Willd. 483, 254.  
*caricina* W. 254.  
*scirpina* W. 254.  
*Kochia* Roth. 143, 184.  
*hirsuta* Nolte 184.  
*Koeleria* Pers. 58, 267.  
*cristata* P. 299.  
*glauca* DC. 267.  
*intermedia* Ahlqu. 267.  
*Koenigia* L. 74, 178.  
*islandica* L. 178.

## L.

## LABIATÆ Juss. 47, 291.

*Lactuca* L. 419, 16.  
*muralis* Don. 16.  
*quercina* L. 290.  
*Scariola* L. 16.  
*virosa* Liljebl. 16.  
*Lælia orientalis* Reich. 105.  
*Lamium* L. 323, 52.  
*album* L. 52.

*amplexicaule* L. 52.  
*confertum* Fr. 52.  
*incisum* W. 52.  
*intermedium* Fr. 52.  
*maculatum* L. 292.  
*purpureum* L. 52.  
*Lappa* Adans. 428, 14.  
*intermedia* Lange. 15.  
*major* Gärtn. 14.  
*minor* DC. 14.  
*officinalis* Wallr. 14.  
*tomentosa* Lam. 14.  
*Lapsana* L. 425, 16.  
*communis* L. 16.  
*pusilla* Willd. 35.  
*Larrea aquatica* DC. 125.  
*Larix europæa* DC. 198.  
*Laserpitium* L. 152, 79.  
*latifolium* L. 79.  
*Lastrea cristata* Presl. 279.  
*Filix mas* Roth. 279.  
*Oreopteris* Roth. 279.  
*rigida* Presl. 280.  
*spinulosa* Presl. 279.  
*Thelypteris* Presl. 279.  
*Lathræa* L. 332, 68.  
*Squamaria* L. 68.  
*Lathyrus* L. 403, 157.  
*Aphaca* L. 296.  
*heterophyllus* L. 157.  
*latifolius* L. 157.  
*macrorrhizus* Wimm. 158.  
*maritimus* Big. 158.  
*niger* Wimm. 158.  
*palustris* L. 157.  
*platyphyllus* Retz. 157.  
*pratensis* L. 158.  
*silvestris* L. 157.  
*tuberosus* L. 157.  
*vernus* Wimm. 158.  
*Lavatera* L. 386, 112.  
*thuringiaca* L. 112.  
*Ledum* L. 245, 170.  
*grönlandicum* Retz. 170.  
*palustre* L. 170.  
*Leersia oryzoides* Sw. 299.  
*Lejogynne aizoides* Don. 136.  
*Hirculus* Don 136.  
*Lemna* L. 4, 223.  
*gibba* L. 223.  
*minor* L. 224.  
*polyrhiza* L. 223.  
*trisulca* L. 224.  
*Lens esculenta* Mönch. 166.  
**LENTIBULARIÆ Reich. 69.**

- Leontodon* L. 416, 34.  
*autumnalis* L. 34.  
*autumnalis* Fl.D. 17.  
*hastilis* L. 34.  
*hispidus* L. 34.  
*lividus* Kit. 34.  
*salinus* Poll. 34.  
*Taraxacum* L. 34.
- Leonurus* L. 321, 51.  
*Cardiaca* L. 51.  
*Galeobdolon* W. 52.
- Lepidium* L. 354, 106.  
*campestre* Br. 106.  
*didymum* L. 107.  
*Draba* L. 106.  
*latifolium* L. 106.  
*petraeum* L. 107.  
*ruderales* L. 106.  
*virginicum* L. 294.
- Lepigonum* Fr. 258, 132.  
*caninum* Less. 132.  
*fasciculare* Lönnr. 133.  
*leiospermum* Kindb. 132.  
*marginatum* Koch. 133.  
*marinum* Wahlb. 133.  
*medium* Fr. 132.  
*medium* Wahlb. 132.  
*neglectum* Kindb. 132.  
*rubrum* Fr. 132.  
*salinum* Fr. 132.  
*salinum* Hn. 132.  
*salinum* Kindb. 132.  
*sperguloides* Lehm. 132.
- Lepturus* R.Br. 68, 257.  
*filiformis* Trin. 257.  
*incurvatus* Trin. 257.
- Leucanthemum Parthenium* Godr. & Gren. 2.  
*vulgare* Lam. 2.
- Leucojum* L. 195, 209.  
*vernum* L. 209.
- Levisticum* L. 157, 79.  
*officinale* Koch. 79.  
*paludapifolium* Reich. 79.
- Libanotis* Crantz. 179, 81.  
*montana* All. 81.
- Ligusticum austriacum* L. 77.  
*Levisticum* L. 79.  
*scoticum* L. 81.
- Ligustrum* L. 6, 56.  
*vulgare* L. 56.
- LILIACEÆ** Juss. 211, 298.
- Lilium* L. 199, 211.  
*bulbiferum* L. 211.  
*Martagon* L. 211.
- Limnochloa alpina* Dr. 234.  
*cæspitosa* Reich. 234.  
*parvula* Reich. 233.  
*pauciflora* Reich. 233.
- Limosella* L. 341, 65.  
*aquatica* L. 65.  
*borealis* Less. 65.
- Linaria* Mill. 342, 61.  
*Cymbalaria* W. 292.  
*Elatine* Desf. 62.  
*minor* Mill. 62.  
*spuria* W. 292.  
*striata* DC. 62.  
*supina* Desf. 62.  
*vulgaris* Mill. 61.
- Linnæa* L. 345, 40.  
*borealis* L. 40.
- Linomyris* Cass. 436, 10.  
*vulgaris* Less. 10.
- Linum* L. 381, 116.  
*catbaticum* L. 116.  
*Radiola* L. 116.  
*usitatissimum* L. 295.
- Listera* R.Br. 473, 206.  
*cordata* Br. 206.  
*ovata* Br. 206.
- Lithospermum* L. 99, 46.  
*arvense* L. 46.  
*maritimum* Lehm. 46.  
*officinale* L. 46.
- Litorella* L. 488, 74.  
*lacustris* L. 74.
- Lobelia* L. 131, 43.  
*Dortmanna* L. 43.
- LOBELIACEÆ** Juss. 43.
- Loiseleuria procumbens* Desv. 169.
- Lolium* L. 71, 257.  
*arvense* With. 258.  
*arvense* Schrad. 258.  
*festucaceum* Lk. 258.  
*linicola* Sond. 258.  
*multiflorum* Lam. 299.  
*perenne* L. 258.  
*temulentum* L. 257.
- Lonicera* L. 132, 40.  
*coerulea* L. 40.  
*Periclymenum* L. 40.  
*Xylosteum* L. 40.
- LORANTHACEÆ** Don. 39.
- Lotus* L. 410, 162.  
*corniculatus* L. 163.  
*major* Sm. 163.  
*maritimus* L. 162.  
*siliquosus* L. 162.

- tenuifolius* Reich. 163.  
*tenuis* Kit. 163.  
*uliginosus* Schk. 162.  
*Ludwigia nitida* Spreng. 295.  
*Lunaria* L. 363, 107.  
   *annua* L. 294.  
   *rediviva* L. 107.  
*Luzula* DC. 212, 221.  
   *arctica* Bl. 222.  
   *arcuata* Wg. 222.  
   *borealis* Fr. 222.  
   *campestris* DC. 222.  
   *confusa* Lindeb. 222.  
   *conglomerata* Mielichh. 222.  
   *glabrata* Fr. 222.  
   *glabrata* Hop. 221.  
   *hyperborea* Br. 222.  
   *maxima* Desv. 221.  
   *multiflora* Lej. 222.  
   *nivalis* Spreng. Beurl. 222.  
   *parviflora* Desv. 221.  
   *pilosa* W. 221.  
   *silvatica* Gaud. 221.  
   *spadicea* DC. 222.  
   *spicata* DC. 222.  
   *Wahlenbergii* Rupr. 221.  
   *vernalis* DC. 221.  
*Lychnis* L. 264, 123.  
   *affinis* J. Vahl. 123.  
   *alpina* L. 123.  
   *apetala* L. 123.  
   *dioica* L. 123.  
   *Flos Cuculi* L. 123.  
   *Githago* Koch. 124.  
   *pratensis* Schk. 123.  
   *silvestris* Schk. 123.  
   *triflora* F.D. 123.  
   *vespertina* Sibth. 123.  
   *Viscaria* L. 123.  
*Lycium* L. 122, 58.  
   *barbarum* L. 58.  
**LYCOPODIACEÆ** Sw. 288.  
*Lycopodium* L. 525, 288.  
   *alpinum* L. 288.  
   *annotinum* L. 288.  
   *Chamæcyparissus* Al. Br. 288.  
   *clavatum* L. 288.  
   *complanatum* L. 288.  
   *inundatum* L. 288.  
   *sabinifolium* Rupr. 288.  
   *selaginoides* L. 289.  
   *Selago* L. 288.  
*Lycopsis* L. 106, 45.  
   *arvensis* L. 45.  
*Lycopus* L. 10, 49.  
   *europæus* L. 49.  
*Lysimachium* L. 110, 70.  
   *nemorum* L. 70.  
   *Numularia* L. 70.  
   *thyrsiflora* L. 71.  
   *vulgaris* L. 70.  
**LYTHRARIÆ** Juss. 140.  
*Lythrum* L. 271, 140.  
   *Salicaria* L. 140.

**M.**

- Majanthemum* Web. 86, 215.  
   *bifolium* DC. 215.  
   *Convallaria* Web. 215.  
   *stellatum* Link. 215.  
*Malachium* Fr. 265, 125.  
   *aquaticum* Fr. 125.  
*Malaxis* Sw. 476, 207.  
   *Loeselii* Sw. 207.  
   *monophyllos* Sw. 207.  
   *paludosa* Sw. 207.  
*Malva* L. 387, 113.  
   *Alcea* L. 113.  
   *borealis* Wallm. 113.  
   *fastigiata* Cav. 113.  
   *litoralis* Deth. 294.  
   *moschata* L. 113.  
   *rotundifolia* L. 113.  
   *silvestris* L. 113.  
   *vulgaris* Fr. 113.  
**MALVACEÆ** Juss. 112, 294.  
*Marrubium* L. 324, 53.  
   *vulgare* L. 53.  
**MARSILEACEÆ** R. Br. 287.  
*Marula foetida* Cass. 3.  
*Matricaria* L. 458, 2.  
   *Chamomilla* L. 2.  
   *discoidea* DC. 2.  
   *inodora* L. 2.  
   *maritima* L. 2.  
   *Parthenium* L. 2.  
   *suaveolens* L. 2.  
*Medicago* L. 409, 163.  
   *apiculata* W. 296.  
   *denticulata* W. 296.  
   *falcata* L. 163.  
   *lupulina* L. 163.  
   *media* Pers. 163.  
   *minima* Lam. 163.  
   *polymorpha* L. 163.  
   *sativa* L. 163.  
   *silvestris* Fr. 163.

- Melampyrum** L. 337, 67.  
     arvense L. 68.  
     cristatum L. 67.  
     nemorosum L. 68.  
     pratense L. 68.  
     silvaticum L. 68.  
**Melandrium** Röhl. 262, 123.  
     *affine* Hn. 123.  
     *apetalum* Fenzl. 123.  
     *crassifolium* Fr. 123.  
     *diurnum* Fr. 123.  
     *noctiflorum* Fr. 122.  
     pratense Röhl. 123.  
     silvestre Röhl. 123.  
     *vespertinum* Fr. 123.  
**Melanosinapis** DC. 368, 99.  
     communis DC. 99.  
**Melica** L. 43, 270.  
     *ciliata* L. 270.  
     *coerulea* L. 266.  
     *nutans* L. 270.  
     *uniflora* L. 270.  
**Melilotus** Adans. 407, 163.  
     alba Lam. 164.  
     arvensis Wallr. 164.  
     coerulea Lam. 296.  
     dentata Pers. 164.  
     *macrorrhiza* Pers. 164.  
     *officinalis* L. W. 163.  
     *officinalis* Lam. 164.  
     *Petitpierreana* W. 164.  
     *vulgaris* W. 164.  
**Mentha** L. 310, 47.  
     *Agardhiana* Fr. 48.  
     *Agardhiana* Hn. 48.  
     agrestis Sole 49.  
     arvensis L. 48.  
     aquatica L. 48.  
     gentilis L. 48.  
     *hirsuta* E.B. 48.  
     *lapponica* Wg. 49.  
     *litoralis* Hn. 48.  
     *nemorosa* W. 48.  
     *nepetoides* Lej. 291.  
     *odorata* Fr. 48.  
     *pratensis* Sole. 48.  
     *pubescens* W. 291.  
     *rubra* Fr. 48.  
     *sativa* L. Hn. 48.  
     *sativa* Fr. 48.  
     *silvestris* L. 47.  
     *villosa* Hn. 48.  
     viridis L. 48.  
**MENYANTHÆ** Mart. 54.  
**Menyanthes** L. 115, 54.  
     *trifoliata* L. 54.  
**Menziezia** coerulea Sm. 169.  
**Mercurialis** L. 512, 172.  
     annua L. 172.  
     Ladanum C. Hn. 296.  
     perennis L. 172.  
*Mertensia maritima* Don. 46.  
*Mespilus Cotoneaster* L. 145.  
*Micranthes hieracifolia* Don. 136.  
     *nivalis* Don. 136.  
*Microstylis monophyllos* Lindl. 208.  
**Milium** L. 32, 274.  
     effusum L. 274.  
**Mimulus moschatus** DC. 292.  
*Moehringia lateriflora* Koch. 129.  
     *trinervia* Koch. 129.  
**Molinia** Schrank. 59, 266.  
     *aquatica* Wib. 266.  
     coerulea Mönch. 266.  
     *maxima* Hn. 265.  
*Moneses grandiflora* Salisb. 170.  
**Monotropa** L. 247, 171.  
     *hirsuta* Nolte. 171.  
     *Hypophegea* Wallr. 171.  
     *Hypopitys* L. 171.  
**Montia** L. 75, 173.  
     fontana L. 173.  
     *minor* Gm. 173.  
     *ricularis* Gm. 173.  
**Moricandia arvensis** DC. 294.  
**Mulgedium** Less. 421, 15.  
     alpinum Less. 15.  
     sibiricum Less. 15.  
**Muscari** Mill. 198, 214.  
     botryoides Mill. 214.  
     racemosum Mill. 298.  
*Myagrum paniculatum* L. 105.  
     *sativum* L. 108.  
*Mühlenbergia pendula* Trin. 274.  
**Myosotis** L. 107, 45.  
     *alpestris* Schmidt. 45.  
     arvensis Hoffm. 45.  
     arvensis Reich. 45.  
     arvensis  $\beta$  Wg. 45.  
     arvensis  $\gamma$  Wg. 46.  
     caespitosa Schultz. 45.  
     *collina* Reich. 46.  
     *deflexa* Wg. 47.  
     *hispida* Schlecht. 46.  
     *intermedia* Lk. 45.  
     *Lappula* L. 47.  
     *lingulata* Schultz. 45.  
     palustris L. 45.  
     *scorpioides* L. 45.  
     silvatica Hoffm. 45.  
     stricta Lk. 45.  
     *stricta*  $\beta$  Wg. 46.  
     versicolor Sm. 45.

*Myosurus* L. 193, 92.  
     *minimus* L. 92.  
*Myrica* L. 509, 197.  
     *Gale* L. 197.  
*Myricaria* Desv. 385, 172.  
     *germanica* Desv. 172.  
**MYRICEÆ** Reich. 197.  
*Myriophyllum* L. 492, 142.  
     *alterniflorum* DC. 143.  
     *pectinatum* DC. 142.  
     *spicatum* L. 143.  
     *squamosum* Læst. 143.  
     *verticillatum* L. 142.  
*Myrrhis* Scop. 185, 77.  
     *odorata* Scop. 77.  
*Myrtillus* Gilib. 230, 168.  
     *nigra* Gilib. 168.  
     *uliginosa* Drej. 168.

## N.

**NAJADEÆ** Lk. 210.  
*Najas* L. 503, 210.  
     *flexilis* Rostk. 210.  
     *major* Roth. 210.  
     *marina* L. 210.  
**NARCISSINEÆ** Juss. 209.  
*Narcissus* L. 196, 209.  
     *poeticus* L. 209.  
     *Pseudo-narcissus* L. 209.  
*Nardosmia frigida* Cass. 11.  
     *spuria* Less. 11.  
*Nardus* L. 25, 277.  
     *stricta* L. 277.  
**NARTHECIACEÆ** Fr. 217.  
*Narthecium* Möhr. 208, 217.  
     *ossifragum* Huds. 217.  
*Nasturtium* Br. 371, 104.  
     *amphibium* Br. 104.  
     *anceps* Wg. 104.  
     *aquaticum* Wg. 104.  
     *aquaticum* Wallr. 104.  
     *Armoracia* Fr. 104.  
     *officinale* Br. 104.  
     *palustre* DC. 105.  
     *Sisifolium* Reich. 104.  
     *silvestre* Br. 104.  
*Naumburgia* Mönch. 111, 71.  
     *thyrsiflora* Reich. 71.  
*Nemocharis silvatica* Beurl. 232.  
*Neottia* L. 474, 206.  
     *latifolia* Reich. 206.

*Nidus avis* Reich. 206.  
     *repens* Sw. 205.  
*Nepeta* L. 315, 50.  
     *Cataria* L. 50.  
*Neslia* Desv. 346, 105.  
     *paniculata* Desv. 105.  
*Nigritella* Rich. 465, 204.  
     *angustifolia* Rich. 204.  
     *nigra* Reich. 204.  
*Norna borealis* Wg. 207.  
*Nuphar* Sm. 296, 86.  
     *intermedium* Led. 86.  
     *luteum* Sm. 86.  
     *minimum* Sm. 87.  
     *pumilum* DC. 86.  
*Nymphæa* L. 295, 86.  
     *alba* L. 86.  
     *biradiata* Somm. 86.  
     *lutea* L. 86.  
**NYMPHÆACEÆ** DC. 86.

## O.

*Odontites* Pers. 334, 65.  
     *litoralis* Fr. 65.  
     *rubra* Pers. 65.  
     *serotina* Drej. 65.  
     *verna* Drej. 65.  
*Oenanthe* L. 169, 81.  
     *crocata* L.Su. 83.  
     *fistulosa* L. 81.  
     *Phellandrium* Lam. 82.  
*Oenothera* L. 233, 140.  
     *biennis* L. 140.  
*Oglifa montana* Cass. 7.  
**OLEINEÆ** Link. 56.  
**ONAGRARIÆÆ** Juss. 140, 295.  
*Onobrychis* Lam. 396, 160.  
     *sativa* Gärtn. 160.  
*Onoclea crispa* Sw. 283.  
     *Struthiopteris* Sw. 283.  
*Ononis* L. 394, 167.  
     *antiquorum* L. herb. 167.  
     *arvensis* L. 167.  
     *campestris* Koch. 167.  
     *hircina* Jacq. 167.  
     *procurrens* Wallr. 167.  
     *repens* L. 167.  
     *spinosa* L. 167.  
     *spinosa* Koch. 167.  
*Onopordon* L. 429, 12.  
     *Acanthium* L. 12.

## OPHIOGLOSSÆ R. Br. 284.

Ophioglossum L. 541, 285.  
*microstichum* Ach. 285.  
*vulgatum* L. 285.

Ophrys L. 466, 204.

*alpina* L. 205.  
*Corallorhiza* L. 208.  
*cordata* L. 206.  
*Herminium* L. 205.  
*latifolia*? L. 208.  
*lilifolia* Gunn. 208.  
*Loeselii* L. 207.  
*monophyllos* L. 208.  
*muscifera* Huds. 205.  
*myodes* L. 204.  
*Nidus avis* L. 207.  
*ovata* L. 206.  
*paludosa* L. 208.  
*paludosa* Fl.D. 207.

*Oplismenus Crus galli* Kunth. 275.

## ORCHIDEÆ Juss. 201, 297.

*Orchidium arcticum* Sw. 207.

*Orchis* L. 460, 201.

*albida* Sw. 204.  
*angustifolia* Reich. 203.  
*angustifolia* Wimm. 202.  
*antropophora* Fl.D. 202.  
*bifolia* L. 204.  
*bifolia* E.B. 204.  
*Conopsea* L. 203.  
*cruenta* Müll. 202.  
*elata* Hn. 202.  
*incarnata* L. 202.  
*incarnata* Fr. 203.  
*incarnata* Hn. 203.  
*lapponica* Læst. 203.  
*latifolia* L. 202.  
*latifolia* Reich. 203.  
*laxiflora* Lam. 202.  
*maculata* L. 203.  
*majalis* Reich. 202.  
*mascula* L. 201.  
*militaris* L. 201.  
*Morio* L. 202.  
*nigra* Sw. 204.  
*obtusata* Pursh. 204.  
*odoratissima* L. 203.  
*pallens* L. 297.  
*palustris* Jacq. 202.  
*pyramidalis* L. 203.  
*Rivini* Gouan. 201.  
*sambucina* L. 202.  
*Traunsteineri* Saut. 203.  
*ustulata* L. 201.  
*viridis* Sw. 204.

*Origanum* L. 316, 49.

*vulgare* Fl.D. 48.  
*vulgare* L. 49.

*Ornithogalum* L. 201, 213.

*arvense* Pers. 214.  
*luteum* L. 213.  
*minimum* L. 214.  
*minimum*  $\beta$  Wg. 214.  
*nutans* L. 213.  
*stenopetalum* Fr. 213.  
*umbellatum* L. 213.

*Ornithopus* L. 398, 160.  
*perpusillus* L. 160.

*Orobanche* L. 331, 68.

*Cirsii* Fr. 68.  
*elatior* Sutt. 68.  
*Epithymum* DC. 293.  
*major* L. 68.  
*minor* Sutt. 293.

*Orobus* L. 402, 158.

*niger* L. 158.  
*silvaticus* L. 159.  
*tuberosus* L. 158.  
*vernus* L. 158.

*Orontium arvense* Pers. 61.

*Osmunda* L. 539, 283.

*crispa* L. 283.  
*Lunaria* L. 284.  
*regalis* L. 283.  
*Spicant* L. 283.  
*Struthiopteris* L. 283.

*Othonna palustris* L.Fl.Su. 5.

*Oxalis* L. 384, 116.

*Acetosella* L. 116.  
*corniculata* L. 295.  
*corniculata* Fl.D. 116.  
*stricta* L. 116.

*Oxycoccus* Pers. 229, 168.

*microcarpus* Turcz. 168.  
*palustris* Pers. 168.

*Oxyria* Hill. 215, 178.

*digyna* Campd. 178.  
*reniformis* Hook. 178.

*Oxytropis* DC. 401, 162.

*campestris* DC. 162.  
*lapponica* Gaud. 162.  
*pilosa* DC. 162.

## P.

*Panicum* L. 38, 275.

*Crus galli* L. 275.  
*glabrum* Gaud. 275.  
*miliaceum* L. 299.  
*sanguinale* L. 275.  
*viride* L. 275.

*Papaver* L. 289, 96.

*alpinum* Fr. 96.



- Argemone L. 96.  
 dubium L. 96.  
 nudicaule L. 96.  
 radicum Rottb. 96.  
 Rhoeas L. 96.  
 somniferum L. 96.
- PAPAVERACEÆ Juss. 96.**  
**PAPILIONACEÆ L. 157, 296.**  
 Parietaria L. 517, 181.  
   diffusa Koch. 297.  
   erecta Mert. 181.  
   officinalis L. 181.  
 Paris L. 237, 215.  
   quadrifolia L. 215.  
 Parnassia L. 188, 121.  
   palustris L. 121.
- PARONYCHIEÆ St. Hil. 173.**  
 Pastinaca L. 155, 79.  
   opaca Bernh. 79.  
   sativa L. 79.  
 Pedicularis L. 339, 67.  
   flammea L. 67.  
   flammea Fl.D. 67.  
   foliosa Gunn. 67.  
   hirsuta L. 67.  
   lapponica L. 67.  
   Oederi Vahl. 67.  
   palustris L. 67.  
   Sceptrum Carolinum L. 67.  
   silvatica L. 67.  
   versicolor Wg. 67.  
   virescens Wg. 67.
- Peplis L. 214, 140.  
   Portula L. 140.
- Peristylis viridis Lindl. 204.
- PERSONATÆ L. 60, 292.**  
 Petasites Neck. 449, 10.  
   alba Gært. 10.  
   frigida L. 11.  
   officinalis Mönch. 10.  
   spuria Reich. 11.  
   vulgaris Desf. 10.
- Peucedanum L. 154, 80.  
   Oreoselinum Mönch. 80.  
   palustre Mönch. 80.  
   salinum Pall.? 293.  
   Silaus L. 81.
- Phaca L. 400, 161.  
   alpina L. 162.  
   astragalina DC. 161.  
   campestris Wg. 162.  
   frigida L. 161.  
   lapponica Wg. 162.  
   minima Less. 161.  
   montana Wg. 162.
- oroboides DC. 161.  
   pilosa Wg. 162.
- Phalaris arenaria Huds. 277.  
   arundinacea L. 277.  
   canariensis L. 299.  
   phleoides L. 276.
- Phellandrium aquaticum L. 82.
- Phippsia algida Br. 266.
- Phleum L. 27, 276.  
   alpinum L. 276.  
   arenarium L. 277.  
   Böhmeri Wib. 276.  
   nodosum Willd. 276.  
   phalaroides Køl. 276.  
   pratense L. 276.
- Phragmites Trin. 42, 270.  
   communis Fr. 270.
- Phyllodoce Salisb. 243, 169.  
   cœrulea Salisb. 169.
- Phyteuma L. 129, 43.  
   spicatum L. 43.
- Picridium vulgare Desf. 291.
- Picris L. 417, 17.  
   hieracioides L. 17.
- Pilularia L. 523, 287.  
   globulifera L. 287.
- Pimpinella L. 166, 82.  
   magna L. 82.  
   nigra W. 82.  
   Saxifraga L. 82.
- Pinguicula L. 8, 70.  
   alpina L. 70.  
   flavescens Flörke. 70.  
   villosa L. 70.  
   vulgaris L. 70.
- Pinus L. 501, 197.  
   Abies L. 197.  
   Larix L. 197.  
   obovata Ant. 197.  
   orientalis Ed. 197.  
   Picea Parl. 197.  
   silvestris L. 197.
- Pisum L. 404, 157.  
   arvense L. 157.  
   maritimum L. 158.
- PLANTAGINEÆ Juss. 72, 293.**  
 Plantago L. 82, 73.  
   arenaria WK. 293.  
   Coronopus L. 74.  
   dubia L. 73.  
   lanceolata L. 73.  
   major L. 73.  
   maritima L. 73.  
   media L. 73.

- minor Fr. 73.  
*serraria* Retz.? 74.  
**Platanthera** Rich. 463, 204.  
*bifolia* Rich. 204.  
*brachyglossa* Reich. 204.  
*chlorantha* Cust. 204.  
*montana* Reich. 204.  
*obtusata* Lindl. 204.  
*solstitialis* Bönn. 204.  
*viridis* Reich. y. 204.  
*Pleurogyne rotata* Griseb. 292.  
*Pleurospermum* Hoffm. 173, 77.  
*austriacum* Hoffm. 77.  
**PLUMBAGINEÆ** Juss. 74.  
**Poa** L. 65, 262.  
*alpina* L. 264.  
*angustifolia* L. herb. 262.  
*angustifolia* Wg. 263.  
*annua* L. 264.  
*aquatica* L. 265.  
*arctica* Br. 262.  
*arenaria* Retz. 266.  
*aspera* Gaud. 264.  
*badensis* Gmel. 264.  
*Balfourii* Parn. 264.  
*bulbosa* L. 263.  
*cenisia* All. 262.  
*coesia* Sm. 264.  
*compressa* L. 263.  
*conferta* Bl. 264.  
*decumbens* Schrad. 267.  
*dissitiflora* RS. 262.  
*distans* L. 266.  
*fertilis* Host. 263.  
*glauca* Vahl. 264.  
*Langeana* Bl. 263.  
*laxa* Hænke 264.  
*maritima* Huds. 266.  
*nemoralis* L. 263.  
*pratensis* L. 262.  
*remota* af Fors. 265.  
*salina* Poll. 266.  
*serotina* Ehrh. 263.  
*stricta* Lindeb. 264.  
*sudetica* Hænke 263.  
*trivialis* L. 263.  
**POLEMONIACEÆ** Juss. 54.  
**Polemonium** L. 124, 54.  
*campanulatum* Th. Fr. 54.  
*cœruleum* L. 54.  
*pulchellum* Bunge. 55.  
**Polygala** L. 391, 110.  
*amara* L. 111.  
*comosa* Schk. 111.  
*depressa* Wend. 110.  
*uliginosa* Reich. 111.  
*vulgaris* L. 110.  
**POLYGALEÆ** Juss. 110.

- Polygonatum multiflorum** All. 215.  
*officinale* All. 214.  
*verticillatum* All. 214.  
**POLYONEÆ** Juss. 173, 296.  
**Polygonum** L. 236, 174.  
*amphibium* L. 174.  
*aviculare* L. 175.  
*biforme* Wg. 174.  
*Bistorta* L. 174.  
*Convolvulus* L. 175.  
*dumetorum* L. 175.  
*Fagopyrum* L. 174.  
*Hydropiper* L. 175.  
*incanum* Schmidt. 174.  
*lapathifolium* L. 174.  
*laxiflorum* Weihe, 175.  
*minus* Huds. 174.  
*mite* Schr. 174.  
*nodosum* Pers. 174.  
*Persicaria* L. 174.  
*Raji* Bab. 175.  
*Robertii* Lois. 175.  
*tataricum* L. 174.  
*viviparum* L. 174.  
**POLYPODIACEÆ** R. Br. 278.  
**Polypodium** L. 527, 278.  
*alpestre* Hop. 278.  
*calcareum* Sm. 278.  
*Callipteris* Ehrh. 279.  
*Dryopteris* L. 278.  
*Filix femina* L. 281.  
*fragile* L. 280.  
*ilvense* Sw. 280.  
*molle* Schreb. 281.  
*montanum* Sv. B. 280.  
*Phegopteris* L. 278.  
*rhæticum* L. Fr. 278.  
*Robertianum* Hoffm. 278.  
*vulgare* L. 278.  
**Polystichum** Roth. 529, 279.  
*angulare* Presl. 279.  
*cristatum* Roth. 279.  
*Filix mas* Roth. 279.  
*Lonchitis* Roth. 279.  
*Oreopteris* DC. 279.  
*rigidum* DC. 280.  
*spinulosum* DC. 279.  
*Thelypteris* Roth. 279.  
**POMACEÆ** L. 144.  
**Populus** L. 510, 187.  
*alba* L. 187.  
*alba* W. 187.  
*balsamifera* L. 187.  
*canescens* Sm. 187.  
*dilatata* Ait. 187.  
*hybrida* MB. 187.  
*monilifera* Ait. 187.  
*nigra* L. 187.

*nivea* W. 187.  
*pyramidalis* Roz. 187.  
*tremula* L. 187.  
*villosa* Lang. 187.

# PORTULACACEÆ Juss. 173.

*Potamogeton* L. 94, 224.  
*acutifolius* Lk. 226.  
*coloratus* Vabl. 225.  
*compressus* L. 227.  
*compressus* Wg. 227.  
*compressus* Hn. 227.  
*compressus* Fr. 226.  
*crispus* L. 226.  
*curvisfolius* Hn. 225.  
*decipiens* Nolte. 226.  
*fluitans* Roth. 224.  
*fluitans* Sm. 225.  
*Friesii* Rupr. 227.  
*gracilis* Fr. 227.  
*gramineus* L. 225.  
*gramineus* Wg. 225.  
*gramineus* Sm. 227.  
*heterophyllus* Schreb. 225.  
*lanceolatus* Reich. 225.  
*lanceolatus* Sm. 225.  
*laticaulis* Wg. 226.  
*lucens* L. 225.  
*marinus* L. 228.  
*mucronatus* Schrad. 227.  
*natans* L. 224.  
*nigrescens* Fr. 225.  
*nitens* Web. 225.  
*oblongus* Viv. 225.  
*obtusifolius* MK. 227.  
*Oederi* Mey. Beurl. 227.  
*pectinatus* L. 227.  
*perfoliatus* L. 226.  
*plantagineus* Ducroz. 225.  
*polygonifolius* Pourr. 224.  
*prælongus* Wulf. 226.  
*pusillus* L. 227.  
*rufescens* Schrad. 225.  
*rutilus* Wulf. 227.  
*salicifolius* Wulf. 225.  
*sparganifolius* Læst. 224.  
*spathulatus* Reich. 225.  
*Zizii* MK. 226.  
*zosteraceus* Fr. 227.  
*zosterifolius* Schum. 226.

# POTAMOGETONEÆ Fr. 224.

*Potentilla* L. 285, 152.  
*alpestris* Hall. y. 154.  
*ambigua* Gaud. 154.  
*Anserina* L. 153.  
*argentea* L. 153.  
*cinerea* Chaix. 154.  
*collina* Wih. 153.  
*collina* Lehm. Fr. 154.  
*fruticosa* L. 152.

*gelida* C. A. Mey. 154.  
*Güntheri* Pohl. 154.  
*incana* Mönch. 154.  
*inclinata* Vill. 296.  
*intermedia* L. herb. och Fr. 154.  
*maculata* Pourr. 154.  
*mixta* Nolte. 154.  
*nemorialis* Nestl. 154.  
*nivea* L. 153.  
*norvegica* L. 153.  
*opaca* L. 154.  
*pallascens* Hn. 153.  
*procumbens* Sibth. 154.  
*reptans* L. 153.  
*rupestris* L. 153.  
*salisburgensis* Hænk. 154.  
*Tormentilla* Scop. 154.  
*verna* L. 154.  
*Wiemannia* Günth. 154.

*Poterium* L. 494, 148.  
*dictyocarpum* Spach. 148.  
*Sanguisorba* L. 148.

*Prenanthes muralis* L. 16.

*Primula* L. 114, 71.  
*acualis* Jacq. 72.  
*elatior* Jacq. 71.  
*farinosa* L. 72.  
*finnmarchica* Hn. 4, 72.  
*grandiflora* Fr. 72.  
*integrifolia* Gunn. 72.  
*norvegica* Retz. 72.  
*officinalis* Jacq. 71.  
*scotica* Hook. 72.  
*sibirica* Jacq. 72.  
*stricta* Horn. 72.  
*silvestris* Scop. 72.  
*veris* L. 71.  
*veris*  $\beta$  L. 72.  
*veris*  $\gamma$  L. 72.  
*vulgaris* Bab. 72.

# PRIMULACEÆ L. 70.

*Prunella* L. 326, 50.  
*grandiflora* L. 50.  
*vulgaris* L. 50.

*Prunus* L. 276, 156.  
*avium* L. 156.  
*Cerasus* L. 156.  
*domestica* L. 156.  
*insititia* L. 156.  
*Padus* L. 157.  
*spinosa* L. 156.

*Psamma* P.B. 30, 70.  
*arenaria* R.S. 270.  
*baltica* R.S. 271.

*Pteris* L. 534, 282.  
*aquilina* L. 282.  
*crispa* Sm. 283.

*Puccinellia distans* Parl. 266.  
*maritima* Parl. 266.

*Pulicaria* Gärtn. 450, 8.  
*vulgaris* Gärtn. 8.

*Pulmonaria* L. 101, 46.  
*angustifolia* L. 46.  
*azurea* Bess. 46.  
*maritima* L. 46.  
*officinalis* L. 46.

*Pulsatilla* Mill. 301, 94.  
*Hackelii* Bot. N. 94.  
*nigricans* Störk. 94.  
*patens* Mill. 94.  
*pratensis* Mill. 94.  
*vernalis* Mill. 94.  
*Wolfgangiana* Bess. 94.  
*vulgaris* Mill. 94.

*Pyrethrum inodorum* Sm. 2.  
*Parthenium* Sm. 2.

*Pyrola* L. 246, 170.  
*chlorantha* Sw. 170.  
*media* Sw. 170.  
*minor* L. 170.  
*rosea* Sm. 170.  
*rotundifolia* Fl.D. 170.  
*rotundifolia* L. 170.  
*secunda* L. 170.  
*umbellata* L. 171.  
*uniflora* L. 170.

*Pyrus* L. 280, 144.  
*Aria* Sv.B. 144.  
*Aria* Willd. 144.  
*communis* L. 144.  
*Malus* L. 144.

## Q.

*Quercus* L. 496, 186.  
*intermedia* Don. 186.  
*pedunculata* Ehrh. 186.  
*Robur* L. 186.  
*sessiliflora* Salisb. 186.

## R.

*Radiola* Roth. 92, 116.  
*linoides* Roth. 116.  
*millegrana* Sm. 116.  
**RANUNCULACEÆ** Juss. 87, 293.  
*Ranunculus* L. 306, 87.  
*aconitifolius* L. 87.  
*acris* L. 89.  
*altaicus* Lax. 88.  
*aquatilis* L. 90.

*arvensis* L. 90.  
*auricomus* L. 88.  
*bulbosus* L. 89.  
*caespitosus* Thuill. 90.  
*cassubicus* L. 88.  
*divaricatus* Schrank. 90.  
*Drouetii* Schultz. 91.  
*Ficaria* L. 91.  
*Flammula* L. 87.  
*Friesii* Godr. & Gren. 89.  
*Friesii* Beurl. 91.  
*glacialis* L. 87.  
*hederaceus* L. 91.  
*hirsutus* Curt. 89.  
*hyperboreus* Rottb. 88.  
*illyricus* L. 90.  
*Kochii* Beurl. 91.  
*lanuginosus* L.? 293.  
*lapponicus* L. 87.  
*Lingua* L. 87.  
*nemorosus* DC. 89.  
*nivalis* L. 88.  
*ophioglossifolius* Vill. 87.  
*paucistamineus* Tausch. 90.  
*pellatus* Schrank. 91.  
*Philonotis* Ehrh. 89.  
*platanifolius* Godr. 87.  
*polyanthemus* L. 89.  
*pygmaeus* Wg. 88.  
*repens* L. 89.  
*reptans* L. 87.  
*sceleratus* L. 90.  
*silvaticus* Thuill. 89.  
*Stevani* Andr. 89.  
*sulphureus* Fr. 88.  
*tripartitus* Nolte 91.

*Raphanistrum innocuum* Mönch. 105.  
*segetum* Reich. 105.

*Raphanus* L. 380, 105.  
*maritimus* Sm. 294.  
*Raphanistrum* L. 105.  
*sativus* L. 294.

*Rapistrum paniculatum* Gärtn. 105.

*Reseda* L. 273, 85.  
*lutea* L. 293.  
*Luteola* L. 85.  
*phyteuma* L. 293.

**RESEDACEÆ** DC. 85, 293.

**RHAMNEÆ** R.Br. 135.

*Rhamnus* L. 137, 135.  
*cathartica* L. 135.  
*Frangula* L. 135.

*Rheum* L. 296.  
*digynum* Wg. 178.  
*Rhaponticum* L. 296.

*Rhinanthus* L. 336, 66.  
*Alectrolophus* Poll. 66.

- alpinus* Baumg. 66.  
*Crista Galli* L. 66.  
*hirsutus* Lam. 66.  
*major* Ehrh. 66.  
*minor* Ehrh. 66.  
*Rhodiola* L. 511, 138.  
   *rosea* L. 138.  
*Rhododendrum* L. 244, 169.  
   *lapponicum* Wg. 169.  
*Rhynchospora* M. Vahl. 22, 231.  
   *alba* Vahl. 231.  
   *fusca* Vahl. 232.  
*Rhytispermum arvense* Lk. 46.  
*Ribes* L. 138, 134.  
   *alpinum* L. 135.  
   *Grossularia* L. 134.  
   *nigrum* L. 134.  
   *petraeum* Wulf. 135.  
   *rubrum* L. 135.  
**RIBESIACEÆ** Reich. 134.  
*Rochelia Lappula* Röm. 147.  
*Roripa amphibia* Bess. 104.  
   *palustris* Bess. 105.  
*Rosa* L. 282, 146.  
   *Acharii* Billb. 146.  
   *alpina* L. 148.  
   *arvensis* L. 296.  
   *canina* L. 146.  
   *carelica* Fr. 147.  
   *cinerea* Sw. 147.  
   *cinnamomea* L. 147.  
   *collina* Fr. 146.  
   *collina* Wg. 146.  
   *coriifolia* Fr. 146.  
   *crassifolia* Wallm. 147.  
   *dumetorum* Thuill. 146.  
   *Eglanteria* L. 146.  
   *fluvialis* Fl.D. 147.  
   *inermis* Mill. 148.  
   *inodora* Fr. 146.  
   *laxa* Retz. 296.  
   *majalis* Retz. 147.  
   *mollissima* Fr. 147.  
   *pimpinellifolia* L. 147.  
   *pomifera* Fr. 147.  
   *rubiginosa* L. 146.  
   *sarmentacea* Sw. 146.  
   *senticosa* Achar. 146.  
   *spinosissima* L. & Wg. 147.  
   *spinosissima* Sm. 148.  
   *suavifolia* Lightf. 146.  
   *Swarzii* Sv.B. 146.  
   *tomentosa* Sm. 147.  
   *venosa* Sw. 146.  
   *villosa* L. 147.  
   *villosa* Ed.9. 147.  
*Rotboellia incurvata* L. 257.  
**RUBIACEÆ** Juss. 37, 291.  
*Rubus* L. 283, 149.  
   *affinis* Weih. 149.  
   *arcticus* L. 152.  
   *cæsius* L. 151.  
   *castoreus* Læst. 152.  
   *Chamæmorus* L. 152.  
   *corylifolius* Sm. 151.  
   *discolor* Weih. 150.  
   *fruticosus* L. 149.  
   *glandulosus* Bell. 150.  
   *horridus* Hn. 150.  
   *ideus* L. 149.  
   *infestus* Hn. 150.  
   *nemorosus* Hay. 151.  
   *plicatus* Weihe. 149.  
   *pruinosis* Arrh. 151.  
   *Radula* Weih. 150.  
   *saxatilis* L. 151.  
   *suberectus* Anders. 149.  
   *tæniarum* Lindeb. 150.  
   *thyrsoides* Wimm. 150.  
   *triflorus* Hook. 152.  
   *umbrosus* Weih. 150.  
   *vulgaris* Arrh. 150.  
   *Wahlbergii* Arrh. 151.  
*Rumex* L. 216, 175.  
   *Acetosa* L. 178.  
   *Acetosella* L. 178.  
   *acutus* L. 176.  
   *acutus* Sv.B. 178.  
   *acutus* Wg. 178.  
   *aquaticus* Fr. 178.  
   *aquaticus* L. herb. 177.  
   *Arisfolius* All. 178.  
   *aureus* With. 176.  
   *conglomeratus* Murr. 176.  
   *conspersus* Hn. 177.  
   *crispus* L. 177.  
   *cristatus* Wallr. 176.  
   *digynus* L. 178.  
   *divaricatus* Fr. 176.  
   *domesticus* Hn. 177.  
   *Friesii* Aresch. 177.  
   *Friesii* Godr. & Gren. 176.  
   *gentilis* Lönner. 176, 177.  
   *Hippolapathum* Fr. 177.  
   *Hydrolapathum* Huds. 178.  
   *longifolius* DC. 177.  
   *maritimus* L. 175.  
   *maximus* Schreb. 177.  
   *Nemolapathum* Ehrh. 176.  
   *Nemolapathum* Wg. Fr. 176.  
   *nemorosus* Schrad. 176.  
   *obtusifolius* L. 176.  
   *obtusifolius* Wallr. 176.  
   *palustris* Sm. 176.  
   *Patientia* L. 296.  
   *platyphyllus* F. Aresch. 177.  
   *propinquus* Aresch. 177.

*sanguineus* L. 176.  
*scutatus* L. 178.  
*silvestris* Wallr. 176.  
*Steinii* Beck. 176.  
*subhastatus* Lindgr. 178.  
*thyrsiflorus* Fr. 178.  
*thyrsoides* Desf. 178.

*Ruppia* L. 95, 228.  
*brachypus* Gay. 228.  
*maritima* Hn. 228.  
*maritima* L. 228.  
*rostellata* Koch. 228.  
*spiralis* L. herb. 228.

## S.

*Sabulina viscosa* Reich. 130.

*Sagina* L. 268, 130.

*apetala* L. v. *cæspitosa* Aresch. 131.  
*apetala* Wg. 131.  
*ciliata* Fr. 131.  
*maritima* Don. 131.  
*nivalis* Lindbl. 130.  
*nodosa* Fenzl. 130.  
*procumbens* L. 131.  
*saxatilis* Wimm. 131.  
*stricta* Fr. 131.  
*subulata* Presl. 130.

*Sagittaria* L. 491, 216.

*sagittifolia* L. 216.

## SALICINEÆ 187.

*Salicornia* L. 1, 185.

*biennis* Afz. 185.  
*fruticosa* Retz. 185.  
*herbacea* L. 185.  
*prostrata* Osb. 185.

*Salix* L. 504, 188.

*acutifolia* Horn. 189.  
*acutifolia* W. 189.  
*alba* L. 188.  
*alpestris* Ands. 194.  
*Amanda* Ands. 190.  
*ambigua* Ehrh. 191.  
*amygdalina* L. 189.  
*angustifolia* Ed. 9. 192.  
*appendiculata* Vahl. 190.  
*arbuscula* L. 194.  
*arenaria* L. 190, 192.  
*aurita* L. 191.  
*aurora* Læst. 192.  
*bicolor* Fr. 192.  
*bicolor* Koch. 193.  
*borealis* Fr. 193.  
*canescens* Fr. 190.  
*caprea* L. 191.  
*chrysantha* Vahl. 190.

*cinerea* L. 191.  
*cinerea* Sv. B. 191.  
*cuspidata* Schultz. 188.  
*daphnoides* Vill. 189.  
*depressa* L. och Ed. 9. 192.  
*finnmarchica* Fr. 191.  
*fragilis* L. 188.  
*Friesiana* Ands. 192.  
*fusca* Fr. 193.  
*fusca* L. 192.  
*glauca* L. 190.  
*grandifolia* Ser. 191.  
*Hartmaniana* Ands. 190.  
*hastata* L. 193.  
*herbacea* Liljebl. 194.  
*herbacea* L. 194.  
*hirtula* Ands. 192.  
*hyperborea* Fr. 193.  
*incubacea* Fr. 191.  
*incubacea* L. 192.  
*Læstadiana* Hn. 190.  
*lanata* L. 190.  
*lanceolata* Fr. 190.  
*Lapponum* L. 190.  
*latifolia* Forb. 193.  
*laurina* Sm. 193.  
*limosa* Wg. 190.  
*livida* Wg. 192.  
*majalis* Wg. 193.  
*malifolia* Sm. 193.  
*mollissima* Ehrh. 189.  
*mollissima* Sm. 190.  
*mysrinites* L. 193.  
*mysrinitoides* Fr. 193.  
*myrtilloides* L. 192.  
*myrtoides* Fr. 193.  
*nigricans* Sm. 193.  
*Normani* Ands. 194.  
*ovata* Ser. 194.  
*paludosa* Hn. 191.  
*pentandra* L. 188.  
*phæophylla* Ands. 190.  
*phylicifolia* L. 193.  
*plicata* Fr. 191.  
*polaris* Wg. 194.  
*punctata* Wg. 193.  
*purpurea* L. 189.  
*pyrenaica* \* *norv.* Fr. 194.  
*repens* L. 192.  
*reticulata* L. 194.  
*reticuloides* Ands. 193.  
*retusa* \* *sarm.* Fr. 194.  
*rosmarinifolia* L. 192.  
*rubra* Huds. 189.  
*rugulosa* Ands. 191.  
*sarmentacea* Fr. 194.  
*silesiaca* Fr. 193.  
*Smithiana* W. 189.  
*Sommerfeltii* Ands. 194.  
*spathulata* W. 191.  
*sphacelata* Somft. 192.

- tenuifolia* Fr. 193.  
*triandra* L. 188.  
*undulata* Ehrh. 189.  
*vagans* Ands. 191.  
*Wahlenbergii* Ands. 193.  
*versifolia* Wg. 192.  
*Wichura* Ands. 193.  
*viminalis* L. 189.  
*viridis* Fr. 188.  
*Ångströmiana* Ands. 190.  
*Salsola* L. 144, 185.  
   *hirsuta* L. 184.  
   *Kali* L. 185.  
*Salvia* L. 11, 49.  
   *pratensis* L. 49.  
   *verticillata* L. 292.  
*Sambucus* L. 187, 36.  
   *Ebulus* L. 36.  
   *nigra* L. 36.  
   *racemosa* L. 291.  
*Samolus* L. 127, 71.  
   *Valerandi* L. 71.  
*Sanguisorba* L. 84, 148.  
   *officinalis* L. 148.  
*Sanicula* L. 149, 83.  
   *europæa* L. 83.  
**SANTALACEÆ** Br. 179, 296.  
*Saponaria* L. 252, 124.  
   *officinalis* L. 124.  
*Sarothamnus* Wimm. 392, 166.  
   *scoparius* Koch. 166.  
   *vulgaris* Wimm. 166.  
*Satureja* *hortensis* L. 292.  
*Satyrion albidum* L. 204.  
   *bifolium* Wg. 204.  
   *conopseum* Wg. 203.  
   *Epipogium* L. 207.  
   *nigrum* L. 204.  
   *odoratissimum* Wg. 203.  
   *repens* L. 205.  
   *viride* L. 204.  
*Saussurea* DC. 434, 12.  
   *alpina* DC. 12.  
*Saxifraga* L. 249, 135.  
   *adscendens* L. 137.  
   *aizoides* L. 136.  
   *Aizoon* Jacq. 136.  
   *autumnalis* L. 136.  
   *bulbifera* Gunn. 137.  
   *cæspitosa* L. 137.  
   *cernua* L. 137.  
   *controversa* Sternb. 137.  
   *Cotyledon* L. 135.  
   *decipiens* Ehrh. 137.  
   *granulata* L. 137.  
   *hieracifolia* Kit. 136.  
   *Hirculus* L. 136.  
   *hypnoides* Hn. 137.  
   *nivalis* L. 136.  
   *oppositifolia* L. 136.  
   *petræa* Gunn. 137.  
   *rivularis* L. 137.  
   *stellaris* L. 136.  
   *stricta* Chr. Sm. 136.  
   *tridactylites* L. 137.  
   *umbrosa* L. 295.  
**SAXIFRAGEÆ** Juss. 135, 295.  
*Scabiosa* L. 80, 36.  
   *arvensis* L. 35.  
   *Columbaria* L. 36.  
   *suaveolens* Desf. 36.  
   *Succisa* L. 35.  
*Scandix* L. 184, 78.  
   *Anthriscus* L. 78.  
   *Ceræfolium* L. 78.  
   *odorata* L. 78.  
   *Pecten* L. 78.  
   *temulenta* Wg. 78.  
*Sceptrum* Rudb. 338, 66.  
   *Carolinum* Rudb. 66.  
*Schedonorus* PB. Fr. 52, 260.  
   *asper* Fr. 260.  
   *erectus* Fr. 260.  
   *inermis* RS. 260.  
   *longiflorus* Fr. 299.  
   *serotinus* (Ben.) 261.  
   *sterilis* Fr. 261.  
   *suberectus* Fr. 260.  
   *tectorum* Fr. 261.  
*Scheuchzeria* L. 219, 216.  
   *palustris* L. 216.  
*Schmidtia subtilis* Tratt. 275.  
*Schoberia* C. A. M. 142, 185.  
   *maritima* Mey. 185.  
*Schoenus* L. 18, 231.  
   *albus* L. 232.  
   *compressus* L. 232.  
   *ferrugineus* L. 231.  
   *fuscus* L. 232.  
   *Mariscus* L. 231.  
   *nigricans* L. 231.  
   *rufus* Huds. 232.  
*Schollera Oxycoccus* Roth. 168.  
*Scilla italica* L. 298.  
   *verna* Huds. 298.  
*Scirpus* L. 24, 232.  
   *acicularis* L. 234.  
   *Bæothryon* Ehrh. 233.  
   *Bellardi* Wg. 254.  
   *cæspitosus* L. 234.  
   *Caricis* Hn. 232.

- carinatus* Sm. 232.  
*compressus* Pers. 232.  
*Duwalii* Hop. 232.  
*fluitans* L. 233.  
*glaucus* Sm. 232.  
*lacustris* L. 232.  
*maritimus* L. 232.  
*multicaulis* Sm. 233.  
*nanus* Wallr. 233.  
*palustris* L. 233.  
*parvulus* Röm. 233.  
*pauciflorus* Lightf. 233.  
*rufus* Schrad. 232.  
*setaceus* L. 233.  
*silvaticus* L. 232.  
*supinus* Sw. 233.  
*Tabernaemontani* Gmel. 232.
- Scleranthus* L. 248, 173.  
*annuus* L. 173.  
*biennis* Fr. 173.  
*perennis* L. 173.  
*verticillatus* Tausch. 173.
- Sclerochloa Borreri* Bab. 266.  
*Scolochloa festucacea* Lk. 267.
- Scolopendrium* Sm. 533, 282.  
*Lingua* Sv.B. 282.  
*officinatum* Sw. 282.  
*Phyllitis* Roth. 282.  
*vulgare* Sm. 282.
- Scorzonera* L. 414, 16.  
*hispanica* L. 291.  
*humilis* L. 16.  
*plantaginea* Schleich. 17.
- Scrophularia* L. 344, 61.  
*alata* Gil. 292.  
*Ehrharti* Stev. 292.  
*nodosa* L. 61.  
*vernalis* L. 61.
- Scutellaria* L. 325, 50.  
*galericulata* L. 50.  
*hastifolia* L. 50.
- Secale cereale* L. 299.
- Sedum* L. 269, 138.  
*acre* L. 139.  
*album* L. 139.  
*anglicum* Huds. 139.  
*annuum* L. 139.  
*balticum* C. Hn. 139.  
*boloniense* Godr. & Gr. 139.  
*dasyphyllum* L. 295.  
*hybridum* L. 295.  
*maximum* Koch. 138.  
*purpurascens* Koch. 138.  
*purpureum* Fr. 138.  
*reflexum* Koch. 139.  
*Rhodiola* DC. 138.  
*rubens* Fl.D. 139.
- rupestre* Fl.D. 139.  
*rupestre* L. 139.  
*sexangulare* L. 139.  
*Telephium* L. 138.  
*villosum* L. 139.
- Selaginella* Spring. 526, 289.  
*spinulosa* Al. Br. 289.
- Selinum* L. 161, 80.  
*Carvifolia* L. 80.  
*Gmelini* Bray. 81.  
*lineare* Schum. 81.  
*Oreoselinum* L. 80.  
*palustre* L. 80.
- Sempervivum* L. 275, 138.  
*tectorum* L. 138.
- Senebiera* Poir. 349, 107.  
*Coronopus* Poir. 107.  
*didyma* Pers. 107.
- Senecio* L. 447, 5.  
*aquaticus* Murr. 5.  
*campestris* DC. 5.  
*crassifolius* W. 290.  
*erraticus* Bert. 5.  
*erucifolius* L. 5.  
*Jacobæa* L. 5.  
*paludosus* L. 5.  
*palustris* DC. 5.  
*saracenicus* L. 290.  
*silvaticus* L. 6.  
*tenusifolius* Retz. Jacq. 5.  
*vernalis* W.K. 6.  
*viscosus* L. 6.  
*vulgaris* L. 6.
- SENTICOSÆ L. 146, 296.
- Serapias ensifolia* Wg. 205.  
*grandiflora* L. 205.  
*grandiflora* Scop. 206.  
*Helleborine* L. 206.  
*Helleborine*  $\beta$  L. 205.  
*latifolia* Fl.D. 206.  
*latifolia* L. 206.  
*longifolia* L. 206.  
*rubra* L. 205.
- Serratula* L. 433, 12.  
*alpina* L. 12.  
*arvensis* L. 14.  
*tinctoria* L. 12.
- Sesleria* Scop. 66, 275.  
*coerulea* Ard. 275.
- Setaria* PB. 37, 275.  
*verticillata* PB. 299.  
*viridis* PB. 275.
- Sherardia* L. 87, 37.  
*arvensis* L. 37.
- Sibbaldia* L. 192, 155.  
*procumbens* L. 155.



- Silaus* Bess. 158, 81.  
*pratensis* Bess. 81.  
**SILENACEÆ** Br. 122, 295.  
*Silene* L. 254, 122.  
*acaulis* L. 122.  
*Armeria* L. 295.  
*gallica* L. 295.  
*inflata* Sm. 122.  
*infracta* Kit. 122.  
*maritima* With. 122.  
*noctiflora* L. 122.  
*nutans* L. 122.  
*rupestris* L. 122.  
*viscosa* Pers. 122.  
*Sinapis* L. 378, 99.  
*alba* L. 99.  
*arvensis* Fl.D. 105.  
*arvensis* L. 99.  
*nigra* L. 99.  
*tenuifolia* Sv.B. 100.  
*Sison inundatum* L. 83.  
*Sisymbrium* L. 379, 100.  
*Alliaria* Koch. 101.  
*amphibium* L. 104.  
*anceps* Wg. 105.  
*arenosum* L. 103.  
*Erucastrum* Poll. 99.  
*Irio* L. 294.  
*islandicum* Fl. D. 105.  
*Loeselii* L. 100.  
*Nasturtium* L. 104.  
*officinale* Scop. 100.  
*Sophia* L. 100.  
*supinum* L. 100.  
*silvestre* L. 104.  
*tenuifolium* L. 100.  
*Thalianum* Koch. 103.  
*Sium* L. 175, 83.  
*angustifolium* L. 83.  
*Falcaria* L. 83.  
*latifolium* L. 83.  
*nodiflorum* L. 83.  
*Smilacina* Desf. 205, 215.  
*stellata* Desf. 215.  
**SOLANACEÆ** Juss. 58, 292.  
*Solanum* L. 123, 59.  
*Dulcamara* L. 59.  
*nigrum* L. 59.  
*humile* Bernh. 59.  
*miniatum* W. 59.  
*tuberosum* L. 292.  
*villosum* Lam. 59.  
*Solidago* L. 452, 10.  
*virgaurea* L. 10.  
*Sonchus* L. 420, 15.  
*alpinus* L. 15.  
*arvensis* L. 15.  
*asper* Vill. 15.  
*coeruleus* Sm. 15.  
*fallax* Wallr. 16.  
*oleraceus* L. 15.  
—  $\gamma$  &  $\delta$  L. Fl.Su. 16.  
*palustris* L. 15.  
*sibiricus* L. 15.  
*Sorbus* L. 279, 144.  
*ambigua* L. herb. 145.  
*Aria* Cr. 144.  
*Aucuparia* L. 145.  
*fennica* Kalm. 145.  
*hybrida* L. 144.  
*scandica* Fr. 144.  
*Soyeria paludosa* Godr. 17.  
*Sparganium* L. 486, 229.  
*affine* Schnitzl. 230.  
*angustifolium* Mich. 231.  
*boreale* Læst. 230.  
*erectum* L. 229.  
*erectum* Wg. 230.  
*fluitans* Fr. 230.  
*Friesii* Beurl. 230.  
*glomeratum* Læst. 230.  
*hyperboreum* Læst. 231.  
*longifolium* Turcz. 230.  
*minimum* Fr. 230.  
*natans* L. 230.  
*oligocarpon* Ångstr. 230.  
*ramosum* Huds. 229.  
*simplex* Huds. 230.  
*vaginatum* Larsson. 230.  
*Spartium scoparium* L. 166.  
*Spathularia stellaris* Haw. 136.  
*Spergella* Reich. 130.  
*Spergula* L. 267, 131.  
*arvensis* L. 131.  
*arvensis* Sv.B. 132.  
*laricina* Fl.D. 130.  
*Linnaei* Ledeb. 131.  
*Morisonii* Bor. 132.  
*nodosa* L. 130.  
*pentandra* L. 132.  
*Sagina* Sw. 131.  
*saginoidea* Blytt. 131.  
*saginoidea* Osb. 130.  
*saginoidea* Sw. 131.  
*stricta* Sw. 130.  
*subulata* Sw. 130.  
*vernalis* W. 132.  
*Spergularia media* Pers. Hn. 133.  
*rubra* Pers. 132.  
*salina* Presl. 132.  
*Spiræa* L. 281, 155.  
*Filipendula* L. 155.  
*salicifolia* L. 155.  
*Ulmaria* L. 155.

*Spirodela polyrrhiza* Schleid. 223.

*Stachys* L. 319, 51.

*alpina* L. 292.

*ambigua* Sm. 51.

*arvensis* L. 52.

*palustris* L. 52.

*palustri-silvatica* Schiede. 52.

*silvatica* L. 51.

*Statice* L. 190, 74.

*Armeria* E.B. 75.

*Armeria* L. 74.

*Bahusiensis* Fr. 74.

*Behen* Drej. 74.

*Limonium* L. & Hn. 74.

*maritima* Mill. 75.

*rariflora* Drej. 74.

*Staurogeton trisulcus* Schleid. 224.

*Stellaria* L. 255, 125.

*alpestris* Fr. 126.

*biflora* L. 130.

*borealis* Big. 126.

*cerastioides* L. 127.

*crassifolia* Ehrh. 126.

*Dilleniana* Mönch. 126.

*Edwardsii* Br. 126.

*Friesiana* Ser. 126.

*glauca* With. 126.

*graminea* L. 126.

*Holostea* L. 125.

*humifusa* Rottb. 127.

*longifolia* Fr. 126.

*longipes* Gold. 125.

*media* With. 125.

*neglecta* Weih. 125.

*nemorum* L. 125.

*palustris* Retz. 126.

*uliginosa* Murr. 126.

*Stenhammaria* Reich. 100, 46.

*maritima* Reich. 46.

*Stipa* L. 36, 274.

*penpata* L. 274.

*Stratiotes* L. 513, 209.

*aloides* L. 209.

*Streblidia ferruginea* Lk. 231.

*nigricans* Beurl. 231.

*Struthiopteris* Willd. 537, 282.

*germanica* W. 282.

*Sturmia* Reich. 477, 207.

*Loeselii* Reich. 207.

*Subularia* L. 357, 107.

*aquatica* L. 107.

*Succisa* Mönch. 79, 35.

*pratensis* Mönch. 35.

*Sueda hirsuta* Reich. 84.

*Swertia sulcata* L. 292.

*Symphytum* L. 104, 44.

*aspermum* MB. 291.

*officinale* L. 44.

*orientale* L. 44.

*patens* Fr. 44.

*patens* Sibth. 44.

*uplandicum* Nym. 44.

SYNANTHEREÆ Rich. 1, 290.

*Syringa* L. 5, 56.

*vulgaris* L. 56.

## T.

TAMARISCINEÆ Desf. 172.

*Tamarix germanica* L. 173.

*Tanacetum* L. 439, 3.

*boreale* Fisch. 3.

*vulgare* L. 3.

*Taraxacum* L. 418, 34.

*corniculatum* Kit. 34.

*lævigatum* Fr. 34.

*obliquum* Fr. 34.

*officinale* Web. 34.

*palustre* Sm. 34.

*Taxus* L. 516, 198.

*baccata* L. 198.

*Teesdalia* Br. 352, 107.

*nudicaulis* Br. 107.

*Telmatophace gibba* Schl. 224.

*Tetragonolobus* Roth. 411, 162.

*siliquosus* Roth. 162.

*Teucrium* L. 312, 53.

*Scordium* L. 53.

*Scorodonia* L. 53.

*Thalictrum* L. 300, 92.

*alpinum* L. 92.

*angustifolium* Jacq. 92.

*aquilegifolium* L. 92.

*collinum* Fr. H.N. 93.

*flavum* L. 92.

*flexuosum* Reich. 93.

*Friesii* Rupr. 92.

*kemense* Fr. 92.

*Kochii* Fr. 93.

*majus* Wg. 92.

*minus* L. 93.

*minus* L. Gottl. Res. 93.

*rariflorum* Fr. 92.

*simplex* L. 93.

*strictum* \* *boreale* Nyl. 93.

*vulgatum* Schultz, Beurl. 93.

*Thesium* L. 97, 179.

*alpinum* L. 179.

*linophyllum* L. Fl.Su. 179, 296.

- Thlaspi* L. 356, 106.  
   *alpestre* L. 106.  
   *arvense* L. 106.  
   *brachypetalum* Jord. 107.  
   *Bursa Pastoris* L. 106.  
   *campestre* L. 106.  
   *perfoliatum* L. 106.  
   *succicum* Fl.D. 107.  
**THYMELEÆ** Juss. 180.  
*Thymus* L. 328, 49.  
   *Acinos* L. 50.  
   *Chamædrys* Fr. 49.  
   *Serpyllum* L. 49.  
*Thyselinum palustre* Hoffm. 80.  
*Tilia* L. 294, 112.  
   *europæa* L. 112.  
   *grandifolia* Ehrh. 112.  
   *intermedia* DC. 112.  
   *parvifolia* Ehrh. 112.  
   *platyphylla* Scop. 112.  
   *silvestris* Desf. 112.  
   *ulmifolia* Scop. 112.  
   *vulgaris* Hay. 112.  
**TILIACEÆ** Juss. 112.  
*Tillæa aquatica* L. 140.  
   *prostrata* Willd. 140.  
*Tofieldia* Huds. 220, 217.  
   *alpina* Sternb. 217.  
   *borealis* Wg. 217.  
   *calyculata* Wg. 217.  
   *palustris* DC. 217.  
   *palustris* Huds. 217.  
*Tordylium Anthriscus* L. 79.  
*Torilis* L. 180, 78.  
   *Anthriscus* Gmel. 78.  
   *infesta* Hoffm. 293.  
*Tormentilla erecta* L. 154.  
   *reptans* L. 154.  
*Tragopogon* L. 413, 16.  
   *crocifolius* L. 16.  
   *minor* Fr. 16.  
   *porrifolius* L. 16.  
   *pratensis* L. 16.  
*Trapa natans* L. 295.  
*Trichera* Schrad. 78, 35.  
   *arvensis* Schrad. 35.  
*Trichophorum* Pers. 20, 234.  
   *alpinum* Pers. 234.  
   *cæspitosum* Hn. 234.  
   *emergens* Norm. 234.  
*Trientalis* L. 223, 70.  
   *europæa* L. 70.  
*Trifolium* L. 408, 164.  
   *agrarium* Godr. & Gren. 165.  
   *agrarium* L. 164.  
   *alpestre* L. 166.  
   *arvense* L. 165.  
   *aureum* Poll. 164.  
   *campestre* Schreb. 165.  
   *filiforme* L. 165.  
   *fliforme* Raj. 165.  
   *flexuosum* Jacq. 166.  
   *fragiferum* L. 165.  
   *hybridum* L. 165.  
   *incarnatum* L. 296.  
   *medium* L. 166.  
   *Melilotus* L. 164.  
   *minus* Smith. 165.  
   *montanum* L. 165.  
   *pratense* L. 166.  
   *procumbens* Godr. & Gren. 165.  
   *procumbens* L. 164.  
   *procumbens* Schreb. 165.  
   *repens* L. 165.  
   *spadiceum* L. 164.  
   *striatum* L. 165.  
*Triglochin* L. 218, 217.  
   *maritimum* L. 217.  
   *palustre* L. 217.  
*Trigonella ornithopodioides* DC. 296.  
*Triodia* R.Br. 56, 267.  
   *decumbens* PB. 267.  
*Tripleurospermum inodorum* Sch. 2.  
*Trisetum* Pers. 46, 268.  
   *agrostideum* Fr. 268.  
   *flavescens* PB. 268.  
   *subspicatum* PB. 268.  
*Triticum* L. 73, 255.  
   *acutum* DC. 255.  
   *acutum* Fr. 256.  
   *affine* Hn. 256.  
   *campestre* Godr. 256.  
   *caninum* L. 256.  
   *hebestachyum* Fr. 255, 256.  
   *junceum* L. 255.  
   *laxum* Fr. 256.  
   *obtusiusculum* Lge. 256.  
   *pinnatum* Mönch. 258.  
   *pungens* Pers. 256.  
   *repens* L. 256.  
   *rigidum* Schrad. 299.  
   *strictum* Deth. 255.  
   *violaceum* Horn. 256.  
   *vulgare* Vill. 299.  
*Trollius* L. 304, 95.  
   *europæus* L. 95.  
*Tulipa* L. 202, 211.  
   *silvestris* L. 211.  
*Tunica* Scop. 250, 124.  
   *prolifera* Scop. 124.  
*Turritis* L. 375, 103.

- alpina* Retz. 103.  
*glabra* L. 103.  
*hirsuta* L. 103.  
*Tussilago* L. 448, 11.  
*alba* L. 10.  
*Farfara* L. 11.  
*frigida* L. 11.  
*hybrida* L. 10.  
*Petasites* L. 10.  
*spuria* Retz. 11.  
*Typha* L. 485, 229.  
*angustifolia* L. 229.  
*latifolia* L. 229.  
**TYPHACEÆ** Juss. 229.

## U.

- Ulex europæus* L. 296.  
**ULMACEÆ** Ag. 180.  
*Ulmus* L. 145, 180.  
*campestris* Sm. 180.  
*ciliata* Ehrh. 180.  
*effusa* W. 180.  
*glabra* Mill. 180.  
*major* Sm. 180.  
*montana* Sm. 180.  
*pedunculata* Lam. 180.  
*suberosa* Ehrh. 180.  
**UMBELLIFERÆ** Juss. 77, 293.  
*Uncinia microglochis* Spr. 252.  
*Urtica* L. 487, 181.  
*dioica* L. 181.  
*urens* L. 181.  
**URTICACEÆ** Juss. 181, 297.  
*Utricularia* L. 9, 69.  
*Bremii* Heer. 69.  
*Grafiana* Koch. 69.  
*intermedia* Hay. 69.  
*minor* L. 69.  
*neglecta* Lehm. 69.  
*ochroleuca* R. Hn. 69.  
*pulchella* Fr. 69.  
*vulgaris* L. 69.

## V.

- Vaccinium* L. 228, 168.  
*Myrtillus* L. 168.  
*Oxycoccus* L. 168.  
*uliginosum* L. 168.  
*Vitis idæa* L. 168.

- Vahlbergella* Fr. 263, 123.  
*affinis* Fr. 123.  
*apetala* Fr. 123.  
*Vahlodea* Fr. 49, 269.  
*atropurpurea* Fr. 269.  
*Valeriana* L. 13, 36.  
*dioica* L. 36.  
*Locusta* L. 37.  
*officinalis* L. 36.  
*sambucifolia* Mik. 36.  
**VALERIANEÆ** Fr. 36, 291.  
*Valerianella* Mönch. 14, 37.  
*dentata* Poll. 37.  
*Morisonii* Koch. 37.  
*olitoria* Mönch. 37.  
*Vallisneria spiralis* L. 298.  
*Vella annua* L. 294.  
*Veratrum* L. 221, 215.  
*album* L.  $\beta$  Lobelianum Bernh. 215.  
*Verbascum* L. 120, 60.  
*bracteatum* Ag. 60.  
*collinum* Schrad. 60.  
*cuspidatum* Fl.D. 60.  
*Lychnitis* L. 61.  
*nigro-thapsiforme* Fr. 60.  
*nigrum* L. 60.  
*phlomoides* L. 60.  
*Schraderi* Koch. 60.  
*seminigrum* Fr. 60.  
*thapsiforme* Schrad. 60.  
*thapso-nigrum* Schied. 60.  
*Thapsus* L. 60.  
*Verbena* L. 309, 56.  
*officinalis* L. 56.  
**VERBENACEÆ** Juss. 56.  
*Veronica* L. 7, 62.  
*agrestis* Fl.D. 65.  
*agrestis* L. 64.  
*alpina* L. 63.  
*Anagallis* L. 64.  
*arguta* Bl. 62.  
*arguta* Schrad. 292.  
*arvensis* L. 64.  
*australis* Schrad. 63.  
*Beccabunga* L. 63.  
*Buxbaumii* Ten. 65.  
*Chamædrys* L. 63.  
*fruticulosa* Fl.D. 63.  
*hederifolia* L. 65.  
*hybrida* L. 62.  
*Linnæi* Hn. 62.  
*longifolia* L. 62.  
*maritima* L. 62.  
*media* Schrad. 62.  
*montana* L. 63.  
*neglecta* Bl. 63.

*officinalis* L. 63.  
*opaca* Fr. 64.  
*peregrina* L. 293.  
*persica* Poir. 65.  
*polita* Fr. 65.  
*præcox* All. 293.  
*saxatilis* L. jun. 63.  
*scutellata* L. 64.  
*serpyllifolia* L. 63.  
*serrulata* Hn. 62.  
*spicata* L. 62.  
*triphyllus* L. 64.  
*verna* L. 64.  
*vulgaris* K. 62.  
*Viburnum* L. 186, 36.  
*Opulus* L. 36.  
*Vicia* L. 405, 158.  
*angustifolia* Roth. 159.  
*cassubica* F.D. 159.  
*cassubica* L. 159.  
*Cracca* L. 159.  
*Cracca* Sv.B. 159.  
*dumetorum* L. 158.  
*hirsuta* Fr. 160.  
*lathyroides* L. 160.  
*Orobus* DC. 159.  
*pisiformis* L. 158.  
*sativa* L. 159.  
*segetalis* Thuill. 160.  
*sepium* L. 159.  
*silvatica* L. 159.  
*tenuifolia* Roth. 159.  
*tetrasperma* Fr. 160.  
*villosa* Roth. 159.  
*Vincetoxicum officinale* Mönch. 57.  
*Viola* L. 133, 118.  
*Allioni* Pio. 120.  
*arenaria* DC. 120.  
*arvensis* Murr. 121.  
*biflora* L. 120.  
*borealis* Weinm. 119.  
*canina* L. 120.  
*elatior* Fr. 120.  
*epipsila* Ledeb. 119.  
*fennica* Nyl. 119.  
*hirta* L. 118.  
*lactea* Fr. 120.  
*lancifolia* Thor. 120.  
*mirabilis* L. 119.  
*montana* L. 120.  
*nemoralis* Kütz. 120.  
*odorata* L. 118.  
*palustris* L. 119.  
*persicifolia* Fr. 120.

*persicifolia* Wg. 120.  
*pratensis* MK. 120.  
*scanica* Fr. 119.  
*silvatica* Fr. 119.  
*silvestris* Reich. 120.  
*stagnina* Kit. 120.  
*stricta* Horn. 120.  
*suecica* Fr. 119.  
*tricolor* L. 121.  
*uliginosa* Schrad. 119.  
*umbrosa* Fr. 118.  
*Wahlenbergii* Beurl. 120.  
**VIOLARIÆ DC. 118.**  
*Viscaria* Röhl. 261, 123.  
*alpina* Fr. 123.  
*purpurea* Fr. 123.  
*vulgaris* Röhl. 123.  
*Viscum* L. 506, 39.  
*album* L. 39.  
*Woodsia* R.Br. 531, 280.  
*glabella* Br. 280.  
*hyperborea* Br. 280.  
*ilvensis* Br. 280.  
*lapponica* Angstr. 281.  
*Vulpia* Gm. 54, 260.  
*bromoides* Lk. 260.  
*myuros* (L.) 299.  
*myuros* var. Parl. 260.  
*sciuroides* Gm. 260.

## X.

*Xanthium spinosum* L. 291.  
*strumarium* L. 91.

## Z.

*Zannichellia* L. 481, 228.  
*major* Bönn. 228.  
*palustris* L. 228.  
*pedicellata* Fr. 229.  
*pedunculata* Reich. 229.  
*polycarpa* Nolt. 228.  
*Rosenii* Wallm. 229.  
*Zostera* L. 3, 229.  
*angustifolia* Horn. 229.  
*marina* L. 229.  
*minor* Nolt. 229.  
*nana* Roth. 229.  
*Noltei* Horn. 229.

# REGISTER

## ÖFVER DE SVENSKA SLÄGTMAMNEN.

Agh 231.  
 Akleja 95.  
 Al 196.  
 Alant 8.  
 Alder 197.  
 Alm 180.  
 Alpros 169.  
 Alté-rot 113.  
 Amarant 181.  
 Amur 163.  
 Andmat 223.  
 Andorn 53.  
 Anis 82.  
 Annbok 186.  
 Apel 144.  
 Arun 58.  
 Ask 56.  
 Asp 187.  
 Axlost 258.

Backbränna 102.  
 Backsöta 161.  
 Baldursbrå 2.  
 Benved 76.  
 Berberis 96.  
 Bergskrabba 73.  
 Bergspring 281.  
 Bingel 172.  
 Binka 9.  
 Bittermjölke 17.  
 Björk 195.  
 Björnbrodd 217.  
 Björnbärsbuske 149.  
 Björnfloka 79.  
 Bladtåg 221.  
 Blidnässla 181.  
 Blindnässla 53.  
 Blodhirs 275.  
 Blodtopp 148.  
 Blomvass 216.  
 Blåbärsbuske 168.  
 Blågull 54.

Blåklocka 41.  
 Blåkunt 46.  
 Blåsuga 53.  
 Blås-ört 69.  
 Bläcken 54.  
 Bockrot 82.  
 Bocktörne 58.  
 Bok 186.  
 Bokhvete 173.  
 Bolltistel 11.  
 Bolmört 59.  
 Bonässla 51.  
 Braxengräs 287.  
 Brudsporre 203.  
 Brunkulla 204.  
 Brunsåra 1.  
 Brunört 50.  
 Bräcka 135.  
 Bräken 282.  
 Bräsmå 101.  
 Bullerblomster 95.  
 Buna-ris 105.  
 Bunarot 82.  
 Båndling 229.

Cypergräs 231.

Daggkåpa 148.  
 Daggört 121.  
 Darrgräs 262.  
 Desmeknopp 84.  
 Dill 79.  
 Dosta 50.  
 Drakblomma 51.  
 Dufkulla 70.  
 Dunört 140.  
 Dverglummer 289.  
 Dyblad 209.  
 Dyborre 209.  
 Dyört 65.  
 Dån 53.

Ek 186.  
 Ekorrbår 215.  
 Elfaxing 275.  
 Elnatråd 36.  
 Elm 257.  
 En 198.

Fackelblomster 140.  
 Fetknopp 138.  
 Fingerhatt 61.  
 Fingerört 152.  
 Finnbår 180.  
 Finnkarv 81.  
 Finnåtel 266.  
 Fjellklint 123.  
 Fjellsåra 12.  
 Fjellsyra 178.  
 Fjellåtel 269.  
 Fjellvicker 161.  
 Fjellvipa 155.  
 Fjäderborstgräs 274.  
 Fjällnarv 132.  
 Fjällrot 68.  
 Fjåra 46.  
 Flen 277.  
 Flenört 61.  
 Floksblomster 10.  
 Flugblomma 204.  
 Foderbråken 282.  
 Fogelav 128.  
 Fogelört 110.  
 Frier 67.  
 Fross-ört 50.  
 Fryle 221.  
 Fråken 285.  
 Furgräs 287.  
 Furu 197.  
 Fyriling 140.  
 Fårpimpinell 148.  
 Fånting 124.  
 Fårgåt-mig-ej 45.

Getväpling 167.  
 Gigelsärt 162.  
 Ginst 166.  
 Glasört 185.  
 Glim 122.  
 Glis 81.  
 Gran 197.  
 Groblad 73.  
 Grodnate 90.  
 Gråbo 3.  
 Gråddådra 108.  
 Gråmålla 181.  
 Grönkulla 204.  
 Guckuskor 208.  
 Guldborste 10.  
 Guldpuddra 138.  
 Guldris 10.  
 Gulsuga 52.  
 Gultopp 171.  
 Gultraf 140.  
 Gyllen 100.  
 Gökblomma 123.  
 Hafre 267, 299.  
 Hafre-rot 16.  
 Hafre-åxing 268.  
 Haftorn 180.  
 Hagtorn 145.  
 Hallonbuske 149.  
 Hare-ris 166.  
 Harfoka 83.  
 Harkål 16.  
 Harsyra 116.  
 Hartimjan 49.  
 Hassel 186.  
 Hasselört 179.  
 Hedblomster 6.  
 Helghö 160.  
 Hexört 142.  
 Hillsko 72.  
 Hinnblad 283.  
 Hjertstilla 51.  
 Hjortron 149, 152.  
 Honungsblomma 205.  
 Hornserf 200.  
 Humle 181.  
 Humlesuga 51.  
 Hundloka 78.  
 Hundrofvä 134.  
 Hundåxing 258.  
 Hven 273.  
 Hvete 299.  
 Hvitlöksört 101.  
 Hyll 36.  
 Hållrot 179.  
 Hårnate 228.  
 Hårserf 228.  
 Hägg 156, 7.  
 Hållebråken 280.  
 Hässlebrodd 274.  
 Hästfibla 4.

Hästhofsört 11.  
 Hästkastanie 84.  
 Hökblomster 18.  
 Hölsnejlika 124.  
 Hönsarv 127.  
 Hönsbet 130.  
 Hönshirs 275.  
 Hör 116.  
 Höskallra 66.  
 Höstfibla 34.

Idgran 198.  
 Igelknopp 229.

Jernört 56.  
 Johannisört 117.  
 Jordknöple 116.  
 Jordnöt 82.  
 Jordrefva 50.  
 Jordrök 98.  
 Jungfrulin 110.

Kabbelök 95.  
 Kafveldun 229.  
 Kafvelhirs 275.  
 Kallgräs 216.  
 Kalmus 223.  
 Kardborre 14.  
 Kardtistel 35.  
 Kambråken 283.  
 Kam-åxing 258.  
 Kase 267.  
 Kassöta 155.  
 Kastlöser 94.  
 Kattfölsört 7.  
 Kattmynta 50.  
 Kattost 113.  
 Kax 78.  
 Kirs 156.  
 Kirskål 82.  
 Kjösa 273.  
 Klint 11.  
 Klintblåra 123.  
 Klockljung 169.  
 Klofibla 17.  
 Klovicka 160.  
 Kloärt 162.  
 Klubbfibla 35.  
 Klådris 172.  
 Klätt 123.  
 Klöfver 164.  
 Klöfverört 162.  
 Knafvel 173.  
 Knapp-agh 231.  
 Knappsäf 233.  
 Knappvädd 35.  
 Knipprot 206.  
 Knoppört 11.  
 Knutarv 71.  
 Knytling 173.  
 Knägräs 267.

Knärot 205.  
 Konig 49.  
 Konvalje 214.  
 Korallrot 208.  
 Koriander 77.  
 Korn 299.  
 Kornådra 105.  
 Kornell 76.  
 Kornfibla 16.  
 Korsört 5, 6.  
 Kovall 67.  
 Krasse 106.  
 Krepling 169.  
 Krislogräs 8.  
 Kristtorn 76.  
 Kronilja 211.  
 Kronärt 160.  
 Kropp 140.  
 Kruffrö 80.  
 Krusbråken 283.  
 Kryddmynta 47.  
 Kråkklöfver 152.  
 Kråkkrasse 107.  
 Kråkris 171.  
 Kummer 155.  
 Kummil 82.  
 Kungsljus 60.  
 Kungsspira 66.  
 Kål 99.  
 Kålsenap 99.  
 Kärrfoka 83.  
 Königsört 178.  
 Körvelfoka 78.

Laktuk 16.  
 Lappljung 169.  
 Ledgräs 143.  
 Libsticka 79.  
 Liguster 56.  
 Lilja 211.  
 Lin 295.  
 Lind 112.  
 Lindådra 107.  
 Lingonris 168.  
 Linnéa 40.  
 Ljung 169.  
 Lomme 106.  
 Lonke 199.  
 Lonkeserf 133.  
 Loppört 8.  
 Lota 261.  
 Lummer 288.  
 Lungört 46.  
 Lunk 173.  
 Luzern 163.  
 Läketunga 285.  
 Läkeört 83.  
 Lärkrud 197.  
 Lök 212.  
 Löksuga 53.  
 Lönn 84.

- Madd 37.  
 Madra 37.  
 Malört 3.  
 Mansblodknopp 117.  
 Manskraft 84.  
 Marehalm 270.  
 Marrisp 74.  
 Martorn 84.  
 Marviol 105.  
 Mell 184.  
 Missne 223.  
 Mistel 39.  
 Mjeltbräken 282.  
 Mjuktätel 270.  
 Mjölktistel 15.  
 Mjölornis 168.  
 Monke 43.  
 Morot 79.  
 Mossatof 234.  
 Mossrot 80.  
 Munkfnat 47.  
 Munkmössa 223.  
 Murgrön 77.  
 Mustippa 92.  
 Musört 7.  
 Myggbloster 207.  
 Mynta 47.  
 Myr-agh 231.  
 Myskegräs 277.  
 Målla 184.  
 Månviol 107.  
 Måra 38.  
 Märke 83.  
 Mästerrot 80.  
 Möblomma 97.  
 Nagelört 109.  
 Narciss 209.  
 Narvgräs 266.  
 Nate 224.  
 Nateserf 210.  
 Nattviol 100.  
 Nejlika 124.  
 Nocka 5.  
 Noppa 6.  
 Nosserot 204.  
 Notblomma 43.  
 Nunneört 97.  
 Nyckelblomster 201.  
 Nypnbuske 146.  
 Nysört 3.  
 Nälkörvel 78.  
 Näckblad 86.  
 Näckros 86.  
 Näfva 114.  
 Nässla 181.  
 Nästrot 206.  
 Nörel 129.  
 Odört 77.  
 Olvönbuske 36.  
 Ormar 257.  
 Ormbär 215.  
 Ormkagge 279.  
 Oxbarsbuske 145.  
 Oxel 144.  
 Palsternacka 79.  
 Perldrufva 214.  
 Piggfrö 47.  
 Pii 188.  
 Plister 52.  
 Polört 55.  
 Poppel 187.  
 Pors 197.  
 Potates 292.  
 Prestkrage 2.  
 Prustrot 215.  
 Punge 71.  
 Påsklilja 209.  
 Pärnträd 144.  
 Qvaller 82.  
 Ramme 234.  
 Rapunkel 43.  
 Rast 44.  
 Renfana 3.  
 Repe 257.  
 Ribs 134.  
 Riddarsporre 95.  
 Rifva 47.  
 Ripört 205.  
 Rocka 105.  
 Rosenrot 138.  
 Rosling 169.  
 Råg 299.  
 Räckenrat 103.  
 Rödarv 71.  
 Rödfloka 78.  
 Rödkulla 65.  
 Rödlonke 140.  
 Rödmålla 183.  
 Rölleka 3.  
 Rönn 144.  
 Rör 271.  
 Saffran 209.  
 Salsa 283.  
 Salepsrot 203.  
 Saltarv 129.  
 Saltmålla 183.  
 Saltört 184, 5.  
 Salvia 49.  
 Sandborst 268.  
 Sandhvita 108.  
 Sandlilja 213.  
 Sandnarv 129.  
 Sandsenap 99.  
 Selleri 82.  
 Senap 99.  
 Senegräs 266.  
 Sileshår 121.  
 Sippha 93.  
 Skalleblomma 61.  
 Skatnäfva 116.  
 Skelört 97.  
 Skogsfrubloster 207.  
 Skogsviol 204.  
 Skräp 10.  
 Skakta 216.  
 Skärffrö 106.  
 Skärfloka 83.  
 Skörbjuggsört 108.  
 Slideknä 174.  
 Slidgräs 275.  
 Slokgräs 270.  
 Slän 156.  
 Slätterfibla 34.  
 Slökesticka 77.  
 Slökorn 257.  
 Smile 268.  
 Sminkbär 183.  
 Sminkort 46.  
 Smultron 152.  
 Småborre 148.  
 Smäre 163.  
 Smörblomster 34.  
 Snarrefva 43.  
 Snyltrot 68.  
 Snödroppe 209.  
 Snöklöcka 209.  
 Sodaört 185.  
 Solvända 118.  
 Solögon 87.  
 Sommargyllen 103.  
 Spansk Körvel 77.  
 Sparris 214.  
 Spenört 79.  
 Spergel 131.  
 Spikblad 84.  
 Spikklubba 59.  
 Spindelört 179.  
 Sporrelblomma 61.  
 Sprengört 82.  
 Springkorn 111.  
 Squattram 170.  
 Stagg 277.  
 Stallört 167.  
 Starr 235.  
 Stenbräken 280.  
 Stenfrö 46.  
 Stenkrasse 101.  
 Stensöta 278.  
 Stingsel 12.  
 Stjernblomma 125.  
 Stjernlök 213.  
 Stjernntistel 12.  
 Stjernvådd 36.  
 Stockros 112.  
 Stormhau 95.  
 Strandkil 9.  
 Strandklo 49.



Strandkål 105.  
 Strandlilja 217.  
 Strandling 71.  
 Strandpryl 74.  
 Strandråg 257.  
 Strandsticka 81.  
 Strätta 80.  
 Stållört 57.  
 Stånds 5.  
 Stäkra 81.  
 Surtorn 96.  
 Svalting 216.  
 Svalört 91.  
 Svarthö 65.  
 Svartsenap 99.  
 Svingel 259.  
 Svingellost 260.  
 Svårdlilja 208.  
 Sylört 107.  
 Syra 175.  
 Syrén 56.  
 Syska 51.  
 Syssla 205.  
 Såprot 124.  
 Såpört 124.  
 Säf 232.  
 Säfferot 81.  
 Säfstarr 254.  
 Säl 188, 191.  
 Sälting 217.  
 Sötblomster 2.  
 Sötgräs 274.  
 Taggbräken 279.  
 Taklök 138.  
 Tall 197.  
 Tallört 171.  
 Tandört 101.  
 Tibast 180.  
 Tidlösa 215.  
 Timjam 49.  
 Tistel 13.

Tistelborre 12.  
 Tjärblomma 123.  
 Toffelblomma 207.  
 Tofs-äxing 267.  
 Tolta 15.  
 Tomt-tistel 12.  
 Topplösa 71.  
 Toste 135.  
 Tranbär 168.  
 Trefingerört 155.  
 Trift 74.  
 Trollbär 59.  
 Trolldrufva 96.  
 Try 40.  
 Tulkört 57.  
 Tulpan 211.  
 Tungört 45.  
 Tusenskön 8.  
 Tväblad 206.  
 Tåg 217.  
 Tätört 70.  
 Törel 171.  
 Törne 146.  
 Vallkrasse 107.  
 Vallmo 96.  
 Vallört 44.  
 Vass 270.  
 Vatten-arv 125.  
 Vattenblink 72.  
 Vattengröe 265.  
 Vattenklöfver 54.  
 Vattenkrasse 104.  
 Vattenslinga 142.  
 Vejde 105.  
 Vendelrot 36.  
 Vetteljus 8.  
 Vetteros 68.  
 Vial 157.  
 Vicker 158.  
 Vide 188.  
 Videört 70.

Vifva 71.  
 Vildhvet 255.  
 Vildpersilja 81.  
 Vinda 43.  
 Vintergrön 170.  
 Viol 118.  
 Vipppa 94.  
 Vippärt 158.  
 Visil 121.  
 Vårbrodd 277.  
 Vårlok 213.  
 Vårsallat 37.  
 Vägsenap 100.  
 Vägvrda 15.  
 Väpling 164.

Wau 85.

Zymbel 206.

Åkerkullor 2.  
 Åkervädd 35.

Åfjebrodd 65.  
 Ångkaffe 276.  
 Ångkampe 276.  
 Ånggröe 262.  
 Ångskrasse 101.  
 Ångsruta 92.  
 Ångsskära 12.  
 Ångstikka 81.  
 Ångstäl 269.  
 Ångsull 234.  
 Årenpris 62.  
 Årter 157.

Ögonblomma 45.  
 Ögontröst 66.

## TILLÄGG OCH RÄTTELSE.

Pag. xx, efter r. 38 tillägges:

158<sup>1</sup>/<sub>2</sub> MEUM. Kronbl. ovala. Delfr. högt konvexa, aflånga, med upphöjda breda åsar, samt oljeränder. Allm. svepe 0 ell. snart affallande. — Pag. 81.

Pag. 65, r. 37 står: 579 läs: 573.

Pag. 81, efter r. 20 tillägges:

172<sup>1</sup>/<sub>2</sub> MEUM Tourn. Björnrot.

\*1 M. *athamanticum* Jacq. stj. trind, strimmig, glatt; bladen 2—3dubb. parbl. delade, med trådsmla flikar; det enskilda svepet af 3—8, n. syl-likä blad. 24 7, 8, hvitg. ell. rödakt. blr. Fig. Reich. t. 91, f. 1.

Fjeldalar, r. (N. Bergens stift, vid Tysnes: Amtmand Meinich, enl. uppg. af Prof. Fries och Ax. Blytt.) *Omkring fotshög, till alla delar glatt växt, med n. bladlös stjeln; bladen, jemte stidor tillhör. föreg. årets blad, samlade vid rotstockens spets; blrna valluktande.* — *Athamania Meum* L.

Pag. 81, r. 24 står: hv. blr

läs: blekg. blr.

» 102, r. 32 » Hörn.

» Horn.

» 132, r. 36 » Leipig.

» Lepig.

» 138, r. 2 » CRYOSPLENIUM

» CHRYSOSPLENIUM.

» 139, r. 40 » Hallonskär

» Halleskär.

» 155, r. 11 » eggrunda

» äggrunda.

Pag. 155, efter r. 37 införes:

\*4 G. *pallidum* C. A. Mey. kort glandelhårig ell. n. glatt; stjelkl. 3delade; blrna luktande; kronbl. n. kortare än fodret, hvita, med n. njurformig skifva och utdragen klo; fruktsprötets nedre del dubb. längre än den qvarsittande öfre. 24 6. Fig.

Tor. st. r. (N. Abildsöe vid Christiania, funnen i Juni 1869 af Med. Stud. N. Wulfsberg.) *Spädare än föreg.; hela örten, afven fodret, blekgrön. Allt enl. meddelande af Scheutz; osedd af utg.*

Pag. 184, r. 3 står: *peganum* läs: *paganum*.

Pag. 232, r. 29 läs: *nedtill* trubb. 3kantig.

Pag. 232, efter r. 34 införes:

\*3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> S. *radicans* Schk. strået som hos föreg.; axen i knippet skaftade, icke hufvudlikt gytttrade; axfjällen trubbiga, utan udd; kalkborsten flerböjda, mycket längre än nöten. 24 7. Fig. Reich. f. 732.

Våta st. r. (N. Hitterdal i Tellemarken: Stud. Grönstad, enl. uppg. af Prof. Fries och Ax. Bl.) *Stor som föreg., hvarifrån den måhända ej är nog skiljd. Stråen flere tillsammans, en del nedligg. och rotsläende; axen mer åtskiljd, längre och smälare än hos S. silv. Norska ex. osedda af utg.*

Pag. 248, r. 39 står: Hasselskog läs: Hesselkog.

Pag. 266, efter r. 21 införes:

- \*8 *G. procumbens* Sm. stråh tufvade, nedligg. ell. uppstigande; den *lilla* och n. *ensidiga* vippans nedre grenar *ensamma* ell. *parvisa*, *korta* och *upprätta*, sträfvä; småaxen smalt aflånga, omkr. 4blommiga; blomstj. aflånga, *starkt* nerviga, med trubbig ell. tvärhuggen spets. ☉ 6, 7. Fig. E.B.532. Reich.Gram.369.

Hälsstr. r. (N. Grejs Fiskevær utanför Christianssund: Kateket Greve enl. uppgift af Ax. Bl.) Omkr. *quartershög*, med *breda* *platta* blad; utmärkt af de *alltid styfva* och *upprätta*, n. *ända till basen småaxbärande vippgrenarne*. — *Sclerochloa* P.B.

Pag. 298, r. 30 tillägges:

Denna art (*Sc. verna*) har enl. uppgift af Prof. Fries och Ax. Blytt verkligen förledet år blifvit funnen i Norge på ön Alden utanför kusten af Sandfjord.

1. The first of the three  
principles of the system  
is the principle of the  
unity of the system.

2. The second of the three  
principles of the system  
is the principle of the  
unity of the system.

10







